

디지털신호처리

Homework #2

정원국 교수님

전자정보공학부

20180474 남아리

1. $x(n) = u(n) - u(n - 10)$ 에 대하여, 가장 낮은 주파수 성분 ($\omega = 0$)과 가장 높은 주파수 성분 ($\omega = \pi$)의 크기를 각각 구하여라.

	n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	$x(n)$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$X(\omega)$
$\omega = 0$ (최저주파수)	$e^{-j\omega n}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	$x(n)e^{-j\omega n}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
$\omega = \pi$ (최고주파수)	$e^{-j\omega n}$	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	
	$x(n)e^{-j\omega n}$	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	0

∴ 주파수 성분에 대해 표로 나타내면 위와 같다. 그러므로 가장 낮은 주파수 성분의 크기는 10이고, 가장 높은 주파수 성분의 크기는 0이다.

$$X(\omega = 0) = 10, \quad X(\omega = \pi) = 0$$

2. 정의식을 이용하여 $X(\omega)$ 를 수식으로 구하여라.

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$u(n) \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (1 \cdot e^{-j\omega})^n \quad (\because u(n) = 0 \text{ for } n < 0) = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}}$$

$$u(n - 10) \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (1 \cdot e^{-j\omega})^n - \sum_{n=0}^9 (1 \cdot e^{-j\omega})^n$$

$$x(n) = u(n) - u(n - 10)$$

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} \{u(n) - u(n - 10)\} \cdot e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} u(n) \cdot e^{-j\omega n} - \sum_{n=0}^{\infty} u(n - 10) \cdot e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (1 \cdot e^{-j\omega})^n - \left(\sum_{n=0}^{\infty} (1 \cdot e^{-j\omega})^n - \sum_{n=0}^9 (1 \cdot e^{-j\omega})^n \right) \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^9 (1 \cdot e^{-j\omega})^n = 1 + e^{-j\omega} + e^{-2j\omega} + \dots + e^{-9j\omega}$$

$$\therefore X(\omega) = \sum_{n=0}^9 (1 \cdot e^{-j\omega})^n = 1 + e^{-j\omega} + e^{-2j\omega} + \dots + e^{-9j\omega}$$


3. $|X(\omega)| = 0$ 을 만족하는 주파수를 모두 구하여라.

$$\tau = 10$$

$$2\pi \times \frac{1}{\tau} = 2\pi \times \frac{1}{10} = 0.2\pi$$

$$\therefore \frac{1}{5}\pi, \frac{2}{5}\pi, \frac{3}{5}\pi, \frac{4}{5}\pi, \pi \quad (= 0.2\pi, 0.4\pi, 0.6\pi, 0.8\pi, \pi)$$

4. $|X(\omega)|, \angle X(\omega)$ 를 matlab을 이용하여 sketch하라.



1. $x(n) = u(n) - u(n - 10)$ 이라서 $0 \leq n \leq 9$ 까지만 1이고 다른 영역에서는 zero이다. 그래서 n 의 범위는 0부터 10으로 설정하였다.

2. discrete-time signal은 주파수영역에서 2π 의 주기성을 갖기 때문에 0부터 2π , 또는 $-\pi$ 부터 π 등 2π 구간만 확인하면 된다. 그런데 우함수, 기함수 같은 함수의 성질을 이용하면 half-period만 확인해도 충분하기 때문에 ω 의 범위를 $0 \leq \omega \leq \pi$ 으로 설정하였다.

3. ω 는 연속변수이기 때문에 $0 \leq \omega \leq \pi$ 구간을 등간격 $\frac{\pi}{500}$ 로 나누어서 계산하였다.

4. 오른쪽 위가 $|X(\omega)|$, 오른쪽 아래가 $\angle X(\omega)$ 에 대한 sketch이다.