

Lęk przed lataniem

Protokół od 14 dni przed lotem do lądowania — 8 kroków

30% pasażerów doświadcza lęku przed lataniem (Boeing, badanie 2018). 6% nie lata w ogóle. Co dziwne — lęk przed lataniem zwykle nie znika sam z czasem — wzrasta. Każdy nie-przelecony lot wzmacnia unikanie.

Ten protokół nie polega na „przekonywaniu się, że samolot jest bezpieczny”. Polega na przebudowie reakcji układu nerwowego przed, w trakcie i po locie. Wystarcza dla większości osób z „zwykłym” lękiem przed lotem (nie z fobią medyczną).

Statystyka, która działa: Twoje szanse na śmierć w wypadku lotniczym to 1 do 11 milionów (NSC, 2022). Szanse na śmierć w drodze na lotnisko samochodem — 1 do 88. Auto, którym dojechałeś, było 125,000 razy bardziej niebezpieczne niż samolot.

Etap 1 · 14 dni przed lotem

Krok 1 · Codzienna autohipnoza spokoju (10 min)

Codziennie, najlepiej rano. Protokół „Spokój w 10 minut” (osobny PDF) lub:

Położ się. 5 cykli oddechu 4-7-8. Skan ciała od stóp w górę. Sugestia: „Czuję się bezpiecznie. Moje ciało wie jak się zregenerować.”

Cel: stworzyć kotwicę spokoju — znajomą reakcję ciała, którą uruchomisz potem na lotnisku.

Krok 2 · Fakt-check (raz, 30 minut)

Usiądź ze szczerym pytaniem: czego konkretnie boję się? Awarii silnika? Turbulencji? Atak panicznego lęku w środku lotu? Klaustrofobii?

Dla każdego konkretnego lęku — sprawdź fakty: jak często się zdarza, jak załoga reaguje, ile potrwa, jak się objawia.

Wiedza nie eliminuje lęku. Ale daje punkty zaczepienia, gdy lęk zaczyna kręcić spirale.

Etap 2 · 7 dni przed lotem

Krok 3 · Wizualizacja udanego lotu (5 min, codziennie)

Zamknij oczy. Wyobraź sobie cały lot — od wejścia na pokład do wylądowania. Krok po kroku, ze zmysłami.

Co widzisz, co słyszysz, co czujesz ciałem. Turbulencje — zauważasz, oddychasz, mija. Lądowanie — koła dotykają pasa, oddech ulgi.

Tym samym mechanizmem co IRT (Imagery Rehearsal Therapy) na koszmary — trenujesz nową reakcję.

Etap 3 • Dzień lotu

Krok 4 • Rano przed lotem (15 min)

Lekkie śniadanie. Bez kawy — kofeina nasili pobudzenie. Zielona herbata OK.

Autohipnoza spokoju (jak w kroku 1).

Pakując się — wybierz 3 rzeczy kotwicy: książka którą lubisz, słuchawki z muzyką/podcastem, butelka wody.

Krok 5 • Na lotnisku (przed wejściem na pokład)

Pojawiający się lęk jest oczekiwany, nie błąd. Nie zwalczaj go. Zauważ i nazwij: „Tu jest mój lęk przed lotem. Witam.”

Trzy fizjologiczne wzdechy. Trzy razy w razie potrzeby.

Zadzwoń do kogoś bliskiego — nie po to żeby narzekać, tylko żeby porozmawiać o czymś codziennym. Wyciąga z spirali.

Etap 4 • W trakcie lotu

Krok 6 • Start

To zwykle najtrudniejsze 5 minut. Silniki, hałaśliwość, przyspieszenie, kąt.

Oddech 4-7-8. 6 cykli — trafia dokładnie w czas startu.

Skup uwagę na jednej rzeczy: książka, podcast, modlitwa, mantra. Nie patrz w okno (chyba że widoki Cię uspokajają).

Krok 7 • Turbulencje

Turbulencje to powietrze nie samolot. Samolot jest zaprojektowany na 3x siły, które występują w najgorszych burzach. Nie złamie się.

Gdy turbulencja zaskakuje — trzy fizjologiczne wzdechy. Skupisz się na fizycznych odczuciach (siedzenie pod tobą, podarko pod stopami).

Sugestia: „To powietrze. Samolot wie co robi. Moje ciało jest bezpieczne.” Powtórz w myślach 5 razy.

Krok 8 • Lądowanie

Druga trudna chwila. Tu zwykle „czujesz” w żołądku spadanie.

Oddech przeponowy, długie wydechy. Skup się na czymś konkretnym przed sobą (pasażer, ekran, książka).

Po lądowaniu — zauważasz: udało się. To doświadczenie wpisuje się w pamięć. Następnym razem będzie lżej.

Po lądowaniu: nie umniejszaj. Nie mów „nic wielkiego, leciałem zwyczajnie”. Mów sobie wprost: „Leciałem mimo lęku. To się udało.” Mózg utrwala to, co celebrujesz.

Czego unikać

Alkohol przed lotem — daje pozorną ulgę, ale podnosi pobudzenie po 2–3 godzinach. Tłumi też sygnały ciała, że „mija” — przeszkadza w utrwalaniu nowej reakcji.

Leki uspokajające bez konsultacji — jednorazowo OK, ale jeśli planujesz częste loty, regularne benzodiazepiny tworzą uzależnienie psychiczne.

„Pewna miejsce” zawsze przy oknie/przy korytarzu — usztywnia wzorzec. Po opanowaniu protokołu, zmieniaj miejsca — pokazujesz mózgowi, że dasz radę wszędzie.

Kiedy potrzebna pomoc 1-na-1

Jeśli ten protokół nie wystarczy — lub jeśli doświadczasz pełnoobjawowych ataków paniki w czasie lotu — warto rozważyć indywidualną sesję hipnoterapii. Praca 1-na-1 pozwala wyjść poza sam fakt latania — zwykle lęk przed lotem ma głębszą strukturę (kontrola, klaustrofobia, lęk śmierci, wcześniejsze doświadczenie).

2–4 sesje wystarczy zwykle, żeby uniezależnić się od lęku przed pojedynczym, zaplanowanym lotem.

Ten protokół jest narzędziem rozwojowym. Nie zastępuje terapii ani leczenia. Jeśli problem utrzymuje się mimo regularnego stosowania — warto sięgnąć po wsparcie 1-na-1 (psychoterapia, hipnoterapia, lekarz).

Tomasz Bochenek · Hipnoterapeuta · Gdańsk
hipnoterapiabochenek.pl · @hipnoterapiabochenek

Materiał do użytku osobistego. Hipnoterapia jest wsparciem rozwojowym i nie zastępuje opieki medycznej ani psychiatrycznej. Jeśli doświadczasz myśli samobójczych lub objawów ostrej choroby psychicznej — zadzwoń na 116 123 (Telefon Zaufania) lub 112.