

LUMBAR SYMPATHETIC BLOCK · 문헌고찰

# 요추교감신경차단

---

방법 · 적응증 · 효과

Technique · Indications · Efficacy

## 전체 흐름 · ROADMAP

# 어떤 병에 → 어디를 → 이 환자가 맞나 → 어떻게 → 되었는지

### ① 질환

LSB가 듣는 병 — 특발성 SMP가 최우선, 이어 당뇨병성 신경병증·허혈성 안정통·하지 CRPS

### ② 해부

교감신경간은 척추체 전외측 L2-L3 — 표적과 주변 위험 구조

### ③ 감별

밤·하지 증상 중 LSB 적응이 아닌 것을 걸러낸다 — ABI·도플러가 출발점

### ④ 술기·안전

투시+조영제로 정확히 — 합병증은 대부분 회피·관리 가능

### ⑤ 확인·효과

진단적 차단 반응으로 SMP 확정 → 관류 실측·통증 감소 (근거수준과 함께)

# LSB는 어떤 병에 쓰나 — 적응증 우선순위

| 질환 (임상 비중 순)        | 핵심 소견 — 감별점                                 | LSB  |
|---------------------|---------------------------------------------|------|
| ① SMP 우세형 (원인 불명)   | 작열통·이질통 + 좌우 온도·색·발한 차 · 신경 하나의 영역보다 넓게     | ○    |
| ② 당뇨병성 신경병증         | 양측 '양말' 분포 저림·화끈거림 · 야간 악화 · 모노필라멘트·진동감각 저하 | ○    |
| ③ 허혈성 안정통 (PAD·CLI) | 파행 → 야간 안정통 · 다리를 내리면 완화 · 차고 창백한 발 · ABI↓  | ○    |
| ④ 하지 CRPS (I/II)    | 손상 정도에 비해 과도한 작열통·이질통 · 부종 · 색/온도 좌우차       | ○    |
| ⑤ 난치성 하지통 (암성·수술후)  | 원인 병소는 설명되나 통증이 남음 — 진단적 차단이 양성일 때만         | △    |
| ⑥ 본태성 다한증           | 통증이 없다 — 표적이 발한이지 진통이 아니다                   | ○ 발한 |

ABI = 발목-상완 혈압비(정상 0.9–1.3, 낮으면 동맥 협착) · 공통 관문은 SMP인가, 확정은 차단 반응 · 근거는 임상 비중과 역순(③만 위약대조 RCT 양성, PMID 3898891)

# 무엇을 걸러내나 — 증상은 비슷해도 LSB 적응이 아니다

| 질환             | 핵심 소견 — 감별점                                                                       | LSB |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 특발성 야간경련 (NLC) | 통증성 <b>근수축</b> · 만져지는 근경직 · <b>족배굴곡으로 완화</b>                                      | ×   |
| RLS (하지불안)     | <b>움직임 충동</b> · 움직이면 완화 · 근경직 없음                                                  | ×   |
| 정맥부전·정맥류       | 부종·무거움 · <b>저녁</b> 악화 · 압박·거상으로 완화 — 교감차단은 <b>동맥 유입만 늘리고 정맥 유출은 못 고친다</b> (부종 위험) | ×   |

이 셋은 밤·하지 증상이라는 걸모습만 겹친다. 기전이 교감신경이 아니므로 차단해도 듣지 않는다.

감별의 출발점은 ABI·도플러 — 동맥성 여부부터 가른다 · 앞 슬라이드의 적응 5개와 짝을 이룬다



## 교감신경 매개 통증(SMP) — 환자는 이렇게 호소한다

- **통증:** 바탕에 타는 듯한 작열통이 깔리고, 스치기만 해도 아프다(이질통).
  - “양말이 닿아도 아파요” · “이불이 스치면 소스라쳐요”
- **범위:** 신경 하나의 지배영역보다 넓게 — “무릎 아래가 다 아파요”.
- **눈에 보이는 변화:** 좌우 발의 색·온도가 다르다 · 땀이 유난히 많거나 없다 · 붓는다.
- **악화 조건:** 추울 때·긴장할 때 심해지고, 밤에 더하다.
- **오래되면:** 피부가 얇고 반들거리며 털·발톱이 변하고 관절이 굳는다.

이 그림은 의심 단서일 뿐 — 차단으로 통증이 줄면 **SMP**, 안 줄면 **SIP**. 한 환자 안에 두 성분이 섞이고 만성화될수록 SIP로 기운다.

## 환자 증상·호소 ②-1 — 당뇨병성 신경병증: 통증의 성질과 분포

- 감각 양성증상: 화끈거림 · 저림·찌릿한 전기 통증 · 쑤심 · 이질통 · 통각과민
- 감각 음성증상: 감각저하·먹먹함 — “양말을 겹쳐 신은 느낌” · 위치감각 저하로 휘청임
- 분포: 양측 대칭 ‘양말’ 형 — 발끝에서 시작해 위로 올라온다.
- 시간 양상: 밤에 악화 — 수면 방해가 주 호소인 경우가 많다.
- LSB 효과 — 정직하게: 통제된 수치가 없다. 유일한 RCT는 양 군 모두 신경파괴였고, 차단만의 효과는 증례 수준.

호소 그대로: “발이 저리고 화끈거려요” · “밤에 더 심해서 잠을 못 자요” · “전기가 찌릿 와요”

Zhang 2020(PMID 32915421, n=60)은 두 군 모두 알코올 신경파괴 — 국소마취제 단독군이 없다 · 증례 PMID 22606406

## 환자 증상·호소 ②-2 — 당뇨병성 신경병증: 자율신경 소견과 진찰

- **자율신경 동반(= SMP 단서):** 발이 차갑거나 화끈 · 좌우 온도·색 차이 · 발한 증가/감소 · 피부 건조·부종
- **진찰:** 모노필라멘트·진동감각 저하 · 발목반사 소실 · 발톱 변화
- **당뇨발이면: 궤양·관류저하 동반** — 통증뿐 아니라 **창상 치유**도 기대 효과.

1차는 혈당조절 + 약물(가바펜틴·프레가발린·듀록세틴). **난치성일 때 LSB를 얹어 보는 자리**이지 1차 치료가 아니다.



## 밤에 저리고 화끈거리는 다리 — 당뇨병성 신경병증과 LSB

- **임상상:** 당뇨병성 말초신경병증 — 발·종아리 **저림·화끈 거림·전기 찌름**, 양측 '양말' 분포.
- **야간통:** 이불 온기·야간 순환·주의분산 소실 → 밤에 증 폭·수면 방해.
- **감별:** RLS(움직이면 완화)·NLC(경련)·허혈성 안정통과 구분.

1차: 혈당조절+약물(가바펜틴·듀록세틴) → 난치성이면  
**LSB 고려**

### LSB — 치료 삽입

- **기전:** 교감차단 → **미세순환↑** + 교감매개통 차단.
- **근거:** 국소마취제 차단만의 통제된 자료는 없다 — **증례 수준**.
- **적용:** 진단차단이 양성일 때 **반복 차단**으로.



## 신경병증은 당뇨병성만이 아니다 — 종류와 LSB 적용

| 분류      | 대표 질환                               | LSB 적용           |
|---------|-------------------------------------|------------------|
| 대사성     | 당뇨병성 말초신경병증(DPN) · 알코올성 · 영양결핍(B12) | △ 난치성 <b>RCT</b> |
| 감염후     | 대상포진후신경통(PHN) 하지 분절 · HIV 신경병증      | △ 선택적            |
| 약제성     | 항암제 유발 말초신경병증(CIPN) — 옥살리플라틴·타ксе   | △ 보고 수준          |
| 외상·수술후  | 환상지통·단단통 · 신경손상 후 통증 · 수술후 신경병증     | ○ SMP 흔함         |
| 교감매개 대표 | <b>CRPS I / II</b> (반사교감이영양증·작열통)   | ◎ 대표 적응          |
| 압박·유전성  | 요추신경근병증 · 포착신경병증 · 유전성(CMT)         | × 원인치료 우선        |

**핵심: 병명보다 교감신경 매개 통증(SMP)인가가 관건 — 진단적 차단으로 확인 후 결정.**

교감신경 매개 통증(SMP) 요소가 클수록 LSB 반응이 좋다 · StatPearls; 문헌고찰 종합

## 환자 증상·호소 ③ — 허혈성 안정통 (PAD·CLI·버거병)

- **파행부터 갈라야 한다** — 걷다 아프고 쉬면 낫는 것은 **척추관협착(신경인성)**도 똑같다.
  - **혈관성**: 아픈 거리가 일정 · 서 있기만 하면 안 아픔 · 자세와 무관하게 쉬면 완화 · 맥박↓ · **ABI↓**
  - **신경인성**: 거리가 들쭉날쭉 · 서 있기만 해도 유발 · 허리를 굽히면 완화 · 맥박·ABI 정상
  - **신경인성 파행에 LSB는 듣지 않는다** — 구조적 압박 문제라 교감신경 축이 아니다.
- **안정통(진행기)**: 누우면 악화, **다리를 침대 밖으로 내리면 완화** — 야간에 심해 수면 방해.
- **진찰**: 차고 창백한 발 · 말초맥박 감소 · 재충혈 지연 · 발톱 비후·털 소실 · **ABI**

호소 그대로: “걸으면 종아리가 터질 듯 아파요” · “밤에 발이 시려 잠을 못 자요” · “상처가 안 아물어요”

ABI = 발목 수축기압 ÷ 상완 수축기압 · 정상 0.9–1.3 · ≤0.9 PAD · <0.4 중증허혈 · >1.3은 중막석회화로 위음성(당뇨·만성신부전에서 혼함) → 이때는 발가락-상완지수(TBI)나 도플러 파형으로 확인

## 환자 증상·호소 ④ — 하지 CRPS

- **SMP의 전형** — 증상 목록은 5쪽과 같다. CRPS에서 다른 점은 **유발 사건이 있고 통증이 그에 비해 과하다**는 것.
- **흔한 방아쇠**: 골절·염좌·수술·석고 고정 — 손상은 나았는데 통증만 남아 커진다.
- **진단은 임상(Budapest 기준)**: 감각·혈관운동·발한/부종·운동/영양의 **네 축**에서 증상과 징후를 확인한다.

**조기(≤12개월)에 하는 것이 유리하다** — 관절 강직·근위축이 굳기 전에.

증상 자체는 5쪽 SMP와 같다 — 여기서는 CRPS만의 판단 포인트만 다룬다 · StatPearls; 문헌고찰 종합



## 환자 증상·호소 ⑤ — 난치성 하지통 (암성·수술후·외상후)

- **암성 골반·하지통:** 골반강 종양·후복막 침범·골전이 — 깊은 쑤심에 작열·발작통이 겹치고 마약성 진통제로도 불충분.
- **수술후·외상후:** 절단 후 **환상지통·단단통**, 신경손상 후 통증 — 발작적 찌름·작열, 추위에 악화.



이 군은 병명이 아니라 **진단적 차단의 반응**으로 고른다 — 원인 병소가 설명돼도 통증이 남을 때 없어 보는 자리.

## 개요 · 해부 · 원리

- LSB는 70년 이상 다양한 하지 통증·허혈 질환에 사용되어 왔다.
- 표적: 신경절 밀도가 가장 높은 **L2-L3**(척추체 전외측). 일부 L2/L3/L4 다분절.
- 원리 ①: 교감신경 차단 → 혈관 확장·측부순환 증가 → 조직 산소화 개선.
- 원리 ②: 교감신경 매개 통증(sympathetically-maintained pain) 경로·자율신경 동반 구심로 차단.

이 강의는 **국소마취제 차단**(진단적·치료적)만 다룬다 — 신경파괴는 우리 손에서 하는 시술이 아니다.


## 해부 요추 교감신경간 — 어디를 겨냥하나



교감신경간은 척추체 **전외측**을 좌우로 종주하며 **대동맥에 바짝 붙어** 지나간다 — LSB 표적은 **L2-L3**. 복강(T12-L1)·상·하장 간막 신경절은 대동맥 전면. 이 인접성 때문에 **혈관 손상·혈관내 주입**이 핵심 위험이고, 조영제로 확산을 반드시 확인한다. · 좌: 오리지널 도해 / 우: 해부학 교과서 도판(교육용 인용)



## L2·L3 조감도 — 표적과 위험 구조



표적=척추체 전외측 교감신경절 · 방척추(정중선 ~7cm) 접근 · 대동맥·IVC·요관·신장·생식대퇴신경·추간공 회피 15

## 방법 (Technique)

- **표준: 방척추 접근 + 투시** (CT·초음파도 가능)
- 바늘: 정중선 ~7 cm 외측 → 척추체 접촉 후 전내측 'walk'
- **바늘·용량:** 22G 7인치 Quincke(**끝을 굽혀** 사용) · 레벨당 총 10-20 mL(예: 0.25% 부피바카인 10 mL)
- 조영제로 **두미측 종방향 확산** 확인
- **성공 지표: 피부온도  $\geq 2^{\circ}\text{C}$  ↑**

약제: 리도카인 1% · 부피바카인 0.25-0.5% · 로피바카인 — **국소마취제만**



## 실제 투시 술기 — 사위 → 측면 → 정면 순서

- ① 사위상(**Scotty dog**)을 L2에서 얻고, 진입로가 열릴 때까지 **더 사위로** 회전.
- ② 진입점: L2 하외측연 바로 외측 — 긴 주사기를 **지시자(pointer)**로 체표에 표시.
- ③ 척추체 접촉 후 **외측으로 walk** — 척추체 전외측으로 미끄러뜨린다.
- ④ 측면상 전환 → **내측·전방**을 겨냥, 끝이 **척추체 바로 앞에** 오도록 진행.
- ⑤ **조영제 실시간 주입 — 두미측 확산 확인, 혈관 조영 배제.**
- ⑥ **L3 반복** → **흡인 음성** 확인 후 주입 · 정면상에서 최종 위치 확인.

L2·L3 바늘을 모두 거치한 뒤 측면상으로 전환하면 빠르다 — 숙련 시 약 5분.




# 투시 영상으로 본 술기 — 바늘은 이렇게 들어간다




① 사위상(Scotty dog) — L2 하외측연에 바늘 접촉



② 척추체 따라 외측으로 walk — 전외측으로



③ 측면상 — L2-L3 바늘이 척추체 전방까지




④ 정면상 — 최종 위치에서 바늘 끝이 더 내측

## 약물은 어디로 퍼지나 — 표적과 확산



① 표적: 척추체 전외측 교감신경간(분홍)



② 피부·연부조직 국소마취



③ 바늘 끝을 교감신경간 옆으로



④ 약물 확산 — 신경간을 따라 종방향

3D 의학 애니메이션 스틸 · 분홍=교감신경간(척추체 전외측), 파랑·보라=약물 확산 · 실제 확산 범위는 반드시 조영제로 확인 · 교육용 인용


## L2·L3 시술 — 전·중 주의할 점

- **영상 유도 필수:** 투시(또는 CT). **조영제**로 두미측 종방향 확산 확인 — 후방(추간공)·혈관 확산 시 즉시 재위치.
- 바늘 끝은 척추체 전외측에 — **psoas·추간공 진입 금지.**
- **요추신경총 차단과 혼동 금지** — 그쪽 표적은 **psoas 구획(체성신경)**, LSB에선 **피해야 할 구조.**
- 레벨은 **L2 하1/3~L3 상1/3, L4로 내려가지 말 것**(생식대퇴신경통 급증).
- **흡인 후 분할·점진 주입**(혈관내·경막외 조기 발견) · 소량 시험주입.
- **항응고·항혈소판제 중단**(심부·후복막 차단 — 출혈 위험) · 무균술.

성공지표 온도  $\geq 2^{\circ}\text{C}$  ↑ 확인 · 시술 후 혈압·하지 근력/감각 모니터.



## 대동맥·IVC·신장을 피하는 법 — 뼈를 놓치지 않는다



핵심 3가지 — ① 척추체 접촉을 유지한 채 뼈를 따라 미끄러뜨린다 ② 측면상에서 바늘 끝을 척추체 전연 앞으로 넘기지 않는다 ③ 너무 외측이면 신장, 너무 내측이면 추간공 · 오리지널 도해

## 혈관·신장 천자 — 실제로 어떻게 피하나


뼈를 놓치지 말고, 전연을 넘기지 말고, 넣기 전에 조영제로 확인한다.

- ① 뼈를 기준으로: 척추체 **접촉을 유지**한 채 외측으로 walk — 뼈를 놓치면 깊이 감각을 잃는다.
- ② 전연을 넘기지 않는다: 측면상에서 끝이 척추체 **전연 바로 앞**이면 정지 — 더 가면 **대동맥(좌)·IVC(우)**.
  - 우측 접근은 **IVC**가 먼저 — 벽이 얇아 흡인 음성이어도 관통될 수 있다.
- ③ 신장: **L1-L3** 높이 후외측 — **과도하게 외측**으로 들어가면 지난다. 정중선 ~7 cm를 지키고, 마른 환자·신장하수는 **하극을 먼저 확인**.
- ④ 넣기 전 확인: **흡인(혈액·소변) → 조영제 → 혈관 음영**이면 즉시 재위치.

안전 · 핵심기술

조영제 읽기

## 조영제 확산 읽기 — 이 패턴이면 멈춰라



실시간 조영제가 최고의 안전장치 — 종방향(위·아래) 확산만 진행 · 혈관·경막외·근육내 패턴이면 즉시 바늘 재위치·재확인




# 합병증 & 회피법

| 합병증             | 원인·기전                               | 피하는 법                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 생식대퇴신경통 (5-10%) | psoas 역류·자극 ( <b>L2 0%·L4 40%</b> ) | <b>L4 회피</b> ·psoas 주입금지·최소용량 |
| 혈관손상·혈관내주입      | 대동맥/IVC·요추혈관 인접                     | 투시+ <b>흡인+조영제</b> ·항응고 중단     |
| 요관·신장 천공        | 후복막 장기 인접                           | 조영제로 깊이·궤적 확인                 |
| 체성신경·신경축 확산     | 바늘 후방→경막외 tracking                  | 바늘 <b>전외측 유지</b>              |
| 기립성 저혈압         | 교감차단 → 혈관확장                         | 수액·서서히 기립· <b>양측 신증</b>       |
| 생식기능 영향         | 양측 <b>L1-L2</b> 동시 차단               | L1-L2 양측 동시 차단 회피             |

핵심: 투시+조영제로 확산 확인 · 바늘 전외측 유지 · L2~L3 표적.

## 생식대퇴신경통 — 가장 흔한 걱정, 대부분 회피 가능



회피: L2하~L3상 표적·L4 회피·psoas 주입금지·소량 / 발생 시: 대개 수 주 내 자연호전·신경병증통 약물로 대증  
· Feigl 1998(PMID 9425975)

## 혈관·LAST·신경 손상 — 조기 인지와 대응

- **LAST(국소마취제 전신독성):** 입 주변 저림·이명·금속맛·어지럼 → 경련·부정맥.
- 대응 — 즉시 중단·산소/기도·경련조절·**20% 지질유탕액 정주**·소생술. 예방 — 흡인+조영제+분할주입+용량제한.
- **신경·신경축:** 주입 중 방사통·하지 위약 → 즉시 중단·재위치. 시술 후 근력·감각 확인.
- **출혈·감염:** 항응고 중단·무균술 · 심한 통증·발열·팽창 시 즉시 평가.

준비된 상태(모니터·정맥로·지질유탕액)면 대부분 안전하게 관리된다.



## 합병증 대비 — 준비·조기인지·환자설명

- **대부분 경미·자가회복** — 심각 합병증은 영상유도·정확한 술기로 드묾.
- **준비:** 모니터·정맥로·응급장비·**20% 지질유탕액** 구비, 소생 프로토콜 숙지.
- **조기 인지:** 조영제 패턴 + 환자 증상(통증·저림·어지럼)을 실시간 관찰.
- **환자 설명(동의):** 흔한 것(일시적 저림·주사부위통·저혈압) vs 드문 것(신경통·출혈)을 사전 고지 → 신뢰·불안↓.

용량은 최소로 — 확산이 넓을수록 위해가 높다.

## 확인 과 효과 — 진단적 차단으로 SMP를 확정한다

- ① 차단이 되었나 — 피부온도  $\geq 2^{\circ}\text{C}$  상승. 되지 않았으면 판정 자체가 불가하다. 재위치·재시도.
- ② 통증이 줄었나 — 줄면 **SMP**(교감신경 매개 통증, sympathetically maintained pain).
  - 반복 차단으로 효과가 누적되는지 확인한다 — 지속되지 않으면 다른 축을 본다.
- 줄지 않으면 **SIP**(교감신경 비의존성 통증, sympathetically **independent** pain) — 교감신경이 원인이 아니다.
  - 교감신경 축을 더 밀지 않고 **방향을 바꾼다** — 약물·체성신경 차단·재활·정신사회적 요인.

순서를 뒤집지 않는다 — 먼저 차단이 되었는지(온도), 그다음 통증이 줄었는지(SMP 여부). 차단이 안 된 상태의 무반응을 SIP로 읽으면 안 된다.

온도 상승은 차단이 걸렸다는 지표, 통증 감소가 SMP의 근거 — 둘은 다른 것을 말한다 · 함정은 다음 슬라이드 ·  
StatPearls NBK431107

## 효과 ① 관류 개선 · 허혈성 통증

- **관류 실측(Dickey 2024):** LSB 후 후경골동맥 직경  $0.17 \rightarrow 0.27$  cm(+58.8%), 모세혈관 재충혈  $3.92 \rightarrow 1.30$ 초, 족부온도  $+2.8^{\circ}\text{C}$ .
- 허혈성 통증(PAD): 하지 통증 최대 **75%↓**, Fontaine 분류·측부관류 개선(Medicina 2024).
- 비재건성 CLI: 재건이 불가능한 환자에서 통증 조절 수단이 된다(Barreto 2018).

### 실측 수치 (Dickey 2024)

**+58.8%** 후경골동맥 직경

**+2.8°C** 족부온도

**3.92 → 1.30s** 모세혈관 재충혈



## 효과 ② CRPS · 기전

- CRPS는 교감신경 매개 통증의 전형 → LSB 후 유의한 통증완화. 최적 환자 선택·조기 시행이 성공률↑.
- Choi 2024(Sci Rep): CRPS에서 교감신경 차단 효과의 지속기간을 전향 관찰로 제시.
- 반응 예측: **교감신경 피부반응(SSR)**이 LSB 반응 예측에 유용(Pain Ther 2023).
- 한계: 중추 감각이 진행된다면 시간이 지날수록 효과 감소 가능.

기전: 교감차단 → 측부순환 혈관확장 → 조직 산소화↑ → 통증↓, 그리고 교감매개통 경로 차단.

## 실제 진료 순서 — 교감신경 축을 겨냥한 단계적 접근

- ① **감별·검사:** '밤/하지 증상'이 **동맥성 허혈(ABI·도플러)**·CRPS·신경병증인지 확인. 특별 경련·RLS·정맥류 배제.
- ② **방향 설정:** 교감매개통·허혈로 판단되면 **교감신경 축(L2-L3)**을 겨냥.
- ③ **진단적 차단:** 투시 유도 국소마취제 LSB → **피부온도  $\geq 2^{\circ}\text{C}$  상승·통증 반응** 확인.
- ④ **반응 양호 시:** **치료적 반복 차단**으로 이어간다.
- ⑤ **대상별:** CRPS는 조기( $\leq 12$ 개월)가 유리 · 당뇨병성 신경병증은 난치성일 때 엇어 본다.
- ⑥ 주의: 특발성 NLC·정맥질환은 적응 아님 · 합병증(생식대퇴신경통 5-10% 등) 사전 고지.

핵심 메시지 · LSB

# 표준은 투시 유도 방척추 접근, 성공은 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$

## 방법

L2-L3 방척추 접근·투시, 정중선 7 cm 외측, 조영제 두미측 확산, 성공지표 온도  $\geq 2^{\circ}\text{C}$ .

## 약제

국소마취제(리도카인·부피바카인·로피바카인) — 이 강의는 신경파괴를 다루지 않는다.

## 적응증

조기 CRPS·PAD/CLI 안정통·신경병증·다한증 등. 특발성 NLC·정맥질환(정맥류)은 적응 아님.

## 효과

관류 실측 개선(Dickey), 허혈통 최대 75%↓, CRPS 통증완화(SSR로 예측).

## 근거

통제된 근거가 얇다 — 허혈성 안정통 외에는 관찰·증례 수준.



## 참고문헌 — LSB

**Dua & Varacallo.** Lumbar sympathetic block. StatPearls. 2026.

Lumbar sympatholysis. StatPearls.

**Zhang.** Lumbar sympathetic ganglion block in lower limb pain. Ibrain. 2022.

**Dickey & Sharma.** LSB increases arterial diameter and blood flow. Cureus. 2024.

**Barreto.** Neurolytic block of lumbar sympathetic chain in CLI. Braz J Anesthesiol. 2018.

**Choi.** Effect duration of lumbar sympathetic neurolysis in CRPS. Sci Rep. 2024.

**Gungor.** Sympathetic blocks for CRPS: case series. Medicine. 2018.

제목 클릭 시 PubMed로 이동

LSB on pain, Fontaine, perfusion in PAD. Medicina (Kaunas). 2024.

LSB efficacy in CRPS-1 by sympathetic skin response. Pain Ther. 2023.

**Straube (Cochrane).** Cervico-thoracic or lumbar sympathectomy for neuropathic pain and CRPS. 2013.

**Continuous LSB + sympatholysis for refractory painful diabetic neuropathy — RCT.** 2020.

Sympathetic blocks: sustained relief in refractory painful diabetic neuropathy (case). 2012.

Lumbar sympathectomy for ischaemia·vasculitis·diabetic neuropathy·hyperhidrosis — series. 2018.

## 근거수준 — 우리가 하는 국소마취제 차단은 어디쯤인가

- **허혈성 안정통** — 유일하게 **위약대조 RCT 양성**(83.5% vs 23.5%). 가장 단단한 자리.
- **CRPS** — 시술 빈도 1위지만 **Cochrane은 음성**, 관찰연구는 양성으로 갈린다.
- **당뇨병성 신경병증** — 차단만의 **통제된 자료가 없다**.
- **SMP 우세형·난치성 하지통** — RCT·지침 근거 없음.

가장 확실한 값어치는 **진단**이다 — 이 통증이 교감신경 축인지 아닌지를 가려 준다.

## 확인의 함정 — 양성 차단을 그대로 믿지 않는다

- 단일 개방형 양성 차단은 진단이 아니라 가설이다.
  - 교감신경절에 국소마취제 vs 생리식염수를 맹검 비교하면 최대 진통 효과는 차이가 없고 지속시간만 다르다(Price 1998).
- 확산에 의한 체성신경 차단도 위양성을 만든다 — 온도와 감각 분포를 함께 기록해 해석한다.
- 온도 상승 폭이 진통 정도를 예측하지는 않는다(n=318, PMID 31365367).

차단 반응으로 척수자극기 성공을 예측하지 말 것.

Price, Clin J Pain 1998;14:216-226 (맹검 위약 비교) · Anesthesiology 2019;131:883 (PMID 31365367, n=318)  
· SSR 진폭 <math>510 \mu V</math>이환 <math>12</math>개월이 독립 예측인자였으나 단일기관 미재현 (Pain Ther 2023, PMC10199976)