

의원 진료실 · 원장용

환자를 안심시키는 시술 멘트 매뉴얼

말 한마디로 통증을 줄이고, 다시 오게 만듭니다

척추 중재시술 · 관절 주사 · 곤란한 순간 응대

이 매뉴얼을 쓰는 이유

같은 주사라도 말에 따라 통증이 달라집니다

시술 실력은 이미 갖추셨습니다. 남은 변수는 '무슨 말을 하느냐'입니다.
환자가 기억하는 건 바늘이 아니라 그때 들은 말과 표정입니다.

이 세 가지만 지키면 됩니다

원칙 1

숨기지 않는다

아픈 걸 아프다고 하되
짧게, 담담하게

원칙 2

끝을 알려준다

“몇 초면 지나가요”
시간으로 달는다

원칙 3

권한을 준다

“불편하면 말씀하세요”
멈출 수 있게 한다

01

바늘 들어가는 순간

가장 많이 실수하는 3초를 다듬습니다

“따끔”은 그대로 쓰셔도 됩니다

피부를 뚫는 건 실제로 따끔합니다. 이걸 ‘누르는 느낌’이라 하면 환자는 속았다고 느낍니다.

문제는 이것

‘따끔’이라는 단어가 아니라 **아픔을 부풀리고 물고 늘어지는 것**
“많이 아파요” · “여기가 제일 아파요” · “벌에 쏘이듯”

그래서 이렇게

한 번만 담담하게 + **시간으로 달고** + **멈출 권한을 준다**
“잠깐 따끔하고 몇 초면 지나가요. 불편하면 말씀하세요.”

감각은 단계마다 다릅니다

한 단어로 뭉치지 말고, 그 순간의 실제 감각을 그대로 알려주세요.

피부 뚫을 때

따끔

“잠깐 따끔하고 몇 초면 지나가요”

마취약 들어갈 때

시큰·화끈

“약이 퍼지면서 시큰한데 금방 무뎌집니다”

바늘 진행할 때

누르는 느낌

“이제부터 지그시 누르는 느낌이에요”

약 들어갈 때

빠근·차오름

“묵직하게 차오르는 느낌은 정상이에요”

바로 쓰는 3초

짜르기 직전, 이 한 문장

“자, 시작할게요. 잠깐 따끔하고 몇 초면 지나가요.
셋 셀게요 — 하나, 둘, 셋.”

‘자, 시작할게요’

예고 — 놀라지 않게

‘잠깐 따끔’

정직 — 속이지 않게

‘몇 초면 지나가요’

끝 — 건딜 수 있게

‘하나, 둘, 셋’

통제 — 대비할 수 있게

침묵을 두지 마세요

아무 말 없이 3초가 지나면 환자는 뭔가 잘못됐다고 생각합니다.

“지금 잘 들어가고 있어요. 절반쯤 지났습니다.”

“누르는 느낌은 정상이에요. 날카롭게 오면 바로 말씀해 주세요.”

“숨 편하게 쉬세요. 참지 마시고요.”

“거의 다 됐어요. 조금만요.”

시술 후 30초

여기서 재방문이 갑니다

시술이 끝난 직후 30초가 그날 진료 전체의 인상을 결정합니다.

① 인정

“잘 참으셨어요. 생각보다 금방 끝났죠?”

② 확인

“지금 어지럽거나 불편한 데는 없으세요?”

③ 예고

“오늘 저녁이나 내일 잠깐 빠르할 수 있는데 정상이에요.”

④ 연결

“이상하면 참지 마시고 바로 전화 주세요.”

이 말만은 **배**주세요

× “여기가 제일 아픈 부분이에요”

아픔에 주의를 못 박습니다

× “하나도 안 아파요”

거짓말은 다음 시술을 어렵게 합니다

× “많이 아팠죠?” (끝난 뒤)

지나간 통증을 다시 각인시킵니다

× “절대 움직이면 안 돼요”

긴장으로 오히려 더 아파집니다

× “어? 이상하네” · 혼잣말

환자는 최악을 상상합니다

02

환자가 꼭 묻는 질문

말문 막히지 않는 표준 답변

“이거 뼈주사죠?”

“뼈에 놓는 주사가 아니라, 신경 옆 정확한 지점에 약을 넣는 겁니다. 엑스레이로 위치를 보면서 해요.”

“말씀하시는 ‘뼈주사’는 보통 스테로이드를 말씀하시는 건데, 오늘은 양을 최소로 쓰고 자주 반복하지 않습니다.”

✕ “뼈주사 아니에요” 하고 끝내기 — 환자는 여전히 못 미더워합니다.

“스테로이드 많이 맞으면 안 좋다던데요”

“맞습니다. 그래서 저희도 횟수를 정해두고 씁니다. 무제한으로 놓는 약이 아니에요.”

“오늘 쓰는 양은 먹는 약으로 치면 아주 적은 양이고, 간격을 충분히 둘 겁니다.”

× “그런 건 인터넷 얘기에요” — 환자의 걱정을 무시하면 신뢰가 깎입니다.

“이거 맞으면 낫는 거죠?”

“이 주사는 통증을 줄여서 움직일 수 있게 해주는 역할이에요. 그 사이에 운동이랑 자세를 잡는 게 진짜 치료입니다.”

“효과는 사람마다 달라서, 오늘 맞아보고 다음에 오셨을 때 얼마나 편했는지 알려주시면 계획을 정하겠습니다.”

× “한 방이면 끝나요” — 안 나으면 그대로 불신으로 돌아옵니다.

“몇 번이나 맞아야 돼요?”

“보통 한 번 맞고 반응을 봅니다. 좋으면 굳이 더 안 맞아도 되고요.”

“계속 맞는 치료가 아니라, 필요할 때만 쓰는 겁니다. 오늘 맞고 2주쯤 뒤에 어떤지 보고 정하시죠.”

✕ “3번은 맞으셔야 돼요” — 처음부터 횟수를 못 박으면 상술로 보입니다.

“방사선 많이 쬐는 거 아니에요?”

“위치 확인할 때만 잠깐씩 쬐고, 다 합쳐도 몇십 초 정도예요.”

“필요한 만큼만 최소로 쬐고, 정확히 놓기 위해서 쬐는 거라 오히려 더 안전합니다.”

× “그 정도는 괜찮아요” — 숫자 없이 넘어가면 안심이 안 됩니다.

“신경 건드리면 마비되는 거 아니에요?”

“바늘이 향하는 건 신경이 아니라 뼈 위의 정해진 지점이에요. 뼈에 닿으면 거기서 멈춥니다.”

“그리고 깨어 계시니까, 다리로 찌릿한 느낌이 오면 바로 말씀해 주시면 제가 위치를 조정합니다.”

× 위험을 길게 나열하기 — 동의서에 있는 내용을 다시 읊으면 불안만 커집니다.

03

시술별 한마디

그 시술에서 꼭 해야 하는 말만

경추 내측지신경차단 · 흉추·요추 내측지신경차단

경추 내측지신경차단

꼭 할 말 — 반복 촬영은 안전 절차

“편하게 누워서 하니 얘기하시면서 하셔도 돼요.”

“여러 번 찍는 건 정확히 보려고 하는 겁니다.”

“어지럽거나 식은땀 나면 바로 말씀하세요.”

흉추·요추 내측지신경차단

꼭 할 말 — 표적은 신경이 아니라 뼈

“엎드려서 하고, 배에 베개 받쳐드릴게요.”

“다리로 뺨치는 시술이 아니라 누르는 느낌 위주예요.”

“바늘은 뼈에 닿으면 거기서 멈춥니다.”

신경근차단 · 경막외 차단

신경근차단

꼭 할 말 — 찌릿하면 '말로만'

“다리로 찌릿한 느낌이 잠깐 올 수 있어요.”

“위치가 잘 왔다는 신호니 걱정 안 하셔도 됩니다.”

“그때 움직이지 마시고 말로만 알려주세요.”

경막외 차단

꼭 할 말 — 응급 신호는 미리

“등을 고양이처럼 말아주시면 수월해요.”

“밀리는 느낌은 정상, 찌릿하면 말씀하세요.”

“힘 빠짐이 심해지거나 소변이 안 나오면 연락 주세요.”

무릎 관절강내 · 어깨 (견봉하)

무릎 관절강내

꼭 할 말 — 몇 주짜리 다리라는 것

“다리 힘 빼세요. 긴장하면 더 빠릅니다.”

“약 들어가며 차오르는 느낌은 정상이에요.”

“이 주사가 버는 시간에 운동·체중을 같이 잡으셔야 해요.”

어깨 (견봉하)

꼭 할 말 — 효과는 2~3일 뒤부터

“뒤에서 놓아 바늘은 안 보이실 거예요. 힘 빼세요.”

“어지럽거나 메스꺼우면 바로 말씀하세요.”

“약효는 2~3일 뒤부터라 바로 안 좋아져도 정상이에요.”

팔꿈치 (외측상과염)

단기 효과는 좋지만 장기적으로는 재발이 많은 시술입니다. 이 사실을 미리 말해두면 나중에 신뢰를 지킵니다.

“이 부위는 원래 예민해서 좀 빠근하실 거예요. 최대한 천천히 놓겠습니다.”

“이 주사는 지금 아픈 걸 줄여주는 거고, 근본은 스트레칭이랑 근력운동이에요.”

“주사만 반복하면 오히려 나중에 더 안 좋을 수 있어서, 오늘 맞고 운동을 시작하시는 게 중요합니다.”

“오늘 밤이나 내일 잠깐 더 아플 수 있는데 2~3일이면 가라앉습니다.”

04

곤란한 순간

당황하면 신뢰가 무너지는 다섯 장면

환자가 어지럽다고 합니다

주사 후 실신은 대부분 15분 안에 생깁니다. 앓힌 채로 버티게 하면 넘어집니다.

“어지러우시군요. 괜찮습니다, 바로 눕혀드릴게요.”

“다리를 이렇게 올릴게요. 금방 편해지실 거예요. 천천히 숨 쉬세요.”

“이제 혈색 돌아왔어요. 바로 일어나지 마시고 몇 분 더 누워 계세요.”

바늘을 무서워합니다

바늘 공포는 아주 흔합니다. 다그치면 그날 시술도, 다음 방문도 사라집니다.

“바늘 무서워하시는 분 정말 많아요. 부끄러워하실 것 하나도 없습니다.”

“안 보셔도 돼요. 저쪽 보시면서 저랑 얘기해요.”

“준비되면 말씀하세요. 준비되실 때까지 기다릴게요.”

다음 날 더 아프다고 전화가 옵니다

주사 후 일시적 통증 악화는 흔한 반응입니다. 미리 말해줬다면 컴플레인이지 아니라 확인 전화가 됩니다.

“네, 그럴 수 있다고 말씀드렸던 반응이에요. 보통 2~3일이면 가라앉습니다.”

“얼음찜질 하루 두세 번 해보시고, 무리한 사용만 피해주세요.”

“다만 붓고 벌겋게 열이 나거나 통증이 계속 심해지면 바로 오세요.”

효과가 없다고 다시 왔습니다

여기서 방어적으로 나가면 환자를 잃습니다. 정보로 받아들이면 다음 치료가 정확해집니다.

“그러셨군요. 언제부터 다시 아프기 시작했는지 알려주시겠어요?”

“잠깐이라도 편했던 시간이 있었다면 그것도 중요한 정보예요.”

“그럼 위치를 다시 보고, 다른 방법도 같이 생각해보겠습니다.”

보호자가 옆에서 불안해합니다

보호자의 불안은 환자에게 그대로 옮겨갑니다. 보호자를 먼저 안심시켜야 합니다.

“보호자분, 옆에서 손 잡아주시면 큰 도움이 됩니다.”

“지금 하는 건 위치를 확인하는 과정이라 시간이 좀 걸립니다. 정상이에요.”

“끝나면 어떻게 지내셔야 하는지 같이 설명드릴게요.”

오늘부터 이것만

짜르기 전

“잠깐 따끔하고 몇 초면 지나가요. 셋 셀게요.”

바늘 진행

“누르는 느낌은 정상이에요. 날카로우면 말씀하세요.”

시술 중

“절반쯤 지났어요. 잘하고 계세요.”

끝난 직후

“잘 참으셨어요. 어지럽거나 불편한 데 없으세요?”

보내기 전

“내일 잠깐 빠르할 수 있어요. 이상하면 바로 전화 주세요.”

기억할 것

아픈 걸 숨기지 말고, 끝을 알려주세요.

환자는 아프지 않아서가 아니라, **아플 때 곁에 있어줘서** 다시 옵니다.

근거: 시술 직전 위협적 표현은 통증을 높이고(VareImann 2010), 경고성 멘트는 통증·불안을 함께 올립니다(Lang 2005).
반면 '따끔' 같은 중립적 예고 자체는 통증을 높이지 않았습니다(Vijayan 2015).