

Lumbar Sympathetic Block

Dua A, Varacallo MA.

StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026.

총설 (Review)

근거수준 —

핵심 내용

- 표적: 교감신경절 밀도가 가장 높은 L2 하 1/3 ~ L3 상 1/3, 척추체 전외측.
- 표준 술기: 방척추(paravertebral) 접근 + 투시 유도. 정중선에서 약 7 cm 외측 진입.
- 조영제로 두미측(craniocaudal) 종방향 확산 확인 후 약물 주입.
- 성공 지표: 동측 하지 피부온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ 상승.
- 합병증: 생식대퇴신경통, 외측대퇴피신경 손상, 기립성 저혈압, 혈관·요관·신장 손상, 신경축 확산.

식별자 · 원문

Bookshelf NBK431107 — <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431107/>

발표자료에서 쓰인 곳

p3 개요·해부 / p4 방법 / p5 조감도 / p7 주의점 / p8 합병증표

요추교감신경차단(LSB) 문헌고찰 · 교육·연구 참고용 · 서지정보는 PubMed/PMC/StatPearls 대조 · 원문 전문은 위 링크에서 확인