






十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社







医学


4




▾超声波



▾胃　镜






▸红血球

▸ 兔　唇



▾ 医用高压氧舱





▸ 生产胶囊药



十万个为什么

医 学

❹

少年儿童出版社

插图　胡永光 蔡康非等
装帧　张之凡 张慈慧
责任技术编辑　袁国强

续编前言

《十万个为什么》自 1961 年问世以来，久销不衰，至今累计印数达 5000 多万册，开创了我国科学普及知识读物长销、畅销的先例。30 多年来，少年读者虽已更迭了好几代，但它仍受到普遍的欢迎。与此同时，我们还不断地收到全国各地读者的来信，希望能将《十万个为什么》继续编下去。读者的热情支持，对我们，是最大的鼓励，并且成为我们编辑《十万个为什么》续编本的动力。经过几年的努力，终于能向热切期待着的广大读者，奉献上这崭新的《十万个为什么》续编本。

《十万个为什么》续编本共 10 册，因为是续编，所以仍按原来的九大学科分类，并接续原来各学科分册的编号出版，即数学 (2)、物理 (3)、化学 (3)、天文 (2)、地学 (2)、气象 (2)、动物 (3)、植物 (3) 和医学 (3)(4)。这一辑续编本 10 册和原来的 14 册合并，组成 24 册一套完整的《十万个为什么》。

《十万个为什么》续编本，在文章的体裁和风格上与原来的 14 册保持一致，在题目的选取和内容的编排上，继续注重知识性和趣味性，并且力求贴近生活，符合青少年

读者的求知要求；同时，我们特别注重结合近年来世界科学技术的新发展，增加了许多传播新科学、新技术的题目和内容，激发读者进一步探索周围世界的兴趣。

参加续编本编写工作的作者，有不少是原来 14 册《十万个为什么》的老作者。我国一些著名的科学家还分别参加了各个分册的审订工作，对此，我们表示衷心的感谢。

希望读者读了续编本以后，对我们的编辑工作提出宝贵意见，帮助我们进一步提高这套书的质量。

编　者

1992 年 10 月

目　　录

为什么药物也会引起营养不良 1
为什么要采用不同的给药方法 2
为什么检查食道、胃、肠要吃白色钡剂 6
为什么要空腹验血 8
为什么察看指甲能诊断疾病 10
为什么“B 超”能诊断疾病 12
有办法让伤口愈合得快些吗 14
为什么急性损伤应该先冷敷止痛 15
为什么骨折后要进行功能锻炼 17
为什么有些人的手术疤痕会越来越凸起来 19
发高烧会把肺烧坏吗 21
为什么会出现“时差反应” 23
为什么有人会“水土不服” 25
为什么胃出血患者呕的血是咖啡色，而大便血是黑色的 27
为什么说咯血与呕血是两回事 28
为什么要切除扁桃腺 30
为什么说“十有九痔” 31
为什么有的人胸部会凸起 33

为什么人体需要适量脂肪 35
为什么会得肥胖病 37
为什么会放屁 39
为什么会便秘 42
为什么说“大便通畅，身体健康” 44
为什么有的人吃了蚕豆会得蚕豆病 46
为什么瓜果菜蔬也能治病 48
为什么说姜是家庭必备良药 51
为什么说茶是人类健康之友 52
为什么音乐也能治病 55
为什么耳针能治病 58
怎样吃鸡蛋才有益健康 61
为什么老年人夜尿会增多 63
为什么有的儿童会患多动症 65
为什么给孩子异性打扮不好 67
为什么精神病往往是遗传得来的 68
为什么儿童也会患忧郁症 70
为什么有些儿童会患恐惧症 73
为什么睡眠要注意姿势 75
为什么小孩睡觉时爱踢被子 78
为什么婴幼儿睡觉时容易出汗 79
为什么说睡平板床好 81

为什么说高枕并非无忧 83
为什么小孩的呼吸要比成人快 85
为什么幼儿不宜久坐便盆 87
为什么人一生不会得两次麻疹 88
为什么说乳房的发育是青春启动的第一个信号 90
为什么饮牛奶也有学问 92
为什么人乳喂养婴儿比牛奶喂养好 94
为什么喂婴儿的牛奶不要过浓 97
为什么要提倡“早喂奶、勤喂奶” 98
为什么用全牛奶喂养的孩子容易发生缺铁性贫血 100
为什么会有多胞胎 101
为什么有的小孩嘴唇生来就是“兔唇” 104
为什么小孩感冒时常伴随呕吐腹泻 106
为什么周岁以内的孩子不宜过早学步.....107
为什么小学生不要单肩背书包 109
为什么幼儿容易发生“牵拉肘” 111
为什么保护儿童牙齿要从母亲怀孕期就开始 113
为什么预防冠心病要从童年开始 114
为什么多吃糖会影响儿童骨骼发育 117
为什么丙种球蛋白不是防治疾病的万能药.....118
为什么常年吃钙片的孩子仍会得佝偻病 121
为什么有些人特别怕冷 122

为什么过多吃含碘食物也会造成甲状腺肿大 124
为什么有些姑娘会得多毛症 126
为什么有的人青春发育期来得很晚 128
为什么说皮肤是人体最大的器官 129
为什么有的人皮肤、毛发都是雪白的.....131
为什么咳嗽多痰不宜急于止咳 133
为什么有的人来月经时会小肚痛 134
为什么患胃肠道病时，腹痛是一阵阵的 137
为什么腹泻时，粪便会稀薄得像水一样 139
为什么有的人小腿肚会青筋突起 140
为什么糖尿病人也会发生低血糖 142
为什么青少年也会得糖尿病 143
为什么糖尿病人特别容易饥饿 145
遗精会不会伤身体 147
为什么过度手淫有碍健康.....150
歪嘴巴是“鬼风”吹的吗.....152
常扳压手指为什么会使指关节变形 154
为什么骨头上会长骨刺 155
为什么有些人进行体育运动后会足跟痛 157
羊癫风是怎么回事 159
为什么健康人有时也会浮肿 161
为什么有的人个头长得特别快 163

为什么缺钙会引起抽筋 164
为什么胃会泛酸水 166
为什么瘦的人胃容易下垂 168
为什么胆道里会生“石子” 170
为什么泌尿道里会生“结石” 172
为什么有些人血液中白细胞会减少 174
为什么有些人容易发生过敏反应 175
“植物人”是怎么一回事 177
癌为什么会转移 179
为什么癌症难以治愈 181
为什么说艾滋病是超级癌症 184
为什么说生命在于饮食 186
为什么考试阶段要特别注意饮食 189
为什么饮啤酒也要适可而止 191
为什么对老年人提倡多吃粥 194
为什么要为纤维素“评功摆好” 196
为什么吃杂粮有益健康 198
为什么梳头有保健作用 201
为什么垂钓有益身心健康 203
为什么许多不良习惯有害健康 205
为什么脾气不好会影响健康 207
为什么说脑子越用越聪明 210

为什么在空调房住久了会得“空调症” 213
为什么新装修的房子不宜立即住人 215
怎样正确使用净水器.....217
为什么说“以步代车”好.....220
为什么豢养宠物须防得传染病 222
为什么洗“桑那浴”要讲究方法 225
为什么不能把墨镜当装饰品 227
为什么说冰箱不是“保险”箱.....229

为什么药物也会引起营养不良？

药物是人类同疾病作斗争的有力武器之一，药物通过影响人体的功能或抑制病原体的生长、繁殖而起到防治疾病的作用。它不仅能控制疾病的发生和发展，同时也可以通过调整人体的功能，加速健康的恢复。但是，我们也应该注意到在药物使用过程中可能出现的不良后果，不能只看到有利的一面，而忽视它的不利一面。例如在我们日常用药中，某些药物可能引起营养物质的吸收不良，严重时还可发生营养缺乏病。



四环素可引起叶酸、脂肪及乳糖的吸收不良；较长期口服水杨酸盐可影响氨基酸的吸收；皮质激素（强的松等）使用过久可发生钙、铁的吸收不良；口服新霉素可抑制脂肪、氮质、胡萝卜素、铁、维生素 B_{12} 及葡萄糖的吸收，同时新霉素还能影响维生素 K 的吸收，使凝血过程

发生障碍；用于治疗糖尿病的降糖灵，口服可导致对葡萄糖、氨基酸、脂肪、维生素 B_{12}、钠的吸收不良；长期服用制酸剂氢氧化铝可发生低磷酸血症、高钙血症而导致骨质软化；用于治疗结核病的对氨基水杨酸钠能引起脂肪、维生素 B_{12} 及叶酸等吸收不良；经常服用各种泻药可引起蛋白质的丢失，葡萄糖的吸收减少、低血钾等。

因此，在使用上述药物过程中，应适当补充一些营养物，同时应注意观察某些营养缺乏病的早期表现，必要时减量、调换或停服某种药物。（翁德立）

为什么要采用不同的给药方法？

生了病，免不了吃药打针。有人不喜欢吃药，宁可打针；有人害怕打针，情愿吃药。这时，医生往往会说服你，告诉你吃药打针的区别，或其他种种给药方法的作用。



各类药品

吃药，又叫口服药。人们把药片、药丸吞入肚内，药物在胃肠溶解吸收后进入血液，就会起到治病作用。固体药物加水制成药水；如果药水很苦，常常溶入蔗糖，制成糖浆药，用来作为婴幼儿口服用药。为避免对口腔粘膜的刺激和苦味，药粉可装在胶囊中。用开水冲化即可服用的冲剂保留了中药汤剂原来的特色，也克服了煎煮中药的不便。药水、糖浆易于吸收；药片、胶囊、冲剂制造、运输、分发都很方便。口服药物相对价廉、安全，是人们最常用的给药方法。但是，病人呕吐不止、昏迷不醒时无法吃药；危急重病时口服药起效太慢；有些药物，像青霉素 G 在胃肠道会受到破坏。遇上这些情况，医生常用注射、也叫打针的方法来弥补口服药的不足。



肌肉注射，药物透过肌肉间隙、穿越毛细血管壁进入血流，吸收较快，起效也快，是注射中用得最多的方法。静脉注射，俗称“吊盐水”。针尖刺入血管，药液涓涓滴入血液，治疗作用最快。因此，医院急诊科里，危重病人总是在“吊盐水”。用药量小、吸收较慢的皮下注射主要用于药敏试验，如青霉素过敏试验和疫苗接种。关节腔内注射，可治疗关节炎；椎管内注射，药物直接作用于中枢神经系统。打针不仅疼痛、不便，针打过多，会损伤组织，引起注射性臀肌挛缩症、血栓性静脉炎等。不慎用错药，更容

易发生严重反应。所以，能吃药的，不应打针。

医生也常用舌下给药、吸入给药、直肠给药、透皮给药等方法治疗疾病。心绞痛时，舌下含化硝酸甘油，药物从口腔粘膜渗入体内而免遭消化液的破坏。抽烟时尼古丁能通过呼吸道吸入体内；同样道理，呼吸道能够吸收细小颗粒、液体和气体的气雾状药物，用以治疗咽炎、哮喘等疾病。置于直肠内的栓剂或药物灌肠，适用于昏迷或不能吃药者，也适用于治疗痔疮、便秘等肛肠疾病。药物制成软膏、霜剂、洗剂等敷贴外洗，是皮肤科和伤、外科常见的给药方法。眼、耳、鼻、外阴等处内给药是治疗局部炎症的有效措施。

人们还致力于探索新的药物运载工具和给药途径。如把药物同磁粒子结合在一起，利用体外磁场效应，引导体内药物到达预定部位；把药物植入皮下，让药物长时间缓解释放等等。

医生根据病人病情的缓急、部位，药物的剂型、作用和特性来决定最合适有效的给药方法。科学的给药方法也给人们治愈疾病带来希望。（陈传）

为什么检查食道、胃、肠要吃白色钡剂？

X 射线是医生的好助手，许多隐蔽的疾病通过 X 射线检查，便会显出庐山真面目。例如，肺部有病，只要站到 X 射线机前透视一下或摄张 X 射线片，就可发现病灶所在；外伤后，要知道有没有骨折，只需在肿胀、疼痛部位拍张 X 射线片，20 分钟后就可明辨。可见，用 X 射线检查食道、胃和肠子时，就不那么简单了，它必须要求患者先吞下白色钡剂才可检查，为什么呢？这得先从 X 射线的检查原理谈起。

X 射线有较强的穿透能力，能穿透人体。由于人体各组织的密度不同，吸收 X 射线的程度也不一致，因此在荧光屏上或 X 射线片上所显示的黑白影像的深浅，也有一定的差异，X 射线诊断就是利用这一原理，根据这些深度不同的阴影，再结合临床检查，进行全面客观的分析，作出诊断。

人体内以骨骼密度最高，气体密度最低。肺部充满气体，所以，当用 X 射线检查骨骼和肺部时，所显示的阴影就比较清楚，这称为自然对比阴影。在自然对比下，骨骼呈白色，充满气体的肺

脏呈黑色。肌肉、心脏、肝、脾等脏器介于两者之间。由于肺和肋骨有自然对比，因此，一般的胸部摄片不需借助任何造影剂就可完成。可是，食道、胃、肠都是软组织构成的，其密度与邻近组织大致相同，故缺乏自然的对比度。为了使食道、胃、肠的轮廓能在 X 射线下清楚地显示出来，人们想出了借助人工对比来进行造影的方法。



经过多年的寻找和选择，人们终于发现药用硫酸钡是一种比较理想的消化道造影剂。首先，X 射线不能透过它，因此在 X 射线片上呈显白色。其次，硫酸钡为一种无臭、无毒，既不溶于水，又不溶于其他溶剂的白色粉末，机体不吸收，对胃肠道又无刺激，对人体毫无危害。当检查食道、胃、小肠时，一般都采用口服法。口服的钡剂里除了有药用硫酸钡，还加上适量阿拉伯胶、糖浆、香精和温开水。因此，被检查者完全不必顾虑钡剂难吃。当检查大肠有没有病变时，一般采用钡剂灌肠法。即把钡剂缓缓地从肛门灌入预先清洁好的大肠里。总之，不论是口服还是灌肠，都必须依赖这种白色钡剂才能显示出消化道的轮廓，

以判断是否有病变。（周小寒）

为什么要空腹验血？


当你去医院看病，医生在对你进行询问病史和做必要的体格检查后，有时会开出化验单请你去做一些检查。但是，有些验血项目，如肝功能、肾功能和血糖等测定则要求病人在第二天清晨空腹时来抽血化验。对此有些人不理解，甚至不愿积极配合，以致影响化验的准确性，最终会妨碍医生的诊断和及时的治疗。

空腹，实际上是指晚上吃饭后不再进食，第二天早晨，除水以外也不吃任何食物，至于为什么有些化验要空腹抽血检查，这主要从以下几方面来考虑的。

一、首先每一种化验采用的检测方法不同，正常值也各异。而正常值的数据是经过对大量正常人抽取的空腹血测定得来的，因空腹时机体相对地处于基础代谢状态，能排除食物等因素的影响，且情绪也较稳定，所以能反映人体血液中的真实情况。把众多的检测结果经过统计处理，便得出某一方法检测的健康人的血液正常值。因此，我们对病人进行某一项血液检查，也应该抽取空腹血检查，这样的检测结果才具有可比性，能真正地反映病人的实际情

况，才能对诊断疾病提供有价值的证明。

二、由于进食后，食物经口腔咀嚼后即由胃肠道消化吸收进入血液，然后由血液运送到全身各个组织器官。因此，食物中的某些成份进入血液后，会使血液中某些成分的浓度增高，这样检测的结果就可能不准确。



三、早晨验血前若已进食，那么，食物消化后产生的大量乳糜微粒便会很快地被吸收进入血液，此时的血液也变得浑浊，医学上称为“脂肪血”，由于不少血液生化检查是通过标本颜色的变化来作出判断的。若血液因乳糜微粒而显得浑浊，那么检测人员就很难观察清楚，最终也会影响检测结果的准确性和可靠性。

由此可见，空腹验血可不受食物等外来因素的影响，最能反映人体内真实的生理情况。一旦医生要求病人去做空腹验血时，病人都必须用科学的态度去对待它。

（唐建华）

为什么察看指甲能诊断疾病？

指甲是皮肤的衍生物。它不仅是保护十指的甲胄，也是大自然赐给人类的天然工具。此外，指甲还是一面能反映人体疾病的镜子。

指甲由高度角质化的细胞所组成，坚韧而有弹性。正常人健康的指甲是半透明色，中央隆起略呈拱形、不厚不薄、光洁整齐。含有丰富血管的甲床紧贴在指甲下，使指甲透出淡淡的绯红色。


不同的年龄、生活、劳动和环境等条件会影响指甲的形态。手工劳动者指甲坚韧厚实，脑力劳动者的指甲则相对薄软。儿童的指甲光滑亮泽，而老年人的指甲满布纵纹。人体营养缺乏或发生某些疾病，指甲的形状、厚度、色泽等也会随之发生变化。

肺源性心脏病、肢端肥大症等病时指甲增厚；慢性炎症、关节炎、甲状腺功能减退时指甲灰暗粗糙、厚而弯曲、状似鸟爪；慢性胃肠道疾病、维生素 B 缺乏时指甲变软易裂；贫血、高山病时指甲中央凹陷，又称“匙状甲”；外伤、砷中毒指甲发白；肾上腺功能减退、银、汞等重金属

中毒指甲变黑；指甲呈蓝色是体内铜代谢障碍的标志。

疾病引起指甲变化与指端微循环血流密切相关。把一滴香柏油滴在指甲根部，显微镜下，我们可以看到许多微细血管，其中最细的只有头发直径的二十分之一。指端的微血管与全身微循环息息相通，对全身的变化十分敏感。人体患病时，指端微血管的形态、分布、运动会有变化，血管内血液流量、流速和血细胞数量也发生变化，最后导致甲床和指甲的变化。昏迷时指端微血管袢状结构减少，高血压、肾炎时管袢变细等就是例子。

中医学认为，人体发甲筋脉、四肢百骸、五脏六腑通过经络连成一个整体。人体局部能够反映相关脏腑的变化。我国医务工作者运用中医理论，总结出指甲不同部位出现



圆、条、三角等大小、形态等不同符号，是代表相应脏腑某些病变和病变程度的一些规律。他们根据这些规律诊断疾病，并把诊断结果与胃镜、超声波等现代诊断方法的结果对照，其中胃窦炎符合率为 89.74%、慢性胆囊炎为 88.69%、颈椎肥大为 94.2%，显示出较高的准确性。

观察指甲能够诊断疾病。但是，指甲会受年龄、职业、体质等多种因素影响，变异较大；而且，人们对指甲诊病规律的认识尚待进一步深入。因此，目前观察指甲诊病作为一种辅助手段，还不能替代其它诊断方法。尽管如此，指甲诊病方便易行、无痛无害、省时省钱，是辅助临床观察病情和自我保健的好方法。（陈传）

为什么“B 超”能诊断疾病？

随着医学科学的发展，先进的诊疗设备不断问世，B 型超声诊断（简称“B 超”）就是在现代电子学发展的基础上，将雷达原理与声学相结合的一种新的诊断方法。“B 超”检查具有准确性高、无损害、无痛苦、无放射性、无需有害的造影剂和比较经济等优点，不仅能检测人体内脏，如肝、肾、脾、胰和子宫等病变，还能用于了解母亲子宫内胎儿的生长发育等情况。“B 超”在临床疾病的诊断中正发挥着越来越重要的作用。

“B 超”为什么能发现人体内组织器官的病变呢？这还得从“B 超”的超声成像原理讲起。超声是声波的一种，它每秒钟的振动次数（频率）很高，超越人耳听力范围的高频声（频率超过 20000 次/秒）。超声具有与一般声音共

同的物理性质，以纵波的方式和一定的速度在空气、水和固体介质中传导，当遇到障碍物时能够反射产生回声以及可以被介质吸收和减弱。同时，超声还具有一些其它重要的物理特点，如与光线相似的方向性，能够成束发射、直线传导等。



“B 超”检查就是利用超声的这些特点，由医生和一台 B 型超声诊断仪来完成。“B 超”诊断仪既有发射超声的功能，又具有接收反射信号的功能。当“B 超”诊断仪工作时，产生一种相应高频的机械振动，即超声，再由探头定时发射短促的超声信号。医生就是手握一个探头在病人所需要检查的部位进行来回探测。由于人体正常组织的密度、声阻抗及吸收系数不尽相同，尤其当抗体组织发生炎症、积液、肿瘤、钙化和气体等时，从器官组织内部反射而来的回声也各不相同。这时，探头能将反射回来的超声信号转换成电信号，再经仪器一系列复杂而精细的处理，转换成该组织器官的断面图像即声像图，在“B 超”仪的屏幕上展现出来。医生就是根据这些不同的断面声像图的图像进行综合分析，来确定疾病的性质和部位。（唐建华）

有办法让伤口愈合得快些吗？

开刀或外伤后有了伤口，有的缝合，显得平整清洁；有的溃烂，难免皮开肉绽，谁不想伤口愈合得又好又快？那么，有些什么办法呢？

伤口愈合是靠组织再生来完成的，一般有两种类型：一种是经过医生缝合处理过的伤口，伤口两边对拢得很好，只要不发炎，7 ～ 8 天就长好。另一种是无法缝合的伤口，愈合就得花时间，新肉要慢慢从伤口底部和四周长拢来，还得经常换药。



要使伤口长好，还应注意以下几个方面：

保持伤口局部的温暖和干燥。因为寒冷容易造成血管收缩，伤口的血液供应就差。而潮湿或沾水，则容易招惹细菌感染，妨碍伤口愈合。

注意补充营养，伤口修复必须依靠蛋白质，因此需要多吃些蛋白质含量丰富的食物，例如鸡蛋、瘦肉、豆类和

乳类等。

适当服用维生素 C，这类药物可以帮助伤口里的微血管生长，能促进伤口周围肌肉生长的作用。为此，多吃些含维生素 C 丰富的新鲜蔬菜与水果有好处，或者短期口服维生素 C，每次 200 毫克，每日 3 次。

伤口要合理地换药和清洁，最好 2 ～ 3 天换一次药，拆线后就不必再换药。缝不起来的伤口，要看具体情况换药，如伤口没发炎且干燥，可间隔 1 ～ 2 天换一次。换药太勤反而会把伤口上新长的嫩肉破坏。如果伤口发炎且渗水时，那需要每天换药，并揩净渗出液，让组织顺利生长。换药用药种类很多，常用有利凡诺溶液、生理盐水、各种抗生素溶液和中药生肌散，生肌玉红膏等，有人也用白糖、蜂蜜换药，如何选用应请医生指导。

最后，还应该强调多活动四肢和身体，让全身血液循环加快，增加伤口的血液供应。越是不动，越不利伤口的愈合。（姚德鸿）

为什么急性损伤应该先冷敷止痛？

在日常劳动或生活中，四肢的关节和韧带等软组织的急性扭伤，是常有的事。扭伤以后受伤的部位往往有剧烈

的疼痛，局部肌肉组织会很快肿起来。这时有人说要赶紧热敷，有人说只能冷敷，两种做法哪个对呢?

让我们先来了解一下急性扭伤对人体组织的伤害情况。急性扭伤时，关节部位的肌肉、韧带、关节囊等软组织，因过度牵拉而撕裂，发生充血肿胀。即使皮肤没有破损，皮下组织、肌肉、韧带内也会有小血管破裂，甚至关节囊内也有出血。腰部扭伤时看起来不红不肿，但软组织损伤的情况是相同的。因此，如果在急性扭伤的初期使用热敷方法，那就会使损伤局部的毛细血管扩张，血液循环加快，加重局部的出血、肿胀和疼痛，不利于受伤组织的恢复。为此，急性软组织扭伤后不可立即用热敷治疗，也不能进行按摩和贴敷有活血作用的膏药，以免加剧肿胀。



发生急性扭伤后，应立即使扭伤局部充分休息，限制活动，并进行冷敷，而且越早越好。具体方法是用水温为 10 ～ 15°C 的清洁冷水，将受伤的部位浸泡于水中；也可用毛巾蘸井水或冰水后敷于扭伤肿胀的肌肉上。这样可使急性扭伤部位的温度尽快下降，让局部毛细血管收缩，血流量减少，从而防止血肿的扩散，消除疼痛，堵塞破损血管的渗血。皮肤有破损时应在敷料外

面进行间接冷敷，有条件时可在扭伤局部喷射氯乙烷等冷冻剂，使局部迅速降温。

急性扭伤后，一般在 24 ～ 48 小时出血就会停止，那时，才可改用温热疗法，在局部用热毛巾、热水袋或热中药袋作热敷，消散瘀血，使肿胀较快消退。　　（贝润浦）

为什么骨折后要进行功能锻炼？

骨折后需要立即上夹板或石膏固定，这是普通的常识，为什么又要进行功能锻炼呢?

任何骨折在愈合过程中，都需要有足够的血液供应。但在骨折后，断端部分必定出血、肿胀，影响正常的血液循环，加上石膏或夹板固定，血液循环就更差。骨折整复固定之后，及时地进行肢体的功能锻炼，可以发挥肌肉对血液循环的“水泵”作用。肌肉收缩，组织压力增高，推动静脉回流；肌肉舒张时，组织压力减低，更多的动脉血通过毛细血管流向静脉，从而促进了肢体软组织和骨内的血液循环，使血流量增加。血流量增加不仅回收了骨折局部的代谢产生的废物，而且带来了骨折所必需的氧和其他物质，能促使骨折愈合。

骨折之后，肢体长时间固定不动，骨头容易脱钙即骨

头中的钙出的多，进的少。由于骨质中的钙大量损失，时间久了就会导致骨质疏松。如果加强功能锻炼，就能促进骨质代谢，提高骨钙的含量。



每个关节内都有滑膜，正常关节活动时，有滑液在不断循环，可防止粘连。骨折后，关节被固定，折叠的滑膜就容易粘连在一起，形成关节内粘连，影响关节的运动，严重者可使关节发生永久性僵硬。因此骨折之后，为了预防关节粘连的发生，就必须及早进行功能锻炼。

骨折后，在一定时间内肢体关节不能正常运动，因而肌肉必定有不同程度的萎缩和无力；下肢表现为站立不稳，无力走路；上肢表现为拿东西无力。这种肌萎缩，医学上叫做废用性肌萎缩，只有通过早期功能锻炼来预防。

由此可见，骨折后既要固定，又要注意适当的功能锻炼。动静结合，这样才有利于加速骨折愈合，并能预防骨折的后遗症。

（贝润浦）

为什么有些人的手术疤痕会越来越凸起来？

不论做什么手术，不论手术大小，都会留下疤痕。疤痕是手术以及其它各种创伤，伤口愈合的必然结局。自身有伤口的人，如果留心观察，可见疤痕的体积和形状会慢慢地、逐渐地发生变化。一般说来，随着时间的消逝，疤痕的颜色将越来越淡，最后恢复正常肤色；体积会越来越小，直至几乎全部消失，隐隐约约只留下一条线痕。但是，有些人却不，皮肤疤痕会越来越凸，高出皮面，变得坚韧而有弹性；会越来越大，超出原有疤痕范围，甚至像蟹脚那样向周围伸展，边缘清楚，形态不规则；表面光滑或高低不平，没有毛发，常因毛细血管扩张而呈鲜红色；局部有瘙痒感，刺痛或伴知觉减退。这种怪疤痕，叫做疤痕疙瘩。

创伤的正常愈合过程中会发生炎症反应。当炎症消退、上皮表面增厚时，伤口深部出现成肌纤维细胞。大约在第四五天，又出现胶原纤维，伤口间隙很快充满排列杂乱的纤维束。最后，纤维束逐渐增大，并产生大量的致密胶原组织（就是疤痕），将切断的组织牢固地连结起来。倘

若疤痕中的纤维结缔组织过度增生，已经愈合的疤痕就越来越凸，形成疙瘩。为什么疤痕的纤维结缔组织会过度增生，使得疤痕越来越凸呢？诱发疤痕增生、形成疙瘩的因素有下列几个：

1. 组织生长能力强。疤痕疙瘩最多见于青少年，因为青春发育期间，组织生长旺盛，创伤后局部胶原纤维的反应性强。



2. 皮肤色素多。有色人种皮肤里的色素细胞较多，色素愈多，组织反应愈强，所以，黑种人易患疤痕疙瘩。

3. 皮肤张力大。伤口所在部位皮肤的张力愈大，产生的刺激愈强，纤维组织增生愈多。如果手术切口与皮肤纹理垂直，或者切口组织缺损较多，强行拉拢缝合，这时由于局部皮肤张力大，愈合后易于发生疤痕增生。同样道理，青少年皮肤弹性足、张力大，易长疤痕疙瘩；老年人皮肤松弛、张力小，疤痕反而平伏。身体不同部位的皮肤张力是不同的，各个关节与足背等处是疤痕增生的好发部位。因为这些部位不仅皮肤张力大，而且活动多，在强力牵拉下，疤痕可反复发生小破裂伴有小出血点，反复刺激纤维组织增生。

4. 切口与皮肤表面所成的角度大。手术，俗称“开

刀”，听起来吓人，其实开刀用的刀很小，只不过是剃须刀片的一半大小。手术刀虽小，用起来却很有讲究。刀片与皮肤表面垂直，这是正确的切割方式，切口愈合后的疤痕细窄。而刀片在皮肤表面的倾斜度愈大，往后的疤痕就愈宽。

5. 异物落入创面。倘若灰尘、滑石粉、棉花纤维、毫毛等等进入创面，势必会引起异物反应，刺激纤维结缔组织增生，疤痕变宽厚。

6. 伤口感染。细菌侵犯创面，局部就有炎性细胞浸润且伴成肌纤维细胞增生活跃。要是伤口化脓裂开，那么，再度愈合的伤口，疤痕必然又宽又大，最后还会长出疙瘩。（盛丹菁）

发高烧会把肺烧坏吗？

许多疾病都会引起发烧，一般把 38.5°C 以上的发烧称为高烧。高烧病人脸色潮红，头昏脑胀，全身酸痛。为了减轻这些不适，医生常给发高烧病人服一些退热剂，使体温下降。可是，发烧毕竟只是疾病的一个症状，中医把发烧称为疾病的“表”。而治病必须治其“本”。“本”未解决，治“表”常难以奏效。因此，往往退热剂药性一过，

体温又立即回升。有时，由于诊断未明，医生为了观察热型，以利诊断，还有意禁止患者使用退热药。这可急坏了病人家属，他们担心高热会把病人的肺烧坏。



高烧真的会把病人的肺烧坏吗？让我们先从发烧的机理谈起。当病毒、细菌之类的病原体侵入人体，或者人体内部因病产生致热原时，人体就会因产生出来的热量大于散失掉的热量而引起高烧，同时产生血流加快、白细胞升高、抗体增加等一系列有利防御的反应。可见，发烧实际上是人体“防御外敌”或“消除内乱”的保护性反应，它与肺部组织的损坏是没有关系的。那么，为什么会有这种误传呢？原因可能是一些患有肺炎的病人，在出现寒战、高烧等最初征兆的时候，由于肺内受病菌感染而损伤的部位还没有达到坏死阶段，这时进行体格检查和 X 射线检查，都不会发现肺部有病变。以后随着高烧不退，病情进一步发展，才显出肺炎的症象，那时再进行 X 射线检查，肺部就会出现阴影，肺炎确诊无疑，于是误解也产生了，认为这个肺炎是被高热“烧”出来的，实际上这是把因果次序颠倒了。


（周小寒）

为什么会出现“时差反应”？

对于远行参加比赛、演出、工作或旅游的人们，乘飞机长途旅行引起的“时差反应”是个令人头痛的问题。他们在抵达目的地后不能全身心地投入工作；白天困倦乏力、昏沉欲睡，食欲不振，晚上则兴奋异常、难以入眠。

“时差反应”，顾名思义，是由于时间差异而引起人体的不适反应。众所周知，地球由西向东自转，约每 24 小时转过经度 360 度，即 1 小时转过经度 15 度。不同经度地方的时刻都不相同。人们规定每隔经度 15 度为一个时区，全球按经度划分为 24 个时区。同一时区里用同样的时刻，相邻两个时区相差 1 小时，东早西迟。太阳光在地区表面移动经度 15 度，正好跨过一个时区、经过一个小时。太阳光所到时区的早晚，规定了该区标准时的变化。飞机往东飞行，方向与日光移动方向一致，时间就“缩短”了。比如，6 月 1 日上午 9 点从上海飞往华盛顿，历经 12 小时，跨越 13 时区，抵达时间该是当地时间 6 月 1 日上午 8 点，正是北京时间晚上 9 点。反之，向西飞行，时间就会“延长”。时间加减数目与飞行方向有关、与跨越时

区数相等。



与地球每天有规律地运转一样，人体也有它一天 24 小时的活动规律。人们习惯白天工作、晚上休息。正常人体温凌晨偏低、午后至傍晚较高。心跳、呼吸频率白昼加快，夜晚减慢。血液中红细胞、白细胞的数量早晨最少、晚上增多。内分泌激素每日的增减，如肾上腺皮质激素夜少昼多、生长激素昼少夜多都是人体生理昼夜周期变化规律的体现。人体生理变化规律的形成与长期所处环境的日照时间、气温气压、湿度等变化密切相关。

人们乘坐飞机向东、西方向飞行，在较短时间内穿越较多时区，时区改变了，昼夜时间改变了，人体原来睡眠、觉醒、体温、血压、激素释放等正常生理节奏也被打乱、甚至颠倒了。北京飞抵华盛顿，是北京时间晚上 9 点，是该准备休息的时候，而华盛顿时间还在早上 8 点，于是人们便在大白天昏沉欲睡、疲倦、注意力和工作效率下降……，出现航空旅行后特有的征状。经过几天至几周时间，人体

心理、生理节奏自动进行调节适应外界环境的变化后，各种时差反应征状也随之消失。

为了避免或减少时差反应，人们可以采取一些预防措施。如飞行前适应：上机前数天，向东飞行者，每日早睡早起 1 小时；反之，晚睡晚起 1 小时。飞行中适应：飞行途中陆续小睡半小时至 1 小时。飞行后适应：下机后及时休息 1 ～ 2 天。然后再参加各种活动。此外，飞行前数天在特定时间内到室外日光下散步；适当改变饮食，也都有预防时差反应的作用。（陈传）

为什么有人会“水土不服”？

日常生活中，常会遇到这样的情况：人们刚到一个新地方，由于突然调换了一个地理环境，有些人便会产生胃口不佳、失眠、头昏无力、精神萎靡等不适，甚至出现消瘦、腹泻、皮肤发痒等症状。这些现象并非由疾病所致，是因为环境突然改变引起的，俗称“水土不服”。

好端端的一个人，怎么会“水土不服”呢？原因错综复杂。主要是身体对新的气候、地形、水质、食物以及风俗习惯等条件的一种不适反应。现代医学研究发现：人体的大脑、心脏等许多器官的活动，都通过生物电现象进行；

当环境的大气电场发生变化时，既可以影响神经冲动的产生和传播，又可影响到心肌细胞的电活动。特别是中枢神经系统，既是人体的最高司令部，又是建立身体和外界环境间相互联系和相互作用的指挥者和协调者。在平时已经适应的环境中，神经活动的兴奋和抑制过程，是经常保持平衡的。

当突然调换了新的环境后，人体与外界环境间的联系就可能发生紊乱，从而打乱了神经活动兴奋和抑制之间的平衡关系，导致一系列“水土不服”的症状的出现。



但是，人又有适应环境和战胜自然的本能，当“水土不服”现象出现后，人体的生理功能也同时开始进行了一连串的调整，使其逐渐适应新的环境。因此，“水土不服”在一般的情况下，是很快就会得到克服的。特别是青少年，生理上的可塑性和对外界环境的适应性更强，他们往往比成年人更容易克服“水土不服”的现象。

（周小寒）

为什么胃出血患者呕的血是咖啡色，而大便血是黑色的？

血液是鲜红色的，可是，当因胃和十二指肠有病而引起出血时，呕出来的血却是咖啡色的、拉出来的血是黑色的。

要解释这个疑问得先从血液的组成说起。血液呈鲜红色，主要是血液中有大量的红细胞，而红细胞的主要成分血红蛋白是红色的。当血液从破损的血管流入胃内后，便与胃液混合，血液中的血红蛋白在胃酸作用下转变为褐色的酸性血红素。这种变色的“血液”再从胃内呕出时，就是人们看到的咖啡色血。不过也有这种情况：如果胃或十二指肠出血的速度很快，或者量很大，那么，这些血便来不及与胃酸作用，立即经食道从口中呕出来，因而血的颜色仍是鲜红色或暗红色的。



胃和十二指肠的出血，既可向上呕出，又能向下通过很长的肠道从肛门排出。一路上不仅红细胞被肠液破坏，血红蛋白也受到一系列的“改造”，特别是结肠中大量存在的细菌，会把血红蛋白中的铁质变成硫化铁。硫化铁是黑色的，因而从肛门拉出来的血就像铺路用的柏油那样黑黑的，医学上称为柏油样大便。当然也有这样的情况：胃和十二指肠的出血速度过快，出血量又大，由于血液对胃肠道强烈的刺激作用，肠蠕动明显增快，使进入肠道的血液中的血红蛋白来不及被“改造”便从肛门排泄出来，这样的血液不是黑色，而呈暗红色。不过这种特别的情况是很少发生的。（周小寒）

为什么说咯血与呕血是两回事？



咯血和呕血都是从嘴里吐血，乍一看，这两种情况很相似，但是实际上，它们是由不同疾病引起的，不可混为一谈。

咯血，是指喉部以下的呼吸道，例如气管、肺，因为血管破裂造成出血而从嘴里咳出来的。很多病都可以发

生咯血，主要有两大类：一类是呼吸道疾病，例如慢性支气管炎、支气管扩张症、肺癌、肺炎、肺吸虫病以及钩端螺旋体病等，患了这些疾病的人，由于病变直接侵犯呼吸道里的血管，造成血管破裂出血。另一类是心血管疾病，例如风湿性心脏病、二尖瓣狭窄症，由于心房里的血液不能畅通无阻地进入心室，连接心房的肺部就会瘀血，咳嗽时就很容易震破肺部血管而造成咯血。

呕血，是指从食道、胃、十二指肠等消化道出来的血，也叫做上消化道出血。发生呕血也有两大类疾病：一类是食道、胃、十二指肠溃疡、肿瘤等病变，直接破坏这些部位的血管造成出血。另一类是肝硬化病，造成肝脏里面的血管阻塞或不通畅，与肝脏血管有联系的食道下端和胃的静脉血管便会随着扩张瘀血，一旦破裂，就会呕血。

其实，仔细区分一下，咯血与呕血在吐血方式上还是有所不同的。咯血时，咽喉部常发痒，伴随着咳嗽从嘴里喷出鲜红色血液，有泡沫，与痰液混在一起。大量咯血停止后，还会有较长时间的痰里带血现象。呕血又是另一番模样，一般不伴随咳嗽，只是上腹部感觉难受和有恶心现象，吐出来的血的颜色不是鲜红，而是暗红色，或与胃液混合变成的咖啡色。又因为呕出的血是从消化道来的，所以常与食物夹杂在一起。

无论是咯血还是呕血，都是内脏器官出血造成的，直

接威胁病人的生命安全。所以掌握咯血与呕血的原因和特点，做到早期诊断和治疗，是至关重要的。　　（姚德鸿）

为什么要切除扁桃腺？


扁桃腺也叫扁桃体，是一种人体淋巴组织，对人体有着防御和抵抗外界病原体入侵的功能。扁桃腺长在口腔内舌根部咽喉的两侧，像两个守卫在人体大门的卫士，防备着入侵之敌。既然，扁桃腺作为人体的卫士，那为什么医生要替一些人切除扁桃腺呢?

原来，扁桃腺表面有 10 ～ 20 个小凹窝，称为隐窝，是侵入人体的溶血性链球菌、葡萄球菌和肺炎球菌等细菌的藏身之处。正常情况下，扁桃腺表面上皮完整，还会不断分泌液体，可将这些躲藏在隐窝处的细菌清除出去。但是，当人体全身或局部抵抗力下降时，防卫能力下降，细菌就会乘虚侵入，引起扁桃腺发炎。于是出现扁桃腺的充血，肿大，表面出现黄白色小脓点，而且会引起全身发热和咽痛等，严重的还会引起风湿热和急性肾炎等全身性疾病并发。因此，在下列情况下应考虑运用手术切除病变的扁桃腺。

一、扁桃腺过度肥大者：扁桃腺炎的反复发作，可使

扁桃腺增生肥大，严重者两侧扁桃腺几乎相碰，堵满咽腔，造成呼吸不畅，病人常常在晚上睡觉时因呼吸困难而被憋醒。时间久了会影响心脏和肺的功能。另外，由于过度肥大的扁桃腺堵住了咽喉，还会影响到吞咽功能，病人因吃饭感到咽部疼痛而吃得很慢或者不肯进食。

二、扁桃腺炎反复发作者：由于反复发作，经常发热、咽痛，就会影响工作与学习。况且，反复发作容易引起风湿热、心脏炎和肾炎等全身性病变。



三、过去曾患过急性扁桃腺炎，而目前长期有低热的人，经过详细的检查，找不出其他原因时，可考虑将扁桃腺切除掉。

四、扁桃腺上长出肿瘤时，也须将肿瘤连同扁桃腺一起切除。

（唐建华）

为什么说“十有九痔”？

痔疮是一种发病率相当高的消化系统常见病，许多成

年人都患有此种毛病。常言道：“十有九痔”（又说“十男九痔”），说明痔疮患者的普遍性。

痔疮是肛门、直肠下端静脉发生扩大、曲张形成的静脉团块，也叫血管团。痔疮有外痔、内痔和混合痔之分，这是由痔发生的位置不同来区分的。简单地讲，痔疮发生在露出肛门之外的，称为外痔；发生在肛管齿状线以下的，称为内痔；如发生的部位两者既有之的，称为混合痔。

人这么容易患痔疮主要是几个原因造成的。首先，自从人进化到直立以后，静脉血液上下体回流的任务就加重了。而动物肛门的静脉血液回流一直很正常，这是因为动物不能直立行走的缘故，所以没见到过动物生痔疮的。因此，痔疮是人类特有的疾病。其次，人的直肠、肛门都位于人体下部，那里血液循环功能是比较差的，静脉血液要从下往上回流，本来就不大容易，如果某种原因增加了静脉回流的阻力，血液回流就更困难了。又如习惯性便秘时，干燥的大便紧紧地塞在直肠下段，压迫肛门周围的静脉，血液回流不通畅，静脉就扩大、曲张。再如经常持久性地站立或直立着工作的人，因为腹中的压力向下，肛门紧闭，使肛门周围的血管没有向左右扩张的空间，也会造成血液循环不通畅，而导致静脉扩大和曲张。



另外，如果直肠下段和肛管有慢性感染时，那里静脉的弹性组织会造成纤维化，而失去正常的弹性。这些都是促使痔疮发生的原因。

要防止痔疮，就应该有良好的生活习惯，多吃蔬菜、多进行体育锻炼、大便要有规律。（劳宏燮）

为什么有的人胸部会凸起？

有的人胸部中央的胸骨明显地向前突起，就像鸡的胸部一样，医学上把这种畸形称为“鸡胸”。“鸡胸”是由于胸部第七、第八和第九根肋骨与胸骨相连处软化内陷，致使胸骨向前凸起造成。凸起程度轻的，表现为胸廓两侧下沉，胸骨向前稍凸起；程度重的，胸廓两侧明显下沉，胸骨向前明显突出，胸廓的横断面成三角形。

“鸡胸”实际上是佝偻病的一种后遗症，而佝偻病是婴幼儿极为常见的一种疾病，病因主要是体内缺乏维生

素 D。那么，身体内缺乏维生素 D 为什么会引起佝偻病呢？“鸡胸”又是怎样形成的呢？原来，维生素的多少与骨头发育关系极为密切。维生素 D 的作用是增强小肠对钙和磷的吸收，也就是说人体从饮食中吃进去的钙，能否被肠子充分吸收和利用，决定于体内维生素 D 的含量。如体内缺乏维生素 D，吃进去的钙再多，也不能很好地吸收利用，白白地从大便中排出。另外，血液中的钙也要通过维生素 D 的作用才能进入骨骼，使骨骼得以正常生长发育，缺少了维生素 D，钙磷代谢便发生紊乱，影响钙沉积于骨骼上，造成骨组织局部堆积和骨质软化这样就会引起骨骼畸形。



预防“鸡胸”，应从婴儿期开始，并从预防佝偻病着手。在婴儿时期要提倡母乳喂养，及时添加辅助食品，如鱼肝油。尤其是应让孩子多进行户外活动，接受阳光的照射，这是因为阳光中的紫外线可促使人体皮肤下的一种 7-脱氢胆固醇转变为维生素 D，可以有效地防止佝偻病的发生。一旦发生了“鸡胸”，如果孩子年龄在 2 ～ 3 岁内，以治疗佝偻病为主；3 岁以后，鸡胸就是一种后遗症了，即使用再多

的药物也无济于事。只能在医生的指导下采取体育锻炼方法，如俯卧撑，拉簧扩胸等，帮助矫正畸形。 （唐建华）

为什么人体需要适量脂肪？

脂肪在体内堆积过多就是肥胖。肥胖与高血压、心脏病、糖尿病、脂肪肝等多种疾病有关。为此，不少追求苗条身材的少男倩女、渴望延年益寿的中老年人，望脂肪而生畏、视脂肪为敌，一日三餐，不沾肉蛋等荤食，也不碰花生、豆油等含脂食物。

其实，禁食脂肪的观点是片面的。因为，脂肪在维护人体健康中发挥着许多不可缺少的作用。

脂肪是体内最经济的能源。它占“地”少，仅为提供相同热量糖体积的 $\frac{1}{4}$；它供能多，每克脂肪氧化时释放 5.6 千焦耳热量，比同等重量的糖和蛋白质的产热量多一倍以上。占体重 10 ～ 30% 的脂肪是人体储存热量的“燃料库”。人体发生“能源危机”时，储存体内的脂肪氧化后可供人体需要能量的 50% 以上。一个人如果停止饮食 1 ～ 3 天，提供人体所需能量的 85% 都来自脂肪。

人体皮下组织和内脏周围含有大量脂肪，犹如软垫。它不易导热，能有效阻止体表散热。天冷时，起到保暖御

寒的作用。它富有弹性，可缓冲外来冲击和震动，保护内脏和肌肉免受损伤。



脂肪是脂溶性维生素的溶剂，它有助于维生素 A、D、E、K 的吸收，让它们在调节人体物质代谢中起着不可缺少的作用。



此外，脂类是构成细胞的重要原料。人体由无数细胞组成。磷脂、糖脂和胆固醇组成的类脂层是细胞的外膜。脑、外周神经组织需要脂类物质。人体生长发育、内分泌激素的形成也都离不开脂类。

脂类有那么多、那么重要的生理功能，难怪营养学家将它与水、蛋白质、维生素等相提并论，列为人体“必需营养素”。

人们发现，女孩体内脂肪含量达到体重 17% 才会出

现月经初次来潮；低于 13%，会引起内分泌功能失调；月经推迟、周期紊乱、甚至闭经。一些为苗条而节食的女孩常常闭经，是体内脂肪缺乏、性激素减少的缘故。瘦者胃、肾等内脏下垂的发病率较高，与支撑固定内脏的肠系膜变薄变“瘦”有关。进食脂肪能刺激胆囊收缩，分泌胆汁，帮助消化。长期不吃脂肪，胆囊收缩功能退化，胆汁潴留，容易生成结石。脂肪摄入过少还会影响脂溶性维生素的吸收，出现皮肤干燥粗糙、毛发脱落、容易出血等现象。

人体需要适量脂肪，尤其是青少年应当摄入适量脂类食物。对于较胖的人和高血压、心脏病等患者应当在坚持体育锻炼的同时，合理节制饮食，在保证人体正常需求下控制饮食，但并不是绝对不吃含脂肪的食物。由此可知，盲目禁食脂肪，结果往往会适得其反。（陈传）

为什么会得肥胖病？

胖与瘦，在一定程度上反映了一个人的营养状况，但过胖或过瘦却是一种病态。一个骨瘦如柴、弱不禁风的人绝对谈不上健美，而过于肥胖则给人以一种臃肿感。肥胖者不仅负担重，活动不便，更重要的是肥胖者容易发生高血压、心脏病和糖尿病等疾病。据有关资料的统计，肥胖

的人寿命相对比较短。由此可见，肥胖对人体健康危害很大。

那么，一个人的体重超过多少才算得肥胖病了呢？这首先得从正常人的标准体重说起。一般讲，正常男女的体重与身高都有一定的比例关系，标准体重的简易计算方法是：

$$\text{男性成人体重（公斤）} = \text{身高（厘米）} - 100 - \frac{\text{身高} - 150}{4}$$

$$\text{女性成人体重（公斤）} = \text{身高（厘米）} - 100 - \frac{\text{身高} - 150}{2}$$



若一个人的体重超过标准体重的 20% 以上者，即可认为是肥胖。目前把肥胖分为单纯性肥胖和疾病引起的肥胖两大类，其中尤以单纯性肥胖居多。

第一类单纯性肥胖常见于那些饮食过多的人。由于饮食中热量摄入太多，超过身体的消耗量，造成入多出少，剩余的热能便在体内转化为脂肪储存起来，使人发胖。有些家庭习惯于吃油脂食物和甜食，不喜欢吃蔬菜、水果等清淡食物；上了年纪的人，由于生活安定，热量摄入多而活动量少，也会发生肥胖。肥胖者由于负担加重，就不大愿意参加运动，而运动过少又易加重肥胖，形成恶性循

环。其次是遗传因素，据有关统计资料，肥胖有一定的遗传性，如果父母中有一人是肥胖者，他们的子女中约有 $\frac{1}{3}$ 会发生肥胖；如果父母两人都是肥胖者，那么他们的子女中有 $\frac{2}{3}$ 会发生肥胖。

第二类是某些疾病引起的肥胖。如甲状腺、垂体、丘脑下部、肾上腺皮质等病变，以及长期使用皮质激素治疗等。

对于肥胖者来说，首要的问题是积极寻找原因，若是疾病引起的应针对疾病加以治疗。对于单纯性肥胖者则应适当控制饮食，在保证蛋白质的情况下，少吃糖类和高脂类的食物，选吃热量少而体积大的食物，如芹菜、笋和萝卜等以增加饱腹感；其次，肥胖者要多参加体育活动，体育锻炼消耗的能量若超过每天的摄入热量，这样就动用了体内原来储存的脂肪，一个时期后人就会变瘦。（唐建华）

为什么会放屁？

放屁，雅称“矢气”，是人体胃肠道通过向下蠕动，将其中气体排出肛门的过程。

正常人消化道中有大约 150 毫升气体。它们中的 60 ～ 70% 来源于体外空气。

人们进餐、喝水、进行吞咽时，会把空气带入胃肠。唾液泡沫和食物中的气体也会经口腔潜入体内。除了外来空气，潜伏在人体肠道内数以亿计的各种细菌，它们在帮助进入消化道的食糜发酵、分解消化道还没有完全分解的食物的同时，也会产生气体。此时，肠菌把血中弥散到结肠的尿素分解为氨，上消化道分泌的重碳酸盐和胃酸混合产生二氧化碳。这些体内产生的气体约占胃肠道气体的 30 ～ 40%。

胃肠道里的气体会通过嗳气，从胃向上经口而出；也会经肠壁吸收弥散入血液，然后由肺呼出。肠内大部分气体经肠蠕动快速下行，悄悄从肛门溜出体外。肠道气体积累较多、肠肌向下推进速度较快，而气体出口——肛门周围肌肉收缩，肛门紧闭时，肠内气体受到挤压形成一个高压区。当气体强行通过肛门，气流产生振动，像口吹簧片，会发出响声。在一般饮食下，正常人每小时排屁 17 ～ 60 毫升，每天排屁 400 ～ 1500 毫升，差异很大。

人屁中 99% 的气体是无臭的，主要有氮、二氧化碳、氧、氢及甲烷等五种。其余不到 1% 的气体如氨、挥发性胺、硫化氢、粪臭素、吲哚等则散发着令人难闻的臭味。屁中除氧和氮来自空气，其它成分大都由细菌发酵分解产生。

人们的生活习惯、饮食结构和进食数量不同，所产生

屁的质和量也不相同。习惯张口呼吸、吞咽唾沫、经常嚼口香糖的人和咀嚼困难的老年人吞气过多，空气进入胃肠。一些经人工特殊处理的食品如面包、蛋糕、冰淇淋、饮料等，含气量高，吃多了会放屁。卷心菜、韭菜等蔬菜和大豆、扁豆等豆类含有大量不易消化的多糖和纤维素，它们在结肠内被肠菌发酵分解为二氧化碳、氢、甲烷。多吃蔬菜和豆类会频频放屁。大蒜、洋葱和韭菜内还有硫化合物，肠菌将它们分解为含硫化氢和硫醇的气体。所以，吃蒜、葱后排出的屁特别臭。许多人肠道内缺乏乳糖酶，不能消化吸收牛奶中所含的乳糖，一旦喝牛奶后，就会腹胀和矢气。鱼、肉、蛋等蛋白质类食物吃得过多，它们在消化道内的残渣被肠菌分解为大量胺类和氨等气体。肠道有炎症时，肠菌过度繁殖，直接作用于营养物质、干扰胃肠正常蠕动，产气排屁增加。



可见，放屁是人体的生理现象，有时也是一种病理反应。人们厌恶放屁之余，也不得不重视它。

（陈传）

为什么会便秘？

便秘是指肠子蠕动缓慢、水份吸收过多，造成大便干硬、次数减少和排出困难的一种现象。便秘不仅在儿童、青年人身上发生，而且也常见于老年人。不少人因大便秘结、出现腹胀而烦躁不安。由于大便粪质坚硬，排出困难，排便时痛苦异常，甚至发生肛裂因而惧怕大便，以致形成恶性循环，影响身心健康。

便秘常见的原因有以下三种。

一、直肠受到刺激不足，难以引起便意：有不少女青年为了保持身体苗条，饮食过于“讲究”，主食过于精细，含粗纤维少，且饮食量不足，蔬菜吃得少，这样食物对直肠的刺激就比较小。大脑因得不到来自直肠的神经冲动，因此就没有便意，以致几天不大便。大便在肠腔中停留时间一长，水份被吸收而变得干燥、坚硬。当然，若长吃含粗纤维过多或刺激性较强的食物（如辣椒），反而抑制肠子活动，也会引起便秘。儿童时期若饮食中蛋白质和钙含量过高，也会使大便呈碱性、干燥而难以排出。

二、排便的动力不足：排便动作看起来似乎是人体很

简单的一种生理机能，其实并不简单。要完成排便过程不仅需要直肠本身收缩，产生向下的压力，而且还需要膈肌收缩下降，腹部肌肉收缩，使腹腔内压力增加，促使大便从肛门口排出。有些人平时缺乏运动或营养不良，因肠壁和腹壁等肌肉收缩无力，排便就会发生困难。

三、精神因素：有些儿童有便意时因受外界因素的干扰，如贪玩、怕父母或幼托老师的训斥等而不敢去大便，过一会便意也就消失了。如此长久下去，由于大便不定时就可形成习惯性便秘。还有些人因肛门周围有病，如脱肛、痔疮、肛裂和脓肿等，因怕大便时疼痛而不敢大便，有意识地抑制大便，时间久了也会形成便秘，而且，这种病人越是不敢大便，大便在肠子中停留时间越长，就越干燥、坚硬，越难以排出。



为了预防便秘的发生，饮食要讲究营养和卫生，养成良好的生活习惯，每天按时大便，即使没有便意也去厕所蹲蹲，坚持一段时间，大多数人都能养成按时大便的习惯。对于那些已经发生便秘的人来说，应仔细寻找原因。如直肠刺激不足引起的便秘，应注意调整饮食，多吃些粗粮和蔬菜、少吃或不吃辣椒等刺激性强的食物。

排便动力不足所致的便秘，应经常参加体育运动，尤其是增加腰腹部肌肉的锻炼，增加排便的动力。如果肛门周围有病，应及时治疗。有便意时不要强忍着。　　（唐建华）

为什么说“大便通畅，身体健康”？

生活中，一些人把吃饭和排便戏谑地称为“进出口”，其实，这个比喻是很恰当的。对一个国家来说，进出口贸易额高，国家就兴旺、发达；对一个人来说，吃饭、排便都很正常，“进出口”顺利，人的身体就健康。而一旦“出口”受阻不畅，“进口”便也会受到影响。长期便秘的人食欲多不振，心绪多不宁，身体多不佳。

为此，我们平时要养成定时排便的习惯，一般人在晨起喝下一杯水或一碗豆浆，或吃了一碗早饭后，大肠会通过大脑向人们发出排便的要求，每天坚持此时大便，这对身体健康是非常有利的。一旦因为出差等其他原因习惯被打乱后，应及时调整过来。有些人因为早上事情太多，无法安排，也可以放在其他时间。有的人排便是两天一次，只要是习惯如此，也是正常的。

合理安排膳食是保持大便通畅的最好办法之一。高蛋白质、高饱和脂肪、大量精制糖、低纤维素的传统西方膳

食者往往排便困难。平时应多吃一些含植物纤维多的粗粮、蔬菜、瓜果等，多喝水。

有便意应及时排，千万不要置之不理。如果有便意而不及时排便，长此以往，直肠的膨胀便不再会唤起排便的要求，就会形成便秘。对妇女来说，如果直肠内粪便过于胀满，会把子宫颈向前推移，子宫体则向后倾，阔韧带内的静脉血流会因弯曲受压而不能畅通，因此子宫壁也发生充血现象，并且由此失去弹性而使子宫保持在后倾位置上。妇女同志会发生骶部疼痛、腰痛、月经障碍等。

老年人由于气血不足、阴液亏虚，以及饮食量少，运动量小，易患便秘。据资料统计，约 11.3% 的老人患有不同程度的便秘。对老年性便秘除进行饮食调理、药物治疗外，老年人应每天进行适当体育锻炼。并且要养成每天定时排便的习惯，即使没有大便，也要每天蹲一次。多喝些水分，有利于调整体液，也有利于大便的排出。



要培养儿童良好的排便习惯，每天固定排便时间；不要总让儿童吃细粮和高蛋白食物，应该给一些粗制食面、蔬菜、水果、红薯等；如果小儿不排便，家长和托儿所的老师就要检查原因，而不要勉强，切不可让孩子无止境长时间蹲坐便盆。（刘正兴）

为什么有的人吃了蚕豆会得蚕豆病？

蚕豆是一种营养丰富、味道鲜美的食物。但是，有的人吃了以后却会出现莫名其妙的不适。轻者食欲不振、浑身不舒服，并有轻度黄疸；多数病人有发烧、头昏、阵发性腹痛、呕吐、黄疸、肝脾肿大、面色苍白、气短、心慌、小便颜色如酱油或葡萄酒色等症状；严重者会昏迷、惊厥甚至死亡。如果到医院检查，血液化验报告红细胞显著减少，每立方毫米内只有 100 ～ 150 万左右，血红蛋白只有 2 ～ 5 克，黄疸指数显著增高。这是一种进食蚕豆或接触蚕豆花粉以后引起的急性溶血性贫血，通常称为蚕豆病，又叫“胡豆黄”。

蚕豆病，是一种古老的遗传性疾病，我国最早见于明朝初期，当时蚕豆叫胡豆，因此蚕豆病就称为“胡豆黄”。这种病有区域性、种族性、家族性和男性多于女性的特点，

得此病的人中有 90% 是不足 13 岁的男性儿童，其中 3 岁以下占 70%。据统计，全世界有 1 亿以上的人易患蚕豆病，从地中海沿岸向东延伸至中东、印度、东南亚一带。



我国主要是长江流域及其以南各省，发生率为 0.4 ～ 15.7%，在云南某些少数民族中高达 18 ～ 68%，而北方却十分罕见。

为什么有的人吃了蚕豆会得病呢? 人体红细胞是血液中最多的细胞，每个红细胞的寿命在人体血液内为 120 天，而维持红细胞寿命和稳定性的重要化学物质是一种叫做谷胱甘肽的东西。谷胱甘肽缺乏，红细胞得不到足够的能量，就变得无力、易衰老而容易被破坏。蚕豆中有一些物质可使谷胱甘肽减少，并能刺激红细胞发生所谓溶血的自身破坏现象。由于大量的红细胞在血管内自身溶解，就会出现黄疸而发生蚕豆病。

谷胱甘肽不是先天就有的，也不是自然而然就能形成的，它的存在或者含量的高低要受到红细胞内葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（简称 G6PD）的影响。如果人体中的 G6PD 缺乏，谷胱甘肽就会明显下降，因此凡本人或家族中有蚕豆

病史的人，可作 G6PD 的测定，如缺乏这种酶，或容易出现溶血的人，不应再吃蚕豆，特别是鲜嫩的蚕豆，还应避免接触蚕豆花粉，以防蚕豆病的发生。（贝润浦）

为什么瓜果菜蔬也能治病？


瓜果菜蔬寻常物，人们日常生活少不了它们。但是瓜果菜蔬也能治病。历史上许多医家都喜欢用瓜果菜蔬入药来治疗各种疾病。李时珍的《本草纲目》中一共记载了 1892 种药物，其中植物药为 1195 种。而植物药中许多就是可供食用的瓜果菜蔬，如枣、梨、柿子、冬瓜、海带、西瓜、山楂、丝瓜、蕃茄等等。现在，当你有病去医院就诊时，医生也往往会说：多吃些新鲜蔬菜，多吃些水果啦，等等。这也正说明，瓜果菜蔬具有一定的药用价值。

实际上，早在古时候，人们就知道，一些植物包括瓜果菜蔬具有药物价值。古老的先民们为了生存，需要向大自然觅取食物，常常要辨识、尝试各种花、叶、果、根等。有时他们会遇到一些“毒物”和“解物”，有时他们会发现一些植物能“泻下”，有的能“致吐”，有的能“镇痛”，有的能“止血”，有的具有“补益强健”作用。后来，当人们发生疾病的时候，就会根据以前的经验，利用这些植物对

症下药，治疗疾病。医药学家总结了劳动人民的经验，摒弃其中不合理的部分，上升到理论阶段。

现代科学研究验证，许多瓜果菜蔬具有某些有效成份，正是这些成份才使这些果蔬具有药用价值。如芹菜、茄子、大枣等都含有较多的维生素 B 和 C，所以它们对预防和治疗高血压、动脉硬化症有较好疗效；山楂由于含有较多的维生素 C 和柠檬酸，所以山楂能开胃消食。又如人体中若长期缺乏某种维生素或矿物质就会导致一些疾病的发生，缺乏维生素 A、D 会引起软骨症、夜盲症；缺乏维生素 B_1 会引起脚气病；缺乏维生素 B_2 可引起口角炎、口腔炎……。而许多瓜果菜蔬中富含这些营养素，所以它们对上述疾病就有治疗作用。

瓜果菜蔬的药用可以分两种，一种是以瓜果菜蔬入药与其他药物一起发挥治疗作用，如用生梨去皮挖心，加入川贝、冰糖，治疗慢性喉炎；用龙眼肉加酸枣仁、茯实炖汤治疗神经衰弱等。另一种是通过单独食用瓜果菜蔬达到保健作用，如夏天吃西瓜达到消暑的目的；吃生大蒜杀菌等等。



但是由于大多数瓜果菜蔬中有效成份的含量较少或不够稳定，有些不一定能单独起到治疗作用，最好再配伍其他药物。如肝炎病人，消化吸收功能较差，除需适当多吃些新鲜蔬菜和水果外，还应该每天服用些维生素 C 片和复合维生素 B 片剂。



瓜果菜蔬用作药物，具有取材方便，经济实惠，几乎无副作用，疗效明显等特点，在临床上受到医生和病家的欢迎。（刘正兴）

为什么说姜是家庭必备良药？

姜，是一种家喻户晓的调料，烧鱼炒肉少不了它；姜也是一味药物，大多数人都知道，若不慎感受风寒，可取生姜数片，煎汤服下，汗出则病愈。

姜，味辛性温，富含挥发油与姜辣素，还含有谷氨酸、天门冬氨酸、丝氨酸、甘氨酸、淀粉以及少量维生素和矿物质，对人体有促进血液循环、加速新陈代谢、促进消化排泄以及抗菌、抗原虫、解毒等多方面的功效。近年来还有人将生姜用于抗癌。《本草求真》载云：“凡中风、中暑、中气、中毒、中酒、食厥、痰厥、尸厥、冷厥、霍乱昏晕、一切暴痛，得之必救”，简直把姜说得神极了。在日常生活中，生姜可用于治疗感冒风寒、呕吐、痰饮、喘咳、胀满、泄泻，并能用于解半夏、天南星及鱼蟹之毒。

小小生姜作用如此之大、之多，足以令人为之侧目。无论在古时候还是现在，有关生姜的研究资料盈篇累牍，完全可以整理成厚厚的一大本书。难怪大学问家王安石在《学说》一文中说：“姜能疆御百邪”。民间也有谚语曰：“早吃三片姜，赛过喝参汤。”明代旅行家徐霞客也曾用生姜治疗感冒，并将此事写进他的游记：“初四日……是晚予

病寒未愈，……初五日，早令仆炊姜汤一大碗，重被袭衣覆之，汗大注，久之，乃起，觉开爽矣。”

现摘录数方于下：

1. 治感冒风寒：生姜 5 片，紫苏叶 30 克，水煎服，乘热饮下，盖被，汗出身愈。

2. 治秃顶：鲜生姜片捣烂，取汁，敷头发大片脱落处，连用 3 ～ 4 周。

3. 治虚寒胃痛、呕吐：干生姜 3 克，研粉，加入米汤内，调匀饮服。

4. 治寒性哮喘、慢性支气管炎：生姜 15 克，切碎，加入鸡蛋 1 只，调匀炒熟后食用。

5. 治脾虚食少：生姜 10 克，茯苓 25 克，白术 15 克，党参 15 克，枳实 15 克，陈皮 10 克，水煎服。

6. 治白虫入耳：姜汁少许，滴耳。

7. 治急性炎症：鲜姜、芋头等量，用石臼捣成糊状，摊在纱布上，敷于患处，可收奇效。 （刘正兴）

为什么说茶是人类健康之友？

我国人民很早就有饮茶的习惯。现在茶已经成为广大人民日常离不开的饮料，无论是高级别的会晤，还是寻常

百姓家的待客之道，都要先敬上一杯茶。

从世界范围来说，现在茶叶与咖啡、可可并称世界三大著名饮料，而且与咖啡、可可相比，茶的历史最久、风行地区最广、饮用人数最多。现在，全世界约有一半以上的人饮茶，茶叶已被举世公认为上品饮料，享有“绿色金子”的美誉。

但是，最早茶叶并不是作为饮料而被发现的。相传，远在公元前 2737 ～前 2697 年，是神农氏最早发现茶，并将茶叶用为解毒治病的药物：“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶（茶的古称）而解之。”自那以后，各代医家对茶叶都很有研究，著名的医药大家李时珍在他所著的《本草纲目》中写道：“茶苦而寒，……最能降火。火为百病之源，火降则上清矣。”食疗专著《随息居饮食谱》载云：“茶微苦甘而凉，清心神，醒睡除烦；凉肝胆，涤热消痰；肃肺胃，明目解渴。……凡暑秽痧气、腹痛、干霍乱、痢疾等证初起，饮之辄愈。”

现代医学研究证明，茶叶有神奇的药效，是人类健康之友。

1. 茶叶中含有咖啡因、茶碱、可可碱等，它们具有兴奋神经中枢、兴奋心脏、扩张肝脏动脉的作用。可用于消除精神疲劳、头昏、嗜睡等；如遇病人呼吸抑制而减弱时，身边又无他药可服，可急以浓茶灌下，以作急救。



2. 茶叶中含有“茶丹宁”等，能增强毛细血管壁的收缩力，并有强心利尿的作用，有利于血液循环和心脏的保健。经常饮用茶叶，有助于心源性水肿、心力衰竭、高血压、动脉硬化、血管神经性头痛等病症的防治；还可用于醒酒、轻度煤气中毒、解烟毒、解油腻、消食清胃等。

3. 茶叶中含有的“茶丹宁”，具有消炎杀菌作用。根据实验，霍乱弧菌、大肠杆菌、伤寒杆菌等放在浓茶汤中浸泡几分钟，多数细菌失去活力。民间也常常有用茶水冲洗伤口、促使伤口愈合的做法。因此，茶叶可以用以治疗急性肠炎、菌痢等。一般说来，绿茶抗菌效能优于花茶，而花茶又优于红茶。

4. 茶叶中含有一种理想的降血糖物质，因其耐热性差，若用开水浸泡则会遭到破坏。若用冷开水浸泡未精制过的粗茶 10 克，5 小时后取服，每次 50 ～ 150 毫升，每日 3 次，可收良好的降血糖效果。

5. 茶叶的药效表现在多方面：茶叶有解毒作用，误服金属盐类或生物碱类毒物者，当其尚未吸收时，可即饮浓

茶，使茶丹宁与毒物结合发生沉淀，延迟吸收；茶叶还能阻断体内致癌物质——亚硝基化合物的合成，可用于预防癌症；茶叶还有消除放射性物质对人体危害的作用。

茶可以给人体健康带来许多好处，除上述以外，还可以消除异味、消除口臭、补充营养、增强体质、减肥消瘦、润肤健美、延缓衰老等。

但是，一些疾病的患者不适宜喝茶。由于茶碱对胃肠粘膜刺激性大，使胃酸增多，所以胃肠溃疡及慢性炎症患者切不饮浓茶；由于茶能兴奋中枢神经，神经衰弱、失眠者不可喝浓茶；茶中成分会与铁分子结合，不易被人体吸收，所以缺铁性贫血患者不可喝浓茶；由于茶中丹宁具有敛肠作用，所以大便干燥、便秘的人不宜喝茶；冠心病、高血压病、严重心脏病、严重肾脏病、严重浮肿及胃肠疾病患者均不宜喝浓茶、多饮茶。（刘正兴）

为什么音乐也能治病？

音乐作为一种养生、治疗手段最早源于我国古代。《素问·针解篇》中有言：“天有五音，人有五脏，天有六律，人有六腑，……，此人与天地相应也。”不同的音律可对不同的脏腑产生效果，依据五行规律，针对不同病症，可运

用宫、商、角、徵、羽五音，采取对症下“乐”。正如《晋书·律历上》所载：“是以闻其宫声，使人温良而宽大；闻其商声，使人方廉而好义；闻其角声，使人恻隐而仁爱；闻其徵声，使人乐善而好施；闻其羽声，使人恭俭而好礼。”显然，音乐对调整人的情绪及培养人的品德操守有很大的作用。

除了有一定音律的演奏吟唱可对人体产生一定的养生、治疗、康复作用外，纯自然界音响也会产生良好的效应。如中国古代深宫大院中往往建造有“听雨轩”，每逢下雨的日子，沙沙的雨声和雨打芭蕉叶声一阵阵传来，会使静坐在轩内的人心情无比宁静、平和，一扫烦躁和紧张之情，有益于修身养性、延年益寿。

目前，音乐疗法作为一门新兴医学学科，正在受到各国越来越多的人的关注，国内有关部门也很重视音乐疗法的应用和发展。有的将音乐伴奏引进人工流产术中，手术时间短，出血量少，病人情绪好；有的用音乐疗法治疗阴性症状为主的慢性精神病人，病人普遍反映，经治疗后胸襟开阔了，对战胜疾病有了信心，精神不再萎靡；有的对献血者使用声乐，可以消除其在成分献血时的不安和避免出现贫血症状。有的医院在门诊用音乐治疗失眠病人，同时辅以药物等治疗方法，效果良好。

“音乐疗法”已被证明对头昏、失眠、多梦、心烦、心

悸、胸闷、肌颤、腹胀等症状有良效；国内外的大量资料证明，音乐疗法对神经官能症、心因性精神病、原发性高血压、冠心病、消化性溃疡、紧张性头痛、斑秃、神经性皮炎等由社会心理因素所致的心理性及心身性疾病有积极的治疗意义。



为什么“乐”能治病、曲能排忧呢？原来这种神奇般的治疗功效是通过物理作用和心理作用两条途径来实现的。如同一颗小石子能激起一泓湖水涟漪振荡，音乐也是一种有规律的声波振动，传入人体后可引起组织细胞发生和谐的同步共振，起到一种微妙的细胞按摩作用。还能同时使颅腔、胸腔或某个组织产生共振，并会直接影响人的脑电波、心律、呼吸律等，从而使生理律趋于正常。所以有人说，“音乐是人类不可缺少的营养”。另一方面，音乐可提高大脑皮质神经细胞的兴奋性，活跃与改善情绪，消除外界精神心理因素所造成的紧张状态，提高应激能力。

但是听音乐也要有所选择，因为并不是所有的音乐对人的身心健康都有好处。国外曾有人对三个不同的交响乐队的 208 名队员进行了调查，发现以演奏古典乐曲为主的

乐队成员大都心情比较平稳愉快；反之，以演奏现代乐曲为主的队员，许多人都患有神经过敏症，有的表现为性情急躁，有的表现为情绪消沉。

为了你的健康，让音乐成为你日常生活中的伴侣吧。清晨起床后听听节奏明快、富于激情的音乐，这会使你一天情绪饱满、心情愉快；忙完了一天工作下班回家后，可选择旋律优美、节奏平和、舒缓的古典音乐，有利于松弛紧张的情绪，减轻疲劳。千万不要收听那种强刺激的音乐，那是对健康有害的。（刘正兴）

为什么耳针能治病？

耳针治病，是一门古老而时兴的科学。

相传很久以前，一个姑娘砍柴归来时双目失明了，这时恰巧遇到一位游医。医生用银针在姑娘耳垂上轻轻扎了几针，姑娘就重见光明了。姑娘感谢这位恩人，每日把银环佩于双耳。从此，开了人间戴耳环之风尚。传说只是传说，有文字记载的是，早在晋代，医学家葛洪“用葱刺耳中，……救卒中恶死”。唐代大医家孙思邈取“耳中穴……治马黄、黄疸，寒暑疫毒等”。明代针灸大师杨继洲“灸耳尖……治眼生翳膜”、“针耳门治龋齿”，等等。一千多年

过去了。今天，人们依然像古人那样，用耳针治病：治头痛、发热、失眠等常见症；治瘫痪、聋哑、癫痫等疑难病。耳针减肥、耳针戒烟戒毒、耳针麻醉等应运而生，并且取得了一定的效果。发源于我国的耳针疗法，现在已遍及世界五大洲。

耳针是中国古老的针灸学的重要组成部分。人们推测，早在 4000 年甚至 1 万年前，我们祖先就用针刺治病了。当时，人们感到身上痛楚，就用手或石针叩击痛处。久而久之，人们逐渐意识到体内一些疾病会在体表的特殊部位反映出来，导致感觉和形态的异常；也会引起耳朵特定部位的异常变化。人们把身体和耳朵的这些特殊部位叫“穴位”。刺激它们，会产生奇特的治疗作用。

人体表面的穴位星罗棋布、遍及全身，它们按一定规律排列着。把有相似作用的穴位连成线，它正是维系体内某一脏腑的“经络”。有趣的是，耳廓上不同穴位排列起来，它酷似一个母体内倒置的胎儿，耳垂是胎儿的头面、耳轮是胎儿的脊柱、耳舟是胎儿的上肢……。中医传统理论认为，“耳为诸宗脉之所附”。络属五脏六腑的经脉直接或间接上达于耳。耳廓虽小，却是这些经脉通过、终止和交会的场所。耳朵正是通过这些经脉与脏腑相互联络、传递信息。内脏病变时，耳廓表面发生变形、变化、结节、脱屑等细微变化。有经验的医生根据这些变化揣测疾病。同

样，在耳廓穴位扎针，特殊刺激信号通过经络传入相关脏腑，能够起到治病目的。



耳针

现代医学证实，耳廓有丰富的神经，耳朵通过它们与全身器官密切联系。耳针治病时，银针刺激兴奋耳廓浅层和深层各种感受器，感受器将各种感觉冲动通过神经“报告”中枢神经系统和相关器官，不断调节各器官的活动。尿量少时，耳针能增加尿量；尿量过多，耳针又有抑制作用；耳针胃区，胃肠蠕动增加；针刺耳廓心、小肠等穴位，冠心病患者症状能得以改善。除神经系统外，耳针还通过其它方式，如体液调节等调整机体。

虽然迄今人类尚未完全揭示穴位、经络的本质及针刺治病的原理，然而，耳针疗法作为中医学宝库中的重要遗产，已在世界各地“开花结果”、广泛应用。　　（陈传）

怎样吃鸡蛋才有益健康？

关于鸡蛋，世界各国有着许多有趣的习俗。在英国，每逢节日或婚宴，主人特意将一只鸡蛋打碎，将蛋清和蛋黄倒入清水中，根据其形状来占卜今后的日子是否美满，然后拌入白糖蒸熟吃掉，以此祝愿生活幸福、和谐。

在法国的一些偏远村庄中，每逢男婚女嫁时，新娘总喜欢把鸡蛋偷放在自己的衣裤中，当走进洞房时，新娘故意不慎摔倒，让鸡蛋掉出，以表示自己会“生蛋”——会养孩子。

在摩洛哥有着一种奇怪的习俗，即妻子不能当着丈夫的面吃鸡蛋，否则会被认为干了伤风败俗的事。

这样的趣闻很多。但是在现实生活中，鸡蛋只是寻常物。由于鸡蛋营养丰富，吃用方便，备受千家万户的欢迎。但是吃鸡蛋也有不少科学知识。

第一个问题是“喜蛋”能不能吃?“喜蛋”即死胎蛋，一般说来，“喜蛋”与普通鸡蛋相比，只要不变质不受污染，两者在营养成分上没有多大差异，因此，只要食者不拒绝，完全可以放心食用“喜蛋”。中医学记载，“喜蛋”可以补虚损，治眩晕。

第二个问题是鸡蛋生吃好还是熟吃好？有人认为，生鸡蛋容易吸收，营养价值高，有益于补养身体，其实不然。首先，生鸡蛋里含有抗生物素和抗胰蛋白酶，有碍于人体对蛋白质的消化，造成肌纤蛋白质和维生素 B 族缺乏。鸡蛋煮熟后，原来含有的抗生物素被破坏，蛋白质结构改变。生鸡蛋蛋白质结构致密，人体吸收率不到 60%，其余部分成为废料排出体外；熟鸡蛋蛋白质结构松散，极易被人体吸收，吸收率可达 90% 以上。另外，蛋壳表面布满细菌、霉菌和寄生虫卵，它们通过蛋壳上肉眼看不见的小孔钻到鸡蛋里造成污染，而熟鸡蛋里这些有害物质都被杀灭了。还有，生鸡蛋有股奇特的腥味，不但破坏食欲，还会引起消化不良，反之把鸡蛋炒熟或煮熟吃，清甜可口，符合卫生。



至于蛋黄营养好还是蛋白营养好这个问题，我们不妨看一下两者的营养素含量，蛋黄中蛋白质占 1.5%，脂肪占 33.3%；蛋白中蛋白质占 1.23%，脂肪占 0.2%。显然蛋黄的营养高于蛋白。此外，蛋黄中还含有丰富的维生素、无机盐、卵磷脂等。有人认为蛋黄中

胆固醇含量高，会引起高血压和冠心病，其实大可不必担心，医学专家认为，每个吃两个鸡蛋并不会导致胆固醇增加，相反蛋黄中的卵磷脂还能有效地防止动脉硬化。

那么红壳蛋好还是白壳蛋好？红壳蛋看上去色泽红润，壳坚不易破碎，蛋黄颜色深，因而大多数人认为它比白壳蛋营养好。其实两者并无优劣可分。红壳蛋的蛋白质含量为 12.4%，脂肪含量为 11.2%；而白壳蛋的蛋白质含量为 13%，脂肪的含量为 9.9%，其他成分含量也基本相当。

鸡蛋是人们公认的优质蛋白质食品，鸡蛋的蛋白质中含有丰富的人体必需氨基酸，这些氨基酸之间的比值最符合人体的需要，容易被人体吸收和利用。　　（刘正兴）

为什么老年人夜尿会增多？

有人对不同年龄的人晚上睡觉以后再起来小便的次数作了调查，结果显示：20 ～ 30 岁，每晚夜尿 1 次或 1 次以上的仅 30%；30 ～ 40 岁，夜尿 1 次或 1 次以上的占 70%；40 ～ 50 岁，夜尿 1 次或 1 次以上的达 96%；50 ～ 60 岁，夜尿增加到 2 次以上的占 50%；60 岁以上，夜尿超过 2 次以上的占 80%。看来，年纪越大，夜尿次数确

实也多。那么，上了年纪的人为何夜尿增多呢?

首先，老人多肾亏。肾亏是中医的病名，现代医学证实，肾亏的人常见肾脏功能和泌尿系统功能减退。人的肾脏重量会随着年龄的增长而减轻，从 40 ～ 80 岁逐渐减少到肾脏原重量的 80% 左右。这主要是肾脏内脂肪增加，组织增厚，使肾小管细胞数目减少。肾脏是人体内废水的“过滤器”，肾小管功能减退，就会使肾脏的过滤率下降，积聚在肾脏里的水分未经充分浓缩过滤就流入膀胱，增加了膀胱的排尿量，这种情况到了夜间随着神经系统对肾脏功能调节作用的减弱而更明显，所以夜尿增多。



其次，上了年纪的人容易得糖尿病。这是由于人到老年期，内分泌系统普遍出现衰退性变化，用于分解糖分的胰岛素分泌减少，致使糖代谢失常，从而发生糖尿病。患糖尿病的人在尿液里有较高的糖分，所以称糖尿。糖尿可使尿的渗透性增强，肾小管重新吸收水分的量减少，于是大量水分从小便排出。所以老年人小便增多常是得糖尿病的重要信号。有的糖尿病人小便量每日可高达 1 万毫升以上，日间排尿 20 次，

夜间排尿 10 余次。

再有，随着年龄的老化，膀胱就像一只玩旧了的皮球一样弹性减退，满是皱壁，医生称为“小梁形成”，小便时膀胱的“逼尿肌”收缩无力，以致每次排尿都有很多尿液剩积在膀胱里。这些残余尿液使膀胱的实际容量大大缩小，当尿量稍为超过膀胱容量的限度时，就会引起膀胱收缩，发出需排尿的信号，这种信号在夜间睡眠时最容易催醒大脑。年龄越大，膀胱的容积越来越小，夜间的尿意信号也越发频繁，小便次数也就越来越多。

如果老年男性患有前列腺肥大，老年女性的膀胱出口处的腺体增生，影响排尿功能和使膀胱积留残余尿，就增加了夜尿次数。

此外，夜尿增多还与老年人的睡眠障碍有关。老年人夜间睡眠易醒，醒后不易入睡，因为睡不着，就对膀胱的尿贮存刺激信号比较敏感，自然会想起床小便，这种夜尿次数多就不是疾病因素了。（贝润浦）

为什么有的儿童会患多动症？

多动症是一种常见的儿童精神行为方面的疾病，最常见发病的是小学阶段的儿童。我国小学生中多动症的发生

率达 1.3 ～ 8.6%。

所谓儿童多动症，主要表现有两个方面：一个是多动。这些孩子坐立不定，嬉戏吵闹没完没了，而且情绪不稳，容易冲动，十分任性，不听劝说，很难管教；另一个是注意力无法集中，容易受外界影响而分散。

多动症儿童在某些发育上落后于同年龄正常儿童；部分儿童在学习、走路、讲话、穿着、控制情绪和对事物的理解等落后于正常儿童。



儿童多动症是由轻微的脑功能失调引起的，所以一度曾定名为轻微脑功能失调症，但是，发生这类失调的原因，却有好几种意见，有的认为，儿童阶段，脑子和神经发育还不健全；有的认为，某些外来因素，例如精神刺激，或者某些伤病，例如脑炎、脑膜炎、脑外伤，以及产妇生养时难产导致婴儿脑部受伤等，都会对后来的脑功能是否健全带来影响。

一些神经生理学家通过研究，发现儿童多动症是患儿的脑与神经传递功能方面有障碍的缘故。神经与脑最基本

的组成单位是神经元，神经元要传递各种信息，须依靠一些化学物质，医学上叫做传递介质，或简称递质。其中有一种叫做单胺类的物质很起作用，而患多动症儿童的脑子与神经中这种单胺类物质代谢有异常，使得脑部功能与神经传递脱节，于是产生了上面讲到的这些症状。此外，医学专家还发现，缺锌、缺铁或内分泌功能紊乱，也可能是儿童多动症的诱发因素。

儿童得了多动症，症状严重时可以用利他灵、苯丙胺等药物治疗；一般情况下不必用药，主要还是加强教育与智能训练，并且为儿童创造良好的学习与生活环境。

（郭莲舫）


为什么给孩子异性打扮不好？

社会上，有的父母对子女性别有所偏爱，明明是男孩，但父母却把他打扮成女孩，认为女孩秀丽娇美；有的明明是女孩，父母因喜欢男孩，便给予男性打扮，聊以自慰。

有人在上海地区调查了三所托儿所，发现有 30% 左右孩子，男扮女装或女扮男装。这种现象对儿童的成长十分不利，有可能会伤害儿童的心理健康。

曾有位 20 岁男青年，因为从小家里给他以女性打扮，

给他穿花衣服、花鞋、留小辫子、涂口红，不知底细的人以为他是女孩，读小学时才剪掉长发，穿男式外衣，但内衣裤仍然是女式的。青春期后，更一反常态，常找比他大的男孩子去玩，并愿意让他们搂着他，还常常打扮成亭亭玉立的少女，与男同学合影。他还偷偷地自服雌激素，最后在一天晚上把自己的生殖器阉割掉了，想把自己彻底变成女性，结果造成了悲剧。



从上面例子说明，幼儿期异性打扮决不是一件好事，心理学家认为，在幼儿期的儿童，有一种“模仿欲”的心理，如果父母对孩子进行异性打扮，就会促使孩子的“模仿欲”发展成一种心理变态。这种变态心理到成年时纠正，那就为时太晚了。（郭莲舫）


为什么精神病往往是遗传得来的？

当医生对一个精神病患者进行诊断和治疗之前，不仅要查病人本人的患病史，并且还十分重视病人家属中什么人患过精神病、患的是什么类型的精神病、程度如何等等

的情况。

这不是没有道理的。因为，有些精神病，遗传因素在发病中起着很大的作用。而且，随着医学科学（特别是产科、婴儿防疫等）的发展，其他能导致精神发育不全（即精神病症）的因素，越来越次要了。以前在精神病病因中占首位的婴幼儿期感染性疾病（如高烧引起的痴呆），已经有了较好的控制手段；又如实行产前检查、新法接生、讲究孕期卫生、早期纠正胎位等等，生下来的婴儿成为“白痴”的可能性大大减小了；再如自从应用流行性乙型脑炎疫苗进行预防接种以来，由乙脑致成精神病的事例也大大地减少了。这样，就使得遗传因素在精神发育不全的病因学中的地位，越来越突出了。

国内外都有医学科学家作过精神病患者的家属患病率的调查统计。如精神分裂症，家属成员的患病率为 2.6 ～ 16.4%，而在一般人群中患病率则只有 0.8% 左右。而且亲缘关系越是近，比例越高，如果父母两人都是精神分裂症患者，其子女的患病率竟可高达 50% 以上。看，遗传在精神病病因中占的位置多么显著呵，怪不得医生非常重视精神病患者的家谱。



那么，精神病又是怎样遗传的呢？我们知道，人类的遗传特征，即决定后代性状的遗传密码是排列在机体组织细胞核内的染色体上的。正常人的染色体是 46 条，双双成对，一共 23 对。按照它们的大小及形状，可以分别予以编号和分组。可是经遗传学家研究后发现，先天性精神病患者的染色体却不是 46 条，而是 47 条。正是这条额外的染色体，造成了染色体的畸型变化，结果产生了一系列的躯体和精神发育方面的异常。

当然，遗传在精神病中更深层次的作用，目前仍是医学科学需要进一步研究的重要课题。（劳宏燮）

为什么儿童也会患忧郁症？

大家都知道，一个人受到重大精神刺激后会引起精神病或忧郁症。那么儿童天真烂漫，无忧无虑，为什么也会

得忧郁症呢?

不同年龄的儿童，有不同的心理特点。这种心理特点一方面与不同年龄的神经生理发育密切相关，另一方面也与生活环境密切相关。婴儿自出生以后，就同他生活的社会环境联系在一起，周围出现的各种声、光信号，各种事物的形象，都可能通过感觉器官传入中枢神经系统，产生感觉、知觉并出现相应的情感和行为。

不同年龄的儿童处在不同的心理发育水平上，从对事物的形象感知，逐渐发展分析、综合能力，直到抽象的思维。随着大脑神经系统功能逐渐完善，心理活动水平也从初级阶段向高级阶段发展，逐渐适应扩大的社会生活范围。

引起儿童忧郁症的因素是多方面的。



例如儿童幼年时就因父母离婚、死亡，因而失去了直接的感情寄托。

又如父母经常斥责孩子，特别是对女孩，稍不如意就说什么“生你出来多余”、“不如死了好”等，日常生活上抚育照顾不周全，缺吃少穿，甚至遗弃等，这些都会使孩子产生自卑心理，忧郁不乐。

在再婚家庭中，孩子遭继父、母歧视，虐待，在家庭中没有地位，也会使孩子产生严重的忧郁心态。

父母情绪低落，经常闷闷不乐，使家庭气氛沉闷压抑，对孩子疏于照管，也会造成孩子的忧郁心态。

儿童忧郁症的具体表现有哪些呢?

1. 隐匿性忧郁症：一种表现在表面行为方面，如不守纪律、不听话、执拗、反抗，容易冲动发怒，甚至做出捣乱、破坏或其他违法行为。另一种表现在心理生理方面，如呕吐、腹泻、肠绞痛、皮肤疾病、厌食或过食，以及肥胖但查不出相应的躯体疾病。

2. 急性忧郁反应：常因亲人突然死亡、分离，或其他重大不幸事件所引起。起病急，表现为情绪低落、易伤心流泪、动作缓慢、声音低而单调、并从言语中反映出绝望感，同时，常伴有食欲缺乏、失眠、夜惊或恶梦等。出现乏力、消瘦、社会活动适应能力下降，但不久得到恢复。

3. 慢性忧郁症：因家庭缺乏欢乐融洽气氛、父母患有忧郁症，或者父母的情绪消极悲观，他们的孩子就会胆小、害羞、易受惊、不合群、学习成绩下降、睡眠差、食欲减退等。慢性忧郁症起病慢、容易反复，严重的可使孩子出现消极观念，如觉得活着没有意思，甚至企图自杀等。

儿童忧郁症的治疗是比较复杂的，除了为孩子建立温暖的家庭环境、改变教育方法和培养乐观情绪外，还要配

合服用适量的抗忧郁药。 （郭莲舫）

为什么有些儿童会患恐惧症？

儿童对客观环境中某些事物产生恐惧，如不敢站立在高楼的窗口，怕失足坠落，害怕黑暗的环境等，这些都是正常的心理现象。

如果这些正常心理现象受到不正确的引导，或遇到意外的惊吓后，恐惧的时间太长，就会渐渐形成恐惧症。曾有个儿童在农村受狗的惊吓，以后见到毛茸茸的东西如狗、兔、猫或裘皮，也产生恐惧感。

儿童经常听大人讲恐怖的迷信故事，或者被大人关在黑房间里，深夜在户外受到惊吓，容易产生怕黑暗、怕空旷、怕巨大响声、怕独处一室或怕单独睡觉等恐惧心理。

父母往往是儿童模仿的榜样，如父母对某些事物产生过度的恐惧，也会影响儿童。如有位儿童的母亲一听到雷声即惊恐不已，闭门关窗，偏偏他的外婆又常讲：“雷公公要打死做坏事的孩子”，于是，孩子便对响雷感到十分恐惧。

一般儿童对黑暗、雷电、某些动物或登高等感到有些害怕，害怕的程度一般极轻，这是一种正常的心理反应，

但长时间极度恐惧则会引起失眠、做恶梦、惊哭，甚至产生懦弱和缺乏自信。

持续的恐惧情绪反应，称为恐惧症。这种反应是剧烈的，可影响儿童的日常行为，并伴有相应心理生理改变。根据我国调查，有关儿童对特殊境遇恐惧发生在 10 岁以内，男女无性别差异，而对特殊动物恐惧几乎全为女孩。上学儿童还可以出现学校恐惧症，严重影响学习。

儿童有恐惧症怎么办呢?



恐惧心理虽说不是病，但它会影响儿童心理发展，如不及时纠正，极容易发展成恐惧症，因此必须用下列几种方法纠正：

首先父母本身，应纠正某些错误观点和教育子女方法，不要恐吓儿童。对一些表面上看起来很可怕的事物应反复说明事实的真相，让他们了解一些有关的科学知识，鼓励他们仔细观察和分析各种自然现象。

要鼓励儿童多阅读欣赏健康有益的儿童小说、电影、电视。不要给儿童讲“鬼”的故事，或看内容荒诞的恐怖电视、电影，锻炼儿童不畏险阻，勇敢坚强的意志。

对于性格内向的孩子，如长期不合群，孤独，往往容易产生恐惧心理。要多鼓励他们参加集体活动，发展各方面的兴趣爱好。比如多参加有益身心的郊游、爬山、游泳等活动，培养孩子开朗、活泼的性格。

养成儿童良好的睡眠习惯，晚上不要使他精神太兴奋，睡觉前先洗脚，上床后可默默数数字，自然而然进入梦乡。

对已经形成恐惧症的儿童，可以采用行为疗法的脱敏治疗。如果儿童害怕动物，那么可以经常到动物园去玩玩，熟悉各种动物，或在他周围布置一些动物模型，让孩子逐步接触，并且详细讲解一些动物知识，最后，带孩子去看真的动物，次数一多，恐惧症就会消失。　　（郭莲舫）

为什么睡眠要注意姿势？

睡眠是人体最重要的休息方式。在人的一生中，大约有 $\frac{1}{3}$ 的时间是在睡眠中度过的。睡眠的质和量决定了休息的好坏，关系到白天学习、工作的效率。高质量的睡眠不仅取决于睡眠的时间、环境，也与睡眠的姿势有关。

有些人喜欢趴着睡，胸腹向下，背部朝天，仿佛这样更安静。但是，俯卧时腿和躯干的一些韧带肌肉得不到完

全放松和休息。在体重压迫下，胸廓活动受到限制，影响了肺的呼吸功能和心脏功能。胸部和阴部被压，不利于青少年发育成长。俯卧时头总是偏向一侧，以免枕头捂住口鼻，时间长了，对侧颈部肌肉容易“拉”伤。因此，俯卧是睡姿中最不科学的，应当加以改正。

不少人习惯朝天睡，身体挺直，四肢舒展，认为仰卧能防止驼背，有利于脊柱和骨骼的发育、促进个头长高。



右侧卧姿

然而，从人体肌肉分布看，仰卧和俯卧相同，躯干和腿部另一部分肌肉仍然处在紧张状态，得不到有效休息。仰卧时双手如果放在胸口，或棉被太厚太重压迫胸部，也会妨碍心肺功能，甚至引起多梦、惊慌的感觉。有打鼾习惯的人仰卧熟睡时，出入咽喉的气流冲击下坠的舌根，发出阵阵鼾声。

侧卧睡眠时，身体稍向前弯曲，肢体关节大多放松、微曲，处在良好休息状态中。左侧卧位，位于胸腔左侧的心脏在下，心脏泵血压力增大，负担加重。右侧卧姿，不

仅减轻心脏负担，而且能向位于腹部右侧的“藏血”器官——肝脏提供更多血液，也能使胃肠道内容物更顺利运行。因为，胃到小肠和小肠到大肠的入口都是朝向右的。所以，人们普遍认为右侧卧睡是最好的睡眠姿式。

除了躯干和四肢，头、颈的姿式也很重要。睡眠时头朝南、脚向北，身体主要经脉与地球磁力线平行，有助于睡眠。人体颈椎略向前凸，没有枕头或枕头过低，颈部肌肉不能放松，头部血管容易充血，起床后就会头胀头痛，眼皮浮肿。枕头过高，颈后部肌肉被牵拉，颈内供血动脉轻度受阻，醒来后会感到肩颈酸痛、头昏脑胀。研究表明，8 ～ 15 厘米厚的枕头较为适宜。仰卧时，枕高约为一拳左右；侧卧时，枕高为一拳半。

一生中睡眠姿势不会一成不变。一晚上睡姿也会反复几次。人体动态脑电图电子计算机扫描观察到。睡眠过程中有二个生理性兴奋波出现。在这二个兴奋波时间内，人们变动体位、改换睡姿。慢速电影记录显示，几乎没有人能在半小时内一点都不改变睡眠姿势。有人说，爱怎么睡就怎么睡。然而，好的睡姿保证了好的睡眠，好的睡眠能使明天更精神、更愉快。（陈传）

为什么小孩睡觉时爱踢被子？

小孩子睡觉时踢被子是司空见惯的事，这与孩子的脑神经尚处在发育阶段，抑制与兴奋的调节功能尚未完备有关。当孩子入睡后，大脑细胞大部分处于抑制状态，小部分大脑细胞还十分活跃处于兴奋状态。特别是白天小孩玩得过分兴奋疲劳，睡前家长过于逗引小儿，或看过惊险的电影、电视，听过紧张可怕的故事，喝过咖啡或浓茶，晚上吃得太饱，睡时被子盖得太厚，睡时衣服穿得太多或手臂压胸等，都可使兴奋的脑细胞更加活跃，便随意向手脚发布活动的指令。这样，就可以看到小孩睡觉时手脚不安定，踢掉盖得好好的被子。

怎样防止小儿睡觉时踢被子呢？在睡前使孩子的情绪保持安定是十分重要的。不要过分逗引小孩嘻笑吵闹、恐吓小孩，给孩子看紧张恐惧的电影或电视、喝



刺激性饮料，睡前不宜

吃得过饱，白天也不要玩得过分疲劳。被子不要盖得太厚，睡衣裤穿得少一些，宽大一些，更不要以衣代被。否则，身体内多余的热量不能散发，小孩闷热难受，身上出汗，就会踢掉被子，让手脚露在外面。此外，要培养孩子有良好的睡眠姿势，不要俯卧，头面部不要蒙在被子里，手不要放在胸前，最好让小孩向右侧睡，临睡前给孩子用热水洗洗脚，改善血液循环，使肌肉放松，这样，就能避免或减少孩子在入睡时乱踢被子。（贝润浦）

为什么婴幼儿睡觉时容易出汗？

有不少婴幼儿入睡后不久，头部，尤其是前额常有出汗的现象，厉害的甚至枕头也会被汗水打湿。对于婴幼儿睡眠中的头部出汗现象，不少人认为是孩子体质虚的缘故。其实，婴幼儿睡觉时出汗多并非都是体质虚弱，其中相当一部分是属于生理性的多汗。

汗是由皮肤上的汗腺分泌出来的，其中 98 ～ 99% 都是水。出汗是人体的一种生理现象，能调节体温，排泄废物，也是身体散热的重要方式。婴幼儿睡觉时出汗与其生理特点有关。婴幼儿正处于快速生长发育阶段，新陈代谢

旺盛，产生的体热较成人多；而他们的皮肤含水量亦较大，微血管分布较广，身体为了维持正常的体温，就以出汗的方式来散发过多的热量，所以小儿容易出汗。即使是在睡觉时，虽然神经已由兴奋状态转变到抑制状态，但由于小儿的神经系统发育还不完善，神经调节功能差，特别是刚入睡或刚要醒来的时候，管理出汗的交感神经会出现兴奋状态，所以小儿入睡后出汗增多。还有一种原因是有些婴幼儿上床前剧烈活动，或者喝牛奶，吃巧克力等，这些都会使身体内产生大量热量，入睡后就通过出汗来散热。此外，室温过高和保暖过度也常常是小儿睡眠时出汗的原因。作为家长往往习惯于以自己的主观感觉来决定小儿的环境温度，喜欢给宝宝多盖被，捂得严严实实，于是小儿身体产生的过多热量不能及时通过对流、传导等散发时，只能通过出汗来调节体温，这些都属于环境温度形成的生理性多汗，不是病。



当然，婴幼儿睡觉时出汗多，有的确实是疾病引起的。例如，患佝偻病的孩子最先出现的症状就是头部多汗，不

管什么季节往往在喂奶时或入睡后出汗增多，熟睡后逐渐消失。又如，一岁左右的孩子，营养不良或体质虚弱时，夜间入睡后，头、胸背部特别容易出汗。如果婴幼儿经常在天亮前或清晨空腹时多汗，同时有面色苍白、软弱无力的症状则可能是血糖过低所致。如果小儿不仅上半夜多汗，下半夜天明前也多汗，同时伴有低热、面颊潮红、消瘦等症状，那就应该去医院检查是否患有结核病。 （唐建华）


为什么说睡平板床好？

人的一生大约有 $\frac{1}{3}$ 时间是在床上睡觉度过的，因此，床对我们来说是相当重要的。千百年来，各个国家的各个阶层都有适合自己的床，有埃及法老图加曼的折合床，也有法国拿破仑帝国时代的元龙高卧的长靠背椅般的睡床，有现代圆形的水垫床，也有中国农村稻草作垫的土炕。从床的组成材料来看，有木板床、棕绷床、钢丝弹簧床、席梦思床等。

哪一种床更有利于人体的健康呢?

从人体的生理结构来看，席梦思床、钢丝床、松驰的棕绷床等过于松软，都不是理想的睡床。在这些软床上睡觉，仰卧时人的脊柱呈弧形，侧卧时呈侧向弯曲，这样会

使脊柱附近的韧带和关节负担过重。日长天久，容易引起脊柱的不适和疼痛。



另外，过于松软的床铺也容易养成人们蒙被睡觉的坏习惯。棉被里空气不流通，时间一长，被窝里的氧气不足，而二氧化碳却越来越多，这样就会导致人体缺氧。熟睡者此时会突然感到胸闷、气急，有的还会做恶梦，半夜中惊叫起来。这样，大脑得不到很好的休息，次日清晨起床后会感到四肢乏力、头昏脑胀，严重影响白天的学习和工作。

如果让孩子睡软床，除会产生上述弊端外，由于孩子骨骼尚未发育定形，还会造成脊柱弯曲变形及侧突畸形。

所以，国外医学家提出一种日常健康法——睡平板床。床铺太软对健康不利，一般说来，床的硬度以仰卧时臀部不过度下陷为原则。如果睡木板床或炕，就能使脊柱基本上保持正常的生理状态。轻度的脊椎错位，只要睡平板床、经过一夜的休息便能得到纠正。婴幼儿睡平板床有利于骨骼正常发育。妇女睡平板床有助于保持优美的体形曲线。

（刘正兴）

为什么说高枕并非无忧？

枕头是人们睡觉时垫在头下的东西。人的一生中约有 $\frac{1}{3}$ 的时间花在睡觉上，所以说，枕头与人有不解之缘，在人们日常生活中枕头对人体健康起着重要的作用。

如果晚上睡觉不垫枕头，头的位置就会比心脏还低，流到头部的血液就会增多，导致头部血管充血，时间一长，就会造成头昏脑胀，眼皮浮肿，睡不好觉。



相反，枕着枕头睡觉，头垫高了，胸部也略微抬高。这样，下半身的血液就可以回流得慢些，能够减轻心脏的负担。对有仰卧习惯的人，垫着枕头睡觉，肺部不会紧贴着床，这样有利于呼吸。而且，枕在枕头上，人的颈部略向前弯，颈部肌肉能放松，有利于人体的休息，早晨醒来人的精神也好。

一般说来，选用枕头必须考虑到枕头的高度、硬度和

弹性。枕头过高，颈部的肌肉就不能自然放松，靠枕头一侧的肌肉会被拉长，造成肌肉长时间紧张，导致疲劳。这样一夜睡下来，脖子疼、头痛，甚至会发生抬头和低头困难，头颈转动不便，这就是俗称的“落枕”。而且，枕头过高，心脏向头部供血困难，无形之中增加了心脏负担。高枕睡眠还会减小颈部和胸部之间的角度，使气管弯曲，通气受阻，容易导致咽干、咽痛和打呼噜。此外，枕头过高还会使胸背部肌肉长期紧张、颈部软组织痉挛乃至组织、血管、神经受压迫，引起肩部酸疼、手麻、头昏等症。所谓“高枕无忧”的说法从医学角度看是不科学的，适宜的枕头应该是不高不低、不硬不软、弹性适中。

那么，枕头到底以多高为宜呢？专家们做过实验，对躺在不同高度的枕头上的人进行脑电图检测，结果发现，枕在 6 ～ 9 厘米枕头上的人，其脑电波最早出现平稳的休息波形；反之，过高或过低的枕头都会影响睡眠，使人产生不适感，难以入睡。

骨科专家认为，从人体生理角度和颈椎形状看，头部枕在枕头上，枕头受压后的高度以 8 ～ 15 厘米为宜，而枕头的形状最好呈马鞍形，两头高，约 15 厘米，中间低，约 8 厘米。仰卧时，头部枕在枕头中间，侧卧时，头部枕在两侧。睡觉枕这种高度和形状的枕头，最符合颈部弧度要求，有利于防止颈椎病的发生和机体的休息。（刘正兴）

为什么小孩的呼吸要比成人快？

和心脏跳动一样，小孩子呼吸要比成人来得快。而且呼吸的频率是与年龄成反比例的，年龄越小，呼吸越快。医学科学工作者做过这方面的实验统计，得出来的各个年龄阶段每分钟呼吸次数的平均值是这样的：

出生～ 1 岁	30 次（每分钟）
1 ～ 3 岁	24 次
4 ～ 7 岁	22 次
8 ～ 14 岁	20 次

而成人每分钟的呼吸频率为 12 ～ 15 次左右。

同样，呼吸次数与脉搏次数的比例关系，小孩与大人的差距也十分明显：

新生儿	1 : 2.5（呼吸：脉搏）
1 ～ 6 岁	1 : 3
儿童	1 : 3.5
少年	1 : 4

而成人每分钟呼吸次数与脉搏次数的比例，约为一比五六之间。

为什么小孩子的呼吸要比大人的快呢?



小孩的肺脏容量要比大人小，肺容量只有大人的六七分之一，潮气量（吸进、呼出空气的涨潮、落潮量）当然也小；可是，小孩子代谢水平和氧气的需要量，相对来说却比较高，所以为了满足身体新陈代谢的需要，只得靠加快呼吸来补偿了。

小孩子胸腔的发育尚不完全，他们胸廓活动范围比较小，呼吸肌也发育不全，呼吸时主要向膈肌方向移动，所以一次呼吸的空气进出量比较小。随着年龄逐渐长大，以上情况逐渐改善，所以，表现出年龄越小的，呼吸越快，次数则越多。


小孩子平时肺的储备能力也要比成人差得多，如果婴儿得肺炎时，缺氧代偿的呼吸量最多不过 2.5 倍，而成人的肺通气量在应急时，可比平时增加到 10 倍以上。

这些都是小孩比成人呼吸快的原因。　　（劳宏燮）

为什么幼儿不宜久坐便盆？

婴幼儿通常都是坐着大小便的，有些家长在幼儿大小便时忙于做家务，就让其独自坐在便盆上，一坐就是好半天。要知道，这种做法对幼儿健康不利，甚至是非常有害的。

便盆或痰盂虽是一种较为方便的排便器具，但是，让幼儿长时间地坐在便盆上，就会引起某些疾病。



幼儿正处于生长发育时期，体内各组织器官的功能尚不成熟。例如，幼儿的肛门括约肌和提肛肌的肌紧张力较低，直肠和肛门周围的组织也较松弛，加上幼儿骶骨的弯曲度还未形成，骶骨与直肠几乎处在一条直线上，直肠容易向下移动。若让幼儿长时间地坐在便盆上，那么，当用力屏气，腹内压力增高时，直肠壁就会受到一股向下的推动力而向肠腔内突出；又由于幼儿肛门收缩力不强，直肠不能

立即回到原来位置，这样就造成直肠脱垂，也就是脱肛，在幼儿肛门口可看见一个粉红色的组织，轻者便后自动缩回，反复发作后，每次便后须用手托回，并常有少量粘液从肛门口流出。严重者因脱出的直肠不能及时复位便发生充血、水肿、溃疡、出血甚至坏死。

此外，幼儿的骨组织，含水份较多，固体物质和无机盐成份较少，因此幼儿骨骼与成人骨骼相比，软而富有弹性。假如做母亲的或幼托老师不注意这点，让幼儿长时间坐在便盆上，脊柱的负重大大增加，尤其是那些患有佝偻病、营养不良的孩子更容易发生脊柱侧弯等畸形，影响体形健美。

因此，为了孩子的身体健康，首先要让孩子从小养成良好的排便习惯。幼儿排便一结束，就要让他起立，千万不要让孩子久坐便盆。（唐建华）

为什么人一生不会得两次麻疹？

麻疹，俗称“出痧子”，它是儿童常见的一种呼吸道传染病。有的孩子在幼儿园时曾患过麻疹，可是在上小学时，突然发烧、全身出现大量红疹，老师怀疑他得了麻疹，怕传染给其他孩子，便不让上学。其实，这孩子患的不是

麻疹，因为患过麻疹的人是不会第二次再患麻疹的。

麻疹是由麻疹病毒侵入身体引起的。麻疹病毒侵袭人体后，人是否会得麻疹，主要取决于人体对麻疹病毒有没有免疫力。免疫力一般是指身体对入侵细菌、病毒的抵抗力。免疫分为主动免疫和被动免疫两种。我们平时打的预防针，注射麻疹疫苗就是一种主动免疫的方法。儿童时期由于机体免疫功能差，抵抗力弱，很容易受到麻疹病毒的侵袭而患麻疹。因此目前我国规定，出生 8 个月左右的婴儿都必须打麻疹疫苗。儿童注射了麻疹疫苗后，身体内便会产生一种针对麻疹病毒的抗体。



同样道理，如果一个儿童患了麻疹，入侵的麻疹病毒在身体里与受到抗原激发的淋巴细胞发生一系列的反应，产生大量针对这种病毒的抗体，这种抗体能干净彻底地清除病原体，使疾病痊愈。此后，这种特异的抗体会长期持续地留在人体内，能对抗此类病毒的再次入侵。因此，患过麻疹的病人都可获得终身免疫，不可能再次得麻疹。

另外，还有一种较为普遍的说法：人一生总要患一次麻疹。其实，这种说法并不正确。现代医学已经证明，人

一生是可以避免得麻疹的，因为人可以通过注射麻疹疫苗，获得免疫力。还有一种情况是有的人受到麻疹病毒的侵袭，但由于自身的抵抗力较强而没有发病，可是机体也会产生大量抗体，长期留在人体内，起到麻疹免疫力的作用。所以并不是每个人都必须患一次麻疹。　　（唐建华）

为什么说乳房的发育是青春启动的第一个信号？

一般说，姑娘长到 10 ～ 11 岁，在月经初潮还未来临时，乳房就已在悄悄地发育了。可以说，乳房的发育是青春启动的第一个信号，它标志着姑娘已步入青春发育期。

少女长到 10 ～ 11 岁，位于大脑下部的下丘脑便开始增加分泌性激素释放因子，这些因子会“命令”脑垂体产生一定量的促性腺激素，卵巢在促性腺激素的作用下，周期性地分泌大量的雌激素或孕激素，以维持女性的特征。



女孩子的乳房就是在卵巢分泌的雌激素和孕激素的作用下开始发育的。雌激素可以促进乳腺小叶的发育，而孕激素则可促使乳腺导管的生长，只有在雌激素和孕激素的协同作用下，乳房才得以充分地发育。乳房的发育，最初是在乳头下出现硬结，这就是乳房发育的萌芽，这时姑娘可能会感到乳房有些胀痛，随着年龄的逐渐增大，乳房也就迅速地发育增大。青春期姑娘乳房发育的规律大致是这样的。10 岁以前仅有小乳头的隆起；10 ～ 11 岁时乳头下出现硬结，乳头旁边出现棕色乳晕；12 ～ 13 岁时，乳房与乳晕进一步地发育增大，隔着衣服会有些察觉；13 ～ 14 岁时胸部已明显隆起；到了 18 岁时乳房基本发育成熟；22 岁时发育停止。这时的乳房呈一对半球状的突起并富有弹性。

乳房正常的发育，标志着女性的成熟。丰满的乳房则是女性所特有的一种自然美。每一个女孩子千万不要穿紧

身内衣来紧束胸部，这样会影响乳房的正常发育。

（唐建华）

为什么饮牛奶也有学问？

许多人习惯于早晨起来空腹喝一瓶牛奶，有的人甚至将一瓶牛奶当作全部早餐，而不再吃其他食物。事实上，这是很不科学的。

因为，人体中的能量主要来自于食物中的三大营养素：碳水化合物、脂肪和蛋白质。其中，碳水化合物是人体活动所需能量的主要供给源，一般人体所需能量的 70% 以上是由碳水化合物氧化分解后供给的。每克葡萄糖（单糖，碳水化合物的一种）在体内完全氧化分解时可以释放 17.1 千焦耳的能量。脂肪在人体内的主要功能是储存能量和供给能量，每克脂肪在体内氧化时可释放 38.9 千焦耳的能量，比每克糖或蛋白质所能提供的能量多 1 倍以上。蛋白质是食物的重要营养成分，其主要作用是修补人体组织，一般不作热量来源，只有在体内碳水化合物和脂肪来源不足时，蛋白质才会转化为能量而被消耗掉。1 克蛋白质能提供约 16.7 千焦耳的能量。

牛奶是含蛋白质比较丰富的食品，如果早上空腹饮

用，并且不同时吃些饼干、馒头或米饭等食物，牛奶中又不另放糖。那么，经过一整夜的睡眠，人体的胃肠已经完全排空，体内需要有新的能量补充，这时牛奶中的蛋白质在缺乏碳水化合物和脂肪的情况下“被迫”转化为能量，而不能起到其增补人体组织的作用，这是很不经济的。



不少营养学家还认为，早上起来时胃肠排空比较快，此时若空腹喝牛奶，又不吃其他食物，牛奶中的氨基酸等营养物质进入体内后，还来不及被消化吸收就被排到大肠。这些氨基酸在大肠内会腐败而形成一些有毒物质。这样不但造成浪费而且损害健康，长此以往是不行的。

还有人喜欢在热牛奶中打入一只生鸡蛋，认为这样吃营养好。然而，这种吃法也是不科学的。因为，生鸡蛋中难免会带有一些病原体如沙门氏菌，而热牛奶是不可能杀灭所有的病原体的。因此这种吃法有发生细菌性食物中毒的可能。此外，生鸡蛋中存在抗生物素蛋白，它会妨碍肠道内生物素的活动。如抗胰

蛋白酶因子可抑制胰蛋白酶的活动，妨碍蛋白的吸收。鸡蛋只有煮熟后，其营养才能被人体吸收，而且不会引起细菌性食物中毒。所以，牛奶不能与生鸡蛋同吃。

综上所述，早晨起来，除了喝牛奶外，必须同时或事先吃一些馒头、面包或米饭等。（刘正兴）

为什么人乳喂养婴儿比牛奶喂养好？

在现代社会里，母亲亲自给孩子喂奶的哺乳率越来越低了。其实，牛奶喂养的效果，远远比不上母亲乳汁喂养的效果。

在人的血液中，含有一种叫丙种球蛋白的物质，它又称免疫球蛋白，是一种抗体，可以杀灭侵入机体的病菌或病毒，使人体免于患病，起到防御作用。母乳中就含有免疫球蛋白这种物质，而且含量相当高。母乳中的免疫球蛋白主要是分泌型免疫球蛋白 A，含量比血液中的含量高几十倍，能随母乳进入婴儿胃肠道，并粘附在胃肠粘膜表面，就像给肠壁穿上了一件铠甲。当病菌由口腔进入胃肠道后，无法冲破这层屏障，因而也就不能进入幼儿身体组织而致病。分泌型免疫球蛋白 A 还可把游离在肠道中的病菌聚集在一起，随大便而排出。人乳中还有大量的巨噬

细胞，它们就像漂游在海水中的水母，能够变换体形向前爬动，一旦遇到病菌，就会立即将其逮住，并吞入胞内消化掉。此外，在每滴母乳中，还有近 5000 个 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞，它们在婴儿胃肠道中就像巡逻部队，发现病菌立即予以围歼。人乳中还有一种奇妙的溶菌酶，能将入侵的病菌溶解破坏。



母乳这些成分，在人工代乳品中是不可能具有的。牛奶中虽然含有某些免疫成分，但是由于种属差异，对人类不产生作用；有些物质的含量也比母乳少得多，如溶菌酶等仅有人乳的 $\frac{1}{300}$。而且饮用牛乳时需要加热煮沸，这样就会把这些成分破坏掉，因而人工喂养婴儿就得不到母乳中的免疫物质，抗病能力就明显降低，容易患病。

婴儿需要的营养物质多，而胃肠道的消化机能差。母乳含有极其丰富的营养素，包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质及维生素等，不但营养价值高，在组成和比例方面都比较合适，而且不易破坏，容易消化。牛乳脂肪中

所含人体必需的脂肪酸仅占人乳的 $\frac{1}{3}$，其余大部分是不适合人类消化吸收的饱和脂肪酸及挥发性脂肪酸。而且牛乳脂肪颗粒较大，不易被婴儿消化吸收。

人乳中有一种糖类，是构成婴儿的血型物质及促进脑神经发育的主要成分，这些糖在牛乳中是没有的。人乳中还含有一些促进婴儿生长发育的因子和元素，它们的含量也都比在牛乳中高得多。而这些因子和元素则是婴儿不能缺少的。例如锌，是婴儿智力发育的必需物质，如果供应不足，将会出现身体瘦小、性发育推迟、食欲不振或出现贫血；铜是婴儿神经系统发育的必需物质，一旦缺乏，会出现神经反应性减弱、白细胞减少、骨质疏松等，而铁是造血的主要原料，更加缺少不得。以上这几种元素，在牛乳中含量都较低。钙和磷在牛乳中的含量虽然比人乳多，但是由于比例失调，使婴儿难以吸收，所以牛乳喂养婴儿患软骨病的发病率高。人乳中钙和磷的含量虽略低，但比例适宜，使婴儿容易吸收。

母乳的成分能随着婴儿成长发育的需要，相应地发生变化。能够满足婴儿需要，这是牛乳所不及的。此外，母乳温度适宜、清洁、新鲜，直接喂哺，遭细菌污染的可能性小，小儿胃肠传染病少。事实证明，母乳喂养的小儿体质强、发育好、发病率和死亡率都低。所以说，人乳喂养要比牛乳喂养好。（贝润浦）

为什么喂婴儿的牛奶不要过浓？

婴儿出生以后，常常会发生母亲的乳汁分泌不足的情况，于是一般都用牛奶来代替母乳喂养婴儿。



喂养婴儿的牛奶，须加一些水稀释和调配，切莫过浓。不加水稀释的全牛奶，婴儿吃下后会出现腹胀、呕吐、腹泻或便秘等消化不良症状。一般给出生一周以内的婴儿喂牛奶，要在一份牛奶中加两份水或米汤；一个月以内的婴儿，一份牛奶加一份水；2 ～ 3 个月以内的婴儿，两份牛奶加一份水，孩子长到 4 ～ 5 个月以上，可以吃不加水的全牛奶，但在两次喂牛奶中间加喂一次水。

婴儿服用牛奶的量也有规定，一般以每天每 1000 克体重服用 100 毫升计算，总量不宜超过 750 毫升，可分六七次喂给。随着孩子长大辅食量的增加，牛奶量可逐渐减少。一般说来，这时的婴儿每天需要的流汁量，可按每

1000 克体重 150 毫升计算，减去每天喂给的牛奶量，即为可供稀释牛奶的液体量。用于稀释牛奶的液体，可选择开水、米汤、果汁等。

为了保证婴儿足够的热量，每 100 毫升牛奶中应加 5 ～ 8 克糖，切不要多加，每日加糖量应控制在 60 克以内，吃糖过多会影响婴儿的食欲。（翁德立）

为什么要提倡“早喂奶、勤喂奶”？

近年来，国内外儿科学者对初生婴儿的开奶时间和喂奶次数提出了新的意见，主张早喂奶、勤喂奶。目前在美国和欧洲一些产科医院里，产妇生下孩子后，稍事休息，即在产房内由护士把孩子抱来，让母亲喂奶。

提倡产妇给婴儿早喂奶、勤喂奶的好处是多方面的：能促进母亲乳汁的分泌。婴儿刚刚出世后的第一次吮乳，虽然母亲的乳汁还没有或量极少，但喂奶这一刺激可以促进母亲脑垂体的内分泌功能，从而使乳腺分泌乳汁。研究表明，母



乳的分泌多少，还与喂奶的次
数有关。每天喂奶 6 次，乳汁分泌量每天在 502 毫升左右，而喂奶 12 次，则可达 725 毫升。

能促进胎粪排出，减少新生儿高胆红素血症。在新生儿的胎粪中，含有大量有毒的胆红素，其中 50% 可被再吸收入血，早喂奶能促进肠蠕动，使胎粪尽早排出体外。据观察测定，24 小时喂奶少于 8 次的新生儿，每 100 毫升血中含胆红素平均为 9.2 毫克，而喂奶超过 8 次以上的，则平均含量减少至 6.5 毫克左右。

产妇产后第一天的初乳，每毫升含 609 ～ 1279 微克具有杀菌作用和提高孩子抵抗力的溶菌酶，但半个月后则下降至最低水平，仅 97 ～ 151 微克。国内的研究资料表明，产后 2 天的初乳中，溶菌酶的含量为新鲜牛奶的 254 ～ 429 倍，说明早喂奶的重要。此外，母乳中还含有大量的免疫球蛋白 A 等免疫物质。

能促进新生儿的体重增加。有调查表明，喂奶多的孩子，产后 15 天体重可增加 561 克，而喂奶次数少的只增加 347 克。

能减少母亲乳头红肿。由于新生儿的吸吮，乳头得到反复按摩，吮乳后乳房膨胀减轻，血液循环较好。事实证明，喂奶次数多的母亲，她的乳头红肿率要显著低于喂奶次数少的。

因此，有人主张正常分娩的产妇，喂奶时间可在产后一小时。一次喂乳时间短的，间隔时间短些，反之则长些，不必强调固定的喂奶时间。（翁德立）

为什么用全牛奶喂养的孩子容易发生缺铁性贫血？

据世界卫生组织调查，儿童缺铁性贫血的发生率约50%，其中婴幼儿则更多，除了先天性储铁不足，后天补铁不及时等因素外，某些采用全牛奶进行人工喂养的婴幼儿，也可引起慢性胃肠道失血，发生缺铁性贫血。

医学科学家研究发现，天天饮牛奶的婴幼儿每日大便中可失血 1.7 毫升，停服牛奶后，每日只失血 0.3 毫升，这是牛奶引起肠道过敏反应所致。

有一些用全牛奶喂养的婴幼儿，由于对牛奶过敏而发生一种渗出性肠病。这是因为在牛奶中含有一种对肠粘膜有刺激作用的物质，可以引起肠道慢性失血。如果一个患有慢性缺铁性贫血的婴幼儿，他每天进食全牛奶在 1000 毫升以上，伴有低蛋白和低铁血症，找不到其它引起缺铁的原因，口服铁剂无效，大便潜血试验明显阳性，在停食牛奶，改吃其它食品后，胃肠功能恢复，贫血能够得到纠正，那么，这个缺铁性贫血婴幼儿的病因就是由于进食全

牛奶引起的。

预防全牛奶喂养造成胃肠道失血而发生缺铁性贫血，每天喂食全牛奶的量应在 750 毫升以下。牛奶应煮沸。另外，还可添加一些含铁丰富的食物，如肉松、肝泥、肉末及大豆制品等，作为婴幼儿的辅助食品。　　（翁德立）




为什么会有多胞胎？

在我们周围，总会有一些人，他们是那样相像：同样的年龄、同样的性别、同样的外貌，甚至爱好和脾气也差不多。除了父母，也许连老师、同学都分不清他们，只能统称他们“双胞胎”。

绝大多数母亲怀孕一次只能生下一个宝宝，如果想要得到第二个宝宝，得花上几个月甚至几年，等到第二次怀孕。然而，有的妈妈一次怀孕就会“轻而易举”同时生下二个、三个甚至更多的孩子，医学上称这种现象为“双胎”

或“多胎”。双胎又称“孪生”。

呱呱坠地的婴儿是由数以百万亿计的细胞构成，而胎儿的最初发生却是从一个细胞——受精卵开始。女性青春发育以后，卵巢开始排出成熟卵子，大约每月排卵一次，每次一卵。如果卵和男性的精子相遇结合，就形成了受精卵。受精卵在母体内，一方面向胚胎儿的发育根据地——子宫挺进；一方面开始分裂，一分为二、二分为四、四分为八……，成双成倍地增多。随着细胞不断繁殖和分化，一个受精卵最终在母体内形成胎儿。胎儿降到人间，便是婴儿。



一些孪生儿不但外貌酷似，他们的性别、血型和遗传基因都相同。如果将他们的器官相互移植，不会产生任何

排斥反应。这是因为，他们的母亲当初按正常情况，一次只排出一个卵。有幸的是，这个卵受精后分裂成为二个卵裂球。两个卵裂球各自发育成长，各自形成一个胎儿。这对由一个受精卵开始发育而形成的孪生胎儿，叫“一卵双胎”。和一卵双胎儿相比，多数双胞胎并不那么相像，他们或男或女，有高有矮，犹如一般兄弟姐妹。他们是二卵双胎儿。他们的母亲当初一次同时排出二个卵，它们分别与精子遇合，形成二个受精卵，发育成二个不同的胎儿。三胞胎的情况就复杂得多，他们可能像一卵双胎那样，由一个受精卵分裂而来；也可能像二卵双胎那样，由三个卵形成三个胎儿；还有可能是一卵一胎加一卵二胎、或一卵一胎加二卵二胎。四胞胎、五胞胎等也可以依此类推。

有人统计，每 80 ～ 90 个胎儿中才会出现一对双胞胎，每 7600 个胎儿中才会出现一例三胞胎，四胞胎、五胞胎、六胞胎等则更少更少了。调查表明，一些孪生儿的父母、祖父母或外祖父母也是双胞胎中的一人。生过双胞胎的母亲再次怀胎，生下双胞胎的可能性是常人的 5 倍。医生广泛应用激素类药物治疗妇女排卵障碍，有时会导致一次排卵过多而怀上多胞胎。显然，双胎和多胎与遗传倾向、药物应用等多种因素有关。人们对双胎、多胎感兴趣的同时，也一直在研究它们。（陈传）


为什么有的小孩嘴唇生来就是“兔唇”？

兔子家族的一个共同特点是上唇都有一条裂缝。尽管兔子的上唇如此与众不同，却是那么可爱。但如果刚出世的小孩嘴唇也像兔子那样裂开，那可不是一件高兴事了。

唇裂确实丑，严重的唇裂往往还伴有鼻子歪斜、塌鼻子与腭裂（口腔顶部的“天花板”裂开）。丑倒不要紧，要是唇裂与腭裂并发，危害性就更大了。因为腭是分隔鼻腔和口腔的隔板。这个隔板存在裂隙，鼻腔和口腔就上下相通。出生后吸吮乳头困难之外，乳汁会漏入鼻腔，引起呛咳，诱发鼻炎、气管炎。倘若不及早手术治疗，由于发音时气流从鼻腔溢出，长大后，说话时会有严重的鼻音，这样就要妨碍语言功能的发育。

唇裂俗称“兔唇”。其实人的唇裂与兔唇不尽相同。兔子的上唇裂口总在正中，并且等分成两半。人的唇裂则部位、大小不一，程度轻重不同。上唇正中裂的极少，往往偏于一侧，而且有的单侧裂，有的双侧裂；有的全唇裂开，有的不全裂开。偶尔，上唇完好，下唇却有个正中裂。所以，称唇裂为“兔唇”，还不如叫它“缺嘴”比较确切。

那么，为什么有的小孩的嘴唇会裂开呢？唇裂（和腭裂）是一种常见的先天性畸形。“先天性”意思说在母亲子宫内时即已存在，而“畸形”指的是体表或体内可识别的结构缺陷。根据大量资料分析统计，唇裂（和腭裂）有一定的遗传倾向，属于多基因遗传。简单说来，基因是排列在人体细胞核内染色体上的遗传物质基础，控制着人们的各种遗传性状，像眼睛的大小、眼皮的单双、嘴唇的厚薄等等。唇（和腭）的裂隙畸形，由多对基因支配，但是这些基因只带来发生这种畸形的易感性，至于是否出现畸形尚需一些特殊诱发因素的激发，这就叫做多基因遗传。胎儿来源于父方精子与母方卵子的结合。卵子受精后的第 3 至第 8 周，称胚胎期。胚胎期是器官分化发育时期，额、面颊、鼻和唇由胚胎口凹周围的 5 个突起部逐渐连接，彼此融合，分化演变而形成。唇的吻合（连接）时间约在卵子受精后 36 天（腭的闭合在 40 天左右），倘若在此期间受诱发因素干扰（如营养不良、病毒感染、药物影响、缺氧等）又从上代继承了遗传基因，唇（与腭）的发育与形成就会脱离正常轨道，该吻合的地方不连接，留下裂隙，结果嘴唇就像兔子那样裂开。



唇裂的孩子可遵医嘱，在适当的时候，去医院进行整形手术。（盛丹菁）

为什么小孩感冒时常伴随呕吐腹泻？

当一个人出现鼻塞、流涕、喷嚏、咽痛、头痛、发热等现象时，大家都知道这是感冒了。但小孩患了感冒有时却远远不止这些症状，严重的还伴随腹痛、呕吐和腹泻。

这是腺病毒从中作祟的缘故。腺病毒是一种生命力很强的致病性微生物，它在 4℃ 环境中可生存 70 天，即使在零下 40℃ 的冰冻世界里也能生存。腺病毒在病人胃肠道内不会死亡，常随大便排出体外，若污染了地面、水源，就能够传染给其他健康人。

这种病毒有一个非常奇特的习性，它专门喜欢入侵呼吸道和消化道。一旦人体被感染，上呼吸道和消化道症状合并出现。不难理解，如果小孩抵抗力降低，夹有腺病毒的飞扬尘土经鼻吸入，或者吃下被苍蝇叮爬而污染此病毒的食物，饮未经消毒和煮沸，含有病毒的水，那么就会患病，除了出现鼻塞、流涕、咽痛、发热等上呼吸道症状外还有腹痛、腹泻、呕吐等消化道症状以及红眼睛（结膜炎）。这样的疾病，医学上称为胃肠性感冒。由于腺病毒能在污

水和尘埃中稳定地存活，因此常常会造成胃肠性感冒大流行。




感冒性胃肠炎有时会引起发烧，体温较高，并且持续时间长，又吐又泻，注射很多抗生素及服用止泻药都无效果。这是因为抗生素对病毒不起作用，无法消灭它们的缘故。目前对病毒感冒暂时还没找到有什么特效药物。中药板兰根、银花、连翘、贯众等有一定的抗病毒作用，可以选用一些煎服，有退烧、止泻、止吐的效果。同时要给病人多饮水，补充营养和维生素，以利恢复健康，当然严重的要去医院补液，以防脱水和酸中毒。

（詹家明）

为什么周岁以内的孩子不宜过早学步？

婴儿出生以后，三个月就会翻身，六个月会坐，八个月会爬，从躺卧到站立大约需要经历一年左右的时间。周岁时能独自站立，或自己扶着床沿、椅、凳，搀着大人的

手跨步行走。有些年轻的父母在孩子不满周岁时，就让他学步和站立了，其实，这种做法并不好。



孩子过早学步极容易得扁平足。据研究，大约 90% 的扁平足是由于足部负担过重引起的。我们知道，人的足底由足部的骨骼构成弓形，支撑着身体的重量，足部的韧带、肌肉、肌腱富有弹性，足弓内的关节像个半椭圆形的弹簧，如果足弓不能发挥这种弹簧的机能，就会形成扁平足。孩子不满周岁，肌肉和韧带发育尚不健全，过早地学步和站立，可使孩子的肌肉和韧带遭受损害，特别是两足的负荷过重，会影响足弓的形成，造成扁平足。孩子长大以后，如果是扁平足，走路动作往往显得很笨拙，触地有声，路走多了容易疲劳；足汗特别多，站立时小腿肚及大腿部肌肉也有牵引疼痛感，晚上上床后往往会发生小腿肚抽筋。扁平足虽然不是什么疾病，但它会给从事重体力劳动和工作中须要不断行走的人带来烦恼和痛苦。

过早学步还会使孩子的腿部骨骼畸形，造成“O”形腿和“X”形腿，使身体的体形很难看。“O”形腿是指人身体立正，足跟靠拢两膝却不能靠拢而分开来；“X”形腿

则刚好相反，两膝靠拢时两足却分开来。婴幼儿时期孩子的骨头嫩，骨骼中的钙较少，水分和有机物成分较多，不能耐受体重负担，过早学步行走，下肢负担过重，就可能使小腿弯曲变形。


正确的做法是，孩子应在满周岁以后才学步和站立，不满周岁的孩子则可以多练习爬。孩子在床上或清洁的地面上用胳膊支撑前身，头向前伸，双腿交替用力向前爬行时，他的四肢、腰背、胸腹各部分肌肉能锻炼得丰满结实。另外，爬行要消耗很多身体内的能量，加快肠胃消化过程，因而可增进孩子的食欲，有利于生长发育，为日后学步和站立打好基础。（翁德立）

为什么小学生不要单肩背书包？

书包是学生必不可少的用具，但有一些书包往往只着重于外表美，而忽视了背书包小学生的生理要求。目前不少地区的小学生仍使用单肩背书包，这对学生的体形和健康均带来不良的影响。

小学生正处于生长发育阶段，身体的各个器官和组织都很娇嫩，特别是骨骼还没有完全长成熟。脊柱周围的肌肉、韧带发育脆弱，脊柱又是依靠脊椎骨、肌肉、韧带、

小关节和椎间盘等维持其形态的，在生长发育过程中，如果营养不良或受重力影响，极易发生变形。单肩背书包的全部重量压在身体的一侧，使脊柱的一侧受压，另一侧被牵拉，造成平衡失调。同时，受压一侧肩部的血液循环也受到一定的影响。这样不仅人感到不舒服，而且还会造成身体畸形，如单肩抬高、驼背、弯腰、头前倾等，甚至能造成脊柱弯曲。



因此，小学生都应使用双肩背式书包，挑选重量较轻的棉布书包，它的长度应大于宽度，以适合肩与背的比例，书包带应稍宽些，并配有肩部软垫。为减少书包对肩部的压力。书包不可过重，只须带当天必备的书籍和文具就行了。同时，为了使脊柱均衡地承受重量，书包必需背正，要紧贴后背，书包的下端靠在腰部，胸部前挺，两手能自由活动。这种背法也有利于呼吸器官的发育。　（汪宗俊）

为什么幼儿容易发生“牵拉肘”？

许多人有这样的经历：小时候大人们拉着学走路、帮着穿衣服时，胳膊肘会突然不能动，更不敢往上举，一动就痛。到了医院，医生一听病情，两手往坏胳膊肘上一使劲，一会功夫，疼痛就没了，胳膊肘又可以活动自如了。医生会告诉你，这不是骨折，而是幼儿的常见病——牵拉肘，俗名也叫“肘掉环儿”。

肘是上臂和前臂的连接部位。肘关节把上臂和前臂连在一起，使前臂能任意伸直或弯曲。一般来说，相连接的两骨的骨端被关节囊包绕，就形成了可以活动的关节。与一般关节不同的是，肘关节除了关节囊外，还有一个精巧而特殊的结构——环状韧带。它专门负责套住前臂的桡骨。环状韧带呈漏斗状，上口大、下口小。由环状韧带包绕的桡骨端则相反，上端大、下端小。这样，桡骨近端就像放在漏斗里的圆锥体，怎么也不会从漏斗下口——环状韧带小口中间下滑脱。前臂就被牢牢固定住了。可是，四五岁以下的幼儿骨骼尚未发育完全，前臂桡骨近端一般粗细，还没有形成“大小头”。它们不像落在漏斗里的圆锥体。而是在环状韧带中的圆柱体，能够自由的“上移下滑”。

加上幼儿关节囊和韧带较为薄弱松弛，肘关节就不像成人那样牢固了。当大人们拉着幼儿的手上楼梯、穿衣服或幼儿跌倒时，幼儿的前臂伸直并被向上提拉。这时，桡骨从围绕它的环状韧带中滑脱出来，形成“牵拉肘”。“牵拉肘”和“肘吊环儿”两词十分形象地说明了幼儿手被吊或牵拉后，肘部桡骨从环状韧带的“环儿”中脱出的情形。医学上称作“小儿桡骨头半脱位”。



“牵拉肘”时，幼儿肘部疼痛而不敢屈臂，不肯用坏胳膊取物或上举，更怕别人触动痛处而拒绝检查和治疗。肘部看不到肿胀和畸形。就连 X 线检查也常找不到病变的根由。医生根据起病的原因和症状，很快就能判断此病，并采取相应的治疗措施。医生一手握住幼儿坏胳膊的腕，另一手握住肘，还用拇指按压肘关节外侧突起处。医生两手使劲向反方向牵拉坏胳膊的腕、肘，并轻轻向内转动前臂、弯曲肘部。当有“咯噔”一下感觉时，半脱位的桡骨端回到了环状韧带环中，肘关节就恢复了原来位置，坏胳膊肘也能正常活

动了。如果复位后幼儿肘关节仍有疼痛，可用热敷或轻轻按摩痛处，渐渐恢复活动功能。

小儿“牵拉肘”得得快，治得快，好得也快。（陈传）

为什么保护儿童牙齿要从母亲怀孕期就开始？

牙齿龋病是儿童口腔的常见病，也是世界上广泛流行的一种疾病，世界卫生组织已将这种龋病列为继癌症、心血管病之后的第三种急需重点防治的疾病。

要使小儿持有一口健康的牙齿，应从牙齿的生长发育之初开始。别以为孩子生下来口腔内一只牙齿也没有，要到出生后 6 ～ 9 个月才长出来的，其实，牙齿的生长发育在娘胎里就开始了。当胚胎发育到第 6 周时，乳牙已经发生，当胎儿长到 5 个月时，乳牙已开始钙化，同时恒牙的牙胚也开始发育。因此，母亲在怀孕期间健康和营养状况的好坏，以及因病用什么药等情况，都会影响胎儿牙齿的生长发育。如果母亲健康情况不好，营养差，特别是在妊娠 5 个月后，胎儿骨骼的生长需要较多的钙、磷以及维生素 D，如不注意在膳食中增加补充这些营养物质，那么，非但要影响胎儿骨骼和牙齿的发育，连母亲自己也可能骨质软化，严重时会出现牙齿松脱现象。胎儿在母腹内如果

牙齿钙化不足，牙釉质中的无机盐少，就会影响出生后孩子牙齿表面的硬度，甚至高低不平、缺损，这样在牙齿上会积存食物，产生菌斑，逐渐形成龋齿，这就是为什么有些婴儿牙齿刚萌出不久便龋坏的原因。由此看来，小儿健齿必须从母亲怀孕后就开始了。此外，母亲在孕期内患病，应避免吃四环素、土霉素、强力霉素等类药物，否则会使胎儿乳齿质脆发黄，并能起抑制胎儿骨骼生长的坏作用，甚至发生短肢畸形。

当然，要想有一口健康的牙齿，还须从小注意口腔卫生，建立常规和正确的刷牙和漱口习惯，少吃甜食，多吃含纤维素较丰富的水果蔬菜，定期上医院检查牙齿，及时治疗和修补龋齿。



（翁德立）

为什么预防冠心病要从童年开始？

冠心病与脑血管疾病、癌症一起，被列为威胁人类生


命的三大顽疾。我国 40 岁以上成年人冠心病的发病率高达 6% 以上。患冠心病老年人的死亡率更高。由于冠心病患者大多在成年后才出现胸闷、心悸、心绞痛等症状，不少人都认为，冠心病是老年人的事儿，要预防，也得从成年开始。

然而，医学研究表明，一些青少年甚至在婴幼儿时期就已经出现了冠心病的趋势。我们知道，日夜不停工作着的心脏依赖心脏的血管源源不断输送血液，提供营养和能量。当大量脂肪类物质沉积在心脏的主要血管——冠状动脉内，形成黄色半月状的粥样斑块后，血管内腔狭窄甚至堵塞，心肌得不到足够的血液营养，就会导致冠状动脉粥样硬化性心脏病，简称“冠心病”。研究人员在尸体解剖中看到，6 个月婴儿的动脉已出现脂肪斑块，3 岁儿童主动脉上有脂肪条纹，而 10 岁时这些脂肪斑块和条纹都形成了粥样硬化斑块。

血液里的脂类来源于胃肠道的消化吸收和体内的自行合成。胃肠道吸收的绝大部分脂类与血液中脂肪的搬运工具——载脂蛋白相结合，由它们把脂类“运载”到身体各处。摄入过多脂类食物、载脂蛋白消极怠工、体内脂类代谢紊乱，多余的脂质便贮留体内，形成“高脂血症”。脂质附着在血管壁上，引起动脉硬化。

促使动脉硬化早期发展的主要原因是儿童和青少年

时期饮食不当、活动过少、患肥胖症和某些疾病。除此之外，脂质代谢紊乱与遗传有关。有人对患高脂血症父亲或母亲家庭的 271 名子女进行检查和统计，结果患高脂血症的占 14%，而普通家庭的子女仅有 3%。体内搬运脂肪的载脂蛋白怠工的原因之一，是它们先天缺陷。数量不足。而少数家族性高脂血症、冠心病患者更具有明显的遗传倾向。随着研究不断深入，人们已经清楚认识到，冠心病不再仅仅是中老年人的疾病，从预防角度看，它也是一种儿科疾病。



高脂血症、冠心病往往有遗传倾向。但是，后天的多种预防措施可以弥补先天的不足。坚持体育锻炼就是积极的预防措施之一。俗话说：“流水不腐，户枢不蠹”。持之以恒的运动锻炼不仅消耗较多体能，使体内多余脂肪转化为能量，还能使人体新陈代谢的调节处在良好状态中。合理饮食是预防高脂血症、冠心病的基础。避免吃过多的动物性脂肪和富含胆固醇食物和甜食，有助于血脂水平稳定。进食适量的鱼、虾、瘦

肉等含高蛋白、低脂肪食物，能够满足青少年生长发育所需要的蛋白质。豆类、蔬菜和瓜果含有丰富营养，是人体不可缺少的食物。当儿童出现体重过重、超肥胖时，就要警惕和预防冠心病的发生。（陈传）

为什么多吃糖会影响儿童骨骼发育？

不少儿童喜欢吃甜食如巧克力、水果糖等。糖是提供人体热量的主要来源，适量吃一点是必要的，但若吃得过多，对儿童健康生长是不利的。

据研究，糖在体内新陈代谢的过程中，要消耗体内大量的维生素 B_1；另外，健康儿童的机体组织是呈弱碱性的，进入体内的糖多了，因糖是酸性的，就会使机体组织呈中性或弱酸性。机体为了保持正常的弱碱性，只能用消耗体内大量呈碱性的钙来中和呈酸性的糖。这样就造成机体内钙和维生素 B_1 的不足，而维生素 B_1 能促进儿童的生长和发育，维持机体的正常代谢；钙又是构成骨骼的重要成份，缺少了它们就会影响儿童骨骼软骨板的生长和骨化。因此多吃糖会对儿童骨骼的发育带来一定的影响。



还有，儿童多吃甜食，机体产生热量便多，就不容易产生饥饿感，进餐时，胃口极差，觉得什么菜肴都不好吃，从而拒食，久而久之，造成厌食症。吃进去的营养物质少了，自然影响儿童肌肉、骨骼的生长。

营养学家告诫说，一个体重 20 公斤的儿童，每日吃的糖分，不应超过 10 克。所以，为了儿童的健康，尽量少吃些糖吧！（翁德立）

为什么丙种球蛋白不是防治疾病的万能药？

不少家长以为只要给孩子注射了丙种球蛋白就能起到有病治病，无病防病的作用，事实上并非如此。

丙种球蛋白是从健康人血或胎盘血中提制成的一种物质，它含有血液中的大多数抗体。经较长期的研究和应用证明，丙种球蛋白可以治疗或预防的疾病为：某些免疫

缺损综合症，如丙种球蛋白缺乏或无能症（如先天性无球蛋白血症和后天性丙种球蛋白血症）、婴儿时期各种类型的暂时性抗体缺乏、牛痘疫苗所产生的严重并发症（湿疹痘和某些免疫缺损综合症）、甲型肝炎、麻疹、破伤风、新生儿溶血病，以及一些严重细菌感染的病例；而对于百日咳、风疹、脊髓灰质炎、腮腺炎、水痘等疾病丙种球蛋白则没有肯定的疗效。因此，除上述一些疾病外，使用丙种球蛋白多属误用和滥用。对于儿童反复发生的病毒性上呼吸道感染、支气管哮喘、扁桃体炎、慢性肾盂肾炎等，如果患者血液中的丙种球蛋白成分并无不足的情况，那么，再使用它就完全不必要了。



正确使用丙种球蛋白，尤其须要注意剂量和时间，例如治疗某些免疫缺损综合症时，一般初次用量为每公斤体重 1.2 毫升，维持量为每公斤体重 0.6 毫升。重复注射间隔时间应为每月一次。丙种球蛋白预防甲型肝炎的效果是肯定的，据一组实验报告，试用丙种球蛋白的与不用的发病率分别为 $\frac{1}{7}$ 和 $\frac{1}{3}$。如要取得较有把握的预防效果，与患甲

型肝炎的病人接触多的人应尽早注射。预防医学科学家认为，丙种球蛋白预防甲型肝炎的效果随与病人接触后间隔时间的延长而降低，若接触病人已超过 10 天，则已无应用价值。又如在接触麻疹病人后 6 天内注射丙种球蛋白，就有预防或减轻发病症状的作用，接触后 9 ～ 15 天，口腔粘膜上出现发病征兆时再注射，一般只能起到减轻病情的作用；假如皮肤上已出现红疹时再注射则已无效。

此外，还应了解丙种球蛋白制剂的某些副作用。注射后 1 ～ 2 天内可能会出现局部疼痛或全身发热反应，停药后即能逐渐消失；个别人甚至可能出现过敏性休克，需采取急救措施，而且以后不能再使用此药了。有一点要指出，给身体完全健康的婴儿注射丙种球蛋白往往带来一些缺点例如它会抑制人体某些特殊抗体（如破伤风及白喉抗体）的产生。

根据上面所说的情况，可知丙种球蛋白在某些疾病的防治中有着一定的作用，但它的应用范围有一定的限制，作用时间也比较短暂，因此，不能片面理解它的作用，把它当作能增加儿童抵抗力的万能药，而忽视了防治小儿疾病的其它有效措施。（翁德立）

为什么常年吃钙片的孩子仍会得佝偻病？

有人听说孩子缺钙会引起佝偻病，在孩子出生后就天天给他喂钙粉、钙片，可是令人迷惑不解的是，孩子仍得了佝偻病，这是怎么回事呢?

的确，佝偻病与缺钙有关，当孩子从母乳或其他食物中摄入体内的钙不足，就会影响骨骼的正常发育；但当钙摄入充足时，能否被骨骼吸收利用，则要靠维生素 D 来协助。维生素 D 的作用是能把吃进去的钙，从肠子里吸收到血液中，再由血液运到骨端，来满足生长发育的需要。孩子出生后天天吃钙粉、钙片，钙的摄入量虽很充足；但是，如果很少晒太阳，或者食物中缺少维生素 D，那么钙虽然多，肠子能吸收的钙量其实并不多，其余都从大便中排出，血液中钙的含量并不高，到达骨端的钙则更少了。这样势必影响孩子骨骼的发育，孩子仍有得佝偻病的可能。




可见，引起佝偻病的原因，不在于吃多少钙片，主要是缺乏维生素 D。因此，应该懂得，在给孩子吃钙片或钙粉的同时，还必须同时给孩子吃些鱼肝油，以增加维生素 D；同时要多晒太阳，增加户外活动，让阳光中的紫外线来帮助孩子自身制造维生素 D。（翁德立）

为什么有些人特别怕冷？

一到冬天，有些人就与众不同，尽管身上棉袄、棉帽、棉鞋“全副武装”，仍然感到寒意未消。

为什么有些人会特别怕冷呢？医学科学揭示了其中的奥秘：他们把不怕冷的人和特别怕冷的人的血液作了十分细致的分析对比，结果发现前者血液中的甲状腺素明显高于后者血液中的甲状腺素，正是这种甲状腺素控制着人们的“抗寒”水平。

发现甲状腺素这种功能，得归功于一名叫曼格纳斯·莱维（Magnus-Levy）的生理学家，他发现吃了由动物甲状腺制得的干粉能够提高机体内氧的消耗量。根据这一点，他提出了甲状腺分泌物可以加强机体内营养物质氧化的观点。现在已经知道甲状腺分泌物就是甲状腺素。



人体内的甲状腺素的分泌是“全自动”的，它直接进入血液，再输送到身体各处去发挥作用。冬天气温降低，甲状腺素的分泌量就会增多，从而加快了体内各种营养物质的“燃烧”（氧化）过程，身体内热量就增多；同时甲状腺素的增多，又能使心脏搏动得稍稍快一些，强一些，这样心脏输出血量增多，促进皮肤血液循环，皮肤血管舒张，皮肤较温暖。人就是这样来抵挡寒冷的。由于甲状腺素的分泌量，并不是人人都一样的，分泌量多的人，冬季就显得不大怕冷，反之，甲状腺素分泌量少的人，遇到气温降低，没有更多的甲状腺素来增加热量，于是便怕冷了。

人体甲状腺素的主要“原料”是谷氨酸和碘，前者在

人体内可以自行合成，但后一种“原料”碘则不能自给，必须不断从各种含碘的食物中获取。因此冬天怕冷的人最好多吃些富含碘质的食物，这样便能为甲状腺分泌出较多的甲状腺素提供足够的“原料”。

当然人体内还有其它内分泌激素，如肾上腺皮质激素和髓质激素也有不同程度的促进机体产生热量的作用，它们和甲状腺素都是“一条战壕里的战友”，因此，如果它们的分泌量不足也可以是构成特别怕冷的原因之一。

（詹家明）

为什么过多吃含碘食物也会造成甲状腺肿大？

碘是人们最早发现与人类健康有密切关系的微量元素之一，它是治疗甲状腺肿的有效药物。早在公元 4 世纪在我国东晋医学家葛洪所著的《肘后备急方》中，就已有用海藻治疗瘿（即甲状腺肿）的记载，海藻中含有大量碘，所以能治这种病；1850 年，法国生物学家查廷发现，许多甲状腺肿大的病人，确与缺碘有关。

缺碘可以影响甲状腺激素的合成，引起地方性或单纯性甲状腺肿大。然而，对于体内积聚的碘过多也可引起甲状腺肿的情况，知道的人就少了，例如日本和我国台湾省

就有不少地方性高碘性甲状腺肿病例。据调查，我国沿海有些地区的居民常吃海带，吃得多的每人每年达 15 ～ 20 公斤，其中就有不少高碘性甲状腺肿的病例。日常饮的水中含碘量过高也可致病，河北省黄骅县滨海地区居民，由于饮用高碘深井水，也发现了地方性高碘性甲状腺肿的病例；山东庆云县也是一个地方性高碘性甲状腺肿发病地区，当地居民在停用高碘深井水半年以后，这种甲状腺肿则慢慢好转。



正常人每天从食物中摄取碘约 150 ～ 500 微克，其中 $\frac{1}{3}$ 为甲状腺所摄取，$\frac{2}{3}$ 主要由肾脏排出体外。有人估计，人体每天会合成 80 微克左右的甲状腺激素，那么每周需供应碘 1 毫克，每年为 35 ～ 50 毫克。在缺碘时，人体甲状腺素的合成就受到障碍，血液中甲状腺素的浓度降低，通过中枢神经系统的作用，可使脑垂体分泌过多的促甲状腺激素，而使甲状腺滤泡上皮增生和肥大，脖子变粗，出现甲状腺肿病。相反，在长期吃进过多含碘食物滥服含碘制剂（碘化钾、含碘食盐等）以后，大剂量的碘进入甲状腺组织，则可抑制甲状

腺对碘的再摄取，降低甲状腺对促甲状腺激素的反应性，抑制甲状腺球蛋白分解酶的活性和甲状腺激素的合成，从而使甲状腺激素分泌减少，同样也能刺激脑垂体，使促甲状腺激素的分泌量增加，作用于甲状腺滤泡上皮，使之不断增生和肥大，而导致甲状腺肿大。（翁德立）

为什么有些姑娘会得多毛症？

姑娘是应该没有胡子的，她们手臂和腿上的汗毛，也比男子细微、稀疏得多。有些姑娘在不应该长毛的部位，长了许多又长又粗又黑的毛，或者毛发呈男性型分布，如唇部、下颌、前胸、大腿、小腿等处，都有不同程度的毛发分布，眉毛也粗而浓黑，阴毛向腹部甚至脐部发展，这种现象可称为多毛症。

毛发可以说是男性激素的“杰作”。男性激素又叫雄激素，人体除头发、眉毛、睫毛等之外，大多数体毛的生长都与体内雄激素水平的高低有关。雄激素水平高，体毛生长可增多增快；雄激素水平低，体毛生长即缓慢、减少。那么，姑娘身体里怎么会有雄性激素呢？事实上，不论男性女性，都有雌激素和雄激素两种激素，只是数量不同罢了。例如，代表雄性激素的睾丸酮，男性每毫升血含 3 〜

11 微微克，女性含 0.2 ～ 0.8 微微克，男性比女性多十几倍，所以，姑娘一般是不会多毛的。



哪些情况会造成女性体内雄激素水平增高，出现多毛呢？最常见的是姑娘得了多囊卵巢症。正常的卵巢只有一个囊腔，而多囊卵巢的卵巢有多个充满液体的囊腔，卵巢表面凸凹不平而肿大。由于卵巢变得肥大卵子不能正常排出，原来应该生产雌激素的卵巢反而产生较多的雄激素。这样，就会使姑娘出现多毛。这种病同时还出现闭经和肥胖。

另一种原因是肾上腺有疾病变化。肾上腺是女性分泌睾丸酮的另一个重要部位，所以凡是能促进肾上腺皮质功能亢进的疾病，都可使血浆内睾丸酮含量增加，引起多毛。其他的内分泌疾病，譬如女青年的甲状腺功能减退，也可能造成多毛现象。此外，有些激素药物，也可引起多毛。还有一些姑娘是查不出病因的毛发过多，则称为突发性多毛症。

因此，出现多毛情况的姑娘，应该请医生找出多毛的

原因，对症下药，才有可能治愈。　　（贝润浦）

为什么有的人青春发育期来得很晚？

少男少女到了 13 ～ 14 岁左右，由于体内性激素分泌量不断增多，就进入了青春发育期，身体迅速长高。男少年出现胡须、喉结突出、声音变粗，还会出现遗精现象；少女乳房增大，出现月经。可是，也有一些人到了应该青春发育的年龄，却不见青春启动的信息。

这种青春发育姗姗来迟的现象，有两种情况：一种叫青春期延迟，青春发育期来得很缓慢，要比常人推迟好些日子，甚至几年，但是最终还是会来的，所以不必治疗；另一种叫青春期阻抑，有的在经过了必要的治疗后，青春发育现象最终还是出现了，但有的即使治疗后，青春发育状况却是不能让人满意。

造成青春期延迟或者阻抑的原因是多方面的，一般认为有两种：一种是先天性因素，也就是遗传、体质差等先天因素造成，或者天生脑垂体、甲状腺、睾丸、卵巢等发育不好，激素分泌量不足，不能够激发青春发育；另一种是后天性因素，出生后生了某些疾病，例如血吸虫病、脑炎、脑膜炎、营养不良、佝偻病等，体质变得很差，内分

泌功能不足，结果也影响性激素的分泌，造成不发育现象。

少男少女发现自己的青春发育期该来未来怎么办呢？如果健康状况看上去还可以，没有发现什么疾病，可以耐心地等待到 17 ～ 18 岁左右。在这段时间里，要注意营养，以及养成每天参加体育锻炼的好习惯；如果身体状况比较差，健康检查时又发现有某些疾病，那么，应该针对疾病积极治疗，医生根据需要会配合使用生长激素或性激素类药物，促使青春发育。（姚德鸿）


为什么说皮肤是人体最大的器官？

我们身体的表面，除口、眼、外阴和肛门等处外，几乎都覆盖着皮肤。一个普通成人皮肤的面积大约有 1.5 ～ 2 平方米，其重量约占体重的 16%。

皮肤的上层是表皮和真皮，下层的皮下组织与体内其它组织相连。毛发、指（趾）甲、汗腺、皮脂腺是皮肤的附属器，它们相互配合，使皮肤成为一个多功能的器官。

人体表面的皮肤，宛如一道天然屏障，保护着体内组织和器官免受外界各种刺激和损害。皮肤含有胶原纤维、弹力纤维和皮下脂肪，坚韧而富有弹性，柔软而具有张力，使皮肤能经受摩擦、牵拉、挤压、冲撞或震荡的考验。皮肤

细胞排列致密、紧紧相联，皮肤表面覆盖薄薄脂层，皮肤呈弱酸性，这些都有效地阻止细菌、病毒从体表侵入体内，还抵御着化学物质的侵蚀。皮肤能防水，防止体内水分散发，使人能生活在较干燥环境中；也不让外界水分进入体内，使人能在江河湖海中游泳。皮肤中黑素细胞和黑素颗粒有吸收紫外线的能力，避免了日晒引起的机体损伤。



皮肤和眼、耳、鼻、舌一样，是人的感官器官。它不断感受体外发生的各种变化，使人体正确了解它四周的环境。找东西时，触觉感受器会告诉你是否碰到东西；气温变化时，温度感受器会告诉你是冷是暖。皮肤中的多种感受器和神经末梢把不同的信息通过神经传入大脑，大脑综合分析后会产生冷热、痛痒、软硬、粗细等多种微妙的复合感觉。人体丧失这种感觉，就难以回避外界对机体的损伤。

皮肤是人体的恒温装置。体温过高时，皮下血管扩张，皮肤温度增高、排汗增加，以散发热量。天气寒冷时，皮肤血管收缩、排汗减少，以维持体温相对稳定。

皮肤通过皮脂腺和汗腺分别排泄皮脂和汗液。皮脂能防止皮肤干裂，润泽毛发。排汗除能散热降温、保护皮肤外，还能排泄药物，甚至代替肾脏的部分排泄功能。皮肤有排泄功能，也有吸收功能。人们常把外用药抹在皮肤上，就是根据这个道理。

皮肤是贮水库，它的含水量是体重的 18 ～ 20%。除了少量的水“自给自用”，皮肤调节着全身的水分代谢。皮肤内的葡萄糖含量是血糖的 $\frac{1}{3}$ ～ $\frac{1}{2}$。皮肤还是人体的矿藏，储存着钠、钾、镁、铜、铁、锌、铝等许多种电解质。表皮内的类固醇物质在阳光作用下，转变为有活性的维生素 D，有助于人体骨骼的发育成长。

皮肤的功能还远远不止上述这些，由此，我们可以知道，皮肤不仅面积大、重量重，而且还具有其它器官所不能比拟的多样化的功能。皮肤被列为人体最大的器官，是当之无愧的。（陈传）

为什么有的人皮肤、毛发都是雪白的？

人的种族不同皮肤、毛发颜色也不同。不过，即使是正宗白种人，他的皮肤、毛发也绝对不会是白的。所以，要是年纪轻轻，眉毛、头发雪白，这可不是人体衰老的表

现，而是一种叫做白化病的病态。

患白化病的人，由于体内缺乏黑色素，不仅全身皮肤雪白、毛发雪白，而且连眼珠也不黑、不褐而呈红色。这种病人的皮肤对光线高度敏感，一点也经不起阳光照射，曝晒后极易出现晒斑和发生各种光感性皮炎，但肤色却不会变黑。至于眼睛，因为眼底也缺乏黑色素而畏光，在阳光或强灯下几乎睁不开，而夜间视力倒比正常人还要好。正因为白化病人与太阳无缘，怕白天，却与月亮亲善、爱夜晚，故而曾获“月亮儿女”的雅号。黑色素细胞制造黑色素需要酪氨酸做原料。酪氨酸变成黑色素这种化学反应，必需有酪氨酸酶的参与和促进。如果人体内缺乏这种酶，黑色素的形成过程就发生障碍。那么，人体怎会缺少酪氨酸酶的呢？说来话长，只怪先天遗传。

人类的体细胞核内有 23 对（46 条）染色体，其中 22 对为常染色体，1 对为性染色体。每对染色体中的 1 条来自父亲，另 1 条来自母亲，称为同源染色体。每条染色体上载有许许多多成直线排列的基因，基因控制着人们的各种遗传性状，像身材的高矮、皮肤的颜色、毛发的曲直、血型的类别等等。白化病是一种常染色体隐性遗传病，这就是说，仅仅在 1 对常染色体上，负责制造酪氨酸酶的那对基因，双双都出了毛病时，才会表现出白化病的症状。倘若只有 1 条常染色体上的那个负责制造酪氨酸酶的基

因出问题，体内还是不会缺乏黑色素的，头发、眉毛、皮肤也不会雪白。当然存在着白化病的隐患。为什么？因为这人是个“致病基因”的携带者。

要是致病基因携带者的婚配对象恰恰也携带有相同的致病基因，那就糟了。按照遗传规律推算，他们的下一代，将有 $\frac{1}{4}$ 的机会从父母双方获得一对致病基因而患白化病，$\frac{1}{2}$ 的机会成为致病基因携带者，仅仅 $\frac{1}{4}$ 是正常人。

隐性遗传病最多见于近亲结婚的家庭中，因为有血缘关系的表兄弟姐妹具有相同基因的可能性高达 $\frac{1}{8}$。一个白化病致病基因携带者，如果与表亲结婚，其子女中有 $\frac{1}{36}$ 的可能性患白化病；如果和非表亲结婚，其子女患白化病的可能性仅仅 $\frac{1}{1200}$。我国婚姻法规定近亲不得结婚，其目的就在于减少隐性遗传病的发生。须知目前对遗传病还无法治疗，就拿白化病来说，只能尽量避免过度日晒，出门应撑伞或戴墨色眼镜，以减轻光感反应。　　（盛丹菁）

为什么咳嗽多痰不宜急于止咳？

咳嗽是一种常见的呼吸道症状，有些人一旦咳嗽，急着要求医生给他止咳，这种心情是可以理解的。

但是，咳嗽对于人体来说，并非完全是坏事；当有异

物、灰尘闯进人的呼吸道时，可以通过咳嗽把这些“非法入境者”赶出体外；当气管受病菌感染发炎而分泌出痰时，通过咳嗽可将痰排出去，以保持呼吸道的通畅。患有慢性气管炎的老年人，每天早上总要咳嗽一通，把一夜间堆积在呼吸道中的痰液咳出来，这才感到胸部宽畅。不然的话，痰液滞留在气管内，病人就会感到胸闷难受，气喘吁吁，甚至发生缺氧，面、唇发紫。因此，咳嗽对人体是一种自我保护性的防御机能。

不过，长期咳嗽不愈，会形成慢性支气管炎，进而影响肺的功能，发生肺气肿、肺心病；过分剧烈的咳嗽，会咳破气管和肺内的小血管，引起咯血；所以，咳嗽应及时治疗，但对于多痰型的咳嗽不要急于止咳，而是要让痰液能顺利咳出来，使呼吸道保持通畅。多痰型咳嗽治疗初期，在使用消炎抗菌药物的同时，应以化痰为主，止咳为辅。如果出现剧烈干咳而又无痰的情况则须在医生指导下使用止咳药。

（翁德立）

为什么有的人来月经时会小肚痛？

首先说说“月经”是怎么回事。月经是女性特有的生理现象。女孩子所以会来月经，因为有卵巢和子宫。卵巢

位于子宫两旁，左右各一。小小的卵巢（成人的卵巢也只不过像橄榄大小，而且前后扁扁的）里面含有许多原始卵泡。子宫是个空腔器官。它的上部宽，前面扁平，后面稍凸，称子宫体；它的下部窄，呈圆柱形，称子宫颈，与阴道相连。阴道是个薄壁通道，开口于外阴部。女孩长到十二三岁进入青春期后，卵巢里的原始卵泡开始发育并分泌少量雌激素，促使子宫逐渐发育。大约到十三四岁左右，卵巢与子宫都发育到一定程度时，就出现“月经”。所谓月经，乃是子宫体壁面向空腔的那层内膜，在卵巢周期性分泌的性激素作用下（不成熟的卵泡只分泌雌激素，一旦卵泡能发育成熟并排卵，就分泌雌激素和孕激素），增生在先，脱落于后所引起的周期性出血。正常情况下，一般相隔一个月左右子宫出血一次，故而称为“月经”。

其次讲讲随月经而来的正常与异常现象。行经前或行经期间，由于盆腔充血，可能出现轻微下腹坠胀、腰酸、精神倦怠、疲乏少力等局部或全身性反应。这属于正常现象。要是每逢月经来潮前后，就觉得小肚一阵阵痛或持续痛，或者连会阴部、腰骶部也痛，或者伴有恶心、呕吐、腹泻等等，甚至面色苍白、手足冰冷、头晕昏厥，那可是痛经毛病。这是什么原因引起的呢?

女青少年的痛经与成年、已婚妇女不同，不大可能由内生殖器病变引起，多数与子宫发育有关。倘若天生子宫

颈管狭窄、子宫体过度前屈或后屈而与子宫颈成锐角，必然阻碍经血外流。经血积聚在子宫腔内，会刺激子宫使它发生强烈收缩，从而引起阵发性疼痛。要是子宫发育不良，且并发子宫血管供应异常，行经时由于子宫收缩不协调，加上子宫肌组织缺血缺氧，会引起痉挛性疼痛。疼痛一般在经血增多后，逐渐缓解。如果子宫内膜不成碎片而是整块脱落的话，也常伴有子宫强烈收缩引起阵发性疼痛，直至整块内膜排出后，疼痛方始消失。此外，痛经还多见于比较敏感，对疼痛的耐受力低以及精神紧张、忧郁的年轻姑娘。

近年来，发现痛经还可能与子宫内膜的前列腺素 $F_{2\alpha}$ 产量增高有关。子宫内膜能产生两种生理作用完全相反的前列腺素，以调节子宫的血液供应。一种叫 $F_{2\alpha}$，能刺激子宫肌及子宫血管收缩；另一种是 E_2，能抑制子宫收缩，使子宫血管舒张。如果月经期子宫内膜产生过多的前列腺素 $F_{2\alpha}$，并且进入血液循环，那么，不仅会引起子宫强烈收缩及子宫缺血，导致痛经，还会引起恶心、呕吐、腹泻等全身症状。



（盛丹菁）

为什么患胃肠道病时，腹痛是一阵阵的？

也许每个人都有这样的经验：吃了不清洁的食物，得了胃肠炎，除了恶心呕吐，一定会出现一阵阵的肚子痛。



我们知道，人体的消化管道担负着对食物消化和吸收营养的重任。它好像一台“推土机”，把嘴巴吃下的东西推到胃肠，把不能消化的食物残渣（粪便）由肛门推出体外；它又如一台“搅拌机”，使食物和消化道分泌的消化液充分搅和，“制作”成提供我们生存需要的营养物质。

这种“推土”与“搅拌”工作是依靠消化管道的运动来完成的，而消化管道运动起来好像波浪似的，看起来仿佛蚯蚓那样一伸一缩，医学上称为蠕动。整个消化管道，从食道到直肠都有这样的蠕动，

而正常平缓的蠕动是不会给人体带来痛苦的。当胃肠道受病菌感染发病时，发病部位的蠕动收缩会更突然、更强烈一些，医学上称之为痉挛。它足以对大脑的痛感神经产生一种痛觉刺激。

观察一下蚯蚓的蠕动可以发现，蠕动像波浪一样一次一次通过它整个身体某一点的。打个比喻，就像在平静的池塘里投一块石子，激起的水波纹会一次一次拍打着岸边。人的胃肠也是一样。如果胃肠某部分发生了病变，强烈的蠕动到达这点就会刺激痛觉神经，人就感觉到一次疼痛，而当强烈的蠕动通过以后，刺激消失，疼痛也缓解，因此肚子痛就是一阵一阵的。有些急性胃肠病，来势凶猛，一开始就感到肚子痛，而在强烈蠕动时疼痛更加厉害，这就是医学上所说的持续性疼痛阵发性加重。身体里另外一些器官如输尿管、胆道等也跟胃肠一样有蠕动的特点，所以，如果这些器官发生了疾病，也出现一阵一阵的疼痛。根据这些疼痛的表现形式，那么，如果肚子痛是持续性的疼痛，这就是腹部其他器官出了问题，例如肝痛、肾痛、盲肠痛、膀胱痛等等，须由医生作出正确诊断。（詹家明）

为什么腹泻时，粪便会稀薄得像水一样？

腹泻俗称拉稀，是一种常见的疾病。

饮食不注意卫生，吃了苍蝇叮过或腐败发馊带病菌的食物，就会得急性肠炎，引起腹泻；还有一种腹泻是由于腹部不注意保暖受了凉引发的。不论什么性质的腹泻，它们一个共同的特征就是粪便不成形，稀薄得像水一样，而且总是不断想拉。

健康的人吃的食物和水，在胃里磨碎混和成为粘糊状的食糜进入小肠，再和小肠粘膜分泌的大量肠液混合，使食糜变得更稀烂，由小肠粘膜吸收食糜中的营养成分和绝大部分的水分，剩下的残渣进入大肠，其中一部分水分被大肠吸收，同时经过细菌的发酵和腐败作用，就变成了较干的粪便从肛门排出。



一个成年人每天大约从食品和饮料、茶水中得到 2 升左右的水分。加上胃、小肠和大肠等分泌的消化液中的水分总量可达 9 升。当带有病菌的食糜进入肠道后，肠粘膜受到病菌分泌的毒素侵害而发炎，就削弱了吸收营养物质和水分的机能；而肠液分泌却旺盛，于是大量的水分和没有充分消化的食物残渣长驱直入大肠，成了稀薄得像水一样的粪便，从肛门一泻而下。难怪腹泻时，大便里的粪水要比一天的饮水量还要多。那么，腹部受冷，没有病菌作祟又怎么会腹泻呢？这是因为寒冷能刺激肠子蠕动加快，使食糜在小肠里停留的时间变得极短，以致食糜的大量水分来不及被肠粘膜充分吸收，便立即进入大肠，这时由于大肠蠕动的加快，也不能充分吸收水分，最后被迫从肛门排出。

人体需要水，水是生命之源，而腹泻使体内的水分大量流失，如果不及时补充水分，足以造成机体脱水，危及生命。所以，严重腹泻的病人，须要静脉输入生理盐水就是这个道理。（詹家明）

为什么有的人小腿肚会青筋突起？

有些人小腿肚上显现出一根根突起的、扭曲得像蚯蚓

样的青筋，这些青筋实际上是扩张了的皮下浅静脉，医学上称为下肢静脉曲张。

下肢静脉人人有，为什么有些人会发生下肢静脉曲张？回答这个问题，必须从下肢静脉的解剖与生理讲起。下肢静脉有深浅两组，深静脉行走于肌肉中间，浅静脉就在皮肤下面。下肢有两条主要的浅静脉，一条叫大隐静脉，另一条是小隐静脉。在两条浅静脉之间，和浅静脉与深静脉之间，有许多叫做交通支的细小分枝相互沟通。静脉管腔中有许多瓣膜，它们的作用如同单向阀门，只准血液从下往上回流、从浅静脉往深静脉流动。当下肢运动时，由于肌肉收缩，挤压包裹在肌肉中间的深静脉，加上瓣膜的作用，下肢静脉内的血液就被挤向心脏。当站立不动时，则因无肌肉收缩的挤压，下肢静脉内的血液不易流回心脏，而且由于地心引力的作用，都淤积在下肢静脉中，使静脉内压力增高。

一般说来，以下 5 种人的小腿肚上常见青筋突出：(1) 长期站立工作的人，像车工、钳工，血液老是淤积在下肢静脉中；(2) 长期从事负重劳动的人，像挑担农民、装卸工人，负重时，腹腔内压力增高，下肢静脉回流容易受阻；(3) 腹腔肿瘤病人及孕妇，肿瘤、妊娠子宫压迫腹腔内静脉，阻碍下肢静脉回流；(4) 下肢深静脉发炎栓塞，以后虽然再通，但深浅静脉交通支的瓣膜损坏，闭锁不全，

深静脉内的血液因而倒流入浅静脉；(5) 静脉壁先天薄弱的人，静脉壁经受不了静脉内压力的升高。

倘若阻碍下肢静脉内血液流回心脏、造成下肢静脉内压力升高的因素持久存在，其结果必然是下肢静脉逐渐扩张、伸长、弯曲，造成静脉曲张。由于静脉一旦扩张后，管腔内的瓣膜就闭合不拢，血液流向反常，从深静脉到浅静脉，自上而下地倒流，致使浅静脉内压力更加升高。所以，下肢浅静脉曲张比深静脉曲张更多见，就是这个道理。（盛丹菁）

为什么糖尿病人也会发生低血糖？

糖尿病的基本症状是患者空腹时血液中的葡萄糖含量一般超过正常水平，但有不少糖尿病人却常常会发生心慌、手抖、出汗、头晕、饥饿、全身无力等低血糖反应，严重时还有头痛、恶心、呕吐、说话颠三倒四、注意力不集中，个别病人甚至可出现抽风、神志昏迷等，这是什么缘故呢?

据临床医学观察，糖尿病人发生低血糖反应，大都发生在使用糖尿病特效药胰岛素过量时，在血糖及尿糖量已减少时，没有及时相应减少胰岛素的用量，导致血糖过低；

其次是在控制饮食的情况下，从事体力劳动和运动锻炼的活动量过大，这样可使血液中的大量葡萄糖进入细胞内，同时又加速身体对葡萄糖的利用和消耗；第三，过分严格控制饮食，或患有某种疾病，食欲极差，进食量锐减的情况下，血糖来源不足，也会发生低血糖。



糖尿病人一旦发生低血糖，应及时治疗处理，否则后果严重。对于血糖症状较轻的病人，可适量吃一点水果糖、饼干或糖开水；对低血糖昏迷、神志不清、不能进食者，应及时送医院抢救。预防低血糖反应的关键，是及时调整胰岛素或其它降糖药的剂量，在胰岛素作用最强的时间或体力活动明显增加时，可适当加餐。（翁德立）

为什么青少年也会得糖尿病？

早在几千年前，就有医生通过品尝尿液的味道来诊断

糖尿病。我国古代将糖尿病称为“消渴症”。

1889 年，德国医生默林和俄国病理学家明科夫斯基，意外地发现，一只经手术切除胰腺的狗的尿液，竟招来成群的苍蝇，由此揭开了糖尿病的秘密。原来人体胰腺里的胰岛能产生一种胰岛素物质，万一体内缺乏胰岛素就会得糖尿病。胰岛素也就成了治疗糖尿病的特效药物。



中老年人较易得糖尿病，特别是肥胖的中老年人，而肥胖能够诱发糖尿病。那么为什么青少年会得糖尿病呢？少数也是肥胖的缘故，多数是由于遗传因素作怪。现在已经证实，糖尿病的发病率在血统亲属与非血统亲属中有显著差别，前者比后者高约 5 倍。父母没有糖尿病，生下的后代一般也没有糖尿病。相反，父母一方有糖尿病或父母双方都有糖尿病，生下的孩子患糖尿病的机会就多。

医学上，糖尿病有许多种分类方法，其中有一种是按年龄区分的：

青幼年型：发生于儿童和青少年。又称消瘦型、不稳

定型。主要是遗传因素的影响，胰腺里的胰岛生下来就有问题，无法正常地分泌胰岛素，所以起病急、病情重，多饮、多食、多尿和消瘦现象明显，空腹血糖水平很高，有时达 200 ～ 300 毫克/100 毫升以上（正常 70—110 毫克/100 毫升）。

成年型：发生在成年人，尤其是中老年人。又称肥胖型、稳定型。多数是胰腺里的胰岛受到某种刺激因素干扰后胰岛素分泌量减少，并非胰岛天生有问题，所以发病较慢，症状也轻，血糖水平不太高。

青少年得了糖尿病，大多数病情较重，而且不易治愈应该积极治疗，医生通常采用控制饮食，合适的体育运动和包括注射胰岛素等降血糖药物的治疗方法。 （姚德鸿）

为什么糖尿病人特别容易饥饿？

国外有部电影，叙述了一位医生研究治疗糖尿病的特效药胰岛素的故事。那里面有这样一个情节，晚上，一个女孩，乘家里人熟睡时，偷偷地来到餐室，狼吞虎咽地大吃起来。当被人发现，并阻止她时，她还要挣扎着把一块肉往嘴里塞。她是一个受虐待的孩子吗？不是，她恰恰是一个很富有的、政府部长的宝贝女儿。那么她怎么会吃不

饱呢？原来，她患了糖尿病。糖尿病人的饥饿感是一种普遍的症状。那么糖尿病人为什么特别容易感到饥饿呢？这就要从患糖尿病的基本病因谈起。说得通俗点，糖尿病就是尿中糖分过高的一种病。正常人的血糖（血液中的葡萄糖）水平，在一天中都比较平衡，早晨空腹测定，正常的是 70 ～ 110 毫克/100 毫升，如果高于 110 毫克/100 毫升的，叫高血糖（还不是糖尿病），低于 70 毫克/100 毫升的，叫低血糖。在一般情况下，血糖在 180 毫克/100 毫升以下时，尿中不会有糖出现，如果一旦超过了这个水平，就出现糖尿了。糖在体内的代谢功能是受胰岛素调节的，有的人因胰岛素缺乏，糖的吸收就会受到阻碍。“多余”的糖会随尿排出体外。这样，人的组织细胞就不能很好地利用葡萄糖，来产生机体所必需的能量了。于是，只能“挖存货”了——把体内的脂肪、蛋白质拿来转化为葡萄糖。结果，糖尿病人就一直处于饥饿的状态，总想补充食物进去。可是，糖尿病人又不允许多吃，于是矛盾更尖锐了，造成饥饿感越来越严重的恶性循环。

糖尿病人不仅有多食的毛病，还有多饮、多尿，和体重减轻的表现，有人把这归结为糖尿病的“三多一少”。多饮是与多尿直接联系在一起的，多尿使机体水分大量丧失，造成脱水，人就感到渴了，于是需要饮水。由于糖尿病人是要控制食量和限止某些食物的，加上平时糖分要比

常人流失的来得多，所以会引起体重下降和消瘦。

全世界约有 1.5 ～ 2% 的人患有糖尿病。糖尿病一般是中老年人的病，但是小孩子也会得的。糖尿病虽然不是直接遗传的，但约有 $\frac{1}{4}$ 的患者往往有家族病史。因此，当出现莫名其妙的、不知原因的“三多一少”现象时，就应该重视，及时求医。




（劳宏燮）

遗精会不会伤身体？

男子到了青春期，往往睡梦中会遗精，即精液不知不觉从生殖器溢出。这是因为到了青春期，睾丸不断产生精子，精囊和前列腺也不断产生精液浆，它们的混合即为精液，待积聚到一定量之后，就会产生神经冲动，造成遗精。古人说：“精满自溢”，就是这个意思。遗精，是性成熟的一种标志。

初次遗精给男少年带来一种新的心理体验。随着年龄

的增长，男少年开始感到异性的吸引力，又有性体验的要求。因此，往往在做梦时发生遗精，又称为梦遗。有的青少年对遗精忧心忡忡，认为“一滴精，十滴血，精液溢出会丧失精气”，这是一种不必要的顾虑。



我们不妨先了解一下精液是怎么产生的。前面已说过，精液是由精子和精液浆组成的。精子由睾丸产生，睾丸一天可产生几千万个精子，刚诞生的精子还没有运动能力，在附睾中停留 10 ～ 25 天便成熟了。成熟的精子贮存在附睾尾部，在排精时便随精液浆一起排出体外。精液浆主要由精囊、前列腺和尿道球腺的分泌物组成。精液浆本身不具有生育能力，它的主要作用是保驾精子以及作为输送精子的运载物质，90% 以上是水。如果把精子比作蝌蚪的话，精液浆就是蝌蚪畅游的水源。睾丸不断产生精子。日长时久，精子在附睾内“住”满了，就要排泄到体外来，遗精便是它们从体内排到体外的一种主要方式。当然各人的遗精次数可以不同，有的人每月 1 ～ 2 次，有的人一两个

月一次，这都是正常的。

再从精液的成分来看，其中精囊液约占 60%，前列腺液约占 30%，精子则不到 5%。精液中除精子外，主要成分是水，其余是少量的果糖、白蛋白、脂肪、酶类和无机盐等。这么少量的营养素，对人体来说，实在是微不足道的。由此可见，遗精不会损害身体健康。

如果遗精次数太多，甚至一两天即发生一次，或者稍有性冲动或性欲念，即有精液流出；遗精后有精神萎靡不振、头昏乏力、腰酸腿软等症状，就应该请医生检查治疗。

出现频繁的遗精，首先要注意有否生殖器官的疾病，如阴茎头炎、前列腺炎。由于炎症刺激，会使性中枢神经处在兴奋状态，诱发遗精。另外，包皮过长，包皮垢不易去除，也是刺激遗精的一个因素。在这种情况下，应该积极治疗，并经常洗澡，注意个人清洁卫生。

此外，青少年要有广泛的生活乐趣，积极参加有益的文体活动，不要看黄色书刊和黄色电视录像，睡眠时最好穿宽松的衣裤，阴茎避免受压，棉被不要过重，这样就会减少遗精的次数。（贝润浦）

为什么过度手淫有碍健康？

青少年进入青春发育期往往会对自己身体外形和心理、生理上发生的微妙变化既感到迷惑不解又想入非非。在这过程中，他们有时常常会出现一些不自觉的行为。手淫就是其中一种。

手淫是指用手或其它方式抚摸外生殖器，以求达到自慰的一种行为。它的最初发生可能是偶然的。幼儿和儿童会因好奇而抚弄生殖器官；穿紧身内裤、骑车、爬竿等活动会磨擦外阴部。生殖器官受到刺激，肌肉收缩和松弛，产生快慰感觉。青春期后，性生理发育进入一个新阶段；性器官发育渐趋成熟，性激素分泌大量增加，性意识开始形成，于是产生了性冲动。在性冲动时，很容易发生自我的、无意识的、简单而不为人知的手淫行为。

性的活动，对青少年的生理、心理的健康发展和道德品质的形成有着密切关系。手淫，作为性活动的一部分，在青年人中并不少见。多数人手淫因好奇开始、偶尔发生而未积以成习，因而对健康没有损害。但是，如果手淫成习，频繁且不能自拔，就会对身心健康带来不良后果。

青少年正处于读书学习、长知识和长身体的阶段，不

仅生理发育未完全成熟，心理状态也不稳定。有手淫习惯的人，对于他人的不良行为往往嗤之以鼻，而自我手淫时，一方面感到自我满足，另一方面内心充满自责、自卑和惧怕。频繁手淫，使人经常处于心理紧张、内心矛盾和不良体验中，就会影响道德观的健康形成和个性品质的正常发展。

沉湎于手淫的人，不仅思想矛盾和精神负担很重，大脑性兴奋中枢长期反复处于兴奋状态，也会干扰神经系统的正常活动。他们上课、工作时注意力不集中、理解力下降、记忆力减退，而且经常会有手淫的冲动。大脑兴奋与抑制过程失调，会出现头晕耳鸣、心悸失眠等神经衰弱症状，甚至会出现暂时的性功能紊乱或低下的情形。



少数过度手淫者会感到下腹隐痛、阴部不适、腰酸膝软、尿频尿急、遗精带下等症状，它们常与泌尿生殖系统疾病有关。过度手淫，不仅盆腔长时间充血，引起精索静脉曲张等症，还会把手上致病菌带进尿道和生殖器官，导致尿路感染、精囊炎等病。

手淫，作为性意识的开

始，它的害处往往不在手淫本身。过度手淫才会带来心理挫折和病理反应。不看不健康的书刊和影视片，积极投身集体活动，培养有意义的兴趣和爱好，养成良好的卫生习惯，这些都是克服手淫习惯的方法。有人说，在青少年发育成长过程中，也许没有哪一个问题会像手淫那样更令青少年感到烦恼和迷惑不解了。然而，正确地认识手淫，懂得过度手淫对身心健康的影响，人们就能从迷惑中走出来。（陈传）

歪嘴巴是“鬼风”吹的吗？

你见过一个人的嘴巴突然歪掉的怪事吗？是不是被什么“鬼风”吹了？或者是碰上什么“邪气”了？

医学上有歪嘴巴这个病，叫作面神经瘫痪。人的面部左右各有一根面神经，它的“任务”是管理舌头味觉、控制口水分泌和支配面部表情。左右面神经对两侧面部肌肉有相同的控制能力，因此面部肌肉两边处于平衡状态，面貌就十分端正。而当一侧患面神经炎时，面神经就会瘫痪，这一侧的面部肌肉就会因为失去控制而变得完全松弛。相反，另一侧健康的面部神经仍对面部肌肉保持很好的控制力。这样面部肌肉失去平衡，嘴巴就被拉到面神经健康的

一侧，成了歪嘴巴。



好端端的面神经怎么会发炎瘫痪呢？原因很多，例如中耳炎、腮腺炎、鼻咽癌、头部外伤头颅骨骨折、胸膜炎等等，都会引起。但是，另有些人歪嘴巴却不是疾病引起的，有的是受了风寒引起的，有的则是无任何原因发生的，那么，这种歪嘴巴又是什么原因呢？现代医学发现那是病毒在作怪，面神经受到病毒侵犯而发病，着凉受风只不过是一种诱发因素。

歪嘴巴不仅面部面容难看，给病人带来精神上痛苦，而且还会出现有病一侧面部麻木、眼睛不能完全闭上、说话漏气、吃饭时口腔只能用一侧咀嚼、耳朵背疼痛等症状。

患了歪嘴巴病，不能着急，多数病人过 1 ～ 2 个月会逐步好转，嘴巴位置重新变正。如果能配合医生进行治疗，效果更好。现在治疗的方法很多，例如采用维生素 B_1、B_{12} 等药物，对面神经起营养和保护作用，也可以用针灸，帮助面部转正，以及理疗，像热敷、红外线照射等，改善面部血液循环，有助面神经炎消失。

综上所述，可见所谓歪嘴巴是“鬼风”吹出来的说法，

是完全没有科学根据的。（姚德鸿）

常扳压手指为什么会使指关节变形？

有些人很喜欢扳压手指玩耍，把手指屈起来，用力扳压一下中间那个关节，发出“嘎巴！嘎巴!”的响声，高兴起来，还要一个个手指轮流扳，跟别人比试谁发出的响声大。要知道扳压手指会使指关节变形。



手指的每个关节两边，都长有质地比较坚韧的韧带组织，以帮助固定关节和支持关节正常活动。如果用力扳压手指关节，韧带组织就会因过分折叠而发出响声，好比将一张照相底片折叠能发出响声，二者的道理是一样的。倘若经常这样扳压手指关节，日子久了就会产生许多不良后果。

首先，引起韧带组织损伤。经常扳压手指关节，会使韧带里的部分纤维组织撕裂，出现疼痛或压痛症状，引起关节不同程度的肿胀，活动受到限制，久而久之，手指会

变得不灵活。

其次，造成韧带的弹性减退，甚至由于韧带经常过分折叠而变得十分松弛，不能很好起固定关节的作用，导致关节活动无力。

第三，会使与韧带紧密连结的指关节囊松弛。因为扳压手指关节时，关节囊一起被挤压和折叠变形。关节囊松弛的结果，造成关节活动无力和活动范围不固定，手指特别容易受到损伤。

第四，指关节会发生不同程度的变形。被扳压的手指指关节肿胀突出，手指呈梭形，两端细，中间粗，模样十分难看。

最后，即使一时不发生韧带损伤现象，但扳压时间长久后，必定会造成关节的慢性劳损，扳压后的当时或以后，关节部位经常会隐隐酸痛不适。

由此可见，常扳压手指关节玩耍，既损害手指关节的功能，又影响手指的健美，所以应该趁早改掉这种不良习惯。

（姚德鸿）

为什么骨头上会长骨刺？

经常听到有些人因腰痛、腿痛、足跟痛上医院。医生

给拍张 X 片一瞧，说是骨头上长出了骨刺，这是怎么回事呢?

人体从胎儿开始直到老年，是一个连续的生命运动，各种器官由不成熟到成熟，由成熟再逐步变得衰老，这是不可抗拒的自然规律。医学上把衰老过程叫做退行性变化，而骨头上长骨刺，就与这种退行性变化有直接关系。

随着年龄增加，骨头本身会发生退行性变化，大量钙质沉积使骨头变得十分脆弱。骨头周围的肌肉、韧带等组织，也会发生退行性变化，弹性降低，质地变脆。但是骨头所负担的工作量却并没有减少，行走、站立、负重样样还得干，无形中等于加重了骨头的负担。加上骨头旁边肌肉、韧带也有衰老的表现，辅助骨头工作的能力也下降。在负担加重情况下，骨头的边缘和肌肉、韧带在骨头上的附着处，就会长出保护性新骨，目的是为了加强骨头的力量，对付负荷加重的局面。于是就形成了骨质的增生和骨刺。

骨头长上骨刺后，有时会造成关节活动不灵活或关节酸胀，这种感觉在早晨起来或久坐后起立时最为明显，经过一会儿活动后会消失。那么，长上骨刺会疼痛吗? 这种疼痛并非直接由骨刺造成，因为增生的骨刺上并没有神经分布。疼痛主要是由于腰腿部和足跟的骨头、关节、韧带、肌肉都有退行性变，造成工作负担加重引起的。当然，骨

刺如果压迫邻近神经时，也会引起疼痛的。



由此可见，骨刺主要是一种老年性疾病。有资料表明，脊柱与腿部和足跟处的骨头长骨刺机会最多，因为这些部位荷重负担最大。40 岁以后就可能出现骨刺，60—70 岁的老人，则多数会出现不同程度的骨质增生与骨刺。

怎样防止生骨刺呢?从小注意锻炼身体是一个好办法，这样可以延缓骨头退行性变化的发生。一旦长了骨刺，除了那些压迫神经非要开刀凿掉的以外，一般只要注意腰、腿、足部的保护，减少腰、腿、足的负担，例如不要久站、久走和荷重等，是可以减轻不适症状的。（姚德鸿）

为什么有些人进行体育运动后会足跟痛？

有些人在进行体育运动后，会感到一侧或双侧足跟疼痛。

这是因为在进行剧烈的体育运动时，足跟难免会与地

面发生频繁的撞击，这样就有可能造成许多损伤，有的可能是一次运动不当所造成，有的则是经常性劳损积累而成。运动后足跟痛大致有这么几种情况：

跖腱膜炎：跖腱膜是长在足底部一种比较有力的组织，对维持足弓起一定作用。它一头长在足跟的跟骨上，如果运动不当，会造成这层腱膜充血、肿胀，出现足跟痛。

跟垫炎：足跟部位的软组织，包括肌肉、脂肪、皮肤等，统称跟垫，它像垫子一样起着防止震荡的作用。运动损伤会引起跟垫充血、水肿。

跟骨滑囊炎：足跟部的跟骨周围长有一种叫作滑囊的结构，里边有少量液体起润滑作用，能减少跟骨因行走而与周围组织发生摩擦，也能防止走路时人受到震荡。运动损伤则会引起滑囊发炎，造成足跟痛。

跟骨骨刺：长期运动损伤，会使跟骨的骨质发生一定程度增生，局部形成骨刺，走路足跟就痛了。




万一发生运动性足跟痛，应采取以下一些措施：在一段时间里，减少或停止跑、跳等体育运动，尤其不要在硬地上运动；进行不着地的足部运动，以保持足部肌肉力量，促进血液循环，帮助足跟部充血、水肿的消退；局部热敷或热水浸泡；在鞋子足跟部垫块厚海绵垫，帮助减少疼痛。当然，如果症状严重，还是应该请医生诊治。

其实，运动性足跟痛是可以预防的。进行体育运动前尤其是需要蹬脚的运动，应充分做好足部准备活动；运动时要掌握正确的动作和姿势，避免足跟猛烈撞击；使用足跟部鞋垫，万一发生足跟痛，应立即采用上面说的措施处理，不让病情进一步发展。（姚德鸿）

羊癫风是怎么回事？

羊癫风是癫痫的俗称。这种病根据症状表现可分大发作、小发作、局部性发作和精神性发作四种，但是以大发作类型最为多见。那么，什么是羊癫风大发作呢？病人突然神志丧失，躺倒于地，全身肌肉强烈收缩抽搐，呼吸骤停，面色青紫，口吐白沫，大小便失禁，喉部肌肉强烈收缩，痉挛，发出像羊叫一样的声音，所以这种病俗称羊癫风。大约过 2 ～ 3 分钟，病人才停止抽搐，慢慢苏醒过

来，然后是头痛、头胀。有的人要隔很长一段时间发作一次，有的人一天就可发作多次，有的人发作的时间持续得很长，需医生用药治疗才能停止。发生羊癫风的原因，神经医学家认为可能有两个：一个是原发性因素，另一个是继发性因素，由于头部外伤、脑炎、脑瘤、脑膜炎等引起，由于大脑功能暂时性紊乱，诱发了羊癫风。但是这种病发病的确切原因，目前还没有完全弄清楚，医学专家们正在深入探索。



癫痫病人是很痛苦的，大发作时病人的身体又有受外伤的危险，所以有癫痫病史的人尽可能不要独自出远门，也要避免疲劳与精神刺激。这样可减少发作机会。万一大发作时，旁人应该加以护理与保护，解开上衣，把头歪向一侧，防止口水吸入气管产生窒息，也可用手帕、布卷塞入口中防止咬破舌头。在采取了这些临时性护理措施后，应尽快将病人送附近医院。（姚德鸿）

为什么健康人有时也会浮肿？

有心脏、肝脏或肾脏病的人会发生浮肿，那是这些疾病表现的症状。但是为什么有些健康人也常常会发生浮肿呢？原来，产生浮肿的原因很多，有的是由疾病引起，也有的是不由疾病造成的。这里，例举一些常见的健康人发生浮肿的情况：

营养不良性浮肿：身体各器官没有什么疾病，主要是长期营养不好，特别是蛋白质食物吃得少了些，导致血液中蛋白质成分不够。蛋白质是一种胶体性物质，它在身体里的作用是使血液具有一定的渗透性压力。血液中蛋白质成分足够时，血液渗透压增加，会将人体组织里边的水分“吸收”到血液里去。如果蛋白质不充分，血液渗透压力就下降，水分就会过多地囤积在组织中，形成浮肿。



月经前浮肿：有些少女或妇女，每逢月经前 7 ～ 10 日，会莫名其妙地出现眼皮沉重的感觉，一觉醒来，两眼好像睁不开似的，接着便感到腹胀和下肢浮肿，到月经即将来临前达到高峰，月经过后浮肿也就消退。这种浮肿是生理性的，与月经周期过程中内分泌功能变化有关，不必担忧。

特发性浮肿：常与站立或行走较多有关，多半发生在旅游时，如长时间站立或行走；人的身体直立时，下肢静脉血液和淋巴液由于重力缘故，回流很费劲，结果使毛细血管和毛细淋巴管里的压力增高，血液或淋巴液中的水分便渗入到人体组织里，形成浮肿。或者脑部血液供应不足，诱发了能引起浮肿的激素物质，例如脑垂体分泌的抗利尿激素增加，排尿减少，造成浮肿。这类浮肿一般发生在腿足部，清晨和上午浮肿程度较轻，下午及晚上加重。

功能性浮肿：多见于女性，局限于眼皮和下肢，还伴有乏力，胃口不好，睡眠不良等情况，原因可能是体内毛细血管功能状况改变的结果，水分容易从毛细血管壁渗出到组织中。

以上这些健康人发生的浮肿，通常程度都比较轻，来得迅速，消退也快，只要在日常生活中注意营养、吃得好些、吃得淡些，避免长时间站立和行走，妇女在经期前注意休息，这样的浮肿是可以防止和减轻的。　　（姚德鸿）

为什么有的人个头长得特别快？

16 世纪的时候，我国有位名叫江瓘的医学家，写了一本医书《名医类案》，其中记载了这么一件事，说太原地方有个大官，儿子名叫皇甫及。这孩子出生时与平常小孩一样，没有什么特别。长到 14 岁时，忽然得了一种怪病：身体长得异乎寻常的高；小小年纪，身高超过 7 尺，身围也变宽，饭量要比往常增多 3 倍，但到翌年便死了。这种怪病现代医学上称为巨人症，这是由于病人的脑垂体上长有肿瘤或细胞增生，使脑垂体分泌生长激素的分量过多，于是个头长得特别快。

人的个头高矮，牵涉的问题很多，与遗传、环境、营养、疾病等多种因素有关。当然，基本规律还是有的：人出生后，第一年增长 20 ～ 25 厘米，第二年约增长 10 厘米，第三年约增长 8 厘米，至 13 ～ 14 岁青春期时增长 7 ～ 8 厘米，也有增长达 10 ～ 12 厘米以上的。大多数人，过了青春发育期，个头增长速度就减慢下来，一般到发育成熟的 25 岁前，个头至多增长 10 ～ 20 厘米。因此，正处于青春期的青少年，个头长得比一般人快是完全正常的

事。

医学上，有这样一个概念，身高比同民族、同性别、同年龄者超出 30% 以上；或者成年男子身高超过 2 米、成年女子身高超过 1.85 米，便称为巨人。巨人不等于“巨人症”，单纯巨人并非有病，得巨人症的巨人都有巨人症的症状，例如饭量特别大、身体抵抗力很弱、经常受感染生各种病等。



得了巨人症，可以通过外科手术或放射线照射等方法，消除掉脑垂体上的肿瘤或细胞增生。如果延误治疗，很容易死亡。

（姚德鸿）

为什么缺钙会引起抽筋？

有时会看到这样的病人：手腕、手掌、手指蜷曲像鹰爪，两脚屈起，僵硬强直，四肢不断抽搐，神情紧张惊恐、焦虑和激动，甚至大叫大嚷。严重时，还会因喉、气管部

位肌肉收缩而发生呼吸困难。

医学上将上面讲的那种病症叫做搐搦 [chù nuò]，也就是通常所说的抽筋。这种病发作时，一天可以出现一至几十次抽筋，每次抽筋可历时几秒至几十秒钟，病人十分痛苦。那么，为什么会得这样的怪病呢？现已查明，这是身体里缺少了钙的缘故。



然而，钙与抽筋有什么联系呢？机体里的钙质有一种控制神经和肌肉活动的本领，也就是只允许神经、肌肉规规矩矩地工作，不能过于兴奋、过于激动而“乱说乱动”。万一血液中钙质含量少于正常值，神经、肌肉便会不受钙质的约束，抽筋现象就发生了。

事实真是这样，病人发生缺钙性抽筋时，医生会给予葡萄糖酸钙溶液等药物进行静脉注射，使病人迅速补足血液中所缺的钙质。这样的对症下药，往往一针见效，病人抽筋很快停止。

人体缺钙的原因很多，例如吃得太少，不注意营养，挑食或偏食，造成进入体内的钙质不足。又如甲状旁腺发

生功能减退，或者因作甲状腺手术不当，连同旁边的甲状旁腺一起切除掉，于是人体的钙质新陈代谢得不到甲状旁腺的控制，也会因缺钙而引起抽筋。

为了避免缺钙性抽筋，可以经常服用葡萄糖酸钙片或乳酸钙片，多吃含钙丰富的食物，例如海带、紫菜、黑木耳、黄豆、豆腐、苋菜等。（姚德鸿）

为什么胃会泛酸水？

胃是消化食物的主要脏器，胃会分泌胃液，胃液中有许多胃酸，它的浓度相当于 0.25 ～ 0.5% 的盐酸，对身体完全无害。相反胃酸能帮助消化食物，也能杀灭食物中的细菌。

胃泛酸水是胃酸分泌过多造成的。

现代医学已经掌握，胃经常泛酸水有两种情况：其一是生理性胃泛酸水，当人的神经紧张，情绪忧郁和过度疲劳时，人体最高神经“司令部”——大脑皮层会发生功能紊乱，专司控制胃酸分泌神经的功能也会同时紊乱，导致胃酸分泌增多；另外，饮食不当，例如吃过咸、过辣、过酸、过冷和过烫的食物，都会刺激胃酸分泌增加。某些食物例如玉米、红薯、马铃薯、山药、甜食、醋等，由于这

些食物含有大量淀粉，糖分和酸，会刺激胃分泌大量胃酸。此外，因治疗某些疾病，服用阿斯匹林、利血平、奎宁、保泰松、强的松等药物，也可刺激胃酸分泌增多。还有，上了年纪的人，食道与胃交界处的贲门功能减退，有时会发生贲门松弛现象，造成胃液向食道逆流。以上这些情况都属于非疾病引起的胃泛酸。

第二种泛酸情况称为病理性泛酸，患慢性胃炎、胃或十二指肠溃疡、胃窦炎等病，往往以胃酸增多为特征，常出现胃泛酸现象。




对于生理性胃泛酸没有什么特殊治疗，尽可能消除诱发因素，减轻胃泛酸程度和减少胃泛酸机会。病理性胃泛酸首先是治好有关疾病，同时要服用止酸药，例如甲氰咪胍 [guā]、碳酸钙、苏打片、胃舒平、西咪替丁或雷尼替丁等，泛酸便会得到制止。

（姚德鸿）

为什么瘦的人胃容易下垂？

人的内脏，在体腔内都是固定在一定的位置上的。上过生理卫生课的人都观察过人体模型，知道了肺在哪里、心脏在哪里？哪里是胃、哪里是肝、肾……这种有秩序的排列，是在生物进化到人的漫长过程中形成的，它使各种内脏器官的功能，得到合理、充分的发挥。因此，我们简直无法想象，一旦人的内脏器官的排列，发生了混乱和变动的时候，人的感觉将会怎么样？

事实上，这种情况有时候在某些人身上是会发生的，那就是内脏下垂，最典型的是胃下垂。正常人的胃，在腹腔的左上方，处在腰带的上下（偏上）位置上。胃的位置能保持相对的固定，是胃周围的韧带将胃固定着。胃周围的韧带包括贲门与膈之间的膈胃韧带、胃小弯与肝之间的肝胃韧带（叫小网膜）、胃大弯与脾



之间脾胃韧带，以及胃大弯下部
的胃结肠韧带。这些韧带有的是
“提”着，有的“拉”着，有的“托”着，这样，胃就固定在它应该在的位置上了。可是，一旦这些韧带松弛了，或者胃壁的张力减低了，那么这个沉甸甸的胃，就会离开原来的位置，垂降下来；严重一点的，当站立时，胃的下缘会“掉进”盆腔。这样，各种不舒服感就会产生，如出现饱胀、厌食、恶心、嗳气、便秘等症状。胃下垂往往在瘦长的人中间更容易发生，这是因为瘦子的腹腔没有太多的脂肪，各种韧带容易松弛，腹肌不发达，腹内压不高，胃自然而然要“掉”下去了。

胃下垂不仅会带来以上的不适，时间长了，还会引起胃炎、胃溃疡，因为下垂了以后，食物容易在胃里滞留而发酵。

胃下垂可分先天性和后天性两种。先天性胃下垂多属韧带天生松弛的关系，而且往往是全内脏下垂；后天性胃下垂则主要是严重消瘦的原因造成的。

得了胃下垂症，除了积极治疗外，平时还须注意饮食，不能暴饮暴食，进食后最好平卧一段时间。在平时，最好使用“胃托”，以帮助胃的位置的固定。　　（劳宏燮）

为什么胆道里会生“石子”？

在人体的右上腹部，有一个由胆囊、胆管组成的胆道系统，里面流动着胆汁，它的源头是肝脏，每天产生 500 ～ 1000 毫升的胆汁，通过胆道系统进入肠子，帮助消化食物。那么，胆道里边为什么会生“石子”呢?



一般认为，胆石的形成要有三个条件：第一，胆汁性质改变；胆汁中胆固醇或胆色素成分增多，它们是形成胆固醇结石、胆色素结石或两种成分都有的混合型结石的“原料”。第二，胆道系统里有发炎或蛔虫阻塞等原因，使胆汁流出不畅，胆汁淤滞，胆汁里的结石“原料”就容易析出和沉淀。第三，以较大的胆固醇、胆色素颗粒、细菌、蛔虫卵或死蛔虫残体等

作为结石核心，由胆固醇或胆色素逐步沉积而形成结石。

胆石症是常见疾病，随着营养水平增加，以及上了一定的年纪后，运动量减少，人就会发胖，会直接影响胆汁成分，使胆汁中胆固醇、胆色素含量增加。另外，胆道系统发炎的机会很多，尤其农村中蛔虫病发病率仍很高，容易并发蛔虫钻胆的胆道蛔虫症，这些情况增加了胆汁淤滞、结石生成的机会。一旦胆石形成后，反过来又会增加胆道发炎的机会，由于互为因果，胆石就会越来越多、越来越大。

当然，胆石症是可以预防的，应该从以下几个方面加以注意：

重视饮食控制，避免过多摄入高脂肪饮食或甜食，这样可减少体内脂肪类物质，也不致于引起脂肪代谢紊乱，并能减少体内胆固醇、胆色素的含量。另外，多吃新鲜蔬菜与水果，增加维生素，也是防止胆石形成的有效方法。

积极参加体育运动，增强内脏功能，不仅能防止胆汁淤积，也能减肥，更能增加身体抵抗力，避免胆道系统发炎。

及时治愈蛔虫病或胆道发炎等疾病，在农村应格外注意这一点。

（姚德鸿）

为什么泌尿道里会生“结石”？

人体的泌尿道包括肾脏、输尿管、膀胱和尿道几个部分，是负责制造和排泄尿液的重要器官，应该保持畅通无阻。但是，有些人的泌尿道里会长出结石来，医学上叫做尿石症。一旦长上尿结石后，有的会产生剧烈的腰痛，有的会发生血尿，有的由于尿液无法排出，肾脏里积储了大量尿液，成为肾积水，使肾脏功能受到严重损害。所以尿石症是一种危害人类健康的疾病。



泌尿道里长出结石的原因是多方面的。有些医学专家认为，天气炎热或在高温环境下长时间工作，出汗太多，尿量减少，尿液浓缩，尿里的结晶体容易沉积成结石，所以我国南方炎热地区尿石症发生率很高，北方寒冷地区相对就少；有的认为，泌尿道本身存在

梗阻性病变，尿液排出不畅，里面的尿垢淤滞沉积成结石；有的认为，泌尿道有炎症，尿里有细菌，尿液混浊，容易形成结石。也有的认为，是营养不良，特别是维生素 A 缺乏，诱发泌尿道结石的。再有的认为，甲状旁腺功能亢进，维生素 D 中毒。其实，上面这些都是造成尿结石的原因，归结成一点，就是在某种因素影响下，使尿液里形成结石的结晶体大量增多，尿液无法把它们全部溶解，只能在尿液中沉淀最后形成泌尿道结石。

现在已经查明，尿结石的种类还真不少，最多见是草酸钙、磷酸钙结石，其次是磷酸铵镁、尿酸、黄嘌呤等结石。得了尿结石病应积极治疗，当然更重要的是预防，应该养成多饮水的习惯，每日保持尿量 1500 毫升以上，出汗多时更应多饮水，使尿的水分增加，溶解尿液里某些构成结石的成分，并且尿液多了便能不断冲洗泌尿道，不让结石形成或逗留。此外应注意有些食品，如豆类、豆制品、菠菜、海带中含钙、磷、草酸等成分较多；动物内脏含尿酸、胱氨酸、黄嘌呤等成分较多，在尿结石发生率高的地区，应该避免过多或常吃这些食物。（姚德鸿）

为什么有些人血液中白细胞会减少？

白细胞又叫白血球，是人体里的“卫士”，具有消灭细菌、病毒等病原体和增强抵抗力的作用。正常人血液里白细胞的数量应是每立方毫米 5000 ～ 10000 个；如果白细胞数量持续地少于 4000 个，而血液中的红细胞、血小板数量却并不减少，那么，此人一定得了白细胞减少症，症状是头昏、乏力，个别人还会发烧。更严重的是，这些“卫士”减少后，人体特别容易感染疾病。有些人往往把白细胞减少认同于贫血，这是不对的，患贫血症的人，血液中减少的是红细胞而不是白细胞。

人体血液中白细胞减少，常常由两种原因引起，一种是人体的造血“工厂”骨髓生产白细胞数量减少。长期服用某些药物，如氯霉素、磺胺药等，这些药物中的某些成分起了抑制骨髓制造白细胞的作用。另外，长期接触 X 线、同位素等放射性物质，或者苯等化学物质而保护措施不当，也会影响骨髓生产白细胞。

第二种情况是白细胞被破坏太多，一般发生在患了肝炎、伤寒或受了其它病毒严重感染后，白细胞的消耗和破

坏就会增多。



万一发生白细胞减少症，首先须找到原因，然后设法去掉病根，使用一些能改善骨髓造血“工厂”制造白细胞功能，增加生产白细胞数量的药物，它们有维生素 B_4、叶酸、鲨肝醇、利血生、辅酶 A、三磷酸腺苷等。经过对症治疗以后，白细胞减退症是能够治愈的。

（姚德鸿）

为什么有些人容易发生过敏反应？

过敏是一种发病率很高，威胁人类健康的常见病。有些人只要吃了虾、蟹，接触了生漆、花粉，注射了青霉素，或者使用了某些化妆品以后，皮肤上很快出现红疹，有的会发生鼻炎、哮喘、胸闷、全身乏力等过敏反应的症状，严重的还会发生休克，甚至引起死亡。

有过敏反应的人，身体里含有某些特殊物质，能引起自身过敏反应。医学上把引起过敏反应的外源性物质，如虾、蟹、花粉等称为过敏原，而把人体内对过敏原引起反应的物质叫做反应素。

反应素是一种特殊的抗体球蛋白，医学上称它为免疫球蛋白 E。某些人的血清里含有这种物质，于是就形成了过敏反应体质。



含有这种反应素的人，初次接触过敏原时，体内即形成一些特殊的浆细胞，这种浆细胞能产生千百万个免疫球蛋白 E 分子，随着血液循环散布到全身，吸附在血管周围的肥大细胞和血液中的嗜碱性粒细胞上，每个细胞上附着着 25 万至 150 万个免疫球蛋白 E 分子。人体内有了大量的免疫球蛋白 E 分子结合在上述细胞的表面，就为发生过敏反应创造了条件。当第 2 次过敏原进入人体内的时候，众多的抗原蛋白质分子与免疫球蛋白 E 分子，手拉手成了“结对子”，细胞根据这个“信号”放出“组织胺”、“乙酰胆碱”等致敏

物质，引起毛细血管扩张，血管的渗透性增高，平滑肌收缩，人体就出现了水肿、荨麻疹、哮喘等过敏反应。


引起过敏的物质种类很多，虽然过敏原几乎无处不在，但只要预防得当，仍然可以避免发生过敏反应或减轻症状。首先要千方百计找到过敏原，一旦确定，则尽量不吃、不用、不接触它们，以杜绝过敏的发生。

对过敏反应的治疗，主要是用抗组织胺类药物，如异丙嗪、苯海拉明等药物。国内外对过敏反应的研究正在不断深入，人类一定会研究出行之有效方法，从根本上解决过敏反应的问题。（吴顺德）

“植物人”是怎么一回事？

在医院里，有时住着一种特殊的病人，他虽然张大着眼睛，时而望着墙壁、天花板，时而望着走近他的人，但当别人大声呼唤他的名字时他却一点反应也没有。即使突然将物体放在他的眼前，他双眼一眨也不眨。而且不说、不动，不吃、不饮，不能控制大小便。这说明大脑功能已经丧失，完全没有知觉了。但呼吸、心跳、咳嗽、喷嚏和吞咽等先天性本能反应还存在，常靠鼻饲流汁、牛奶等食物来维持生命。像这样的病人只不过像植物一般会吸收营

养保持生命而已，于是便称为“植物人”。



成为“植物人”的原因很多，如严重脑外伤、煤气中毒，或窒息、急性心肌梗塞造成呼吸、心跳突然停止。由于病人呼吸、心跳停止后，大脑的供血供氧也就停止了。时间一长，正常脑组织会受到严重破坏。同时，还会产生各种代谢障碍和脑细胞酸中毒等情况。这种损害往往从大脑皮层开始，逐渐向脊髓扩展。所以，脑缺血缺氧时间愈长，造成的脑损害就愈大。医学上认为，在常温、常压下，脑所耐受缺氧时间不能超过 3 ～ 4 分钟。一般缺氧 15 秒，便可造成几分钟的昏迷；3 分钟以上，则可产生几天的昏迷。心跳停止时间超过 5 分钟以上，就可以引起死亡。所以，有些病人虽经奋力抢救，恢复了呼吸和心跳，但人的高级“司令部”——神经中枢的指挥已经失灵，变成了“植物人”。

由此可见，凡是能严重造成大脑广泛性损害的疾病，都会使人成为“植物人”。一旦形成“植物人”后，要恢

复正常就非常困难了。但是也有例外，例如 1991 年 2 月 17 日《新民晚报》报道，泉州市一名昏睡 14 个月左右的“植物人”终于开口说话。说明如何救活“植物人”，还是值得深入研究的。（汪宗俊）


癌为什么会转移？

人类与癌作斗争已有很长的历史了。20 世纪 80 年代的 10 年内，是癌症研究进展最快的时期，在癌症成因、生长的规律方面，有不少新的认识；在治疗的途径、新药的研制方面，也有较多新的收获。但是，与真正制服癌症的要求比起来，还相差甚远。人类尚须继续作出巨大的努力。

癌症为什么这样顽固狡猾？除了致癌因素复杂以外，它还有一个使人十分头痛的特点，就是癌细胞很容易扩散和转移。当病人的家属一听到医生说已经扩散、转移了，就会像被人当头敲了一棒似的，顿时失望。因为，凡是转移了的癌症病人，都表明已经到了病症的晚期了。

癌喜欢转移的这个特性，给人类征服它带来了更大的难度。把癌比喻为“恶性罪犯”，一点也不为过；把癌称之为“流窜犯”，应当说也很确切。癌会转移，是由内因和外因两方面造成的。从内因来说，主要是癌细胞不像正

常细胞那样来得“安分”，它们聚在一起时间长了，就要“吵架斗殴”。癌细胞的这种性格，主要是细胞膜的钙含量太少了的缘故。钙离子具有维持细胞互相粘着的能力。由于人体正常的细胞之间，钙含量正常，于是彼此间的引力和排斥力能保持平衡。但是癌细胞就大大不同了，癌细胞的含钙量只有正常细胞的一半左右。钙离子的缺少，再加上癌细胞还会释放一些扩散因子（如透明质酸酶），这样，癌细胞表面的电荷失去了平衡，就造成了癌细胞之间彼此排斥的局面。这股排斥力就是癌细胞转移的“动力”。



应当说这个内因是癌细胞会转移的决定性因素。除此之外，肿瘤部位的肌肉收缩、内脏蠕动、按摩、压挤，以及手术时癌细胞脱落等种种外因，也会促使癌的扩散和转移。

癌扩散和转移是有一定规律的，它的方式和途径，大致有四种：

一、淋巴转移。癌细胞侵入淋巴管后，随淋巴液循环到达区域性淋巴结。然后这一组淋巴结再转移到下一组淋

巴结，形成广泛的淋巴转移。有癌细胞转移的淋巴结，体积会增大，质地会变硬，融合成团状。因此，当突然出现质硬、块大的淋巴结时，要及时进行检查。

二、血液转移。癌细胞会侵入血管，转移到身体的其他部位去。如胃癌、绒毛膜细胞癌的癌细胞会通过血液循环，先到肺部，在两侧肺部形成多发性转移，同时，又会通过肺再扩散到其他的器官和组织。血液转移是一条主要渠道，也是消化道器官癌的主要转移途径。

三、浆膜腔转移。内脏癌肿侵犯到浆膜时，癌细胞会脱落，像播撒种子一样种植到其他浆膜上去。这种转移现象称之为“种植性转移”，也叫“腔道转移”。

四、局部扩散。以原发病灶为中心，癌细胞沿着四周散布开去，形状是不规则的，有的像树根；有的像蟹脚。

人类正在更积极地与癌症作斗争。有人预计，到了 21 世纪，人类征服癌症将会有意想不到的进展。　（劳宏燮）

为什么癌症难以治愈？

癌症是危害人类的顽凶。全世界每年有 500 万以上的人因癌症死亡。我国癌症死亡人数每年约有 95 万，平均每 33 秒就有一人死于癌症。人们叹息，半数以上的癌症

患者是青壮年；人们担忧，人类迄今还不能彻底征服癌症。确实，癌症难治是有其原因的。

与其它疾病不同，癌症致病因素纷繁错杂。人们已知 1100 多种天然或人工合成化学物质能引起癌症。香烟中的苯芘、隔夜菜中的亚硝胺会致癌；放射线、长期磨擦和热的刺激会致癌；霉菌产生的黄曲霉素也会致癌。病毒是引起癌症的头号嫌疑犯。一些消化道的癌瘤与遗传有关。约 $\frac{3}{5}$ 癌症患者生病前均有精神紧张、过度抑郁及严重精神打击的历史。内分泌紊乱、免疫功能低下容易引起癌症。人们还在细胞核中发现导致肝癌的相关基因。人们对癌症的病因和发病机理进行广泛“内查外调”，尽管如此，目前对它们仍未完全明了。一般认为，癌症的发生大多是多种致癌因素和促癌因素综合作用的结果，而“综合”两字包括许多涵义。

与其它疾病不同，癌症病势凶险、发展较快、变化奇多。人体正常细胞的发育增殖受到体内神经、内分泌和细胞内在程序的控制。患了癌症后，肿瘤细胞形态、代谢和功能异常，它们群集一处，不再安分守己，从原发部位开始无限制地生长、扩展。许



癌 症

多人发现癌症时往往已处在中晚期。肿块压迫、浸润周围器官，阻塞管腔，直接或间接破坏器官功能，导致机体衰竭。如肺癌时呼吸困难，肝癌时肝脏破坏。肿块压迫局部引起疼痛；肿瘤产生毒素导致发热；肿瘤攫取营养，使人的体力极度消耗。癌细胞容易脱落，它会随淋巴液、血液“漂流”到身体其它部位，在那里形成新的肿瘤——转移癌，造成机体更多损害。

与其它疾病不同，癌症治疗方法多、限制多、副作用也大。手术是治疗肿瘤的有效方法。但如患食管上段癌、舌根癌，手术创口大，难度高，一般不予手术。肿瘤广泛转移，手术无从下手。遇上这些情况，只能求助化学疗法和放射疗法。化学疗法是用化学合成药物抑制或消灭肿瘤细胞。化疗对治疗肿瘤和防止肿瘤转移、复发有一定疗效。化疗药物的共同缺点是不分敌我，在杀伤癌细胞的同时会损坏正常组织。骨髓抑制、白血球数减少就是明证。放射线能够杀伤生长繁殖旺盛的肿瘤细胞，对正常组织影响较小。虽然放疗对淋巴肉瘤、睾丸精原细胞癌等放射线敏感肿瘤有效，但它仅是一种局部治疗手段。除了上面这些治疗方法外，免疫治疗和中医药治疗对延长患者生存期、提高生存质量也有帮助。癌症治疗尚缺乏特效手段。临床医生正想方设法利用现有各种方法，扬长避短，综合治疗癌症。

癌虽难治，却并非不治之症。一些癌症，如早期皮肤癌、宫颈癌均可治愈，其它癌症患者存活 20 年以上亦不少见。

癌症，人类生命之患。人类早已向它发起挑战。随着科学进步，人们相信，彻底征服癌症的日子不会太遥远。（陈传）

为什么说艾滋病是超级癌症？

被称为“20 世纪超级癌症”的艾滋病，现在已波及世界五大洲 157 个国家，已有 29 万病人以及 1000 多万艾滋病病毒感染者。据专家们估计，在 20 世纪的最后 10 年中，感染艾滋病的人数可高达 1400 万人之多。

艾滋病是由于感染了一种人类免疫缺陷病毒引起的全身性疾病。艾滋病病毒在人体内要经过一个相当长的时期才表现出症状来，医学上称这个时期为潜伏期。在潜伏期内，人们自己虽不感到有任何症状，但在他的血液中可检测到这种病毒刺激机体而产生的艾滋病病毒抗体，我们将这种处于感染阶段的人称为感染者。这些人看上去与健康人一样，活动自如，但是有传染性。感染艾滋病病毒后，约有 10 ～ 20% 的人将在数月或 2 年后发病，这就是艾滋

病。患者出现反复发热盗汗，无缘无故迅速消瘦，慢性咳嗽和呼吸困难，持久的疲劳无力，颈、腋窝或腹股沟淋巴结肿大，腹泻、食欲不振，皮肤粘膜有出血斑，并有鼻血、血痰、吐血、血尿等出血症状。接着，全身抵抗力明显衰退甚至消失，导致反复感染，特别会发生出血性肉瘤和全身衰竭，直至死亡。据统计，患了艾滋病后，2 年内的病死率为 50%，5 年内的病死率可达 80 ～ 90%。至今，已有 15 万余人死于艾滋病。

目前，治疗艾滋病还没有特效药，有些药物仅能改善患者症状和延长一些生存期，但有毒性副作用。那么，艾滋病有没有预防疫苗？现在，经过 6 种艾滋病疫苗的效果检验，初步报道各类疫苗是安全的，但是效果尚不理想，原因是关键技术还未解决，因此在最近 3 ～ 5 年内研制出可供全人类预防使用的疫苗可能性还不大。



由于艾滋病尚无疫苗预防，发病后又无特效药治疗，且死亡率极高，所以被称为“超级癌症”。研究证明，艾滋

病的主要传播媒介是血液、精液和其他体液（包括唾液、母乳等），主要的传播途径是同性恋、两性不健康的性行为、输血、打针、分娩和哺乳。它不会通过空气传播，也不会经蚊虫叮咬传播，更不会经共用饮食、游泳、劳动、握手、同用厕所而传播。所以只要一个人能够洁身自爱，坚决杜绝不正当的性行为，拒绝使用进口血液及其制品，不吸毒……这样，就不会染上或传播艾滋病。　　（贝润浦）

为什么说生命在于饮食？

人不吃饭就要饿死，这是确定无疑的。作为高等动物的人，为了生存，就必须要吃食物。

社会的进化、生产力的发展，使人们不再仅仅满足于把食物作为生存的手段，不再仅仅满足于吃饱。时至今日，人们似乎更注重于食物的营养与人体健康的关系，更注重食物与提高生命质量的关系。

我们知道，人体需要的营养素为蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、水和食物纤维七大类。各种食物中所含的营养素及营养素的多少都是不同的，没有任何单独一种天然食物能供给人体所需要的所有的营养素。因此，日常的饮食应该多样化，以保证人体对各种营养的正

常需要。

我国的营养学家根据各种食物所含营养素种类的特点及饮食结构，将所有食物分为五个大类：第一类为谷类、薯类、杂豆类，它们主要提供碳水化合物、蛋白质和 B 族维生素，是主要的能量来源；第二类为肉、禽、蛋、鱼、奶等动物性食品，它们主要提供蛋白质、脂肪、矿物质、维生素 A 和 B 族维生素；第三类为大豆及其制品，它们主要提供蛋白质、脂肪、食物纤维、矿物质和 B 族维生素；第四类为蔬菜和水果，它们主要提供食物纤维、矿物质、维生素 C 和胡萝卜素；第五类为动、植物油脂、各种食用糖和酒类，这是一类纯热能食物，它们主要提供人体能量。



在一天三餐中，要注意尽量选择不同种类的不同品种的食物。食物的摄取量要根据人体的需要而决定，饮食要适度，饥饱要适当。过饱或过饥，会导致肥胖或消瘦，也不利于身体的健康。青少年或者恢复期的病人，需相应增加食量。中老年

肥胖者要适当控制饮食。

脂肪是重要的饮食成分，它是人体热量来源之一，但过多的脂肪是导致冠心病发生的主要因素。从目前我国的情况来看，大多数人饮食中总脂肪提供的热能，占饮食总热能的百分比，尚未超过世界卫生组织建议的 30%，全国平均数是 18.4%。所以，对大多数人来说，没有必要过分限制动物性食物和纯热能食物的摄入。在少数大城市和一些经济发达地区，有些人脂肪摄入量过多，对这些人应适当限制食用含脂肪较多的食物，以防冠心病的发生。

现代科学研究发现，以前认为毫无营养价值的食物纤维，事实上对人体健康很有帮助。首先，它具有促进肠道蠕动、防止便秘和肠癌发生的作用；其次，它对一些慢性疾病如心血管疾病、糖尿病等有预防作用。为此，我们每天应该吃一些富含纤维素的食物，如粗粮、杂粮、豆类、蔬菜和水果等。

一般人每天食盐的需要量为 5 克左右，我国绝大多数人目前消费量为每人每天 15 ～ 16 克。过多的食盐是高血压病产生的重要因素之一。因而，我们应减少食盐的摄入，菜肴中应少放盐，以略感有些咸味为度，开始时可能有些不习惯，以后慢慢地会适应的。

我国的食糖消费量的水平较低，但由于甜食容易导致

龋齿、影响食欲，影响其他营养素的摄入等因素，一般以少吃为好。

烈性酒除热量高外不含其他营养素，酗酒会使食欲下降，食物摄取量减少。长期酗酒的人会导致营养缺乏症，此外，酒精对肝脏有损害，还会影响造血系统。少量饮用可助兴，增加节日气氛，对身体也无害。

建立合理饮食制度，妥善安排一日三餐，早餐一般占全日总热能的 30%，午餐占 40%，晚餐占 30%，不可暴饮暴食。

综上所述，也可归纳为 8 条，即：食物要多样；饥饱要适当；油脂要适量；粗细要搭配；食盐要限量；甜食要少吃；饮酒要节制；三餐要合理。（刘正兴）

为什么考试阶段要特别注意饮食？

许多人都经历过学生阶段，也都体验过那从小学、中学到大学的数以百次的大小考试的滋味。为了有一个好的成绩，在考试阶段，考生们大都精神紧张，废寝忘食，吃不香，睡不安，体力和脑力消耗都很大，有的学生在考试阶段会体重减轻，体质下降，血压升高，消化不良，头昏脑胀，以至于影响大脑的思维。

在复习迎考及参加考试这整个阶段中，结合学生消耗大的现实，除了需引导合理安排时间，适当调整身心外，必要的营养供应非常重要。

碳水化合物是人体生命活动及工作、学习所需能量的主要来源，米饭、糕点、面食及糖果等都含有大量碳水化合物。考试阶段，除其他营养，首先得保证有足够的碳水化合物供应。这样就能保证机体内糖元的贮备，就能保护大脑和心肌细胞，从而提高复习的效率，有利于调整心理状态，延迟和减轻疲劳程度。

蛋白质能提高大脑的活动能力，大脑功能活动时一些神经介质的合成过程中需要大量蛋白质。考试期间，由于高强度的脑力劳动，考生比平常时候需要更多的蛋白质。为了保证大脑敏捷的思维能力，考试期间应该为考生提供足够的含蛋白质食品。动物性食品如瘦肉、鱼、牛奶、家禽以及大豆制豆中都含有丰富的蛋白质。

卵磷脂是参加大脑思维活动的重要物质，卵磷脂转化而成的乙酰胆碱是帮助神经传递和增强记忆力的物质。大豆、鸡蛋、牛奶和动物内脏中含有较多的卵磷脂，应注意经常补充。

另外，还要多吃一些富含维生素的新鲜蔬菜和水果。维生素参与人体各组织的新陈代谢，还是体内酶的重要组成成分。维生素有利于大脑和神经系统功能的正常工作，

足量供应维生素有利于消除和延缓大脑神经的疲劳。



在考试的日子里，早饭一定要吃好吃饱，适当吃些水果。在两场考试之间，还可以吃些巧克力和果汁，这样既可以补充些热量，减少体内肝糖元的消耗，预防产生低血糖，还有兴奋大脑使其保持最佳工作状态的作用。

还有，在考试阶段，要消除紧张、恐惧心理，心情要愉快轻松；要注意劳逸结合，晚上要早些睡，保证睡眠时间和质量。这样，再加上必要的营养，就能提高效率，起到事半功倍的作用。（刘正兴）

为什么饮啤酒也要适可而止？

啤酒是一种以大麦为主要原料的低度含酒精饮料，因为其含糖分较高，营养丰富，所以被人们称为“液体面包”。

啤酒中含有多种氨基酸、维生素以及糖分、啤酒花渗出物等营养成分，适量饮用，既可佐餐助兴，适情怡神，又可增加营养，促进健康。啤酒清香爽口，可消暑解渴，夏日里尤其受到人们的欢迎。

啤酒含酒精量低，低浓度啤酒的酒精含量只在 2% 左右（以重量计），中浓度啤酒的酒精含量为 3.5% 左右，高浓度啤酒的酒精含量也只占 5% 左右。所以，不少人都不把啤酒当酒，每逢聚会，便开怀畅饮，如同喝白开水一般，殊不知这是非常有害的。



根据国外癌症专家的研究发现，长期大量饮用啤酒的人，患口腔癌和食道癌的危险性要比喝烈性酒的人还高 3 倍。澳大利亚学者们经过大量调查后发现，每天喝 5000 毫升以上啤酒的人易患直肠癌。德国一家大型啤酒

厂以前曾定有一条厂规，即允许本厂工人每天饮用5000 毫升啤酒。但经过 5 年的调查发现，该啤酒厂工人患癌症的人比其他食品厂工人高 2 倍。

经分析发现，啤酒中含有大量亚硝酶，喝得过多时，这些亚硝酶大量积聚，就会直接损害口腔和食道粘膜。喝啤酒时常用的佐餐菜肴有咸鱼、香肠、卤菜、腊肉等腌熏食品，它们中所含的色素和亚硝胺等化学物质经与酒精作用后，也会产生不利于口腔和食道粘膜的物质。

大量啤酒进入人体后，还会使血铅浓度升高，每天饮啤酒 1500 毫升的人，其血铅含量可增高 30%。维生素 C 可以降低血铅浓度，减少大量啤酒对人体的危害。因此经常饮啤酒的人，不妨多吃些水果和蔬菜，少吃些熏制食品。

科学家们还认为，长期大量喝啤酒，对肝脏的损害比较大，比喝同等数量葡萄酒的人更容易患肝脏疾病。同时，由于在酿造啤酒的大麦芽汁中含有钙和草酸。还含有大量的鸟嘌呤核苷酸，它可能使人体内的尿酸增加 1 倍以上，这会促使结石的发生。所以多喝啤酒可能促发肾结石病。

经常大量饮用啤酒的人，往往会发生心脏肥大、心动过速、肥胖等病症。

下面三种人则不可饮用啤酒。

1. 哺乳期妇女　啤酒是以大麦为主要原料的一种酿制饮料，中医学认为，大麦芽有回乳作用，会抑制奶汁的分泌。

2. 慢性胃炎患者　科学研究发现，啤酒进入体内后，会影响胃粘膜前列腺素 E 的合成，损害胃粘膜，造成病人上腹部胀满感、胃纳差和胃部烧灼感。萎缩性胃炎患者尤其不宜饮。

3. 泌尿系统结石症患者　啤酒中所含的钙、草酸及鸟嘌呤核苷酸都会促发肾结石病。　（刘正兴）

为什么对老年人提倡多吃粥？

人们提倡老年人多吃粥，是有道理的。首先，这同婴幼儿吃稀糊糊的东西一样，因为婴幼儿还不能用牙来咀嚼较硬、较韧的食物，吃进嘴的东西，只能囫囵吞下去；而老年人，特别是高龄者，他们的牙齿往往退化了，或者残缺了，也不可能做到充分咀嚼，所以适宜于吃稀一点、软一点的东西。

其次，老年人胃口普遍要比中、青、少年的胃口差，他们的消化系统机能减退，平时的活动量也小了。消化功能的减退，相应的吸收功能也差了，因此要多吃些容易消

化的食品，既减轻消化系统机能的负担，又可充分吸收营养。而粥正是能符合老年人这些要求的理想食品。



用粥来防病健身，在我国有很悠久的历史，著名诗人陆游就十分提倡吃粥，他说：“世人个个学长年，不知长年在目前，我得宛丘平易法，只将食粥致神仙。”长时期来，民间还有春季吃荠菜粥、夏季吃绿豆粥，秋天吃藕粥，冬天吃羊肉粥的习惯。

一些医学家经过研究，还特地为老年人配制了很多种药膳粥，如安徽中医学院巴坤杰教授的“长寿粥”是这样配制的：党参 20 克（或东北人参 6 克）、黄芪 20 克、生姜 5 片、粳米 100 克。每日早餐趁热食之，也可早晚各一次。老年人长期食用，定能四肢暖、精神爽、食欲增。当然，有些药膳粥并不是任何老年人都适宜的，要看各人的身体情况来定。

我国自古以来，留下了许多关于药膳粥的宝贵资料，

可供我们借鉴。　　（劳宏燮）

为什么要为纤维素“评功摆好”？

由于人体内没有分解纤维素的酶，所以纤维素不能被人体所吸收，它毫无营养价值，在体内只是一个匆匆“过客”，最后只能作为食物残渣随粪便排出体外。多少年来，人们一直追求精美的、低纤维的食物，致使一些富含纤维素的食物长期以来在人们心目中的地位十分低贱。但是近年来，科学的发展使纤维素意外受到医学专家和营养学家的青睐，并肯定它有四大贡献。

一、便秘的“克星”　我们知道，纤维素能促使肠道的蠕动和排空；高纤维的食物只需 12 ～ 14 小时便能从肠道中排出，而低纤维的食物则需 28 小时，甚至 3 天才能够从肠道中排空。1 克纤维素大约可以增加粪便容量 5 ～ 7 克，纤维素还能使排便通畅。

二、抑癌食物　高蛋白、高动物脂肪、高糖的传统西方膳食者，其大肠癌的发生率是东方高纤维膳食者的 5 倍。动物实验也证明，食物中加入一定量纤维素饲料的大鼠与不加入纤维素饲料的大鼠比较，前者直肠癌的发生率远远低于后者。由此，专家们认为纤维素有抑癌作用，而

且这种抑癌作用是双重的。在消化过程中，胆汁在肠道细菌作用下会转化成二次胆汁酸，这是一种致癌剂。粪便在肠道内过长时间的停留，使二次胆汁酸和其他一些致癌物与肠壁的接触机会增加，容易诱发大肠癌。纤维素的双重抑癌作用表现在首先它能促使肠道快速排空，使二次胆汁酸等致癌物与肠壁接触机会减少；同时，它能抑制某些肠道细菌的生长，藉此而使二次胆汁酸的浓度降低。

三、减肥良药　作为“现代文明病”的一种，肥胖目前非常流行。与之相应的是，肥胖者各系统的各种疾患，均比正常体重者的患病率要高得多。

引起肥胖的原因很多，其中主要一条是营养过剩。要保持健康的身体必须要减肥。减肥的手段除了运动外，从饮食角度考虑，就是限制能量的摄入和吸收。高纤维食物本身的能量较多，能增加饱腹感，还有阻止吸收食物中碳水化合物的作用。同时，纤维素通过畅通大便，增加大便量，可带走部分能量。所以，多食高纤维食物有利于减肥。

四、心血管病人的福音　科学家们对一些冠心病死亡者的饮食习惯作了比较，发现其中低纤维饮食者与高纤维饮食者的比例为 4 比 1。据研究，纤维素之所以有利于心血管系统，主要是因为它能增加胆盐的排泄，抑制胆固醇的吸收，使胆固醇代谢正常，有利于维护心血管系统的健康。同时，由于纤维素降低了胆汁内胆固醇的含量，这样

就能减少胆石形成的可能。食物纤维还能降低血糖，有利于防治糖尿病。

此外，食物纤维还有利于维持肠道正常菌群的生长，抵御一些腐蚀性细菌的入侵，防止致病致癌因素的生成，能起到防病抗癌的作用。

但是，凡事皆有个“度”，提倡和重视纤维性食物，并非意味着多多益善。太多的纤维素容易把人体所必需的糖分、脂肪等一些营养素随之排出体外而造成营养失调，特别对青少年，不宜过分强调高纤维食物，中老年人可适当增加纤维性食物。（刘正兴）


为什么吃杂粮有益健康？

我国南方，稻花飘香，人们碗里总是装着米饭；而在北方，麦浪滚滚，嘴里吃的也都离不开面粉做的馒头、面饼……一日三餐，大米、面粉用作主食，人们早就习以为常。然而，营养学家告诫人们，多吃杂粮有益健康，五谷杂粮混合吃比单一食用更好。杂粮，就是稻谷、小麦以外的粮食，如玉米、高粱、豆类等。

我们知道，人体生长发育、新陈代谢、生理机能需要多种多样的营养。其中以蛋白质、脂类、糖类、多种维生

素、微量元素等最为重要。比如，一个成人每天需要摄入 80 ～ 100 克蛋白质，而在组成蛋白质的 20 多种氨基酸中，有 8 种须由食物中的蛋白质供给。缺少蛋白质，会导致体重下降、肌肉萎缩、营养不良。而缺乏 B 族维生素，会引起神经炎、癞皮症、贫血等等。我们每天吃饭，正是为了从粮食中获取各种营养。大米和面粉仅供给人们较多的碳水化合物和蛋白质，而其它营养成份则供不应求或无“货”可供。杂粮正是起到了拾遗补缺的作用。

玉米面是人们常吃的杂粮。和面粉比，玉米面在热量、维生素和矿物质含量方面一点也不逊色，其蛋白质含量介于面粉和大米之间，而含脂最多，且以不饱和脂肪酸为主。不饱和脂肪酸能抗血管硬化、防止细胞衰老。玉米含有较多钙、磷，对骨骼和神经系统发育、降低血压均有益处。玉



米中还有米、面缺乏的维生素 A 的前身——胡萝卜素，后者有保护视力和皮肤等作用。

小米的蛋白质、脂肪和铁的含量都比大米多，它的蛋白质中还含有多数杂粮所缺少的一些氨基酸。小米中有着较丰富的 B 族维生素和少量胡萝卜素。高粱米脂肪和铁含量也比大米稍高。甘薯所含氨基酸种类与大米相仿，有较高的营养价值。而它的 B 族维生素和钙含量却比大米高。甘薯还含有维生素 C 和胡萝卜素。

豆类蛋白质含量高，是米、面的 2 ～ 5 倍；质量好，含有与动物蛋白质相似的必需氨基酸，它还含有谷类蛋白质中少有的赖氨酸，但缺乏谷类中常见的蛋氨酸。豆类供热量多，B 族维生素含量也高居诸杂粮之首。

通过比较分析，我们看到各种粮食都有各自的营养特点。大米、甘薯蛋白质质量高。面粉蛋白质含量高。玉米、小米脂肪多，还含有米、面中缺乏的胡萝卜素。豆类不仅蛋白质量多质好，和小米一样，还富含 B 族维生素。人们根据这些特点，合理搭配、掺杂混合多种粮食，就能使膳食中所含营养素种类齐全、数量充足、比例适当，从而满足机体正常发育和健康的需要。常见的谷类和豆类食品混合食用；如吃白薯替代部分米饭，这正是遵循主、杂粮营养互补的原则。多吃杂粮，不仅能改变口味、增进食欲，而且更有利于身体健康成长。（陈传）

为什么梳头有保健作用

木梳是我国劳动人民在南北朝时代发明的，至今已有1500 余年的历史。久享盛誉的常州木梳在宋朝时就已驰名蒙古，载誉南洋了。木梳不仅是人民必需的生活用品，而且还可作为工艺品供人们欣赏。木梳的材料有许多种，其中以黄杨木为最佳，枣木次之，现在的木梳多用胶木或塑料制成。

木梳的主要功用是美发。

人的头发约有 10 ～ 15 万根，每根头发都有个毛囊，毛囊底部是毛乳头，毛乳头突入毛根末端的毛球内。毛球内有血管、神经，能供应头发的营养。毛球周围有毛母角化细胞和毛母色素细胞。毛母角化细胞具有生长头发的作用，毛母色素细胞具有合成黑色颗粒、充盈毛干的功能，能使头发发黑。



用梳子梳头，可以刺激头皮部

的血液循环，改善头发的营养状况
和促使毛母色素细胞工作，使头发发黑。梳头能使头发内空气流通，使头发蓬松，有利于头发的生长。经常梳头，能使头发整齐、美观，起到美化自己的作用，在社交场合中，能给对方第一眼里留下个好印象。

梳子应选择齿梳稀且有弹性的梳子梳头。篦子齿密而尖，易牵拉头发而使之折断或脱落，不宜使用。梳头时用力要适当，不要硬梳，以免损伤毛囊，使头发脱落。

梳头还有一个重要作用是保健。

中医传统理论认为，头是“诸阳之首”，人体上十二经脉和奇经八脉都会于头部，头部穴位有几十个，还有十几个特定刺激区。经常梳头可扩张头部毛细血管，加速血液循环，有利于保持大脑的清醒状态；梳头还能刺激头部穴位和特定刺激区，起到类似于针刺和按摩的作用，从而达到调整气血、防病治病的目的。一些专家通过专题研究认为，梳头还有延年益寿的作用，根据他们的观点，妇女之所以较男性长寿，得益于经常梳头。

下面介绍几则梳头治病的方法：

1. 每天早、中、晚各梳头一次，用力适中，头皮各部分都梳到，梳齿尖要求与头皮接触，每次 2 ～ 3 分钟。坚持不懈，能防治眩晕、失眠、高血压、眼糊等症。

2. 每天清晨自前向后轮番梳理头发，齿尖接触头皮，

然后再自后向前梳理各 50 次。对青年白发和斑秃有辅助治疗作用。

3. 每天用木梳（最好是用黄杨木或枣木制成的）梳一遍头，然后用木梳齿尖轻轻叩打头皮各个部分 5 ～ 10 分钟，然后再梳一遍头。此法可治疗血管神经性头痛、偏头痛和眼疾。若能结合穴位和疼痛部位叩打，效果会更好。（刘正兴）

为什么垂钓有益身心健康？

现在，在一些中老年人中间，利用休息天，去郊外钓鱼的人，逐渐地多了起来。这些人，热衷于钓鱼活动，难道仅仅是因为嘴馋，要去钓几条鱼来换换口味吗？这倒不是的。你要知道，钓鱼也是很不错的一项体育活动，他对中老年人来说，有益于增进他们的身心健康。这可以从下列几方面来说明。

钓鱼一般总要到郊外去，特别是江畔、湖滨、海边。在那里垂钓，同时可以纵情观赏大自然的如画景色，使人心旷神怡。郊外有新鲜的空气，空气中的阳离子又比城里来得多。所以在那里垂钓，不仅心情舒畅，而且对患有哮喘、肺气肿、高血压、失眠症的人来说有好处。住在山岭

海滨的人长寿者多，其中一个重要的原因，就是由于空气中阳离子多的缘故。

垂钓的另一个好处是，静坐或静站在那里，好像行气功一样，注意力集中，能忘记疲劳、锻炼身心，这对治疗多种慢性病是有好处的。



经常去野外钓鱼的人，因为多吹野风，自然会比呆在城市里、房间里接受更多一点冷的考验，这样抵抗力就会比别人来得强，特别不大容易感冒。

再一点是，经常进行钓鱼活动的人，实际上还能磨练意志、提高涵养。由于垂钓时需要相对保持安静，所以有利于克服暴躁、冲动、性急、易怒等不良的性格，这样，对防止高血压、脑溢血、心肌梗塞都有作用。　　（劳宏燮）

为什么许多不良习惯有害健康？

医学家们曾经就“日常习惯与健康”这一主题进行过大量的调查，并且归纳了一些不良习惯和好习惯。

不良习惯有：

强忍小便：极有可能诱发膀胱炎。

压迫手指关节：会使韧带过度伸张，手指及指关节容易扭伤，最后，导致手指变形及关节炎。



咬指甲



揉眼睛



不吃早餐



俯　睡

咬指甲：细菌和真菌会从口里传到手指破损的皮肤上，或由手指传染到口腔里。

饱餐后即睡觉：容易发胖。

睡前不刷牙：易损坏牙齿。

氯化钠摄入过多：会导致体内积液，易形成肾脏疾病、心脏病和高血压。

揉擦眼睛：会引起眼部细菌发炎及睫毛折断或脱落。

不吃早餐：会引起胃部不适和因热能不足而引起疲倦乏力和头痛等。

俯睡：压迫胸部、心脏、肺部和面部，醒后面部浮肿，眼睛中有血丝，人感觉疲劳。

磨牙：损伤牙齿，并导致头痛、耳痛及腭痛等。

让化妆品留在脸上：会刺激皮肤，并使眼睛发炎。

挤压暗疮：会损伤皮肤，并可能留下疤痕。

喝大量咖啡：会染黄牙齿，引起胃病，使胃溃疡加重，使神经变得更紧张。

用口呼吸：不利于净化空气，易引起体内细菌感染。

咬物（铅笔、指甲等）：时间一长，会造成牙齿局部磨损，也不卫生。

此外，吸烟、酗酒、睡懒觉、不爱活动、偏食等都是不良习惯，有害于人体健康。

好习惯有：

多活动：平时不爱活动的人与经常从事体育锻炼的人相比，前者猝死、心绞痛、脑血栓等心血管疾病的发病率明显高得多。

每天睡足 7 小时：在日本曾对 106 万名老人进行调

查，发现每天睡足 7 小时的老人死亡率最低，老人的睡眠时间过多或过少都会使他们的死亡率提高。

不吸烟：大量调查结果揭示，吸烟而又几乎不参加锻炼的人与不吸烟平时又经常参加各种体育活动的人相比，心肌梗塞发病率要高出 2.5 倍，而且前者发病后有一半人在 48 小时内死亡，后者即使发病，死亡率也低得多。

少脂肪少盐少糖饮食：在美国，现在人们都设法减少从饮食中摄入脂肪、盐和糖的量，经常参加体育锻炼，因此健康水平明显提高，反之，德国男子由于大量摄入脂肪和糖，并且吸烟酗酒，工作繁重又缺乏必要的体育锻炼，以至于健康水平降低，寿命缩短。

爱好文娱活动：日本人的寿命正在不断延长，除了经常打球、游泳外，他们还积极参加各种娱乐活动，增加生活情趣，有利于消除疲劳，增进健康，延年益寿。（刘正兴）

为什么脾气不好会影响健康？

生活中常有这样一种人：脾气不好。这种人的心情与大多数人不一样，在公众场合，或者表现为“一人向隅，举座不欢”，属伤感型；或者表现为动辄发怒，举措不当，属急躁易发怒型。这些人很难与大家相处。

我们知道，脾气是一种持续性的情绪，它可以持续几个小时，几天乃至几个星期。从生理角度说，脾气是机体对外界刺激的一种生理反应，它是通过神经和体液的反馈来进行的。人在发脾气时，机体内的肾上腺素和儿茶酚胺就增高，于是出现心跳加快、呼吸急促、血压上升、小动脉痉挛等，外在表现有面红耳赤、粗声粗气，甚至出现浑身颤抖现象。过量的肾上腺素和儿茶酚胺的分泌会损害心、肝、肾和大脑的细胞。中医学认为：脾气不好是一种肝火过盛的表现，会产生头痛面赤、口苦咽干、性情烦躁、心火过盛，导致消化和循环系统障碍。

脾气不好的人的神经刺激界限值比较低，轻微的神经刺激，哪怕是一句话或者一件小事不如意，都会使肾上腺素和儿茶酚胺分泌增加，脾气发作，失去自我控制能力。这样会严重影响身体健康。



如何克服坏脾气呢？方法有许多。

体育锻炼：运动对稳定情绪、振奋精神上远比服药效果好，这种运动最好是耗氧运动，

如跑步、骑车、竞走、游泳等。

这种锻炼每周要练习 3 ～ 5 次，每次不得少于 20 分钟。

颜色调节：要消除烦躁、沮丧情绪，就应该避免穿色彩比较深的衣服，如红色的、黑色和深蓝色的。要摆脱压抑的气氛，应该选择鲜明和活泼的颜色，医院里通常采用柔和的浅蓝色窗帘，因为，这有利于安定病人的情绪。

音乐缓和：首先可以选择能适合你当时心情的音乐，慢慢逐步换上你所希望获得的那种心情的音乐。例如，忧郁时可先听哀伤的乐曲，这是改善心情的第一步，然后经过几段乐曲的调整，再播放轻松、愉快的曲子。

食疗配合：食物与脾性之间有着某种联系。单独食用碳水化合物，具有安定作用，因为碳水化合物能刺激大脑产生一种神经传导介质——血清素，能使人感到平静、舒适。相反，食用大量含咖啡因的食物会导致神经衰弱、脾气暴躁，或者使人更加沮丧、焦虑不安。

光线加强：许多人到了冬天容易精神萎靡、神情沮丧，这是因为冬季光线减弱的缘故。针对这种情况，应加强室外活动，或每天增加 2 ～ 3 小时的人造光照，这样情绪便会有所好转。

睡眠保证：睡眠充足能使人缓解疲劳，消除不良心情。


此外，加强自我修养，处事豁达，积极乐观，多关心他人，有意识克制自己，不要多想一些不切合实际的事，

这样就可以不断提高刺激界限值。至于有人觉得发了脾气之后会出现一种“松弛”感，认为这样对身体有益无害，那就错了。事实上，这种“松弛”感只是机体的一种代偿现象和心理错觉罢了。（刘正兴）

为什么说脑子越用越聪明？

在平时，常常可以听到这样的一种说法：“人的脑子多用了，会死掉许多脑细胞”、“人脑多用了会笨的”。说这种话的人，一是不懂科学，二是那些懒人找的借口，是不愿意用脑思考的人自欺欺人的话。

事实上，人的机体的各个部位，都是越用越健壮的，脑子也是一样。让我们先来看一个数据：经科学家研究证明，人的大脑皮层，大约有 140 亿个神经细胞，也叫神经元。这么多数量的脑细胞，对一个人终身来说，足够足够了。有人计算过，如果一个人活到 100 岁的话，经常运用的脑神经细胞只不过 10 几亿个，还有 80—90% 的脑神经细胞没有动用了。所以，根本谈不上会有什么“脑子多用会笨”的事情。



“生命在于运动”，这是生物界的一个普遍规律。人的机体，用则灵，不用则衰；脑子用得勤的人，肯定越聪明。因为这些勤于用脑的人，脑血管经常处于舒展的状态，脑神经细胞会得到很好的保养，从而使大脑更加发达，避免了大脑的早衰。相反，那些懒于用脑思考的人，由于大脑受到的信息刺激比较少，甚至没有，大脑很可能就会早衰。这跟一架机器一样，搁在那里不用就要生锈，经常运转就很润滑。外国就有过这样的研究，科学家观察了一定数量的 20—70 岁的人，发现长期从事脑力劳动的人，到了 60 岁时仍能保持敏捷的思维能力，而在那些终日无所事事、得过且过的懒人当中，大脑早衰者的比例大大高于前者。这也可以从古往今来的许多政治家、军事家、科学家、作家的身上得到应验。这些人有许多到了老年以后，仍然保持着灵敏、快捷的头脑。反过来，他们中间倒不乏这样的

例子：身体的其他部位先衰老了（如心脏等其他器官），最后医治无效，停止了生命，但脑子没有死亡，仍显示出相当的生命力。这种不平衡的十分可惜的现象，往往使人们为之感叹。不是许多人有过这样的设想吗？最好医学能发达到这样的地步：有些伟人因其他疾病死亡了，但仍能保持住他的卓越的脑袋，以便把它移植到一个因意外而死亡的、各部位机体都很健康的人身上去。

除了懂得了脑子多用只会聪明、不会笨的道理以外，我们还应该了解“多用脑、可防老”的科学性。这对老年人讲，尤为重要。我们常说，大脑是人体的司令部，如果大脑迟钝了下来，身体各器官的生理功能当然也不会旺盛起来。所以，保持大脑的活力，就能促进其他机体、器官保持活力；大脑如早衰，也会影响其他身体部位的早衰。老年人健康的好坏，往往是生理、心理、环境等因素互相影响的结果，老年仍保持着勤于和善于用脑的好习惯，就会有一种很好的心理状态，以使自己的生活、精神充满活力。

“勤于用脑，延缓衰老”，这个道理是很科学的。老年人要如此，何况我们青少年呢？让我们大家养成勤于用脑、善于用脑的良好习惯吧。（劳宏燮）

为什么在空调房住久了会得“空调症”？

空调，现在已成为一种比较热门的商品；随着人们经济条件的改善、生活水平的提高，空调进入千家万户的势头也已经出现。

凡事总是有利有弊的。空调给人的工作和生活带来了舒适，夏天不热、冬天不冷；但是随着空调使用的普及，和使用时间的延长，也就出现了一个新问题。当然，在经济发达的国家，这个新问题早就发生了。这就是“空调症”，或曰“空调综合症”。

长时期地在装有空调的环境中工作和生活的人，往往会感觉各种各样不舒服。当然，各人不舒服的情况和程度是有不同的，但归纳起来大致有这么几方面：最常见的是下肢或全身发冷、酸痛无力，头痛，咽喉痛，腰痛，四肢神经痛，不同程度的肠胃炎，以及易患感冒，等等。空调给人带来这么多的症状，所以称它为“综合症”，真是名副其实。

有人把上面罗列的症状，叫作“不适应症候群”，因为“空调症”实质上是一种对环境不能适应而造成的后果。

第一，空调使室内外环境（包括气温、湿度、气流、光线）出现悬殊的差异；长时间呆在空调房里，一旦外出，夏天身上立即会出汗，冬天使人一阵发冷，所以非常容易得感冒。第二，空调室内空气清洁度差，尤其是二氧化碳浓度高、负离子数量严重不足。这样，人往往会感到胸闷、心慌、头晕、乏力。第三，空调室内的环境特别适宜各种细菌、病毒、霉菌的生存和繁殖，因此使人感染的机会更多了。第四，空调室内的建筑材料、地毯、化妆品，甚至图书报刊的油墨等等，都会向室内散发甲醛，对眼、鼻、呼吸道及皮肤等，有很强的刺激。

要把“空调症”减低到最小的程度，就应该采取多方面的措施，最主要的一条，是要经常开窗清洁室内空气，其次是要坚持户外的活动和体育锻炼。另外，卧室里装空调，使用的时间不要过长，并且在入睡前要关掉。



（劳宏燮）

为什么新装修的房子不宜立即住人？

一幢幢大楼如雨后春笋般地拔地而起，一批批居民告别旧居陋室乔迁新屋。

但是，有一些人在搬进新居后不久，往往会出现头痛、头晕、流涕、鼻塞、咽痛、眼结膜发炎等症状，甚至会发生呼吸急促、胸部郁闷、精神状态异常。

为什么会产生这种现象？原来，目前所用的建筑材料和室内装饰物中含有一些有毒物质和放射性物质，它们会对人体产生毒害作用。例如水泥、石灰、油漆、涂料、钢筋、塑料、沥青等中含有聚氯乙烯、聚乙烯、铅、石棉、甲醛、酚等，在新造好的或新装修好的房子里，这些物质的浓度比较高。它们可以通过人体的呼吸道和皮肤被吸收到体内，进入血液循环，影响人体的免疫力，从而产生上述“居室综合症”现象。

根据国外在环境保护方面的研究，对在工厂密集处、交通繁忙处及居民居室内三个地方的监测结果进行分析后发现，空气污染最严重的竟是窗明几净的居室。每个家庭中从油漆到清洁剂所引起的癌症，甚至比邻近化工厂的

地区由空气中化学物质所引起的还要高 3 倍。

那么，居室内主要有哪些污染物？它们对身体健康有何危害性？



1. 石棉　建筑上主要用于保温、绝缘和防火。人体如摄入过多的石棉，会引起石棉肺、肺癌、皮肤癌等。

2. 甲醛　各种胶合板、家具、化学地毯等中含有大量甲醛，甲醛若被人们反复大量吸入后，可以引起鼻炎、哮喘、急性呕吐等，长期接触甲醛还会引起皮肤癌。

3. 氡　从建筑物下面的土壤、水井以及自来水、天然气和石块、砖、混凝土中散发出来。人体若吸入大量的氡，就会使气管癌和鼻癌的发病机会增多。

4. 其他致病污染物　塑料墙布上的化学物质、烟尘、家电产生的电磁场、宠物新陈代谢过程中产生的废物、室内花草产生的对人体污染物质等，也会影响室内空气的清洁。

5. 尼古丁　香烟是室内污染物中最令人深恶痛绝的，

它不但会导致吸烟者本身呼吸系统的疾病，还会影响不吸烟者的健康。

当然，谁也不可能因为怕噎而不吃饭，因为怕患“居室综合症”而拒绝迁居新屋。只要我们对这个问题有了充分认识，就有对付它的办法。首先，因为这些有毒物质只有达到一定浓度，才有可能影响人体健康，如果我们经常开窗，室内通风良好，空气新鲜，就可保证安全无虞；其次，生产单位应严格控制建筑材料中有毒成分的量，必要时可加用覆盖涂层等；还有，不要急于迁入新居，最好在新房建成及装修以后，开窗通风晾上一段时间；在还未住人的新居内装饰布置从而逗留时间过长后，应到室外活动一下，呼吸一下新鲜空气、晒晒太阳。做到上述各点，就有利于身体健康。（刘正兴）

怎样正确使用净水器？

上海自来水的水质较差，特别是每年夏季，自来水带着股河水臭味和漂白粉呛人气味，令人难以入口。水质差，并不是自来水厂制水工艺不够格的缘故，其根源在于取自于黄浦江的原水水质差。

上海几乎所有自来水厂的取水口都在黄浦江上，而孕

育了大上海的黄浦江的污染却日益严重。一些工厂不加任何处理直接把污水排放到江中；来往船只肆意向江中倾倒垃圾废物；农田里的农药、化肥、污水通过小沟、渠道流到支流再流进黄浦江；市民们每天几百万吨的生活污水连同一部分粪便被排入黄浦江。黄浦江正在变得越来越黑、越来越臭，黑臭期越来越长。

广义地说，水质的污染分为三种情况：首先是由于地壳中一些元素分布不够均衡，从而引起饮用水中某些微量元素过多或过少，结果导致对人体健康的危害。如缺碘会引起甲状腺肿大，缺氟会引起龋齿，过量砷会引起色皮肤素沉淀、角化病及皮肤癌等。



其次是致病微生物对水质的污染，这种污染会引起霍乱、伤寒、脊髓灰质炎、甲型病毒性肝炎等。第三为有机化学污染物对水质的污染，这种污染物到目前为止，已测出有 2221 种，其中有 20 种已被确认为致癌物，26 种为可疑致癌物，18 种为促癌物，46 种为致突变物。这里所指的水质污染则指第二、三种污染。

自来水厂对原水的处理除了沉淀、过滤外，就是加氯（氯气、漂白粉或漂粉精）对水进行消毒。污染愈严重，加氯量愈大。一般来说，这样处理的结果，致病菌基本被杀死。但有机物的污染非但不能控制，相反氯可与水中存在的多种物质发生反应，生成一些具有直接致突变作用的有机化学物。美国对 14 个城市水厂的原水和自来水进行了研究，结果表明，4 个厂的原水为致突变阳性，2 个厂为可疑阳性，8 个为阴性。而水厂出来的自来水中，却有 8 个厂的出水为致突变阳性，3 个厂为可疑阳性，只有 3 个厂的出水为阴性。

饮水中的有机物与癌症有什么关系？国际国内的大量研究论文都已揭示，临床大量数据也已证明：饮用不合格的水是人们患癌症的重要因素；近年来上海地区癌症发病率的上升与水质的严重污染有密切关系。水厂对原水的处理不可能去除致癌物，同样把水烧开也去除不了水中的致突变物。唯一切实可行的措施是家家使用净水器。

如何合理使用净水器?

1. 自来水的流量应与净水器中活性炭的吸附能力相当，一般应控制在每分钟 1000 毫升左右，太快达不到净水要求。

2. 及时更换净水器中的活性炭，以半年换一次为宜。

3. 经活性炭净水器过滤的水不可生饮，仍须加热煮沸

后才可饮用。

使用净水器是一种去除水中有机化学污染物既简便又经济的方法。据测定，合格的净水器去除致突变物的效率达 80% 以上，最高的达 95.3%。经过这样处理过的水，一般能达到无色无臭无味的标准是比较符合饮水卫生要求的。（刘正兴）

为什么说“以步代车”好？

时代的快节奏和城市交通的发达，使得许多人养成出门必坐车的习惯，如果这是工作需要，本无可非议。但也有的人明明只有一两站路，却宁愿花上比走这段路还要长的时间去搭车，而无论如何不肯步行，事实上也并没有什么急事急着等他去处理。有的人条件优越，小轿车进出，从家门到工作单位，从工作单位到会场，都以车代步，不愿多走一步路。省力是省力了，对自己的健康却是十分不利的。

有道是：“户枢不蠹，流水不腐”，生命在于运动。日本的科学家发现了一个有趣的规律：随着小汽车数量的不断增加，糖尿病发病率也在不断上升，这是因为经常乘车的人运动少，容易发胖。肥胖不仅会诱发糖尿病，也会使

糖尿病患者病情加重。这一规律在发生能源危机时能从另一面得到证明：一些本来一直乘车而现在不得不步行的糖尿病患者，看病的次数明显减少了。

一项对坚持运动的人的调查研究显示，经常步行的人较少发作心脏病，而且一般健康状况较好，寿命也较长。这项为期 16 年的调查还发现，一星期步行 15 千米的人和一星期步行不足 5 千米的人相比较，前者长寿的比例高 21%。



那么，一天步行多少为宜呢? 从医学角度看，如果将步行作为全天的唯一运动，那么最低运动量为 1 万步。如果以每分钟走 100 步，每小时即走 6000 步。换言之，即每天在走路时间上的总和约为 1 个半小时以上。这样才能达到活动身体、保持身体健康、不至于发胖的目的。


当然步行路程及步行时间与一个人的年龄、健康状况都有关系。老年人可以走得慢些，路程短些；年轻人则应走快，路程也要长些。

近年来，欧美各国竞相发展健走运动，所谓健走，是指大步流星地走路，既不像散步那般悠闲，又不像跑步那样剧烈，步幅为 60 ～ 70 厘米，每秒钟 2 ～ 3 步，深呼吸一次。健走的优越性是明显的，能使全身肌肉和筋骨得到有力有节奏的震荡，使内脏器官得到按摩，从而有效地增强心肌收缩力，增加心脏排血量，促进血液循环，增大肺活量，增强肠胃消化吸收机能，使大腿和手臂肌肉更加坚实发达；也有益于通经活络，疏利关节，提高身体素质，增进体态的健美。

为此，奉劝诸君，以步代车好。凡是上下班或读书路程半小时能走到的，不要乘车，以步行为好，也省却受那份挤车的苦。凡是需乘车一二站路的，时间也还充裕的，还是不要乘车步行为好。为了你的健康，请步行。（刘正兴）

为什么豢养宠物须防得传染病？

现在，随着人民生活水平的不断提高，豢养宠物已成为一种时尚，一些退休赋闲在家的老人也多乐此不疲。宠物有许多种，有天上飞的，如鹦鹉、鸽子等；有地上跑的，如狗、猫、猴子等；也有水中游的，如热带鱼、乌龟等；门类很多，人们根据自己的喜好和条件，各择所爱。



我们知道，动物是人类的朋友，豢养动物有益于人类的身心健康，有助于增添生活情趣、平抑烦躁情绪、降低血压、放松节奏、寄托思念之情等等。但是，豢养动物必须注意卫生，防止传染病的蔓延。

狗“通人性”，所以狗向来是人类豢养的第一宠物，全世界豢养的各类犬近亿条。然而，一旦狗感染上狂犬病毒，它就有可能通过抓伤、舔伤或咬伤等途径，把狂犬病传染给人类。人若被疯狗所伤，一般在 2 ～ 3 个月后发病。由于目前医学上对狂犬病尚无专门治疗药，所以感染者的死亡率几乎是100%。因此，一旦发现被疯狗咬伤，应立即采取紧急措施，冲洗伤口，注射狂犬病疫苗。

猫也是人们豢养较多的一种宠物，不少人爱猫如命，对猫又是亲、又是抱的，甚至与猫睡一个被窝。但是猫也会传播疾病。猫能够传播一种弓形体寄生虫，使人畜共患寄生虫病。孕妇被传染上这种疾病以后，寄生虫的病原体可危害胎儿，使胎儿发育异常，出现脑积水、小脑畸形、

智力缺陷、视网膜炎等，并可导致早产或死胎；由于患这种寄生虫病的人绝大多数不出现症状。所以几乎无法察觉和对症治疗根本的办法就是家里有孕妇时不要养猫。

还有一种猫抓病，通常是人被猫抓伤或咬伤后被传染上的，它的致病原是衣原体——一种很小的微生物。病人会出现淋巴结肿大、化脓，甚至发热等等。

其他一些宠物，在给人类带来乐趣的同时，也都可能传染一些疾病，例如：

鹦鹉会传播“鹦鹉热”，病人突然出现高烧、剧烈头痛、失眠、纳差、呕吐及全身肌肉、关节疼痛。严重的还会出现循环衰竭，个别会死于肺水肿。


鸽子传播肺部曲菌病，病人主要表现为慢性气喘。在皮肤、外耳、鼻窦、眼眶、脑膜等处也会发生曲菌感染，造成病人组织坏死和脓肿。

绿毛龟大多带有沙门菌，一旦污染食物，会发生食物中毒，病人表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠炎症状。

综上所述，豢养动物必须注意卫生，窝要经常打扫，水要勤换；要经常给动物洗澡、晒太阳；要及时给它们打防疫针；平时要注意观察动物，发现有不正常反应，应及时给以必要的治疗；不能与宠物同居一室。　　（刘正兴）

为什么洗“桑那浴”要讲究方法？

所谓桑那浴，就是冷热交替浴。桑那浴最早是芬兰人发明的，那时的浴室是一间盖在湖边的小木屋。屋内先生上火，火上放着石头，待石头烧红，将水泼到石头上。顿时室内蒸汽缭绕，高温烘人。入浴者在小屋内赤身裸体耽一段时间，浑身上下大汗淋漓。然后走出室外，一下跳进冰冷的湖水中。一热一冷之后，接着用桦树枝条抽打身体，如此反复多次。



目前，桑那浴已在世界各地推广，在一些星级大宾馆和高档的浴室里，也能享受到桑那浴。现在的桑那浴，一般是先在浴室内进行蒸汽浴，短时间内使皮肤温度上升至 38 ～ 40℃，在室内停留 5 ～ 10 分钟，然后再进行冷水淋

浴，让皮肤温度下降 4 ～ 8℃。也有完全模仿芬兰人的：浴室角落里置一盆旺盛的火，火上几块烧红的石头，自己动手从旁边一个小桶舀水浇到石头上……。除了健身的效果，还可享受那一份情趣。

芬兰人最喜爱桑那浴，几乎家家户户都辟有桑那浴室。芬兰全国还成立桑那浴协会，专门研究有关桑那浴的问题，比如桑那浴的温度、时间、湿度、浴室的大小等。协会建议：浴室内温度应控制在 80 ～ 90℃，在浴室内停留时间每次应限制在 10 分钟内，前后重复三次，等等。

美国是提倡推广桑那浴最力的国家，美国国内桑那浴普及程度较高，研究也颇深。美国国内的桑那浴室都装有一个自动调查温度和湿度的装置，入浴者先在一般的浴池中泡上 5 ～ 10 分钟，然后用冷水淋浴，时间约 3 ～ 12 分钟，接着休息 15 ～ 20 分钟，这样算一次，如此重复三次。

为什么那么多人热衷于洗桑那浴？洗桑那浴到底对人体有什么益处？在高温的浴室内，人大量出汗，一次桑那浴，每个人大概会流 500 毫升汗水。每两周洗一次浴，连续 4 ～ 5 个月，能改善人体新陈代谢，减轻体重。同时，洗桑那浴可使心跳和脉搏加快，血压略升高，皮肤血管扩张，其情况与长跑等体育锻炼结果相似，有利于增强人的体质，防治伤风感冒、腰酸背痛、关节酸痛等症。

但是，洗桑那浴方法不当也会引起猝死或危险。第一次参加桑那浴的人、特别是老年人，入浴后，在高温浴室里最多只能停留 5 分钟。逐渐适应后可适当加长时间，但每次最多不能超过 10 分钟，否则会发生危险。发热病人、脱水病人、刚饮过酒的人或刚结束锻炼的人，体内缺乏水分，都不宜进行桑那浴，否则会因大汗而发生虚脱。癫痫、心功能代偿不全和慢性肺源性心脏病人均不得参加桑那浴。甲亢病人和更年期妇女应谨慎参加桑那浴。（刘正兴）

为什么不能把墨镜当装饰品？

或许是因为受一些电影电视的影响，一个时期以来，有一些男女青年非常喜欢戴墨镜，而且往往不分场合，不看时辰，不注意季节和天气的变化，终日鼻梁上架着一副标着某某名牌的墨镜。在他们眼里，这样似乎显得很美观，有风度。其实，这样做对他们的视力是很有害的，以视力下降作为时髦的代价，显然不合算。

戴墨镜如何影响视力？通俗地说，人的眼睛好比照相机的镜头，戴墨镜好比镜头前加了滤色镜。我们知道，太阳光是由红橙黄绿青蓝紫七种颜色合成的。滤色镜的作用是允许与滤色镜片颜色一样的光线通过、与滤色镜片颜色

相近的光线部分通过，而不允许与滤色镜颜色相去甚远的光线通过。显然，滤色镜会减少总进光量，而且光的成分也有所不同。



墨镜确能起到减少强光线对眼睛的刺激，避免紫外线损害眼睛。所以在进行日光浴、接受紫外线治疗，或在室外强烈日光照耀下，需要戴墨镜，而在阴雨天、黄昏、室内、看电视或电影，或在光线较暗弱的地方，都不宜戴墨镜。如果不论外界条件如何总是长时间戴墨镜，天长日久，眼球会对有一定强度的自然光适应能力下降，导致视力下降。同时，还会对某几种颜色光线敏感度下降而患色盲症，严重时还会产生头痛、头晕、眼花和不能久视等症状。

墨镜确实也有一定装饰作用，因此，在购买镜架时要注意尺寸和式样跟自己的脸型相配，不要一味追求新颖奇特。镜架的外缘线条最好能和脸颊线条相一致，方脸的人应配一副方框镜架，尖脸的则应戴上宽下窄的眼镜，这样就会显得美观大方，舒适而有风度。

同时注意，不要选购塑料镜片，因为塑料镜片制作相当粗糙，厚薄不一，透光度差，损害视力，尤其不利于儿童的视力发育。

患有某些眼疾的人应配戴特殊颜色的镜片；青光眼患者应配戴特制的绿色镜，这样有利于降低眼内压，减轻患者痛苦；红绿色盲者应该戴上红色镜，便于辨别红绿灯；视力低弱的人应配戴黄色镜片，这样对提高视力有一定好处；患深度近视的人则适宜配戴蓝色镜片。　　（刘正兴）

为什么说冰箱不是“保险”箱？

随着家用电冰箱的日益普及，给人们日常生活带来了方便；人们无需每天上街买菜，不用为晚餐后的余饭剩菜担忧，更不必为“不速之客”光临感到尴尬。因为，冰箱里有各色冷饮、成包鱼肉、新鲜果蔬……冰箱，俨然成了家庭食品的贮藏箱、保险箱。

电冰箱用电作动力来制造箱内的低温环境。低温可抑制食物中微生物的繁殖，降低食品中酶的活性和各种化学反应的速度，从而保持食品新鲜不变质。所以，低温保藏食品是人们最常用的方法。冰箱也就倍受人们青睐。

然而，冰箱保存食物有时并不那么“保险”。经常有

报道说，一些人吃了从冰箱拿出的食物后出现发热畏寒、腹痛难忍、上吐下泻，甚至脱水等食物中毒症状，经检疫，才知道是食物中的细菌在作祟。食物的腐败变质大多是致病菌和腐败菌引起的。这些细菌中的绝大部分欢喜在 20 ～ 40℃ 温暖环境中生长繁殖。温度太低，它们便不能为所欲为。但是，



少数细菌不怕低温，它们能在 0℃ 以下继续生长繁殖。引起耶尔森氏结肠炎的耶尔森氏菌就是其中一种。它有惊人的耐寒本领，属于“嗜冷菌”。另一些导致肠道感染的常见菌，如沙门氏菌耐寒本领稍差，只能在 6.7℃ 以上的环境中生长。冰箱上层冷冻柜温度在 0℃ 以下，下层冷藏柜温度约在 6—8℃ 之间。如把未经清洗的鲜鱼等食品放入冷冻柜，依附于食品的嗜冷菌也带入冰箱。冷藏柜潮

湿密闭、温度在零度以上，也有利于细菌繁殖。低温下细菌繁殖受到抑制，储藏的食物不会很快变质，但当生的食物取出冰箱自行解冻时，各类细菌立刻大量繁殖，能招致食物加速腐败，必须经过清洗和烹饪后才能食用。生、熟食物放在一起，熟食品极易受到附在生食品上的细菌的感染，这类熟食，吃了就会犯病。少数霉菌的耐寒性比细菌还强。所以藏在冰箱里含水分较多的食物也是会霉变的。

肉类在冷冻后变得坚硬，而果蔬受冻后不再脆嫩爽口，这是因为冷冻使动、植物细胞间的胶质体断裂，食物组织结构遭到破坏。冷冻时，食品中的水分不会完全结冻。即使在 -29℃，仍有 10% 的水分存在。食物中的化学反应仍在缓慢进行。因此，脂肪含量多的食物在冰箱中储藏久了，会发生脂肪酸败。一般而言，4℃ 时肉类可存放数日，0℃ 时可保存 7 ～ 10 天，-10℃ 以下则可保存数月。

总之，冰箱只是能是一种有时间性的贮存箱，不是消毒箱、保险箱。冰箱内生、熟食物须分开置放；隔餐剩菜吃前当加热煮沸；冰箱要定期清理、揩净，保持冰箱内清洁，食物不能贮放太久。（陈传）

