






十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社







医学2

刷　牙 ▶





▲ 口腔检查

眼保健操 ▼




显微镜观察 ▶




针刺麻醉 ▼





痢疾杆菌




蛔虫卵

十万个为什么

医 学

❷



少 年 儿 童 出 版 社

插　图

朱　然　袁晓沧等

装　帧

张　之　凡

十　万　个　为　什　么

医　　学

（2）

本　社　编

少年儿童出版社出版

（**上海延安西路** 1538 **号**）

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂排版　　上海市印刷四厂印刷

开本 787×1092　1/32　印张 6.875　插页 1　字数 115,000

1962 年 10 月第 1 版　1981 年 4 月第 3 版　1982 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—230,000

统一书号：R13024 · 90　　定价：（科二）0.52 元

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

为什么有的人分辨不出颜色 1
为什么要养成“二要二不要”的用眼卫生习惯 3
为什么有的近视眼叫做“假性近视” 4
为什么眼保健操能预防近视眼 5
为什么有些人的眼睛会有散光 8
为什么老年人会发生老光眼 10
近视、远视、老光和散光的眼睛，为什么要戴眼镜 ... 11
为什么配眼镜要验光 12
为什么有的眼镜能戴在眼睛里 14
为什么有的儿童眼睛会斜视 16
为什么会患沙眼 17
为什么眼睫毛会向内倒 20
为什么眼皮会跳 21
为什么眼皮会浮肿 22
为什么有的人眼睛见风要流泪 24
灰沙、铁屑进入眼睛怎么办 25
发生了酸碱性眼伤怎么办 27
为什么要防治红眼睛 29
为什么黑眼珠会生星 30

“偷针眼”是怎样引起的 32
为什么有些人看东西时会觉得眼前有黑影飞舞 33
为什么电焊工人要戴面罩 34
为什么眼睛的角膜能移植 35
为什么挖耳是种坏习惯 36
为什么有时耳朵里会发响 38
为什么耳朵会流脓 39
为什么事先有准备可减少强声对耳的伤害 41
为什么不要随便挖鼻孔 43
为什么患鼻炎的人辨不出香臭 44
为什么有的人鼻子容易出血 45
为什么伤风时鼻子不容易通气 46
为什么气管里不能停留异物 47
鲠了鱼刺怎么办 49
为什么有的人牙齿不整齐 51
为什么牙齿长歪了可以扳正 54
为什么牙齿蛀了要补 56
为什么乳牙坏了也要医治 58
为什么临睡前吃糖果、饼干容易生蛀牙 60
为什么晚上也要刷牙 61
为什么生花斑牙的人不容易生蛀牙 63
为什么有的人吃了冷的、热的东西，牙齿会酸痛 65

为什么有的人刷牙时牙龈会出血 66
为什么有人牙痛时脸会肿 68
为什么有的人牙齿焦黄 70
为什么牙齿会松动 72
为什么用牙签剔牙不好 73
为什么有的人会口臭 75
为什么有的婴儿会生“奶癣” 76
为什么有的儿童夏天会生痱子 78
为什么有的儿童夏天容易生疖子和脓疱病 80
为什么有的儿童冬天脸上有一片片白斑 82
为什么冬天有些人的耳朵和手会生冻疮 83
为什么会生风疹块 85
为什么有些人皮肤沾了漆会发痒 87
桑毛虫皮炎是怎么回事 88
为什么人跌倒后会有乌青块 91
为什么伤口碰着咸的东西会痛 92
为什么伤口愈合时觉得痒 94
为什么皮肤病好了以后，有的留有疤痕，有的没有 ... 96
为什么有些病要生热疮 98
为什么有的人会生灰指甲 99
为什么热天容易生脚湿气 101
为什么脚上会长鸡眼 102

为什么有些人有狐臭.....104
为什么有些青少年的头发会早白.....105
为什么有的人头发会突然成片脱落.....107
为什么会引起脂溢性脱发.....110
为什么能用头发诊断疾病.....111
为什么验血可以帮助诊断疾病.....113
为什么化验大便可以诊断人体内有没有寄生虫.....115
什么叫细菌，什么叫病毒.....117
为什么呼吸道传染病常在冬春季发生.....120
为什么肠道传染病常在夏秋季发生.....122
为什么受了凉会泻肚子.....124
为什么发高烧前先感到冷.....125
为什么发烧时要多喝开水.....126
为什么打嗝时不宜喝水.....127
为什么冬天容易得感冒.....129
痰多了是不是有病.....130
为什么热天容易中暑.....132
为什么受凉后喝姜汤可以预防感冒.....134
为什么会发生低热.....136
为什么有的人晚上要盗汗.....137
为什么有的人会梦游.....139
为什么有些人会失眠.....140

为什么有时小便会出现浑浊现象 142
为什么有的青少年夜里会遗尿 144
为什么饭前便后不洗手容易得蛔虫病.....146
为什么得了蛔虫病会肚子痛 148
蛔虫钻胆是怎么回事.....149
为什么有的小孩夜间肛门奇痒 151
为什么得了钩虫病脸会发黄、全身无力 152
“大脚疯”是怎样引起的.....154
为什么不能在有钉螺蛳的水中捉鱼或洗澡.....156
为什么疟疾发作时发冷发热 158
冬天没有疟蚊，为什么还有人害疟疾.....160
为什么有些地方的人容易患“粗脖子” 161
为什么生黄疸病的人眼白会发黄 163
为什么肾炎病人要吃素淡食物 165
为什么患水肿病的人不能多吃盐 167
为什么打针前先要把针筒里的药水射掉一点 169
为什么注射青霉素之前要做皮肤试验.....170
为什么要打预防针 172
为什么人一生要种几次牛痘 174
为什么种牛痘后会发痒 175
为什么要在规定的时间服药 177
为什么服药时最好不要喝茶 179

为什么有些病要注意“忌口” 180
为什么月经初潮的少女要注意经期卫生 182
吸烟对人体有哪些害处 185
照 X 射线会损害身体健康吗 189
为什么中医把脉可以诊断疾病 190
为什么中医看病要看舌头 192
为什么推拿可以治疗筋骨损伤 195
小儿腹泻怎样用推拿疗法治疗 198
什么叫针刺麻醉 199
为什么会生阑尾炎 203
为什么会生痔疮 205
为什么会有平脚 206
为什么会发生“落枕” 208
为什么青少年容易发生脊柱弯曲 210
为什么老年人容易发生骨折 212
为什么骨折后会长好 213
为什么断手可以再植 215
小腿抽筋会伤害身体吗 219
肌肉可以搬家吗 221
为什么烫伤后不可以乱涂红药水或紫药水 222
为什么人烫伤后，有的要包扎，有的不要包扎 224

为什么有的人分辨不出颜色？

你去看一部彩色电影，不仅欣赏到电影中演员那种引人入胜的表演，同时，还看到美丽无比的各种颜色。可是，有的人却并不如此，他辨不清彩色电影中的鲜艳颜色；还有个别人在看彩色电影时，一点颜色也辨不出，等于在那里看一部黑白片。同样两只眼睛，为什么会有这么大的区别?



颜色，可以说是五光十色，千变万化。可是一切千差万别的色彩，都离不开红、绿、蓝这三种基本色光。人眼睛里的视网膜上，长有一种“圆锥细胞”，它对这三种色光有特殊的感觉能力，由于其他各种颜色都是由这三种色光按不同比例混合成功的，所以眼睛就能辨别出各种各样的颜色。红花绿叶，蓝天白云都一目了然。如果由于某种原因，缺乏辨别红色的能力，就叫做“红色盲”。不能辨别绿色的，叫

做“绿色盲”。对紫色不能辨别，就叫“紫色盲”。红绿两色不能辨别，就叫做“红绿色盲”。如果对三种颜色都不能辨别，那就叫做“全色盲”。平时较常见的是红色盲和绿色盲，紫色盲和全色盲比较少见。

那么，有人可能要问，色盲是怎样发生的，它的原因又是怎样？这在目前还不清楚，一般认为是先天遗传的，就是说父母有色盲，他们的孩子可能也会有色盲，至于因为视神经或视网膜得了病引起的，这是很少见的。


色盲的人，男的比女的要多 5 ～ 6 倍，因为先天遗传很有规律，譬如：父母都有色盲，所生的儿子是色盲，女儿是带色盲者。带色盲者，就是本人没有色盲，但结婚后所生的儿子半数有色盲，女儿半数是带色盲者。这就是说男的得色盲的机会要比女的多。

有色盲的人，对需要辨别颜色的工作是不适宜的，譬如：汽车、火车、飞机和轮船上的驾驶员，因为需要辨别红绿灯，所以就不能担任，否则会发生严重事故（色盲开始被人们注意，就是在 1875 年瑞典发生火车互撞事故后才引起的）。另外，如从事军事、美术、印染、纺织、化学、医学、药学等工作，由于需要辨别颜色，因此也是不适宜的，至于从事一般工作还是可以的。

有人问色盲有没有办法治好？由于它的原因还不清楚，因此也没有什么满意的治疗办法。　　（杨敬文）

为什么要养成“二要二不要”的用眼卫生习惯？





大家都有这样的体会，两只手拿东西拿久了，或者两只脚走路走得多了，就会感到有些酸，甚至有些发麻。眼睛也一样，看书或写字时间久了，眼睛也会发酸，甚至流眼泪，这是疲劳的信号。手脚发酸发麻，只要休息一下，疲劳就可消除。眼睛就不同，如果疲劳过度，就会发生近视眼，使视力减退。可是有些青少年并不理会这些，看起小说书来，就不肯放手，想一口气把它看完，看得连饭也不想吃，走路看，乘车看，躺在床上也看，看的时候既不注意光线强弱，也不注意书本与眼睛的距离。除此以外，还有些青少年，在学习做作业时，往往不注意坐的姿势，头东倒西歪，又不注意适当的休息。这样时间一长，不仅使眼球发生充血，同时使眼睛的“调节作用”长时间处在紧张状态。由于过度疲劳，使负责调节的组织发生麻痹，就逐渐发生近视眼，使视力减退。





为了保护视力，我们提倡“二要二不要”的用眼卫生措施。“二要”是：读书、写字的姿势要端正，眼睛和书本的距离要保持一市尺，连续看书或写字一小时左右要休息片刻，或者向远处眺望一会。“二不要”是：不要在光线暗弱和直射的阳光下看书或写字，不要躺在床上和走路或者在动摇的车厢里看书。

如果认真执行，经常坚持，养成习惯，就能保护视力预防近视眼的发生。（杨敬文）

为什么有的近视眼叫做“假性近视”？

正常的眼睛，看远是不需要调节的，看近就需要调节。近视眼一般可分为两种类型：一种是由于眼球的前后长度（也叫前后直径），超过了 24 毫米的正常长度，这种近视叫做“真性近视”，也叫“轴性近视”。另一种是由于不注意用眼卫生习惯而引起的。如读写时间过长，在光线过强或过弱的场合读写，眼睛与书本的距离过近，走路或躺在床上看书或者在动摇的车厢里看书，以及读写时坐的姿势不正等等，使眼睛里负责调节的睫状肌，经常处于紧张的


调节状态。另外，在眼睛里象双凸镜一样的“晶状体”，也经常使其最大限度地向前凸出，来适应需要。睫状肌好象宽紧带，经常处于拉紧状态，时间一长，就会失去原有的作用；就是说，睫状肌因过度紧张的调节，发生疲劳甚至发生痉挛，最后使视力减退，而成为近视眼。这种近视眼，在医学上叫做“假性近视”，也叫做“功能性近视”，这时尽管眼球的前后直径长度是正常的，但是看远还是不可能清楚。这种近视眼，要及时纠正不良的用眼卫生习惯，并及时请医生使用放大瞳孔的叫做“阿托品”或者“后马托品”的眼药水，或者采用戴老光眼镜的方法，叫做“雾视法”处理，使调节作用放松，消除紧张状态，它的视力多数是可以改善，甚至恢复正常，这样近视也就不存在了。但是，这些处理必须及时，如果时间久了，眼睛内部和眼球就会发生变化，那么，就会变成另一种所谓真性近视眼。

（杨敬文）

为什么眼保健操能预防近视眼？

有些青少年的眼睛原来很好，可是以后逐渐成了近视眼。这是怎样造成的呢？造成近视眼的因素很多，其中最主要的是不注意用眼卫生，长时间用眼过度，使眼睛的调

节与集合长时间地处于紧张状态，时间一久，眼睛就逐渐成为近视眼。眼保健操，是针对造成近视眼的原理，运用祖国医学中的推拿、针灸、穴位按摩等方法，综合而成的预防近视眼的措施。眼保健操通过按摩穴位处的经络，引起条件反射，从而消除眼睛的调节和集合的紧张，恢复调节和集合的功能，这种作用祖国医学叫做“疏通经络、调和气血”。



在整个人体中，经络系统与血液循环系统相似，也是分布于全身的。如果某个部位发生障碍，就会产生疾病。眼保健操的穴位按摩，就是起到排除障碍的作用，使经络疏通，有利于加强血液循环。它是一种物理疗法。这种微弱的穴位按摩刺激，可以通过神经的反射，加强整体组织的新陈代谢，改善和增进血液循环，消除调节和集合的紧张，恢复人体的生理机能，从而起到预防近视眼的作用。


所以，眼保健操是一种符合科学原理的预防近视眼的方法，只要坚持下去，持之以恒，做到作操穴位正确，就可以起到预防近视眼的作用。做操时要闭着眼睛，手法要轻缓，节拍要均匀。

眼保健操共有 4 节，做操具体要求如下：



揉天应穴


第 1 节——揉天应穴：闭目静坐，以左右手大拇指罗纹面按左右眉头下上眶角处，其他 4 指散开弯曲如弓状，支持在前额上，按揉面不要过大，用力也不要过大（节拍 8×8）。



挤按睛明穴

第 2 节——挤按睛明穴：以右手或左手大拇指与食指挤按鼻根部，先向下按，然后向上挤，一按一挤共一拍（节拍 8×8）。

第 3 节——按揉四白穴：先以两手食指与中指并拢，放在紧靠鼻翼两侧，大拇指支撑在下腭骨凹陷处，然后放下中指，在面颊中央按揉，按揉面要小（节拍 8×8）。



按揉四白穴

第 4 节——按太阳穴、轮刮眼眶（太阳、攒竹、鱼腰、丝竹空、瞳子髎〔liáo〕、承泣等穴）：双手各蜷起 4 指，以左右大拇指罗纹面按太阳穴，以左右食指第 2 节内侧面轮刮



按太阳穴轮刮眼眶

眼眶上下一圈，先上后下，轮刮上下一圈计 4 拍（节拍 8×8）。（杨敬文）

为什么有些人的眼睛会有散光？

常常听说某某人的眼睛有散光。为什么会有散光？它的原因很多，最主要的是由于眼睛的角膜弯曲度发生变化所造成的。角膜也叫“黑眼珠”，是眼球前面的一个窗户，它不仅光滑透明，而且呈完整的半球形。它的主要功能是通过光线，把光线集中起来，使它进入瞳孔达到眼底的视网膜，结成焦点，然后再反映到大脑，使人们能清楚地看到外界景象。所以，当半球形的角膜弯曲度发生变化，象一块磨得不平的镜片，表面呈现凹凸不平、不规则状态的时候，外来的光线就不能在视网膜上结成焦点，而是弥散四方，使大脑对外界物体的认识出现一片模糊，这样就产生了散光。这种散光，医学上称为不规则的散光。由于角膜弯曲度改变太多，所以很难用眼镜矫正。

又有一种叫做有规则的散光，是由于角膜弯曲度在某一方向与它的垂直方向不一致时引起。它的类型很多，有单纯远视散光，有单纯近视散光；有复性远视散光与复性近视散光以及混合散光等，它多数是由于角膜的屈光能力

不同所造成，并与近视或者远视同时存在，是可以用眼镜矫正的。



正 常



散光甲



散光乙

由于角膜不平、弯曲度不正而引起不规则散光的原因有两种：一种是先天遗传，另一种是由于后天角膜发生了疾病。如：角膜发生溃疡或外伤等，痊愈后产生了瘢痕，就会造成角膜不平，弯曲度不正。


有规则的轻度散光，一般不会影响视力，但可能有眼睛疲劳等不舒服的现象。很多人当用眼时间稍久，就会引起头痛，眼睛和眼眶周围酸痛等不舒服的感觉，少数人甚至还有恶心、呕吐的症状，对健康和工作有一定影响。至于散光比较严重时，则看到物体一片模糊，对工作更有影响。

因此，如果眼睛有散光，应该请医生进行验光矫正，配戴适度的眼镜。对于因某些眼病引起的不规则散光，有时可配戴一种放在眼睛里的“接触眼镜”矫正，但这也要在医生的指导下进行。（杨敬文）

为什么老年人会发生老光眼？



人的两只眼睛，除了有病的例外，在年轻的时候，都是既能看远又能看近，到 40 岁以后就不同了，看远可能还是一样清楚，可是看近要把东西放得远一些才能看清，有人认为眼睛有毛病，其实并不是什么毛病，是一种生理变化，叫做“老光”，它象人们到老年时头上出现白头发一样。



我们的眼睛，看远时处在休息状态，看近时要依靠眼睛里的一种叫做“晶状体”的组织，进行“调节”。晶状体象一块透明的双凸镜，它具有非常良好的弹性，能自动变厚和变薄，当你看一本字体很小、放得很近的书，要看清楚它，就需要晶状体的帮助，它会自动的变得很厚，向前面凸出，当然这样变厚和变薄，还需要依靠象宽紧带一样的睫状肌和附在晶状体周围的小

韧带的收缩和放松。

但是晶状体的变厚变薄的弹性，不是永远不变的。在初生儿的时候，晶状体和眼球的其他部分比较，它要大一些，同时它象有些水果一样内部有核，但是比较小，而且也比较软。当然这种核绝对不象水果里面的核那样，晶状体内部的核是完全透明的，以后随着年龄的逐渐增加，晶状体也逐渐变得既硬又大，它的弹性也逐渐消失，这样“调节”也就受到影响。所以人们到了 40 岁以后，就会发生不同程度的老光，看近要依靠一副老光眼镜来帮助。（杨敬文）

近视、远视、老光和散光的眼睛，为什么要戴眼镜？

有近视、远视、老光或者散光的人，有的看近清楚，看远不清楚，有的看远还可以，看近一片模糊，有的看远近都不清楚，那么有没有办法使他们看远近都清楚？有，可以采取取长补短的办法，给他们配上一副适度的眼镜。譬如：近视眼，是由于眼球的前后直径过长，使远处物体的结象不能恰好落在视网膜上，而是在它的前面，所以看远不清楚。如果给他配上一副适度的凹透镜眼镜，利用它对光线发出散开的作用，把前面的结象移到视网膜上，这


样就能看清楚了。又如：远视眼，由于它的眼球前后直径比较短，或者屈光能力薄弱，使外界物体的结象落在视网膜的后面，因此看远近都不清楚。如果给他配上一副适度的凸透镜眼镜，通过它对光线集合的作用，把结象从后面移到视网膜上，这样也就清楚了。还有老光，由于起调节作用的晶状体失去了弹性，不能适度地变厚，因此对外界光线不能很好地集合，所以看近就不能清楚；如果给他配上一副凸透镜眼镜，帮助把光线集合，那么，看近就清楚了。至于散光，多数是由于角膜的弯曲度发生变化，或者屈光系统不正常，使眼内出现两个物体的结象，有的是一个在视网膜上，而另一个则在前面或者后面，也可能一个在另一边；如果给他配上一副圆柱镜眼镜，利用这种眼镜，只在某一方面才有屈光作用，把落在前面或者后面的另一个结象，移到视网膜上，成为一个结象，这样也就看得清楚了。所以有近视、远视、老光或者散光的人要戴眼镜。

（杨敬文）

为什么配眼镜要验光？

有些人的眼睛有了近视、远视、老光或散光，就随便买一副自认为满意的眼镜戴上，这是不对的，是不科学的。

因为近视也好，远视也好，老光也好，散光也好，各人的程度并不相同，有的程度比较低，有的却很高，有的有了近视还有散光，有的有老光还有散光，总之是千差万别，非常复杂。如果眼镜度数不适合，虽然有时戴上去看东西好象比原来清楚，但往往戴了不久反而感到不舒服，头和眼睛发生胀痛，甚至戴坏眼睛。




因此，配戴眼镜事先必须请验光师或者眼科医生进行验光。经过验光后根据不同的年龄、不同的屈光性质和不同的职业，进行配戴眼镜，譬如：年轻人的近视，因为调节力比较强，光度要配到看得最清楚为宜；年龄较高的近视，根据实际光度要减少一些。远视眼则相反，年轻人不能配足，年龄较高的则应配足。除此之外，还要考虑各人的职业，如：汽车、火车上的驾驶员，配的光度应该着重于远视力，做精密工作的人，配的光度应该着重照顾近视力。只有经过详细的验光和周密的考虑，配戴一副适合的眼镜，才能符合工作需要，而又不损伤眼睛。　（杨敬文）


为什么有的眼镜能戴在眼睛里？

眼睛患了近视、远视、老光或者散光，就得去配一副度数适合的眼镜。配的眼镜，总是依靠它的架子和人们的耳朵和鼻子的帮助，才能戴在眼睛的前面，这对戴眼镜的人来说视力是增加了，却带来许多麻烦，初戴上一副眼镜，耳朵鼻子会发生酸痛，在雨雪的天气走路，就非得经常把眼镜取下擦一擦再戴上，否则就模糊不清，而且有些人还不能戴上眼镜去工作。比如：演古代戏的京剧、越剧演员怎么能戴了眼镜到台上去表演呢？跳高或者足球等运动员怎么能戴了眼镜去参加比赛呢？戴眼镜的麻烦恐怕还不止这些。

为了解决这些问题，科学家们研究设计了一种叫做“无形眼镜”，也叫“接触眼镜”，这就是人们所讲的戴在眼睛里的眼镜。这种眼镜既不需要架子也不需要框子，它的大小直径最小的只有 9 毫米，最大的也只有 12 毫米，只有普通眼镜的四分之一左右大小。它的厚薄只有 0.1 ～ 0.3 毫米。这种眼镜，是采用最洁净的有机玻璃制成的，它的原料既结实又坚韧，因此不会破碎。它的光洁度和精密

度极高，因此放在眼睛里能与角膜的弯曲度完全吻合。戴上这种眼镜，由于它能随着眼球转动，因此看物准，视野广，同时再也不必顾虑象戴普通眼镜所产生的问题，演员和运动员也能戴了眼镜参加演出或者进行锻炼和比赛，这为他们带来了很大的方便。这种眼镜目前有两种类型：一种是硬性的；一种是亲水软性的。





接触眼镜，它能解决许多普通眼镜不能克服的问题，譬如：由于角膜高低不平所产生的不规则散光，它能矫正；两只眼睛的度数相差很大，它也能使用；有 1000 ～ 2000 度的高度近视眼，可以不必再戴又厚又重的普通眼镜。亲水软性接触眼镜还可用来治疗某些顽固性眼病。除此以外，接触眼镜在工业生产上还可以作为良好的防护眼镜。可是它也有缺点，初戴时不习惯，其次不能长时间持续戴着，要戴戴取取，否则会使角膜的生理和新陈代谢引起不良反应。接触眼镜要根据各人的眼睛大小、角膜曲率，经过仔细测量后才能配戴。　　（杨敬文）


为什么有的儿童眼睛会斜视？

眼睛斜了，医学上叫做“斜视”，向鼻侧斜叫“内斜视”，向耳侧斜叫“外斜视”。



有些孩子生下来眼睛是很好的，可是到了三四岁，却忽然变成斜眼了。有人说，这是吹了“怪风”；有人说，是见了强烈的阳光，等等，其实都不是。

人们的正常眼睛，既能看远近，又能左顾右盼，上下运动，而且两只眼睛总是一起活动。这主要是每只眼球周围有六条肌肉的牵引，互相协作，密切配合的结果。如果某条肌肉的收缩力量过强或过弱，无法与它的对抗肌肉相平衡；或者一条肌肉麻痹失却作用，眼球的牵引力也会失去平衡，这样就会出现眼球偏向一侧的现象。譬如：靠里面的肌肉抽筋，收缩过强，或者靠外面的肌肉麻痹，放松了，眼球就会向内斜，成为内斜视。相反的肌肉发生同样的情况时，眼球也会向外斜，成为外斜视。



斜视的发生原因，属于肌肉力量的不平衡，绝大多数与眼的屈光异常（近视、远视）有关，孩子们的斜视多数属于这一种。至于肌肉麻痹的多半是因发热或其他疾病引起的，大多发于中年及老年人，而且是突然发生的，伴有复视及头昏和眼花等现象，必须及早设法治疗。

斜视，不仅会影响孩子的容貌，更重要的会使斜视的眼睛变为弱视，严重地影响视力，因此要及早矫治。

早期轻度的斜视，可以将好眼睛遮盖起来，使孩子用斜视眼看东西，慢慢地使它恢复到正常的位置上，另外替孩子配戴一副适当的眼镜，这也是矫正斜视的一种方法。以上方法不能矫正时，就必须请医生施行手术矫正，但是手术矫正在七岁以前做最好，到长大了再做手术，即使把斜视矫正了，也往往因为已变弱视，而视力不能恢复。


（杨敬文）

为什么会患沙眼？


沙眼，有人认为是眼睛里飞进灰沙而引起的眼病。其

实并不如此，它是一种慢性传染性眼病，它与灰沙并不相干。譬如：北方灰沙比南方多，但是南方和北方一样有很多人得沙眼。那么沙眼是怎样引起的呢？沙眼是由一种依原体引起的。这种依原体很小，好几百个放在一起才只有一个普通细菌那么大，用普通的显微镜还看不到，只有用放大上万倍的电子显微镜才能看到它。这种沙眼依原体，最常出现的地方是：眼屎、毛巾、洗脸水、手帕和脏手。如果不注意卫生，使用沙眼病人的毛巾、手帕或者合用一盆洗脸水，或者用脏手擦眼，就会在不知不觉中感染到沙眼。

得了沙眼有哪些现象呢？在初起比较轻的时候，可能既不痛又不痒，一点感觉都没有。因此自己往往并不知道，偶而去体格检查却被医生发现了。到病情发展严重了，就会经常感到眼睛发痒、发轧、干燥、有些痛，早晨起来有眼屎，吹着风就流眼泪，看书感到眼睛很吃力，看起来也有些糊涂。如果翻开眼皮看看，医学上叫做“睑结膜”的上面，本来这层薄膜应该是光滑透明，血管排列整齐，可是有了沙眼后血管就模模糊糊，同时生了许多象沙子或者象鱼子那样的颗粒，象石子路那样高



沙眼依原体



沙眼

低不平。当颗粒越来越多的时候，最后象腊肠一样一串串地长满了整个睑结膜。

沙眼发展到严重的时候，还要侵犯到叫“黑眼珠”的角膜上面，按理角膜既透明又光滑，好象玻璃窗一样，能透过光线。但是当得了沙眼后就容易使透明的角膜发炎而变得混浊不清，这样看东西也就不清楚了。

沙眼不仅会使眼睛看东西不清楚，同时还会使眼皮向里面翻，使排列整齐的眼睫毛倒向眼球。这样就会使眼睫毛象刷子一样擦伤角膜，引起发炎。严重的还会使角膜全部混浊和干燥，造成视力减退甚至失明。

沙眼的危害性既然这么大，那么就应该很好地预防。预防的方法，首先要注意清洁，讲究卫生，要勤洗手。不管有无沙眼，不要与别人合用毛巾和洗脸水，不要用脏手和别人的手帕擦眼睛，其次要定期进行检查，发现有沙眼，可用疗效较好的斑马牌眼药水、利福平眼药水、金霉素、四环素、红霉素眼膏等进行治疗，或去医院请医生治疗，要把它彻底治好。

沙眼没有免疫力，治好后还可能再感染，所以在治疗期间以及治好后，都要注意清洁卫生，加强预防。

（杨敬文）

为什么眼睫毛会向内倒？

眼毛，又叫睫毛，它生在上、下眼皮的边缘上，既能防灰尘和汗水，又能象帘子一样遮住强光的刺激。当汗水从上面流到睫毛的时候，它会立即通知大脑发出警报，使眼睛闭下来，使手用手帕或毛巾去把它擦掉，起着保护眼睛的作用。如果眼睫毛发生向内倒，那么，它不但不能起到保护眼睛的作用，相反由于眼睫毛对黑眼珠的经常摩擦，会发生破坏作用。

为什么好好的眼睫毛会向内倒呢?

它的原因是很多的。譬如：在翻开眼皮的睑结膜上，得了沙眼，因长期发炎，逐渐引起结疤而收缩，使睑结膜缩短向内弯曲，这样就把眼睫毛拉向内倒。



睫毛内倒

其次，有些老年人，由于眼睑的皮肤松弛，眼眶周围的脂肪逐渐减少，眼皮缺少支撑的组织，这样也会引起眼睫毛向内倒。

除此以外，有些小孩在发育过程中，由于眼球比较扁而小，眼睑皮肤却比较宽，这样也会使眼睫毛向内倒。

因沙眼和年老而引起的眼睫毛向内倒，由于它对黑眼珠等有破坏作用，因此要及时请医生进行手术治疗。至于有些小孩子在发育过程中引起的眼睫毛向内倒，在年龄比较小的时候，由于眼睫毛比较软，对黑眼珠等组织影响不大，所以不必急于进行手术治疗。如果到一定年龄，眼睫毛还是向内倒，没有恢复正常，这时由于眼睫毛比较硬，对眼睛会发生刺激和破坏作用，因此也必须请医生进行手术治疗。（杨敬文）

为什么眼皮会跳？

人们的“眼皮”，有时会无缘无故突然之间连续地跳得很厉害，使人感到很不舒服。有人说，“左眼跳财，右眼跳灾”。其实，这完全是一种迷信的传说。

“眼皮”，医学上叫作“眼睑”，它是眼球的“门户”，起着保护眼球的作用。在人们的眼睑内，有一条很薄的肌肉，叫做“轮匝肌”。这种肌肉纤维是围着眼睛成轮形生长，它可以随意活动，当它收缩时，眼睑就会闭合。如果轮匝肌纤维的某个部分，受到某种影响，促使它突然产生反复收缩，就会出现“眼皮跳”的现象，医学上叫做“眼睑震颤”。

那么，轮匝肌纤维怎么会产生反复收缩，出现眼睑震颤呢？原因主要有两种：一种是由于失眠或睡眠不足，眼睛过度疲劳，或者由于贫血、烟酒过度，使轮匝肌纤维过度收缩，引起缩张失常而产生的；另一种是由某些眼病引起的，如近视、远视、散光、结膜炎和角膜炎等。此外，眼睛受了强光刺激，或者滴用缩小瞳孔的药物，也可能引起眼睑震颤。

由此可见，偶然的眼皮跳动不是什么病，只要注意适当休息，很快就会消失。必要时服一些小剂量的奎宁，也可以收到很好的效果。如果经常发生眼皮跳，跳个不定，则应请医生检查和治疗。（杨敬文）

为什么眼皮会浮肿？



人的眼皮突然发生浮肿，是常有的事。实际上眼皮浮肿并不是一种单独的疾病，而是局部或者全身某种疾病的一种症状。因为人们的眼皮下组织特别疏松，空隙也比较多，所以很容易积留液体，发生所谓“水肿”，使眼皮肿胀。眼皮浮肿有一定的范围，向上不超过眼眉毛，向下不超过颊面。

眼皮浮肿，有发炎引起的和非发炎引起的。由发炎引起的，如眼部的麦粒肿（偷针眼）、丹毒、眼睑急性湿疹、结膜炎、角膜炎、急性青光眼、眼眶内的组织和眼球发炎、脑膜炎、副鼻窦炎以及眼部受到创伤和被昆虫所咬等，都可以使眼皮发生浮肿。



非发炎引起的，如心脏病、肾脏病等，也可以使眼皮发生浮肿。除此以外，还有内服或局部使用青霉素、阿托品或者磺胺类等药物发生过敏时，也会引起眼皮浮肿。还有一种是血管神经性水肿，这种浮肿往往突然发生，但很快就消退，这种现象在妇女月经期间常会发生。至于有些人眼皮下的脂肪组织过多，眼皮比较肥厚，这并不是眼皮浮肿。

如果发现眼皮浮肿，除了自己可以用热毛巾热敷外，应及时请医生检查，以便针对原因进行治疗，只要把病治好，眼皮浮肿也就很快消退。如果时间久了，往往由于水肿部分的组织，因营养不良，而发生一种叫做结缔组织的增生，使浮肿永远不能消退。（杨敬文）

为什么有的人眼睛见风要流泪？

流泪的原因很多也很复杂，当人们受到刺激、悲伤、疼痛、打喷嚏、咳嗽、呕吐、大笑，或者眼睛受到强光、灰沙、烟熏，以及使用某些药物等等，都可以发生流泪，这种流泪好象倾盆大雨的雨水，一时无法从下水道中排出一样是暂时性的。

此外，眼睛得了沙眼、倒眼毛、黑眼珠生星、有远视或近视也会发生流泪，这种流泪是一种病态，如果把眼病治好，给有远视或近视的人配戴适度的眼镜，流泪也会停止。

如果眼睛的边缘发炎或者得了沙眼，使眼睛的边缘或结膜发生结疤，造成下眼皮向外翻或者使眼角的上、下两个小孔和通向鼻腔的小泪管闭塞，这会发生经常性流泪。除此以外，得了沙眼等眼病，把病毒或细菌带到了导流眼泪的“泪囊”中，会引起“慢性泪囊炎”，这样除了经常流泪外，同时在内眼角还常有象脓一样的分泌物，用手指轻压眼角下面便会满眶是脓。经常性的流泪，是由于平时泪水不多，流到外面泪水也比较少，可是当遇到风吹的刺激，泪水就会增加，因此，一天到晚总好象很悲伤，眼

泪流不停。如果发生这种经常性流泪的现象，应该及时请医生检查和治疗。有些流泪通过及时的处理是可以治好的。（杨敬文）


灰沙、铁屑进入眼睛怎么办？

眼睛里的“眼球”，是人体中一个比较脆弱的组织，它的作用却很重要，人们看东西全靠它。当我们睁眼看东西时，眼球前面的一部分组织就暴露在外面。这时，如果一不小心有灰沙吹进了眼睛；或操作机床时，有一颗铁屑弹入了黑眼珠（角膜），那该怎么办?

眼球的角膜是一层脆弱而透明的薄膜，它的中央厚度只有 0.8 毫米，周边也只有 1 毫米，角膜上没有血管，但神经相当丰富，这是人们能够看清外界物体的第一道关口。当灰沙、铁屑等异物进入眼睛，角膜就首当其冲受到损伤，从而使透明的角膜变成灰白色的薄翳，或者遗留铁锈，造成角膜透明度减弱而影响视力。如果受伤后引起感染发炎，或者铁屑弹入角膜的力量较大，那就更严重了。

外界的异物种类繁多，如：砂子、石子、玻璃、煤屑、竹头、木片、麦粒和稻壳。还有：金、银、铜、铁、锡、钢等等，不同的异物进入眼睛，都会产生不同的化学性和非

化学性反应。比如，铁会迅速产生铁锈，石、煤、玻璃等会产生机械性刺激。异物一旦侵入眼睛，会出现流泪、怕光、疼痛和异物感等情况，这往往与异物的大小及每个人的角膜感受灵敏度有关。一般来说，一个十分细小的异物往往使人没有感觉，一个反复受异物损伤的人，角膜的感觉灵敏度会减退，一般老年人比青年人感觉差，男性比女性差。



异物侵入眼睛，开始多粘附在表面，可轻轻拉起上眼皮，使异物随着眼泪流出。如不能流出，可用清洁的棉花把它轻轻擦掉。万一异物附在眼皮的内面，可将眼皮翻开把它擦掉。对于嵌得较深的异物，应及时请医生诊治，切不要用脏手揉擦，更不能用不清洁的物品随意挑拨，以免引起感染发炎。

为了保护眼睛的健康，在工厂、农村应注意生产安全，遵守安全操作规程，要戴防护眼镜，机床的排列要注意方向和距离，并应装置防护罩或吸尘器。防暑降温风扇的风力不要过强，风向要来自背后，工作结束时要把机床上和地面上的碎屑扫除，以加强预防。（杨敬文）

发生了酸碱性眼伤怎么办？


当你走过一个建筑工地的时候，不巧遇到一阵风把一粒小的生石灰吹进眼里，立时觉得很痛，可不要揉眼睛，赶快到医院里去冲洗，迟了眼睛会受伤。人们作实验的时候，或者在化工厂操作时，如果不小心眼睛里溅进了硫酸或硝酸之类的液体，也要立即到医院去冲洗，一点也不能大意。

生石灰之类是碱性化学物质，硫酸等是酸性化学物质，这两种物质如果不慎进入了眼睛，就会立刻发生破坏作用。酸性化学物质进入眼睛，对组织产生凝固性破坏，但它不向深层发展；而碱性化学物质一旦进入眼组织，不但破坏表层，而且还会向深层逐渐发展。因此，碱性化学物质比酸性具有更大的破坏性。

酸碱眼伤所出现的症状，是随着酸碱浓度的不同而有轻重。浓度较低的，可引起怕光、流泪、眼睛刺痛、睁不开眼白发红与黑眼珠表面脱落（角膜上皮脱落）等症状，这些症状可以较快地消失。

浓度较高的酸或碱所引起的眼伤，症状就相当严重。

眼睛除了会出现红肿、怕光、流泪、疼痛等刺激症状以外，受伤的组织不仅会表面脱落，而且还可以侵袭到深部，使深部的眼球组织也同样发生极其严重的病变，而影响视力，甚至造成失明。生石灰（氧化钙）侵入眼睛，遇到眼泪水立即会变成熟石灰（氢氧化钙），可释放出高热，因此，不仅可造成碱化学伤，同时还可产生热灼伤。



酸碱化学物质腐蚀力强，作用快，侵入眼部时间越长，组织损伤越重。所以一旦发生酸碱眼伤，就必需争取在最短的时间内把酸碱洗净，如果离医院较远，不能立即找到医生时，就应该马上到自来水龙头下先充分冲洗几分钟，切勿耽误。

如果发生酸碱性眼伤，酸性物质可用 2 ～ 3% 碳酸氢钠等弱碱溶液冲洗；碱性物质可用 2 ～ 3% 硼酸等弱酸溶液冲洗，这可起到中和作用。对于生石灰侵入眼睛，则应先把它取出，随后再行冲洗，以防遇水后发生热灼伤。现场急救的迅速与方法对头，是抢救过程中的关键，经过反复清洗抢救后，还应及时送医院进行检查处理。

（杨敬文）

为什么要防治红眼睛？

人们往往把眼白发红的症状称作“红眼睛”，或者叫“火眼”和“赤眼”，认为这是一种小毛病，这是完全不对的。因为引起眼白发红的原因很多，有许多眼病都可以使眼白发红，眼白发红只不过是某种眼病的一种现象。例如急性结膜炎、角膜炎、虹膜睫状体炎、急性青光眼和巩膜炎等眼病，都能使眼白发红。因此，绝不能把眼白发红都笼统地称为“红眼睛”。

所谓红眼睛，一般是指“急性结膜炎”，它是由细菌或病毒引起的。它的发病很急，在感染细菌或病毒的几小时内即发病。在炎热的夏天，由于细菌或病毒容易生长和繁殖，有时会引起暴发流行。一旦感染此病，从发病到痊愈少则 3 ～ 4 天，多则 7 ～ 8 天，甚至更长时间。

这种病开始时眼睛有些发痒、发轧，感觉上好象眼内有沙粒，眼白逐渐发红，眼皮发肿，眼屎很多，早晨起床上下眼皮被眼屎粘住。由于眼屎的影响，使看到的东西模糊不清。有时还会出现头痛、喉痛、发热以及耳前腺压痛，眼白下面出现出血状鲜红色等。如果发展严重，黑眼

珠（角膜）也会受到影响，引起发炎，从而影响视力。



红眼睛是怎样传染的呢？主要是通过手、手帕、毛巾、公共浴室和脸盆、游泳池等接触传染的。红眼睛是完全可以预防的，预防的方法，主要是要养成勤洗手、不用脏手揉眼的良好习惯。洗脸时要做到分水、分巾，不用红眼睛病人用过的毛巾和脸盆，毛巾要经常用肥皂洗涤晒干，挂在通风处，保持清洁、干燥。脸盆要经常保持清洁，公共毛巾要严格煮沸消毒。

一旦得了红眼睛，应自觉做到不去游泳池游泳，不到公共洗脸池和浴室去洗脸洗澡。同时，还应积极进行治疗，治疗的方法可用 1 ～ 2% 冷盐水浸洗眼睛，一天 3 ～ 4 次。此外，可采用磺胺眼药水或抗菌素眼药水滴眼，有的也可用疱疹净眼药水。如果症状较重，则应到医院检查治疗。


（杨敬文）

为什么黑眼珠会生星？


黑眼珠也叫“角膜”，是一层既光滑又透明的薄膜。它

的大小只占眼球六分之一，厚薄只有 0.8 ～ 1 毫米，它没有血管，却具有丰富的神经，所以，它不仅完全透明，同时感觉又特别灵敏。角膜是眼睛的窗户，有了它，人们的眼睛才能对外界物体明察秋毫，可是有的人却在透明的角膜上生了星，使视力受到影响。生星是一个总的名称，有象水泡一样高起来的星，有凹下去一大块的星，有一点点或者一片的，有多有少，有大有小。

为什么好好的角膜会生星呢？这有很多原因，譬如，得了沙眼或者红眼睛（急性结膜炎），就容易生一点点叫做“角膜炎”的星，或者生凹下去一块叫做“角膜溃疡”的星。如果沙眼发展严重引起倒眼毛，由于经常擦刺角膜，那就更容易生星。还有体质衰弱或者对结核有过敏因素的人，就容易生象水泡一样高起来叫做“疱疹性角膜炎”的星。除此以外，如果角膜被树枝、灰沙或铁屑等擦伤，引起发炎，也会发生凹下去一块的星。生了星会有怕光、流泪、疼痛、发红和睁不开等现象。最后还会留下一点点或一块块的翳〔yì〕，永远退不掉，影响视力。要避免角膜生星，应该注意清洁，讲究卫生，防止感染到沙



角膜炎



眼等眼病，同时还要经常注意保护眼睛防止角膜受伤和发炎，万一角膜生了星，应立即请医生治疗。　　（杨敬文）

“偷针眼”是怎样引起的？

“偷针眼”在初起时，首先在眼睫毛根部的眼皮处发生一个小红块，它的形状很象麦子，所以医学上叫它“麦粒肿”。它分两种：生在眼皮外面的叫“外麦粒肿”；生在眼皮里面的叫“内麦粒肿”。这种小红块有些发胀，摸着就痛，不到几天肿的范围扩大，会使整个眼皮（眼睑）红肿得连眼睛也睁不开，严重的还会发生高热。几天后逐渐化脓，穿破眼皮的皮肤，脓流出来后也就慢慢地好了。


麦粒肿

偷针眼是怎样引起的呢？有人说是因为偷了人家的针引起的，这是没有根据的。主要是因为不注意眼部的清洁卫生。如用脏手和脏手帕擦眼睛，使眼睫毛附近的一种叫做“蔡氏腺”的组织感染到化脓性的细菌，就会引起偷针眼。

得了这种病，在开始时可以用热毛巾敷，每天 4 ～ 5 次，每次 10 ～ 15 分钟，红肿往往会消退。如果红肿不退或有黄色脓疱出现的话，就应请医生医治，切不可自作主

张，随意用没有消毒的针或其它东西乱挑，更不能用力挤压，因为这样会把脓液中的细菌或毒素挤入血管，通过血液的流通会引起败血症而发生意外。（杨敬文）

为什么有些人看东西时会觉得眼前有黑影飞舞？


有些人的眼睛在看东西的时候，眼前会出现象灰尘或者象蚊蝇一样的东西在飞舞，眼睛眨一眨或者动一动，它会随波逐流一起浮动，扰乱视线，使人感到烦恼和不安，这到底是什么东西在眼睛里作怪?

我们知道，在眼球内的后半部，有一个很大的空隙，在里面充满了一种半胶质的透明体，叫做“玻璃体”，有了它才使眼球能经常保持球形，如果在这种玻璃体内有细微的不透明体，这就会随着它的波动，而使眼睛出现黑影飞舞。那么，这种现象是怎样产生的呢？一种是由于胎儿时期，在眼睛发育过程中，残留了一些不透明的细胞或者血球，它是极其微小的，小得连显微镜也往往看不见，可是它能随着玻璃体的浮动，在眼底的视网膜上产生阴影，而使人感到在眼前有黑影飞舞，这种飞舞在注视蓝白色背景时更为显著。这是一种生理现象，所以，它不仅不会发展，而且不去注意它，会逐渐消失。

另外还有一种叫做“玻璃体混浊”，是由于眼睛内部发炎、出血或者高度近视眼，在眼睛里产生了细微的蛋白凝固物质和白细胞。这些集合在一起的物质是不透明的，它的形状大小也是千变万化，各不相同，通过一种检查眼睛的检眼镜或者角膜显微镜可以看到。它随着玻璃体的浮动而一起浮动，使人感到在眼前有黑影飞舞，严重的时候往往会影响视力。它不仅是一种病态，而且还会随着眼病的变化而逐渐增加。因此，一旦发现这种情况，应及时请医生检查和治疗。（杨敬文）

为什么电焊工人要戴面罩？

当你走过烧电焊的地方，你一定会看到电光闪闪，火星四溅。如果你站在那里目不转睛地看上 1 ～ 2 分钟，那么过 6 ～ 10 小时以后，眼睛就会感到火辣辣的刺痛，怕光、充血、睁不开来，眼泪流个不停。严重的时候，眼睑的皮肤会出现好象烈日晒过的颜色，有时还可能出现水泡泡，结膜充血水肿，在角膜（黑眼珠）上发生一点点的脱落。这种现象，一般可以持续 6 ～ 8 个小时，在 24 小时内，它又会逐渐消退。这就是得了一种叫做“电光性眼炎”。



有人一定要问，为什么这么看一看就会得病呢？因为在这种闪光中，含有大量对眼睛有害的紫外线。它的光波有长有短，400 ～ 300 毫微米是长波，300 毫微米以下是短波，当眼睛接触波长 314 ～ 250 毫微米短波紫外线的时候，有 2% 被透过，98% 的紫外线却被角膜和结膜所吸收，这样就使角膜和结膜组织发生变化，产生象上面所讲的那种“电光性眼炎”。

为了防止这种眼病，所以电焊工人或者帮助做这种工作的人，一定要戴上防护面罩或防护眼镜，不使紫外线透过。一旦发生这种病，如果是比较轻的，可以用冷毛巾敷一下或者服些止痛药片，严重的就必须请医生检查和治疗。

（杨敬文）

为什么眼睛的角膜能移植？

一些患眼病的人，不幸眼睛失明了，他们多么渴望能恢复光明。这些人往往提出：“我的眼睛能调换一个吗?”

调换整个眼睛，目前的科学技术条件还不能办到，但调换眼睛的一部分结构，如角膜（即黑眼珠）是完全可以的。这种手术叫“角膜移植”。如果一个人的角膜，因疾病或外伤，长了一个白斑，特别是位于角膜中央的较大的白斑挡住了光线的进路，影响视力，而眼部其他组织都是正常的，就可以考虑这种手术。角膜移植手术是将病人的有白斑的角膜去掉，而换上一片刚从死后不久的尸体眼球上取下来的透明角膜，如果移植上去的角膜生长很好，并保持透明的话，病人就能恢复视力，重见光明。

角膜移植手术因需要人的尸体的角膜，所以来源受到一定的限制。为了解决角膜来源，目前，科学家正在找寻代替物，如利用有机玻璃、塑料制品等做成人工角膜进行移植，在这方面，已经取得了一些可喜的成果。（王文吉）

为什么挖耳是种坏习惯？

耳朵是人体的听觉器官。在耳朵的外听道里，常常分泌出一种象蜡一样的油脂腺，跟灰尘、皮屑等混在一起，医学上称“耵聍”〔dīngníng〕，就是我们常说的“耳屎”。耳屎常会刺激外耳道的神经细胞，使我们产生痒的感觉。于是，有些人总喜欢眯着眼，拿起火柴梗、牙签、细铁丝

等东西，在耳朵里挖来挖去，有些人明知道自己耳朵里的耳屎早已挖尽，但还是喜欢挖个不停。

挖耳这种习惯好不好呢?



很不好。耳屎根本就不应该挖去，因为耳屎是人体分泌的一种保护耳朵的物质。耳屎味道很苦，又是油腻腻的，如果小虫钻进耳朵，尝到苦味，就会退出来；灰尘钻进耳朵，就会给油脂粘住。所以耳屎是保护耳朵的一道防线，如果把它挖去，就等于向小虫、灰尘开了方便之门，让它们长驱直入。挖耳的用具一般都是不清洁的，会使耳朵的外听道染上细菌，发肿化脓；一个不小心，戳破了耳朵里面的鼓膜，会发生中耳炎，引起听力减退，以致发展成为聋子。

所以，挖耳是种只有害处、没有好处的坏习惯。

耳屎积得太多了，又痒得难受，那怎么办呢?

耳屎太多了，多到塞住了听道，或者奇痒难受的时候，可以用一根牙签，卷上一些干净的棉花，把耳屎轻轻地扫出来，千万不要随便抓起个什么东西去乱挖一阵。

（王国忠）

为什么有时耳朵里会发响？

耳朵是听声音的器官，正常人的耳朵里是完全安静的，这样才不会干扰从空气中传来的声音。正如一架好的收音机，除了收进来的音乐和说话声以外，本身不应该有杂音一样，否则听起来就不清楚了。

但是，有些人的耳朵里却经常有响声，这种响声有的象蝉鸣，有的象汽笛声，有的象开火车，有的象流水声，也有的声音是一跳一跳的，等等，各式各样的声音都可能有。

耳鸣的原因相当复杂，身体虚弱时出现耳鸣，这是比较常见的。除了全身情况以外，耳鸣时常是耳部疾病的一种表现。由于内耳和听神经是感受听觉的，所以任何对它们的刺激都可能感觉为声音，而产生耳鸣。如听神经发炎或被肿瘤压迫，内耳的炎症、水肿、缺氧或缺血，中耳附近血管受压，或头颈部肌肉不正常的收缩，都可能造成耳鸣。

一般说来，耳鸣不严重，可能关系不大。如果伴有其他的症状，如头痛、头昏、眩晕、听力减退等，就应该查

明一下产生耳鸣的原因。 （余孝基）

为什么耳朵会流脓？

耳朵流脓俗称“烂耳朵”，是一种比较常见的疾病，一般人认为这不过是小毛病，其实不对。

耳朵是负责听觉的器官，它分为外耳、中耳和内耳三个部分。外耳包括耳廓及耳道；中耳包括鼓膜、听小骨及通向鼻咽部的咽鼓管；内耳由保持平衡位置的前庭、半规管及负责听觉的耳蜗所组成。中耳和内耳与头颅相邻，中耳腔上方仅由薄的骨板与大脑隔开。由于中耳的位置与脑子相接近，如果耳朵长期流脓，一旦有骨质破坏时，细菌就会侵入脑部，引起脑膜炎或脑脓肿。因此，耳朵流脓并不是小毛病，轻的会影响听力，少数严重的可以危及生命，必须积极地预防和治疗。

耳朵为什么会流脓呢?

最常见的原因是伤风感冒。伤风感冒时，细菌容易从鼻腔通过鼻咽部的咽鼓管进入中耳腔，引起中耳粘膜发炎；小儿患急性传染病（如猩红热、百日咳、麻疹），由于全身抵抗力降低，也可以引起中耳炎；还有，婴儿哺乳时，不小心将乳汁流入中耳的咽鼓管，也会引起中耳炎。另外，

由于游泳跳水方法不当，挖耳误伤鼓膜，或强声造成的鼓膜穿孔，都会使细菌感染而引起中耳炎。

如果急性中耳炎不及时治疗，就可能转为慢性，导致长期流脓不止。

知道了中耳流脓的道理，就应该采取积极的预防方法。

中耳炎的主要原因是全身抵抗力差，所以应积极开展体育运动，增强体质。

平时鼻涕可向后吸，由口腔吐出，或将手帕松松地放在鼻孔前，用自己呼吸的力量将鼻涕擤出，也可交替地将左右鼻孔分开擤涕。

中耳流脓的病人，大多数鼻子也有毛病，要同时治疗鼻病。中耳有脓，先要用双氧水洗清卷干后，再滴耳药。



如果长期流臭脓，同时伴有头痛、恶心、呕吐、高烧等症状，应及时到医院检查，以防脑膜炎、脑脓肿等发生。

得了中耳炎不宜去游泳，因为游泳时，会使水经过中耳到内耳，影响前庭，引起平衡失调，在水中易发生意外事故。（朱家珠）

为什么事先有准备可减少强声对耳的伤害？



夏天打雷，轰隆一声巨响，常常把门窗震得吱吱发响，耳朵也会被震得嗡嗡叫，听不清声音，过一会儿才恢复正常。如果这时看到天空闪电，立即张开嘴巴，或用手指塞住两耳，就会减少这种伤害。

为什么事先有准备可减少强声对耳的伤害呢?

我们先从耳朵能听声音谈起。从耳朵窟窿向里看，只能看到鼓膜，就算到底了。其实在鼓膜里边有一块小地方，好象照相馆里的“暗室”，叫鼓室。鼓室里悬着三块小巧玲珑的听小骨，这是人身上最小的骨头。它们连接在鼓膜及耳蜗上。耳蜗里藏着专管听声音的神经末梢。这三块听小骨跟鼓膜一样，有传送声音和扩大声音的作用。平时我们耳朵能听到声音，就是通过耳廓将声音（振动的波）收进来，先震动鼓膜，再由鼓膜后面的听小骨传到耳蜗；耳

蜗再通过听神经报告“人体的司令部”——大脑，人就听到了声音。

如果我们事先没有准备，耳朵突然受到强声的刺激，象炸弹的爆炸声、意外事故的爆裂声等，就会发生耳内出血、鼓膜破裂或耳聋。这是因为三块听小骨总重量还不到50 毫克重，它们非常精致细巧，鼓膜稍有震动，它们也跟着震动。这样细巧的东西，当然经不起强声波的冲击。我们平时讲话的音强约为 50 分贝，响雷可达 120 分贝，而炸弹爆炸声更厉害。声音过大，把鼓膜或听小骨震破或震伤，人的听力就会减弱。如果强声把耳蜗里听神经震坏，那么就会发生耳聋。

所以，当我们知道附近有强声要发生，就应该事先用手捂住耳朵或用耳塞加以保护，同时立即张开嘴巴，耳朵就不会被强声所伤害。张嘴有什么好处呢？在鼓室里的前下方，有一根细而长的管子，直通鼻腔的后方，叫“咽鼓管”。张开嘴巴，使咽鼓管畅通，声波一面由耳朵窟窿进去，冲向鼓膜的正面；另一面还由鼻子通过咽鼓管，冲向鼓室，这样使鼓室内的气压与外界的气压相等，才不会使鼓膜和听小管受到伤害。（吴顺德）

为什么不要随便挖鼻孔？

有些人欢喜用手指头挖鼻孔，这是一种很不卫生的坏习惯。

你以为鼻孔就只是外面看到的那两个小洞洞眼吗？不，不是的，在那小洞洞眼的后面，还隐藏着一个宽敞的“庭院”——鼻腔呢！



鼻腔里有许多又粗又长的鼻毛，从鼻孔里进进出出的“旅客”都要经过它的检查，有些居心不良的“坏分子”——灰尘还未进到鼻腔就被扣下。鼻毛，就是这样不分昼夜地守卫着这两扇重要的大门——鼻孔，保卫着你的健康。用手指挖鼻孔，容易引起鼻毛脱落，使之失去保护作用。

鼻腔表面覆盖着一层又薄又嫩的粘膜——鼻粘膜，别看它娇嫩，可是并不软弱，如果“触犯”它时，就会分泌出大量象粘液又象脓液的分泌物，让你拖上两条长长的鼻涕，十分难看。

鼻腔粘膜的血液供应非常丰富，分布在上面的小血管纵横交错象河流，最后都向脑子里面汇合。

有许多人常流鼻血，就和挖鼻孔的坏习惯大有关系。鼻粘膜上的血管非常多而管壁又十分薄，碰碰会引起鼻子流血，有时鼻血白天不流，却偷偷地在夜里流，当你一觉醒来时，枕边早已流了殷红的一片鲜血。欢喜挖鼻孔的人常会引起鼻粘膜发炎化脓。

既然挖鼻孔有这么许多坏处，所以鼻孔不要随便去挖。（倪连）

为什么患鼻炎的人辨不出香臭？

在解答这个问题之前，我们先应该了解一下人的鼻子为什么能闻到气味。

鼻子要能闻到气味，必须具备两个条件：第一，嗅觉神经必须是好的；第二，带有气味的空气，必须能够进入鼻内与嗅神经的末梢接触。这两个条件缺少了任何一个，就闻不到气味，两个条件中任何一个条件不够理想，嗅觉就会差一些。

鼻炎，就是鼻子里的粘膜发炎。嗅神经是分布在鼻腔上部的粘膜里的，当粘膜发炎的时候，嗅神经就要受到一

定的影响。

其次，患鼻炎的人有一个很主要的症状，那就是由于粘膜的肿胀而产生的鼻塞。鼻塞就是鼻子不通气，空气既然不能进去，那么空气中的气味，当然也就不能进到鼻子里去，因而不能被闻到。而且，由于鼻腔呈一个上窄下宽的锥体形，鼻粘膜较轻度的肿胀时，鼻腔上部就已经闭塞了。前面已经提到，嗅神经是分布在鼻腔上部的粘膜里，鼻腔上部闭塞时，空气就无法与嗅神经末梢接触。所以，即使鼻子只有部分阻塞时，也会有嗅觉减退或嗅觉丧失的可能。（余孝基）

为什么有的人鼻子容易出血？

正常的鼻子不应该出血。鼻子容易出血可能是鼻子本身有毛病，也可能是由其他因素引起的。

从鼻子本身来说，使它常常出血的主要原因有以下几种：

一、外伤——跌伤、碰伤会使鼻子内的小血管破裂而出血。比如经常喜欢用手指挖鼻子，损伤了小血管就会出鼻血。

二、鼻中的血管过于丰富，这些血管又位在很浅的表

面，容易由于干燥而破裂出血。



三、鼻子有病，象鼻粘膜的急、慢性炎症，由于鼻粘膜破裂而流血。

鼻子容易出血也可能是其他疾病引起的，其中最常见的是：

一、急性传染病——伤寒、猩红热、回归热、黑热病等等，在病程中，由于身体发高热使鼻粘膜充血，很容易一碰就流血。

二、血液病——白血病及其它血液病等患者，由于血液不易凝固，会经常出鼻血。

三、维生素缺乏症——主要是缺乏维生素 C，使细胞间质的合成发生障碍，毛细血管的通透性增强、脆性加大，以致轻微的擦伤和压伤就会引起毛细血管破裂出血。

此外，患高血压的人，经常咳嗽、打喷嚏的人也容易出鼻血，因为咳嗽、打喷嚏时会使血压急速上升。（盛丹菁）

为什么伤风时鼻子不容易通气？

鼻子不通气不一定是伤风，伤风时多半鼻子不通气。伤风一年四季都可能发生，特别是在冬末春初当气候冷热

多变的时候。

伤风就是感冒，是一种滤过性病毒引起的传染病。它的主要病变部位在上呼吸道。所谓上呼吸道是由上而下包括鼻子、咽喉、气管各部分，是气体出入的必经道路。伤风时最先受到影响的总是呼吸道的第一关——鼻子。

鼻子正象一间前后没门的屋子，当中有块隔板把它分成了左右两小间，每间的侧壁上又挂着三块卷曲的鼻甲。这个房间统称为鼻腔，前面通向外界——就是鼻孔，后面通向咽部——它是鼻子和口腔后方的空腔，是呼吸和吞咽合用的一条交通要道。鼻孔里面，也就是鼻腔外端，排列着许多鼻毛。鼻腔表面则铺有一层具有纤毛的、毛细血管极其丰富的粘膜。鼻腔粘膜经常分泌出少量粘液——就是鼻涕。

伤风时，鼻粘膜发炎，它的毛细血管扩张、组织肿胀、分泌物增多使气体出入受到了障碍，鼻子当然不容易通气了。正象个本来就不大的房间，你把它的四周墙壁加厚加宽，又放满了东西，不是就不能走路了吗？　　（盛丹菁）

为什么气管里不能停留异物？


我们知道，口腔和口咽部虽然都是食物和空气的过

道，但是还分为两条途径。空气由鼻腔进入，经过鼻咽部、口咽部、喉咽部、气管进入肺部。食物由口腔进入，经过口咽部、喉咽部、食管、胃进入肠。

呼吸道是空气进出独一无二的呼吸通路，一旦呼吸通路被阻塞，就要影响呼吸功能，轻的引起下呼吸道炎症，严重的可引起窒息，危及生命。所以气管里容不得别的东西存在。我们一旦遇到异物进入气管就要及时治疗。



一般呼吸道异物大多数是从口腔误吸入的。尤其是 4 ～ 5 岁以下的小儿最为多见，譬如，这些小孩在吃东西的时候，哭、笑、叫、吵，同时又要吸气，口中的食物就容易被吸到下呼吸道内，成为呼吸道异物。



被吸进的异物，最常见的有西瓜子、花生米、黄豆、蚕豆、向日葵子等。有时也可以遇到小珠子、钮扣、图画钉等和一些儿童的小玩具。

吸入异物，根据位置不同可出现不同表现：一般是喉部异物最为危险，因为喉是呼吸道的门户，一旦被异物堵住，马上会出现呼吸困难，引起窒息。另一种是气管异物，主要为阵发性咳嗽和呼吸困难。再有的是支气管异物，可

以堵塞支气管，如果完全堵塞支气管时，可发生肺不张，后果也十分危险。

一旦发现有明确的异物吸入，并出现阵发性咳嗽及呼吸困难，脸色青紫，就应该立即去医院诊治，采取紧急措施，迅速取出异物。

呼吸道异物的病例，大多数可以在异物取出后迅速痊愈。但如不及时治疗，也可在短时间内因窒息而致死。所以呼吸道异物应引起重视，平时应加强预防工作：

当小孩口中含有食物时，不要引他们哭、笑、吵。

要教育小孩，不要把小玩具放到嘴里去，也不要给 3 ～ 4 岁以下的小孩吃花生、豆类、瓜子之类的东西，以免吸入呼吸道。（朱家珠）

鲠了鱼刺怎么办？


吃饭的时候最好不要讲话，因为边吃边讲往往会打扰正常的咀嚼动作。如果吃鱼，一不小心，鱼刺就会鲠〔gěng〕住。

鲠了鱼刺怎么办？不少人习惯用大口吞咽饭团的方法将鱼刺带下。实际上这个方法是很危险的，因为盲目吞咽饭团容易将鱼刺越鲠越深，不仅取出困难，而且一旦鲠在

食管里，感染后容易引起食管穿孔，可造成相当严重的后果。因此鲠了鱼刺应当及早钳出，不要乱吞饭团。



鱼刺最容易刺在扁桃体上，张大口就能看到的，可以用镊子取出；如果鲠在舌根部、会厌周围，自己往往不容易看到，应该请医生用异物钳钳取；要是鲠在食管里，医生也不能看到的，得使用 X 射线透视检查，它的方法是让检查者吞服一口不透光的带有少许棉絮的钡剂，当钡剂流过鱼刺时，其中钡絮就被鱼刺钩住了，于是在 X 射线机荧光屏上就显示出潴留的钡絮，鱼刺的部位相应地就被确定，医生就可以在食管镜下钳取鱼刺。



民间流传着吃米醋或用单方威灵仙来驱除鱼刺，在没有食管镜等设备时，也是可以试用的一种方法，但须慎用。

总之，鲠了鱼刺，自己不能取出时，还是应该及早请医生处理为好。（薛林英）


为什么有的人牙齿不整齐？

张开嘴巴，首先让人看见的就是牙齿。有人牙齿长得整齐美观，有人牙齿却前后歪斜，相当难看。即使一母所生，兄弟姊妹的牙齿也都不同，有的整齐，有的不整齐。难道说是妈妈偏心吗？没这个话，多半是你自己不好。

根据生长的时间来说，牙齿有乳牙和恒牙两种。当我们还在妈妈肚子里的时候，乳牙就已经发育完全了。当婴儿出世不过六个月左右，它们就开始向外长。乳牙大都是整整齐齐的，除非你母亲在怀孕的时候患有重病、营养不良或者你出世时不太顺利，面部受到损伤因而影响了你上下颌骨的发育，才会使它们排列不整齐。乳牙到一定年龄就要脱落，换上的新牙称为恒牙。恒牙因为是在我们出生以后才开始发育的，所以它们的排列非常容易由于各种因素的影响而不整齐。哪些是使恒牙排列不整齐的因素呢？

一、吮手指——不少孩子有吮手指头的坏习惯。一发现这种坏习惯及时纠正还不要紧，日子一久就会把上颌前面的几个牙齿往外推而造成上前牙突出的畸形。啃指甲、

咬笔杆等等相类似的动作都能引起同样的后果。



二、咬下唇——经常咬下嘴唇非常不好。这么做不但能使上颌前牙往前突出，还会使下颌前牙向后退缩。严重的甚至上下牙齿碰不到一起而不能咬合。

三、咬舌头——小孩子刚学说话，常常会把舌头放在上、下牙齿中间来发音。久而久之，由于舌头的经常向前推动，就可能把前面的那些牙齿推得突出来。这样，牙齿还会排得整齐吗?

四、口呼吸——用鼻子呼吸是正常的，用嘴巴呼吸是不正常的。当我们的鼻子通气不畅时，就会自然而然地改用口呼吸。用嘴巴呼吸，牙齿容易受到舌和唇的压迫，并且由于通过口腔的大气压力的改变能使上腭逐渐长得又高又窄。上腭一变形，牙齿也就排不整齐了。

五、睡眠姿势不好——有的小朋友喜欢用手或拳头枕在一边脸颊下面睡觉，或者合仆睡，把下巴压在枕头上，长大了牙齿的排列常常不整齐。因为，长期受压迫的上颌骨或者下颌骨的发育受到了障碍。颌骨发育不良，长在它上面的牙齿必然受影响，而不能整整齐齐地生长出来。

六、额外的牙齿——恒牙照理说只有 32 个，但是有些人由于发育的异常，会比一般人多长出一个或几个牙齿。这些额外的牙齿既然长了出来，当然要占位置。原来只能容纳 32 个牙齿的地位，现在要多安插一二个，那么就前后重迭不齐了。

七、乳牙脱落过早或过迟——乳牙脱落过早，接替它位置的恒牙还没来得及长出来，留了个空隙，邻近的牙齿就会向空隙处倾斜和移动，使空隙变成狭窄，恒牙不能在正常位置萌出而造成排列不齐。乳牙到期不脱落，不肯让位给它下面的恒牙，恒牙却不管它上面的乳牙让不让位，仍然坚持要长出来，往上顶不出，就往前后左右乱钻，这么彼此不肯相让，说什么牙齿也不会排列得象样。

八、镶配不及时——儿童时期都爱吃糖。多吃了糖，又不注意刷牙漱口，牙齿就容易蛀。要是蛀得厉害，那就非拔不可。恒牙拔了就该趁早镶配，否则邻近的牙齿就会往空隙处倾斜与移动。结果当然是牙缝稀疏而彼此排不整齐。

由此可见，牙齿所以会排列不整齐，多半是我们自己不注意的结果。因此，我们每个人可以检查一下是否有咬笔杆、咬下嘴唇、合仆睡等不良习惯，如果有的话，应该立刻纠正。


（盛丹菁）

为什么牙齿长歪了可以扳正？

有些人的牙齿洁白、整齐，不仅生理功能好，而且惹人爱；但有的人牙齿却长得歪歪斜斜。于是，去请求口腔科医生替他扳正。经过检查后，医生认为可以矫正，并替他做了一副矫正器戴在嘴里。不到半年，牙齿果然按照人的意志进入正常的位置上来了。

牙齿长歪了为什么可以扳正呢？原来，牙齿长在牙槽骨里，而牙槽骨与全身的骨组织一样，它具有一种生理反应。骨组织受压迫的一面，破骨细胞特别活跃，骨组织不断被吸收；而被牵引的一面，造骨细胞特别活跃，骨组织不断增生。医生利用了骨组织生理上的特殊性，给患者纠正位置不正的牙齿。嘴里戴一副矫正器可以使某一个或几个牙齿受到牵引或推力，牙齿随着根部的骨组织增生或吸收，不断地变换位置，使牙齿移动到正常的位置上。但是，矫正器加在牙齿上的力量是极微的，加力过大可以使骨组织受到破坏，造成牙齿松动。而且，骨组织的增生与吸收的速度是极其缓慢的，所以，要矫正一只牙齿常常要经过三个月到半年时间，长的要超过半年。牙齿的移动象钟上

的时针一样，粗看上去是一动不动的，而实际上却在不断移动，只是肉眼看不见罢了。



上面所讲的这种方法，医学上叫作畸牙矫正。矫正的年龄，最好在 12 ～ 16 岁，年龄稍大一些也可以矫正，但较年幼者要困难些。畸牙矫正的意义不仅是使某一只或几只位置不正的牙齿得到纠正，而更大的意义是帮助口腔组织克服种种障碍，从而获得正常的生长、发育。

畸牙矫正毕竟是困难的，而更重要的是要防止牙位不正的情况发生。首先，应该保护好乳牙，乳牙有病应该及时治疗，使乳牙保存到接近恒牙长出的时期，促使乳、恒牙正常交换。其次，儿童在换牙以前应多吃一些耐嚼的食物，促使颌骨正常地发育，等到换牙时，才有可能使较大的新生恒牙容纳下来，整齐地排列在牙槽脊上。

牙齿排列整齐，不仅好看，而且可以少患牙病，相反，牙齿长歪了，就会多患牙病。因此，我们人人应该争取嘴里有一副整齐、健康的牙齿，更好地发挥它的生理功能。

（赵明森）

为什么牙齿蛀了要补？

牙齿，刚长出的时候都是好好的，而不知什么时候出现了小洞洞，吃冷、热、甜、酸的食物感到不舒适，有时感到疼痛。医生说，这是蛀牙，要赶快补。好好的牙齿为什么会蛀呢？蛀牙为什么要补？


蛀牙容易使人误解成“蛀虫蛀牙”。事实上，在蛀牙形成的过程中，根本没有蛀虫。因此，蛀牙这个名称是不科学的，医学上称它为龋〔qǔ〕齿。蛀牙的病因很复杂，至今尚未完全弄清楚。有些科学家认为，蛀牙的发生主要是由于牙齿本身的缺陷和外来的致病原两大方面。正常的牙齿也存在沟沟凹凹，这些沟沟凹凹容易潜藏细菌及食物碎屑，因此，这些部位容易发生蛀牙。如果牙釉质钙化不良，就更容易发生蛀牙。外来的致病原是指口腔里的致病菌，尤其是变型链球菌和乳酸杆菌，它们依靠淀粉及糖类食物生存，并且在新陈代谢过程中不断地产生乳酸。这种乳酸可以使牙齿脱钙形成蛀洞。

那么，牙齿蛀了为什么要补呢？

我们只要好好地了解一下蛀牙的发展过程，对这一问

题就一清二楚了。蛀牙的初期，只是一个小黑点，当然也有棕褐色的。经过一段时间，这个小黑点随即变成小洞，并不断扩展成大洞。到最后，整个牙冠被腐蚀，只剩下牙根。这样，一只牙齿全完了。而且，在发病的过程中，常常伴有疼痛或化脓肿胀。假如在蛀牙发生的初期能够及时补好，那么，就不至于发展到不可收拾的地步了。

补牙怎么能治好蛀牙呢？有些人去过医院，而且看到过口腔科医生用一架电钻在病人的牙齿上钻窟窿，这就是补牙的第一步。钻齿的目的是将蛀坏了的组织磨去，并且钻成一个合乎补牙要求的洞型，再用药物进行消毒，最后用一种补牙材料充填到洞里去，并且按照牙齿的外形雕刻，使牙体形态恢复原状。



一般常用的补牙材料是银汞合金，它是由银合金粉和水银合成的。因为它是一种金属，所以也具有一般金属的特性。银汞合金坚硬耐磨、传导性能强。前者是优点，后者是缺点。如果充填物太大时，一遇到冷、热刺激就传导


到牙齿里面去，使牙齿感到酸痛或胀痛。因此，深洞充填时，还要用一种能够隔绝传导的粘固粉衬底，才能免除这种缺点。

目前，补牙是治疗蛀牙的有效方法之一。经过补牙，不仅可以制止蛀牙的发展，而且可以恢复牙齿的正常生理功能。所以，患了蛀牙一定要补好，而且补得越早越好。（赵明森）

为什么乳牙坏了也要医治？

常常有人这样说：“孩子的乳牙反正是要换的，坏了又何必医治呢?”

是的，乳牙是要被恒牙代替而脱换的，可是为什么又要医治呢？这究竟是什么道理呢?



原来，乳牙和恒牙的交替是根据一定的年龄，陆陆续续挨次脱换的。一般在六七岁时便开始自门牙到磨牙（臼齿），一个个挨次序与恒牙交替，直到十二岁左右才换齐。由此看来，乳牙虽然要脱换，但它们毕竟是儿童时期咀嚼食物的工具，

要担负整整十年的咀嚼任务呢！特别是八只乳磨牙（小孩臼齿），咀嚼功能最大，脱换最迟；如果有病不治，孩子怕痛，吃东西不敢细嚼，大块食物吞咽到胃里去，消化起来比较困难，这就影响了营养的吸收。

况且，乳牙有病，也会影响恒牙的生长，如牙齿因蛀蚀化脓，虽经医治，无法保留，不得不过早拔除，或者病牙因失去自然脱落的机能，虽已到交换期也不肯让位给恒牙等，都会使恒牙不能依正常的方向和地位萌出，却从侧位歪着长出来，而发生排列不齐。牙齿长得不整齐，不仅影响咀嚼功能，并且容易发生牙病。

孩子在六岁左右，开始在乳磨牙的后面长出第一个恒牙（又称六岁牙），上、下、左、右各一只。这四只第一恒磨牙在全口牙齿的功能上和发育上占着极重要的地位。可是，因为它们是在儿童时期生长的，往往容易被错认为是乳牙而忽视过去。

此外，孩子上下颌骨的发育，一方面依赖身体内部的生长激素，另一方面依赖着牙齿咀嚼食物所给予的刺激。而且，后者是一个极其重要的因素。正常的牙齿，就有良好的咀嚼功能。良好的咀嚼功能，又可刺激颌骨的正常发育。相反，乳牙过早毁坏或脱落，造成咀嚼功能减退，颌骨的发育自然也会受到影响。

乳牙是儿童时期的咀嚼工具，和儿童的生长发育有密

切关系，又直接影响恒牙的健康，因此，我们不能小看乳牙。孩子从小就要养成刷牙的习惯，注意口腔卫生，减少牙病的发生。乳牙有了病，也要积极医治。　　（邱志芳）

为什么临睡前吃糖果、饼干容易生蛀牙？





每个人的口味不同，有的人喜欢吃甜，有的人喜欢吃咸。不过小孩子特别喜欢吃甜东西，尤其是吃糖。

糖是碳水化合物，摄入身体以后能产生热量，供肌肉活动时作燃料。1 克糖（生物化学上所说的糖，包括淀粉酵解成的和纯糖）可以产生 4 卡热量。所以，适量吃糖对身体是有益的。

那么，为什么说临睡前吃糖果或饼干就容易生蛀牙呢?

因为糖和饼干都是碳水化合物，恰恰也是口腔里的变型链球菌和乳酸杆菌等细菌所必需的养料，这类细菌利用粘性的糖组成一种菌斑，粘在牙缝和牙面的凹沟里。这些细菌在菌斑内依靠了糖生存、繁殖，而且在新陈代谢的过程中，还不断地产生乳酸。乳酸是腐蚀牙齿的能手，使很

硬的牙齿脱钙软化，形成蛀洞。如果不信，你可以做一个实验，用一只蛋或蛋壳放在醋里浸泡两天，蛋壳就会变软，这是同样的道理。


白天吃糖问题还不太严重，因为唾液不断地分泌，可以使牙齿上的糖分冲淡，吃饭时一些粗糙耐嚼的食物有一定的摩擦作用，可擦掉牙面上的菌斑。另外，刷牙、漱口也可以清除一些菌斑。但是晚上情况就不同了，当你睡着的时候，唾液分泌减少了，东西也不吃了，牙也不刷了，这些菌膜就可以粘在牙面上。所以说，临睡前吃糖或饼干都容易生蛀牙。（赵明森）




为什么晚上也要刷牙？


有些人在起床以后，往往会感到嘴里发腻、发臭，这是什么道理呢？原来，前一天吃了不少东西，有甜的、咸的、酸的、辣的，在牙缝里和牙面上存留不少食物碎屑。口腔里的细菌可以使食物碎屑腐败、发酵，这样，当你一觉睡醒，嘴里就发腻、发臭了。不仅如此，当你睡着的时候，口腔活动几乎停止了，唾液的分泌也减少了，口腔失去了自洁作用，细菌也乘机繁殖。久而久之，即可发生蛀

牙、牙龈炎。这样一说，为什么晚上也要刷牙，就不难理解了。





很多人已经养成早晨刷牙的习惯，好象早晨不刷牙就不能吃早点，但晚上刷牙的人还不够普遍，而晚上刷牙却又如此重要。再说，晚上的时间比早晨更充裕一些，更有条件将牙齿刷干净。







有的人虽然早晨、晚上都刷牙，但由于刷牙方法不正确，没有达到刷牙的目的。例如不少人采用横刷的方法，左右横着推拉，虽然可能将牙齿表面刷干净了，但牙缝里仍嵌着不少食物碎屑。而且横刷可以使牙龈受到创伤，牙齿受到磨损。









正确的刷牙方法是顺着牙缝上下刷，刷上牙时从上往下刷，刷下牙时从下往上刷，里外都要仔细刷干净。另有一种刷牙法，叫短横刷法，与上面说的一般横刷法有所不同。一般横刷法牙刷毛在牙面上刷的动幅度较大（约几厘米），而短横刷法则幅度很小（约 3 毫

米以内）。刷牙时好象颤动一般，不仅能刷净牙面，而且又不损伤牙齿和牙龈。使用的牙刷以牙刷头小、牙刷毛稍软且有韧性为最佳。（赵明森）


为什么生花斑牙的人不容易生蛀牙？

居住在我国云南、贵州、山西、陕西、河南等地区的人，有不少生花斑牙的。更重要的是，生了这种花斑牙以后，就不容易生蛀牙。根据很多科学家的调查，生花斑牙的蛀牙发病率远较正常牙低。奇怪！好好的牙齿容易生蛀牙，相反，那些花斑牙倒不容易生蛀牙。为了揭开这个谜底，我们先来研究一下花斑牙的来历。

花斑牙，医学上称它为“氟斑牙”。“氟斑牙”的意思是指牙齿的牙釉质层有很多棕色的斑迹，粗看上去象小花点，所以有人叫它“花斑牙”。怎么会生这种牙齿的呢？原来，这些地区的饮水中含氟的矿物质成分较高，科学家将这些地区称为“高氟地区”。过多的氟分子可以影响牙齿的结构，甚至使牙齿变色。只要从小在这些地区长大的，他们就有可能生花斑牙。

为什么生花斑牙的人不容易生蛀牙呢？一些科学工作者对这个问题进行了反复的研究，总算有了一些眉目。原

来，花斑牙的牙釉质中含的氟分子高于一般正常牙齿。有的人认为：这种氟具有抗菌、抗酸、抗酶的作用。因此，生了花斑牙就有不同程度的抗蛀作用。那么，是不是生花斑牙越严重越不容易生蛀牙呢？那也不是的。如果含氟量过高，牙釉质在发育期间遭到严重影响，这种牙齿的结构疏松，也难免生蛀牙。



这个发现，对预防蛀牙方面开辟了广阔的途径。目前，已将某些氟化物用于“低氟地区”预防蛀牙，而且证实了氟化钠、氟化亚锡等药物都具有降低蛀牙发生率的效果。与此同时，受到“氟斑牙”的启发，在其他防蛀药物的研究上，也有很大的发展。例如，有些地区在自来水中加氟，人们饮用含氟的水，同样产生效果。但氟的含量很微，仅 0.8 ～ 1 P.P.M.（P.P.M. 为百万分之），如果含氟量过高，则对人体有害。（赵明森）

为什么有的人吃了冷的、热的东西，牙齿会酸痛？



牙齿是咀嚼食物的工具，但有的人吃东西非常挑剔。冷的、热的不能吃，甚至连甜的、酸的也不能吃，一吃就感到酸痛。难道牙齿出了毛病吗?

牙齿是一个活体组织，它有许多神经感受器。如果牙齿出了毛病或受到外界的刺激，这些感受器就会报告大脑，牙齿就有了酸痛、疼痛的感觉了。

正常的牙齿遇到暴热、暴冷也会有不适的感觉。比如你刚喝了一杯热茶，马上就吃一根棒冰，这时，你的牙齿就感到胀痛。甚至可能要不舒服一阵子，才慢慢好起来。



但有的人吃一般冷、热、甜、酸的食物，就会感到酸痛或疼痛。这种情况，多半是牙齿出了毛病。那么，患哪一些牙病时，遇到冷、热、甜、酸的刺激，就会感到酸痛或疼痛呢?

一、牙周组织萎缩：在正常的情况下，牙根部分埋藏在牙槽骨里，外面覆盖了一层牙龈组织。但一旦牙槽骨和牙龈萎缩以后，牙根就露出来了。这样，一遇到冷热刺激就酸痛，尤其是对冷刺激极为敏感。

假如，牙齿外面一层釉质磨损以后，牙本质就露出来了。这样，一遇到冷的、酸的刺激就感到酸痛。甚至咀嚼稍硬一些的食物，也会感到酸痛。

二、蛀牙：蛀牙的早期，可能没有什么变化，但蛀洞形成和扩大以后，一遇到刺激就会感到酸痛，尤其是对冷的、热的、甜的较为敏感。甚至食物嵌入蛀洞时，也感到疼痛。

三、其他如牙齿外伤、折断或折裂都可以使牙齿特别敏感。一遇到外界的刺激就感到酸痛或疼痛。

如果我们在吃冷、热、甜、酸食物时牙齿感到酸痛或疼痛，决不是没有原因的。需要请医生检查一下，看看存在什么牙病没有。（赵明森）

为什么有的人刷牙时牙龈会出血？

有人害怕刷牙，原因是一经刷牙，牙龈就要出血。为什么有些人刷牙很好，而有些人刷牙时牙龈会出血呢?



刷牙时牙龈流血的原因很多。

有些人由于使用的牙刷头过大、牙刷毛过硬或刷牙方法不正确，可以使牙龈遭受创伤。尤其是采用横刷法的人，刷牙时将牙龈刷破了，通红的鲜血就从牙龈里流出来了。当然，如果用保健牙刷代替过大、过硬的牙刷，用顺着牙缝上下刷的方法来代替横刷法，牙龈就可能不出血了。

牙齿上堆积了很多牙石的人，刷牙时牙龈容易出血。为什么呢？原来，牙石硬如石头，有的牙石深入到牙龈缝里面。当你刷牙的时候，牙刷毛碰到牙龈，而迫使牙龈和牙石摩擦。这样一来，毛细血管丰富的柔软的牙龈，被挤压、摩擦，以致破裂，血就流出来了。而且，有牙石的人，牙龈或多或少有些发炎，所以更容易出血。有牙石的人，只要去掉牙石，刷牙时就可能不出血了。

有些人由于牙龈发炎，牙龈组织充血、水肿，只要轻轻碰一下就会出血。最严重的是坏死性牙龈炎，不碰它也会出血，甚至晚上在枕头上流下一摊血水。当然，患有上述两种病的人，一刷牙就出血。

也有极少数人由于身体里缺乏维生素 C，包括在牙龈内的毛细血管壁变薄，使血细胞容易渗出。所以刷牙时轻轻碰一下，血就流出来了，甚至说话时也会出血。

极少数人患有血友病、紫癜病等血液病，也常常牙龈出血。轻轻地刷牙也可以流很多血。


当然，每个人刷牙时牙龈出血的原因不全相同，有的是由于这个原因，有的是由于那个原因，也有的是由于几个原因的巧合所致。所以，刷牙时牙龈经常出血的人，可以请口腔科医生检查一下，详细地分析原因。（赵明森）

为什么有人牙痛时脸会肿？

往往有些人牙痛了两三天，一晚睡起，脸肿起来了。为什么有人牙痛起来脸会肿呢？只要我们好好研究一下引起牙痛的原因是什么，研究一下牙病的发展过程，对这个问题就会有所了解。

首先，研究一下蛀牙的发展过程。蛀牙开始只在牙齿上出现一个或数个洞洞，而到了后期，细菌侵入牙齿中心——牙髓腔，使牙髓腔里的神经、血管及其他一些软组织发炎、化脓。这时候往往牙痛大发作，常常吃止痛药也不顶事。牙髓腔里的细菌再往下，就出了根尖孔，并在根尖周围的骨组织中蔓延、扩散，以致牙槽骨发炎，形成牙槽脓肿，脸也肿了。这样，从一个牙齿的疾病，并发了牙槽脓肿和脸颊部的软组织感染，是好了呢，还是发展、恶化

了呢？不说也明白了。



再说牙周病的发展过程。牙周病是指牙齿周围组织发生了病变，而牙齿本身可能是好好的。医学上所指的牙周组织是包括：牙龈、牙周膜和牙槽骨。牙周病初期可能只是局部牙周组织发炎，一旦波及整个牙周组织时，疼痛难忍，牙齿不能合拢。如果炎症得不到控制，继续扩散，可以形成牙周脓肿，甚至波及脸颊部的肌肉等组织，脸就肿起来了。

还有，常见的智齿周围炎，也可以引起脸肿。由于智齿周围常覆盖一些龈瓣，而且该牙紧靠着牙槽弓的末端，周围都是软组织，所以，智齿一经发炎，周围的软组织极容易受到细菌及其毒素的侵袭，脸就更容易肿。

牙痛，对大脑来说，是敲起一声警钟，也就是告诉大脑，牙齿病了。这时候，应该请医生诊察一下，看看究竟是哪一个牙齿生了病，生的是什么病。如果任其发展，牙痛以后，接踵而来的可能就是脸肿，不能不引起注

意。（赵明森）

为什么有的人牙齿焦黄？

有些人牙齿洁白有光，而有些人却是一片焦黄。

牙齿，在我们嘴里可以看到的部分叫“牙冠”，是用两种组织构成的。牙冠的外面一层是釉质，即人们常说的“珐琅质”，这层组织是半透明乳白色的，质地非常坚硬。第二层是牙本质，有人称它为象牙质，它的颜色是浅黄色的，质地较釉质软。浅黄的牙本质透过半透明的牙釉质，使牙齿变成白中略带黄色。随着年龄的增长，由于牙釉质的磨耗、牙本质的变深，牙齿可能稍黄一些，其变化不是太大。但有的人牙齿受了某种因素影响，牙齿变成深黄、死灰或焦黄的颜色，这都是不正常的。

有的人由于没有养成口腔卫生习惯，没有经常刷牙、漱口，或刷牙方法不正确，食物碎屑嵌在牙缝里、粘在牙面上，日久后形成污垢，使牙齿发黄。

有的人经常喝浓茶、抽香烟，可以使牙面上附着一层黄色、褐色或黑色等色迹。

居住在山西、贵州等省的人，由于当地的饮水中含氟化物太多，使牙齿上出现黄色或棕黄色的斑纹，人们把它

叫成“花斑牙”，医学上称它为“氟斑牙”。

东南亚的某些国家如印度尼西亚、缅甸、马来亚、印度等国内的某些居民，常常咀嚼槟榔之类的果实，使牙齿染上一层褐色的迹。

有的人由于在牙齿发育的幼年时期生过某种疾病，或服过多的四环素类药物，从而影响了牙齿的发育，造成釉质的厚度分布不匀，使牙本质的颜色很容易透出来，牙齿颜色变得更黄。

牙齿受外伤，根尖区营养血管断裂，将使牙齿坏死，而牙齿的颜色可转变成死灰或死褐色。

如果牙齿患了蛀牙以后，也会变成黄色、棕黄、灰色及黑色。

由此看来，造成牙齿颜色异常的原因很多，但不外乎发育上的问题，口腔卫生习惯不好，以及某些牙病造成等几个方面。

在引起牙齿变色的各种因素中，有的因素主观上可以克服，如由于口腔不卫生引起的污迹，只要坚持每天早晚刷牙，饭后漱口，牙齿就可以转变为白；有的因素主观上不易克服，如花斑牙，必须依靠医学的发展，才有可能得到改变。


因此，解决牙齿变色的问题，应该去请教口腔科医师。

（赵明森）


为什么牙齿会松动？

牙齿是个活体组织，它是从牙槽骨里长出来的。牙齿怎么会长牢的呢？原来，牙根的周围有牙床骨紧紧地将它围住，而且牙根和牙床骨之间有无数纤维，从各个不同方向将牙齿拉住。这种纤维在医学上被称为牙周膜（也有称谓牙周韧带），牙齿就是依靠牙周膜被固定在牙槽骨里。但牙齿有一种生理性的动度——牙齿在牙槽骨里正常范围内的移动，这是因为包绕在牙根周围的牙周膜富有弹性的缘故。这种移动常常在咀嚼食物的时候才出现，移动的情形微小得连肉眼都不易察觉。我们现在所说的牙齿松动，是指超过这种生理动度，而且肉眼可以看得出来的松动。

那么，牙齿怎么会松动的呢？牙齿松动不外乎外伤及疾病两大类原因。



首先说外伤。超过牙齿所能承受的外力加于牙齿，可以使牙槽骨折断，牙齿和牙槽骨之间的纤维撕裂，甚至牙根本身折断。这样，牙齿失去了固定的力量而松动了。




再说，疾病也可以使牙齿松动。蛀牙的初期或中期不至于使牙齿松动。但到了后期，细菌从蛀洞进入髓腔，又从髓腔到根尖周围。此时，即可发生根尖周围炎或牙槽脓肿，牙槽骨和牙周膜遭受破坏而使牙齿松动。牙周病更可使牙齿松动，因为牙周病就是指牙龈、牙周膜和牙槽骨发生感染、破坏，所以患了牙周病，难免牙齿要松动。

因此，要使牙齿不松动，最好的办法是保护好牙齿，首先不要使牙齿遭受创伤，尤其在体育运动时应特别注意保护牙齿。其次，必须防止蛀牙和牙周病的发生，如果已经患了这些病，应及早治好它。（赵明森）

为什么用牙签剔牙不好？



剔牙是个很坏的习惯。要知道我们的牙齿本来排列得很整齐，牙齿与牙齿之间的空隙都被牙槽骨和牙龈组织所充满，所以，一般牙齿排列整齐的人，牙齿之间不存在空隙，除非是牙槽骨和牙龈组织萎缩了才出现空隙。有些人经常用牙签、火柴梗或其他东西剔牙缝，遂使牙缝渐渐变宽，原来牙缝比较宽的人，越剔就越宽。这样，食物就更容易嵌进牙缝里去。



为什么说用牙签剔牙可以使牙缝增宽呢？大家都知道，牙签和火柴梗是木制的，如果我们用显微镜或放大镜去细细观察一下的话，就不难发现牙签或火柴梗上面有数不清纤细的木刺，哪怕精工制作的牙签也不例外。当你拿它来剔牙的时候，这些纤细的木刺随即刺进牙龈组织中去。有时一不小心，牙龈被戳破了，牙签上和口腔里的细菌乘机而入，造成牙龈发炎、肿胀。牙槽骨和牙龈经常受外伤或发炎，可以导致牙周组织萎缩，使牙缝增宽。再说，经常用牙签剔牙缝，一种外加的力量可以使接触紧密的牙齿逐渐分离。牙缝增宽后，不仅可以嵌塞食物，而且容易发生蛀牙、牙周病。照此看来，用牙签剔牙坏处很多，而好处却一点也没有，所以口腔科医生常常劝导人们不要用牙签剔牙。

如果遇到食物嵌入牙缝时，不剔牙用什么办法来解决呢？漱口是一种简单易行的办法。只要你含上半口水，用两颊部的肌肉不断鼓动口里的水，用水的冲击力使牙缝里的食物出来。再不然就用刷牙的方法，可以用牙刷毛的尖端紧贴着牙缝，顺着牙缝上下刷，食物自然就掉下来了。如果还不行，可用一根棉线小心地嵌进牙缝上下通一下，食物就掉下来了。如果这些方法都不行，至多只能用细小

的金属针将嵌入的食物剔出，但必须防止对牙龈组织的损伤。有些食物嵌塞是由牙齿排列和上下接触关系发生变化造成的，这就要请口腔科医生治疗解决。　　（赵明森）

为什么有的人会口臭？




有些人在说话时，口里散发出一股气味，这就是常称的口臭。

为什么会有口臭呢？从口腔局部来看，成年人口臭多半是因患有牙周病，这些人常觉得牙齿摇动、发浮、咀嚼无力，有少量的脓液从牙缝里溢出，这种牙龈和牙槽骨的慢性发炎化脓，就会产生口臭，单靠漱口、刷牙不能完全消除，需要彻底治疗。早期的牙周病，一般经过治疗可以痊愈，如果拖延至晚期，不但治疗困难，有时为了根治，还不得不采取拔牙的办法。

当牙齿有蛀牙时，蛀洞很多，食物碎屑嵌在里面，时间一长，食物残渣腐败发酵，也会产生臭气。这种情况，只要充填好蛀洞，口臭就可消除。

当然，有些人平时不注意口腔卫生，或镶有假牙的人不注意假牙的清洁，嘴里也会有臭味。这种人若能早晚刷

牙，口臭可以消除。



有口臭的小孩，多半是患有溃疡性牙龈炎，俗称“烂牙疳”，当孩子张开口时可以看到牙龈腐烂溃疡，很容易出血，而且唾液增多。这种病，可用药水棉花蘸 1.5% 的双氧水轻轻洗拭患处，再以 0.1% 的高锰酸钾溶液漱口，并涂搽必要的药物即会痊愈。当然，孩子有蛀牙也同样会产生口臭。

此外，某种药物和金属中毒、鼻腔发炎或患有肺结核、肠胃病和糖尿病等全身性疾病的人，在呼吸、讲话时也会散发出一种气味，那就要根据发病的原因进行治疗了。

至于吃了葱、蒜、韭菜等引起的特殊气味，往往会很快自动消失。（邱志芳）

为什么有的婴儿会生“奶癣”？

有些肥胖的婴儿，脸上往往出现很痒的小红点，用手抓破后，有粘糊糊黄橙色的水分渗出来，水干了就结成痂。这种症状，在医学上称为“婴儿湿疹”，南方人俗称“奶癣”，北方人俗称“胎毒”。

其实，奶癣并不都是吃母亲的奶引起的，更不是什么胎里带来的毒气，而是一种过敏性疾病。因为有过敏性体质的婴儿，当吃了、闻到或接触过某些东西，会发生过敏反应，在脸上就表现出湿疹。例如，有的婴儿吃了牛奶或鱼、虾等会发生湿疹，停吃以后，湿疹就好了。有的婴儿闻到油漆、花粉，碰到羊毛、樟脑丸等也可发生。但也有些婴儿很难找到发湿疹的原因，因此在引起湿疹的原因还没有查清楚以前，治疗也就不容易见效。

为什么婴儿患湿疹较多呢?

这是由于婴儿中枢神经系统发育不完善，调节作用不强；当吃了某些食物，或接触到某些东西以后，会刺激体内某些酶系统产生一些组织胺类的活性物质，作用于皮肤感受器，改变其机能和代谢状态。这样在多次反复的刺激作用下，对于皮肤角质层较薄，末端毛细血管丰富，组织液富有较多水分及氯化物的婴儿来说，就非常容易发生渗出性炎性过敏反应。到 1 ～ 2 岁以后，婴儿皮肤结构接近成人，湿疹也就减轻或消失了。

那么，为什么患湿疹的，多数都是胖小儿呢?

因为湿疹的发病，决定于两方面的因素：一是病人的过敏性素质；二是致敏感的因子。在湿疹的发病上，病人的过敏性素质起主要作用。一般肥胖小儿机体反应性强，对某些内在的或外在的致敏感因子具有较高的敏感性。因

此患湿疹的多数都是肥胖的小儿。

小孩得了湿疹，该怎么办呢?

一、应避免各种刺激皮肤的因素，不要用碱性强的肥皂洗脸和洗“奶癣”的地方，穿衣服不宜太紧、太厚，也不要让太阳光直晒着有湿疹的地方。

二、饮食要适宜，不要给婴儿吃得过多或过少，以保持正常消化。要多吃些蔬菜，绿叶蔬菜中含有很多维生素和钙、镁，能降低小孩皮肤的过敏性。同时要忌食辛辣、鱼腥刺激性食物。

三、有了湿疹不要乱用药方，用得不合适，反而加重病情。在发湿疹时期千万不要接种牛痘，不然会发高烧，反应重，湿疹地方还会出牛痘，好了以后留下疤痕。

四、有了湿疹应该先去医院看看，根据医生指导，适当用药，湿疹是可以控制的。


由于湿疹仅侵及表皮层，治愈后也不会有疤痕。

（史锁洪）

为什么有的儿童夏天会生痱子？

每到三伏酷热的季节里，你会发现有些儿童的身上和脸上都是痱子。

痱子，在医学上称为红色粟粒疹，闷热天气里最容易发生，是出汗过多而又排泄不畅，使汗腺开口处皮肤发生了急性炎症的结果。



你注意到痱子的发生规律吗？天气热倒不一定出痱子；当天气又热、又闷、又潮湿，汗珠躲在汗毛孔里象要凝固似地不肯出来，这时汗腺口被汗液泡肿，使排汗不畅，就容易出痱子。穿着柔软、轻松而又宽大的衣服时，就不大容易出痱子，如果衣衫又厚又重，密不透风地裹在身上，那就最容易出痱子。欢喜啼哭的胖娃娃，久病体虚长期卧床的患者，这些人都非常容易出汗，所以也很容易出痱子。

是不是出汗多的人都要生上一身一脸的痱子呢？也不是，事实上即使在最热的天气里，也有很多人从不生痱子。譬如运动员经常在大太阳下进行体育锻炼，他们并不个个都生痱子。出汗，只是生痱子的一个起因，全身健康状况，皮肤抵抗力的强弱，才是决定出痱子的主要因素。

那么，怎样才能保持皮肤健康和增进皮肤的抵抗力呢？

首先，需要定期洗澡，保持皮肤表面的清洁卫生。皮

肤上有成千上万的汗毛孔，这些全是皮肤的“呼吸器”。长久不洗澡，油垢积在毛孔里，就会使皮肤的“呼吸”不畅，难怪隔上一个时间不洗澡，就会觉得浑身不舒服。

此外，多晒阳光和洗冷水澡都可以增强皮肤抵抗力，夏天注意居处凉爽通风，少出汗，衣着柔软轻松，也可以避免生痱子。（倪连）

为什么有的儿童夏天容易生疖子和脓疱病？

疖子和脓疱病，都是指葡萄球菌侵入皮肤引起的皮肤病，夏天比较多，儿童特别容易发生。



皮肤象一件天然的外衣，保护着整个身体。皮肤表面，存在着各式各样的细菌，其中也包括造成疖子或脓疱病的葡萄球菌。皮肤一有破损（不管这一破损小到眼睛无法看出），它就乘机而入，兴风作浪。过去曾经有人计算过全身表面的细菌数，他从浴盆内将一个人全身皮肤上洗下来的细菌加以计算，发现清洁的人只有八千五百万个，而一个不清洁的人可多

到十二亿一千万个，几乎是一与十四之比。难怪人体随时随地有发生疮疖的机会了。

皮肤表面平常是具有酸性反应的，这种酸性有抑制细菌繁殖作用，但是当夏天大量出汗又不及时擦干洗清，汗液就会发生分解，反而成为细菌繁殖的培养基。此外，皮肤表面本来还有分泌多种杀菌物质的本能，如果大量汗液加以冲淡，那么这些杀菌物质就失去作用，分布在全身皮肤表面的大约三百万个汗腺，对这些葡萄球菌来说，好象打开了三百万个大门，随时可以被侵入引起疮疖了。

儿童的皮肤看来特别细嫩红润，这是因为孩子的皮肤不但比较薄，皮下血管丰富，而且表面的角质层也比较薄。角质层是保护皮肤的皮肤，儿童的角质层比成人薄，也就说明儿童皮肤更容易受到擦伤以致有更大的被细菌传染的可能性。

其次，由于儿童不能精确地反映关于冷热意见，衣服只有随家长的意志来穿脱，以致常常穿得太多，弄得一身大汗，这当然增加了生疖子的机会。

另外，儿童的皮肤比较敏感，皮肤上微小的损害，也会发生显著反应，象发生湿疹、荨麻疹、痒症，搔伤时，就容易引起化脓菌的感染。

儿童出了汗，自己不会擦洗，更容易生疖子和脓疱病了。因此，做家长的对于幼年儿童，在夏天特别要注意孩

子的皮肤清洁和适当的冷热，这才是预防疖子和脓疱病的有效办法。（蒋君遐）

为什么有的儿童冬天脸上有一片片白斑？

天气冷了，我们常常发现有的儿童脸部有一片圆形浅白色细屑斑，这种白斑医学上称为“面部单纯糠疹”或“白色糠疹”。

如果你仔细观察，就会发现这一片白斑的形成是经过几个阶段的：起初是淡红色斑，并伴有轻微搔痒，随后痒和红斑消退，形成淡白色斑，表面有细小脱皮。细小皮屑脱落后，留下一片圆形或椭圆形淡白色斑。

为什么脸上会出现一片白斑呢?

原来是这样：正常人的皮肤“基底层”中有一种非常细小的黑色颗粒，医学上称“黑色素”。皮肤颜色的深浅就是由它的数量多少来决定的。它的形成是由一种酪氨酸经过一系列化学变化后造成的。在这过程中，有各种因素起作用，太阳里的紫外线就是一个重要因素。紫外线多，黑色素形成也多，皮肤就变黑。

儿童的皮肤容易被微生物，如霉菌或细菌寄生。这样，在细菌集中的地方，皮肤就好象盖上一层薄膜，紫外线不

容易照射进去，于是黑色素形成减少，脸上就出现一片细屑白斑。

由于夏天空气潮湿，阳光强烈，杀菌力比较强，加上天热出汗多，所以脸上很少出现一片白斑，即使有也变得看不清楚。

脸上有了白斑，用金霉素药膏擦，很快就可以治好。

（孙克锦）

为什么冬天有些人的耳朵和手会生冻疮？

到了冬天，有些人虽然戴手套、穿棉鞋，仍然要生冻疮。也有些人，一点不加保护，并且常常在室外工作，反而不生。



这是为什么?

大家都知道：生冻疮与天气冷有关系。但冬天生冻疮的人究竟是少数，换句话说，多数人在同样冷或更冷的环境里并不生冻疮。这又是为什么?

经验告诉我们：生冻疮的

原因除了天气冷的因素以外，还有一个重要因素，就是和血液循环有密切关系。

身体真正健康的人，象码头工人、运动员等，他们的皮肤黑黝黝，胸背挺直，肌肉发达，胃口好，气力大。他们天天在外面工作，即使冬天，也要在风里、雨里或雪地里活动。天气算得上冷了，但不生冻疮。这是因为他们整天活动，全身血液循环旺盛，血流通畅，裸露着的脸和手等组织营养良好，所以不易得冻疮。

另外有些人，文质彬彬，很少活动。还有些人有贫血、心脏或营养不良的毛病。虽然天气还不太冷，保护得也很好，但也要生冻疮。这是因为这些人整天不活动，血液循环不旺，血流不畅，特别是手背、耳缘，更易产生郁血，引起局部组织坏死，造成冻疮。

身体好的人在一般冬天的气温下是不会生冻疮的。如果遇到特别冷的气候，象摄氏零下二三十度，也要加以保护，不然，也会生冻疮和冻伤。

当皮肤遇冷血管收缩的时候，最好用手按摩，或多活动活动，使血液流动畅快。（秦立模）

为什么会生风疹块？

有的人在吃了一些海味等食物以后，有时会全身突然发生很痒的、略高出正常皮肤的皮疹，有的是鲜红色，有的是淡红色，也有的是灰白色。皮疹有大有小，小的还不到米粒大，大的比手掌还大，每个皮疹保持的时间都不很长，一般不超过 24 小时就消退了。但由于新皮疹相继发生，病程就延长了。如果没有新的皮疹继续发出，那么病很快就会好。这种皮疹，叫做风疹块，在医学上称为“荨麻疹”。



个别的人，在发生皮疹时还有肚子痛、想吐等不舒服的感觉，这是由于肠胃道也发生了象皮肤那样的病变而引起的。如果病变发生在咽喉部，就可能会引起呼吸困难、气急等现象。这时就要及时进行抢救，不然的话就会出现危险。

为什么会得这种病呢？这是因为有的人比较敏感，当一些特殊的物质，如蛋白胨等进入身体以后，身体里就产生一种物质来对抗它。在对抗过程中，身体某些组织、细胞就发生了变化，放出一些特殊物质，它使血管扩大，血清渗到皮肤组织中去。当皮肤中血清含量增多以后，皮肤就鼓起来，这就产生了风疹块。当皮肤中血清被吸收掉，风疹块也就消失了。

平时我们吃一些海味不会发生风疹块。如果过度疲劳或饮酒太多，同时又大量吃鱼吃肉等，这时肠胃道将没有完全消化的蛋白质吸入体内，也是发风疹块的原因之一。

慢性病灶，如慢性阑尾炎、蛀牙以及肠寄生虫病、微生物感染等，都可能是发风疹块的原因。个别的人由于寒冷或炎热的刺激也会发风疹块。

有的人在吃药打针以后也会发风疹块，这是由于药物过敏所引起的，青霉素过敏常常是这种情况，因此必须引起注意。

如果发生了风疹块，就应当详细寻找发病的原因。一时找不出原因，也要按照一般抗过敏的办法进行治疗。苯海拉明或扑尔敏是常用的药物，必要时可试用利血平以及维生素 C 和麻黄素等药物。如果伴有肚子痛等症状，可用阿托品或颠茄酊等治疗。药物所引起的风疹块应立即停止用药，并按药物过敏处理。

增强人的体质，治疗各种病灶，有过敏反应的食物不要再吃，正确使用各种药物，这些是预防风疹块的有效措施。（李长恒）

为什么有些人皮肤沾了漆会发痒？

漆是一种树汁，是我国的一种特产，用途很广，几乎每个家庭都有用漆涂过的用具，如每天用的桌子、椅子和马桶等都是用漆涂过的。由此可见，漆和我们日常生活有着密切的关系。

但是，也有少数人沾上了油漆，或者嗅到它的气味，甚至走路经过漆店门口，皮肤就会红肿起来，有时还会起皱、出水；如果在脸部，眼睛不能张开，既胀又痒，这种情况俗称“漆风”。



还有些人因为每天坐油漆过的马桶接触到漆，在屁股上发生和马桶口一样大小的一圈皮肤损害，俗称“马桶癣”。

严重的时候，不但接触或暴露部位会发炎发痒淌水，而且身体其他部位皮肤也会有这种现象，甚至发烧。以后

如果不小心再碰到漆，还会再发，可能还要重些。

为什么这些人会有这种情况，而大多数人并没有这种现象呢?

有些人搽用一些药膏如青霉素药膏，三磺软膏，清凉油等，或吃了一些药片，皮肤也会发痒。就是说，这些人对漆、对这些药膏或药片不适应，医学上说有过敏现象。有些人吃了鱼虾海鲜，皮肤也要发痒。我们也可以说：这些人对鱼虾海鲜有过敏现象。

避免过敏现象的最好方法，就是不和这些东西接触。如果万一发生了，最好请教医生。（秦立模）

桑毛虫皮炎是怎么回事？

炎热的夜晚，人们在树下乘凉，偶尔有的人在颈部、四肢等裸露部位突然发现一些红色小疙瘩，中心有时可见小水疱，刺痒难忍，常成批发生。有经验的人知道这是发生了桑毛虫皮炎。

桑毛虫又叫桑毒蛾或毒毛虫。它不仅危害桑叶，影响桑叶的产量，还会使家蚕中毒，患黑斑病。它还能危害桃、李、苹果、梨、柿、梅等果树的叶子，以及城乡绿化树木，如柳、杨、榆树等树叶。桑毛虫身上有一种毒毛，接触人

和家畜后，能使人和家畜发生皮炎。人得病后，奇痒难忍，影响睡眠和工作。

桑毛虫一生分卵、幼虫、蛹、成蛾四个时期。成蛾交配后，雌蛾在叶背上产卵，常集在一起呈椭圆或带状的卵块，每个卵块平均有 200 ～ 300 个卵。卵经 4 ～ 7 天化出第一龄灰黑色的幼虫，有点象家蚕，但略小一点；再经 2 ～ 7 天又脱皮成第二龄幼虫，这时全身出现彩色，并有毒毛。幼虫经 5 ～ 7 次脱皮，吐丝结茧化成蛹，茧壳很薄，结在叶背、桠杈附近。蛹经 9 ～ 10 天化出成蛾，长约 15 ～ 18 毫米。雄蛾比雌蛾略小一点。桑毛虫一年能传 3 ～ 4 代。



桑毛虫幼虫经过第二次脱皮后出现毒毛，幼虫长得越大，身上毒毛越多。这种毒毛极小，眼睛看不见。10 根毒毛连接起来，只有 1 毫米长，每条虫体上有 200 ～ 300 万根。毒毛呈箭针形，其中心为空心管道，内含毒液，非常轻，很容易从虫体脱落，随风飘扬。如吹到人体暴露部分，毒毛会很快刺进皮肤，被刺的部位，就会出现绿豆至赤豆大小的红疙瘩，中心可有针头大小的

水疱，皮疹多少不定，有时疏散，有时对称分布。7 ～ 9 月份是桑毛虫的盛发期，流行区环境中毒毛较多，加之天气热，衣服单薄，皮肤的裸露部位多，毒毛吹到皮肤上的机会也多，因此夏天发病较多。

预防桑毛虫皮炎最根本的方法是消灭桑毛虫，可采取诱杀成蛾、摘除卵块、药物喷杀幼虫等措施。另外，桑毛虫的天敌有寄生蜂和寄生蝇两种，保护这些益虫，也有利于消灭桑毛虫。其次要防止和避免接触桑毛虫的毒毛，当树上桑毛虫未经消灭时，不要在树下或下风向乘凉，也不要晒衣服、尿布等。在遇到吹刮大风时，宜将迎风的门窗关闭，以免毒毛吹入；白天可将被席卷起，以防毒毛吹落在床上。

如已被桑毛虫毒毛侵害发生皮炎时，千万不要用手去抓，因为越抓毒毛越向皮内钻，而且越抓越痒，抓破后，还容易引起继发感染，使皮肤溃烂化脓，有时还能将毒毛由指甲带至别处，再发皮炎。得病后要及早处理，用胶布或透明胶纸在发痒处反复粘揭几次，将附着在皮肤表面或已部分刺入皮肤浅层的毒毛粘去；或者及早用肥皂水冲洗，如仍发痒，可用各种止痒药水或热水烫局部，热可破坏毒液而逐渐止痒。如全身皮疹，且瘙痒剧烈，影响劳动和睡眠时，可酌情内服一些抗组织胺类药物，如扑尔敏、非乃更等。

（李树莱）

为什么人跌倒后会有乌青块？

走路不当心摔一跤是常有的事。有时候摔一跤一点也没什么，爬起来就能走。有时候却会摔得站也站不起来，除了感到疼痛以外，摔伤的地方还会出现乌青块。

乌青块，是皮肤血管破裂引起皮下溢血的结果。



皮肤里血管非常多。皮肤里不但血管多，并且这些血管都具有共同的特点——管腔细小而管壁薄。这些小血管是经不起外界压力的。如果我们跌一跤只是臀部着地，一般不会发生乌青块，因为臀部皮下脂肪多，缓冲作用大。如果我们小腿前面或者手臂外侧等皮下脂肪少而骨头与皮肤紧贴之处受到碰击的话，那就必然会出现乌青块。因为皮肤受外力的突然袭击而它后面又是硬梆梆的骨头，缺少厚软的皮下脂肪

作缓冲，皮下组织内的血管就要破裂。血管破裂，血管里的血液当然要流出来，这时红细胞里的血红蛋白分解，与酸性物质发生化学变化，所以从皮外看起来就是一块青紫。（盛丹菁）

为什么伤口碰着咸的东西会痛？



皮肤破了，人会觉得痛，伤口越大越痛，一不当心伤口接触了咸东西如食盐、咸菜之类，更是钻心地痛。

皮肤很敏感，不仅表面有数不清的汗毛，就连微风吹动它都能感觉到，而且表皮下有非常丰富的神经纤维和各种各样感受器，皮肤表面有任何动静都会立即有“情报”送到大脑。

皮下的神经纤维有三种：触觉、痛觉、温度觉。三种神经纤维都敏感，痛觉尤其敏感；要是皮肤不知道痛，准是得了病。

但，神经纤维不是直接暴露在外，而是借各种特殊感受器（痛觉的、触觉的等感受器）和皮肤表面相连的。通

常打一拳，捏一把，被打被捏的那一部分皮肤也会觉得痛，不过，痛的时间很短，一会儿就过去了，不会一直不停地痛。如果不去碰它，就一点也不痛，因为，这些管痛觉的神经纤维外面，穿上了外衣——皮肤表皮，给保护住啦！

要是皮肤破了，有了伤口，那就不同了，敏感的痛觉神经纤维从伤口处暴露在外，风吹、日晒，空气中各种各样刺激，都会影响到它，引起疼痛，何况破了的伤口附近，多少总有点水肿，水肿会压迫神经，还很可能受到细菌感染，细菌感染后会放出毒素，直接刺激神经，怪不得伤口越大越痛！

那么，为什么伤口碰到咸东西时就更痛呢？

因为咸的东西里面含有盐分，盐分浓度较高时，能直接刺激痛觉神经纤维。当盐接触伤口时，暴露在伤口内的神经末梢，受到刺激，所以伤口和咸的东西接触时就会使疼痛加剧。

医疗上配成的 0.9% 的生理盐水，它和人体体液的渗透压是相等的，因此不会引起伤口疼痛，临床上常常用来洗涤伤口。（倪连）

为什么伤口愈合时觉得痒？

有人受了伤，经过一定时间，伤口痒得难受。老年人就会说：“不要紧了，快好了。”一般规律确实是这样的，伤口要是发痒，不久就会长好。所以，人们常常把发痒当作伤口快要长好的一个信号。当然，也不是个个伤口都是如此。



人的皮肤分为多层，在表皮的最低层，有一层细胞叫生发层，这层细胞的生命力很强，象花草树木的芽一样，能不断地生长繁殖，表皮损伤的浅伤口，就是靠生发层长好的。在好的过程中，由于伤口很浅，神经受不到什么刺激，也就不大会有痒的感觉，长好后也没有伤疤；但是，范围比较大，损伤比较厉害，深达真皮的伤口，将愈合时常常发痒。由于损伤的深浅，范围和有无细菌感染的不同，伤口愈合的过程和所需的时间也不同。创伤经过修补和组织再生而痊愈的过程，叫做愈合，愈合大致可分为两类：

第一类：外科手术切口的愈合——手术切口是在无菌状况下造成的缺损，组织的损伤比较轻，切口的两面又有缝合线把它们固定，因此，愈合较为迅速。

第二类：受感染伤口的愈合——感染细菌而发炎化脓的伤口，组织的缺损范围比较大，由于必须等坏死组织完全脱落和彻底清除后，缺损才由肉芽组织填补而逐渐愈合。所以，所需的时间要比未受细菌感染的伤口长得多。


较深伤口的愈合是由一种新的组织补上去的，这种新的组织叫做结缔组织，它就是人们常说的伤口里长出来的肉芽形成的伤疤。新生的血管和神经都要长进结缔组织，由于长进结缔组织里的血管特别密，大家都长，正在生长的新的神经跟它们挤在一块儿，很容易受到刺激。痒，是人体受到轻微刺激的一种感觉。神经很灵敏，特别是新生的神经，稍受刺激，就会产生痒的感觉。

人体各组织的再生能力不同。一般说来，神经组织的再生能力比较低，所以在伤口愈合过程中神经组织的再生也出现得比较晚，一般在神经快长好的时候，也是伤口快长好的时候，这时新生的神经末梢和血管已经长进了结缔组织，局部知觉也逐渐恢复，所以这时候伤口就容易发痒。等到伤口完全长好以后，新的神经习惯了周围的环境，也就不觉得痒了。（李树莱）

为什么皮肤病好了以后，有的留有疤痕，有的没有？

皮肤病种类很多，有的好了以后，一点儿影子都没有，例如，痱子和风疹块。有的要留下一个疤痕。它的位置、大小、形状和颜色常常反映着原来皮肤病的性质。例如，脸上的麻子表示生过天花；颈项旁边的伤疤表示有过皮肤结核（俗称疬子颈）；身上大片疙瘩表示烫伤过；肚皮上的刀疤表示曾经动过手术；头上的秃疮表示生过癞痢头。

为什么好好的一块皮肤会变成疤痕呢?



当然，好好的皮肤不会无缘无故地变成一块疤的，只有当皮肤的结缔组织受到破坏，然后补上新的组织，才会形成疤痕。

皮肤从上到下，从表面到深部可以分为表皮、真皮、皮下组织以及附属的一些东西，如血管、神经、腺体、毛发、指甲（或趾甲）等。

表皮完全是细胞组成的，再生力很强。如果一种皮肤病只有表皮受损伤，那么，好了以后是没有疤痕的。小孩的“奶癣”不正是这样吗?

真皮是由结缔组织构成的，里面有许多象一束一束线样的纤维组织。它如受到破坏，必定由新的纤维组织来替补，这种纤维的排列不象原来那样规则，而是杂乱无章的，这样就形成一个疤。

在真皮里，还有许多东西，如输送营养的血管，分泌汗水、皮脂的汗腺和皮脂腺，辨别感觉的神经等。当一块组织被破坏时，在这个部位的这些血管、神经和腺体也遭到不同程度的破坏。因此疤痕组织不但外表和正常皮肤不一样，而且功能也不及正常皮肤。

什么病没有疤，什么病有疤，这是疾病规定了的，但是我们可以影响它。例如，生热疖头会有疤的，如果我们处理得好些，疤就会小些，甚至看不出。相反的，假如天天去挤它，用针挑，结果疤痕可能比不治它还要大，还要明显。

生了皮肤病，假使自己不懂得如何去正确处理，还是不要乱动的好。（秦立模）

为什么有些病要生热疮？



我们常常看见有些人在嘴丫附近涂些紫药水。你问他为什么，他说生了热疮。

有些人每次感冒或发烧的时候，热疮都要出来捣蛋，最多每月要 2 ～ 3 次，冬天格外容易发生。当发觉嘴丫皮肤又痛又痒的时候，就知道不对了，它要来了。果然，第二天在这个发痒的部位出现一簇小水疱，真象火烧一样，又热，又痛，又痒。不小心把它抓破，便结盖，甚至化脓，有时候张嘴说话也不方便。这样经过一个星期或十天的时间，盖才会脱落，皮肤逐渐恢复正常。有时同一个部位，要发几次，这个刚刚好，不久那儿又出来了。皮肤和粘膜交界的地方是它最喜欢的场所，如嘴丫、鼻孔、眼角和外生殖器附近。

为什么会生热疮?

热疮是比细菌还要小的病毒引起的，医学上叫它单纯疱疹或热疱疹。这种病毒平时躲在我们人体里，等待机会便出来捣乱。当身体发烧的时候，如得了感冒、脑膜炎、

疟疾、肺炎等，这个时候它最高兴，表现在皮肤上一簇或几簇小水疱。有些老人家说：这是身体里的“毒气”或“湿气”发出来了，其实不是的，是两回事，是发烧的“副产品”。

有时候不发烧也会有这种情况，如日晒、肠胃炎、月经失调等。

要叫热疮不发生，首先要加强身体锻炼，不生毛病。平时要讲究卫生，注意饮食。（秦立模）

为什么有的人会生灰指甲？

正常人的指甲，表面光滑，透明发亮，给人以一种美的感觉。但是有少数人的指甲，颜色呈灰色或棕黄色，指甲高低不平，又厚又脆，有的卷曲、破裂；有的前端蛀空，部分或整个甲板与甲床分离；也有少数人指甲变薄萎缩，样子十分难看。这些指甲是一种病态的表现，医学上叫做甲癣，俗称灰指甲。

甲癣和头癣、手癣、足癣、体癣等很相近，也是由霉菌引起的，最常见的病菌有红色毛癣菌、石膏样毛癣菌、絮状表皮癣菌和念珠菌等，它们在指甲上安下家，生长繁殖，破坏甲板，使指甲变质发脆而生甲癣。

甲癣一般很少单独发生，大都和身上长的手癣、足癣、头癣或体癣等癣病有密切关系。因为长了这几种癣病的人，有病的地方发痒，经常用手去搔，癣菌钻进指甲缝的机会多，容易得病。所以长甲癣的人，一般身上都有其他癣病。

甲癣虽然是个小毛病，但生的人不少，在南方每 20 人中就有 1 人生甲癣。当指甲毁坏后，手指头失去了保护，干事情就不方便。有些职业还会受影响，如纺织女工妨碍接线头，影响工作效率和质量；饮食行业的人有碍卫生；一般人也会影响美观。所以，还是预防为好。怎么预防呢？最好是不用手去搔长癣的地方，以防止传染。如果做不到这一点，至少搔过以后，马上用水把手洗净，指甲缝也要洗干净，减少传染的机会。

如果已经生了甲癣怎样治疗呢？许多人会想到治癣的特效药——灰黄霉素，但需要半年至一年才能医好，这样长时期服用有时产生药物反应，不但对肝脏和骨髓有毒性作用，且在动物实验中已证实可引起肝癌。而且有的也不一定治好，因服灰黄霉素几个月后，仍可从甲屑中培养出霉菌。即使治愈，也易复发。临床实践证明，如治疗得法，只要局部搽药，大多数也可以医好。关键是先要去除病甲，可用刀片削刮或用高浓度尿素软膏等溶甲药物去除病甲，然后搽药，使药物有机会渗透病甲，以杀灭霉菌。常用药

物有 30% 冰醋酸、3% 克霉唑丙二醇液等。甲癣好起来比较慢，有时坚持治疗一年还断不了根，所以，要有耐心，坚持搽药，甲癣是可以治愈的。

甲癣大都是从手、足癣等直接传来的，所以，要治好甲癣，首先要治手、足癣及其他癣病，如果这些癣病治不好，还能再传染，就断不了根。（李树莱）

为什么热天容易生脚湿气？

脚湿气就是脚癣，它是霉菌引起的皮肤病。霉菌喜欢寄生在皮肤表面、趾甲、毛发等处，更喜欢温暖和潮湿。夏天天气热，脚趾缝总是又热又潮湿，这对于霉菌来说是再好也没有的生长繁殖条件，所以，热天容易生脚湿气。至于冬天，汗出得少，气候冷而干燥，不利于霉菌的生长繁殖，所以，冬天不大会生脚湿气，即使热天生了脚湿气没治疗或者治疗得不够彻底，到冬天病情也会暂时静止一下。不过，经常穿球鞋、胶鞋和模压底皮鞋的人例外。

既然霉菌只寄生在皮肤浅层，照理很容易医治，为什么老是治不好呢？脚湿气所以常常复发，不外乎以下两种可能：

一、治疗不彻底：虽然说霉菌多寄生在皮肤浅层，但

深层也会有。如果搽了几次药，看看脚趾缝已经干燥也脱了皮，认为已经好了，不再继续搽药，那么藏在皮肤较深处的霉菌，隔几天还会繁殖。



二、重复感染：在脚癣霉菌活动的时候，鞋子上、袜子上，多多少少会沾染一些霉菌的孢子。孢子对冷与热都能耐受，用肥皂洗一下是杀不死它们的，等再穿这些鞋袜时，霉菌就又有机会活动了。重复感染除了是由于自己传染自己以外，还有一种可能是由于用公共浴巾、公共脚盆而再传染的。

（盛丹菁）


为什么脚上会长鸡眼？

脚上长的鸡眼与手掌、足底长的老茧不同。

生老茧地方的皮肤厚而硬，触觉减退，所以不觉痛不觉痒，也无压痛。

鸡眼只长在脚上，并且往往生在足的骨骼突出部分，如足趾背面，小趾外侧，足底、足趾间或趾甲下。足部骨骼有畸形的人比较容易生鸡眼。鸡眼和老茧，同样是由于

经常受到摩擦压迫，使皮肤角质层变厚的结果。不过鸡眼不象老茧那样突出表面，它有钉状角质物嵌在皮肤里，中央发白或呈黄色，活象个鸡的眼睛，所以叫鸡眼。由于鸡眼的“芯”嵌在皮肤里，压迫到真皮乳头层的神经末梢，因此，生鸡眼的地方常常很痛。



生鸡眼主要是由于穿了过紧过窄的鞋子，尤其是不合脚的皮鞋造成的。足部骨骼畸形仅是次要因素。紧鞋穿穿是会变宽，但要经过相当长的时间。在这个过渡时间中，足部骨骼突出部分的皮肤经常受到鞋底鞋面的摩擦和压迫。局部皮肤受到损伤，最后就会使角质层过度增生而形成鸡眼。由此可见，为了防止脚上长鸡眼，最好还是挑选合足宽大的鞋子穿。（盛丹菁）

为什么有些人有狐臭？

有些人走到人家面前或者当你走过他们身边时，就有一股难受的气味冲到你鼻子里，特别在夏天更为明显，真象动物园里狐狸小便气味一样。这种气味俗称狐臭，多数是从两个腋窝发出来的，医学上就叫它臭汗症。有时乳房或阴部也会有这种臭味。

臭味是怎样来的呢?



我们人身上有两种汗腺，分泌两种汗液。一种叫小汗腺，差不多全身皮肤都有它的踪迹，从出世一直到死亡，工作不停。它是受神经控制的，所以有时汗多些，有时汗少些。另一种叫大汗腺，只腋窝、乳房、肚脐、阴部几个少数部位存在。这种大汗腺从发育成熟时起才开始分泌汗液。它不受神经控制，只受内分泌影响，所以女同志在月经期或妊娠期格外明显。等到年纪大了，大汗腺开始萎缩，不再分泌汗液，所以狐臭也就自然消失了。

臭味的来源有两种说法：最早的说法是汗本身就是臭

的，现在相信这种说法的人已经不多了。近来研究发现：汗本身并不臭，因为大汗腺分泌的汗水里有少量蛋白质物质受到皮肤表面细菌的分解作用，产生一种脂肪酸，放出臭味。大家或许都有这样经验：如果穿球鞋，几天不洗脚，脚会发臭，就是因为脚汗与细菌作用的结果，并不是脚汗本来是臭的。由此看来，汗多了，再遇到细菌，才会产生臭味。如果两缺其一，臭味也就无法产生。

那么，狐臭有没有办法治疗呢?

有的，最简单的方法就是保持腋窝等地方的清洁，每天用热水肥皂洗几次，必要时把腋窝毛剪干净，不让细菌有藏身之处，同时洗起来也比较彻底。搽些消毒杀菌药水或药膏，或擦些药粉也有同样作用。

假使这个方法不能解决问题，可以用手术割掉腋窝一部分汗腺，使汗减少，臭味也就减轻或根本消失。

狐臭对人健康没有害处，如果臭味不是那么严重，不治也没有坏的影响。（秦立模）

为什么有些青少年的头发会早白？

年纪老了，头发应该由黑变灰，由灰变白。年纪愈老，头发愈白，这是理所当然的事，谁也不会奇怪。但是，年

纪轻轻的小伙子或小姑娘要是满头油亮乌黑的头发变得花白，别说他自己犯愁，就是别人见了也会多看上几眼哪！人未老，头发却白了，这是怎么回事呢?

早年白头不同于老年白头。老年白头是自然而然的机能衰退性生理变化。早年白头不是遗传，就是“头发有病”。如果自己的父母或者祖父祖母也是早年白发的话，那可能属于遗传性。如果家族中没有这么个遗传因素，那总是头发有病。



白发的病原十分复杂，先天性多与白皮病同时伴发，后天性除老年生理性白发外，可能与严重营养不良、情绪激动、心情不快、悲观忧郁等有关。老年白发一般在 40 岁以后才开始，青年白发约在 20 岁左右出现。

头发所以有颜色，因为头发里含有一种黑色素。色素含得多，头发的颜色就深。色素含得少，头发的颜色就淡。要是根本没有色素，那就变白。头发的色素是由毛发乳头形成的。如果色素形成过程发生障碍，或者已形成的色素运输到毛根的皮质里去的过程发生障碍，或者色素被一种在身体内到处游荡的游离细胞吞噬而离开了毛发乳头，那么，不问你的年龄是大是小，头

发就会因而丧失色素而变白。　　（盛丹菁）

为什么有的人头发会突然成片脱落？

头发对头皮起着一定的保护作用。成人的头发总数约有 10 万根。每根头发有它自己的寿命，大约 2 ～ 6 年，它长到一定长度，寿命到头了，就老死脱落下来，这是一种正常的生理现象。所以，每天脱落几根以至几十根头发是很平常的事情。在一般情况下，头发脱落与生长的速度处于平衡状态。如果头发脱落很多，或者一片一片地脱落，那就不正常了。

不正常的脱发，是头发的生长受到了影响而产生的。引起脱发的因素很多，有生理性的原因，如妊娠、分娩后脱发；也有病理性的原因，如病后的脱发。

头发的生长就象庄稼需要肥料一样，要靠营养。营养是靠血液运送的。如果一个人长期多病，气血不足，身体营养差，头发就会因缺少营养而容易脱落。有人生过伤寒、痢疾等病之后，头发脱落得稀稀拉拉的，就是这个原因。

有的人并没有生什么大病，身体也还健康，但是，一夜功夫，头上的头发忽然脱落了一大片，脱发处头皮光亮，这种脱发，医学上叫斑脱。过去人们受了封建迷信的影响，

认为斑脱是被鬼舐去或剃去的，叫它“鬼舐头”或“鬼剃头”。当然，这种说法是毫无科学根据的。



斑脱可一片或数片，倘若斑脱周围的头发松动易拔，说明病情正在发展，如不积极治疗，少数患者就会发展成全脱，严重的甚至连眉毛、胡须、腋毛、阴毛等也会纷纷脱落。

斑脱的原因，虽然到现在还没有完全搞清楚，但是不少斑脱病人与神经精神因素有关，有的人因脑震荡、外科手术、外伤等引起神经伤害，使神经营养发生障碍而引起或加重脱发；也有的人经常心事重重、烦闷、忧虑，或者遇到某些事情，精神过于紧张或兴奋，使脑子受到很大的刺激。由于神经功能失调，引起毛乳头的血管收缩，使头发营养的供应发生障碍，而使头发的生长受到影响。人体的一切活动都是脑子控制的，脑子受了刺激，不能正常发挥作用，使头发的营养受到影响，就出现了脱发的情况。

由上述原因引起的脱发，大都是暂时性的，经过一段时间后，身体恢复了健康，神经功能正常了，头发的营养正常了，新发就会逐渐生长。一般初长的头发常常比较细

而软，颜色较浅，时间久后变粗变黑，逐渐恢复原状。这种脱发对健康是没有影响的。

发生了斑脱最重要的是不要紧张，紧张会使脱发加重，斑脱本身对身体健康并无危害，主要是美观问题。不要整天为脱发而情绪紧张，否则，神经功能失调，脱发更厉害。因此，保持精神愉快和身心舒爽，是恢复和加速头发生长的重要条件。绝大多数斑脱是可以恢复的，有的甚至会不治自愈。脱发区可用局部刺激疗法，如用七星针叩击、生姜擦或外用斑蝥酊、辣椒酊或其他生发水等药物刺激头皮，使斑脱局部发生暂时性充血，以增进毛囊的营养，使脱发减少，并促进新发的生长。空闲时经常用手指按摩头皮，以促进局部血液循环，对毛发的生长也可能有益。如果每周局部注射一次牛奶针、氢化可的松或去炎松，很快就可以治好。此外，紫外线或氦氖激光照射也有一定帮助。

祖国医学认为“发为血之余，发焦枯者为血不足”，也有认为与气血不足有关，故宜养血活血，补养气血，可用四物汤或八珍汤加减。成药可选用神应养真丹或二至丸等。有人用中药雄黄 15 克、硫黄 15 克、凤凰衣（出过小鸡的蛋壳和壳内白皮）15 克、穿山甲（炮制）9 克、滑石粉 30 克、猪板油 30 克、猪苦胆一个，将五味中药共为细末，用猪板油和猪苦胆汁调和药末，捣如泥状，用纱布包

好轻轻地搽抹患处，每日 2 ～ 3 次，连用 1 ～ 2 周可望生出新发，并渐渐痊愈。（李树莱）

为什么会引起脂溢性脱发？

有的人年纪虽轻，但头发却变得稀少起来，常常在头顶部或两侧额角先发生，以后向四周扩大，头发数量不断减少，成为“秃顶”。如果脱发严重时，那么只在枕部及耳后还保存一些头发外，其他部位几乎全部脱光，但这种情况是很少见的。一般发展到一定程度后，脱发速度就逐渐缓慢下来，如能得到适当的治疗，脱发可能逐渐停止。这种类型脱发，头皮由于皮脂分泌太多而变得光滑发亮，除了有轻度痒感外，没有其他不舒服的感觉，主要发生在男青年。

那么，为什么会发生脂溢性脱发呢？皮肤的皮脂在正常情况下经常分泌一定量的皮脂，以滋润皮肤和毛发，维持皮肤和毛发的正常生理功能。一旦皮脂腺功能不正常，如皮脂腺分泌得太多或太少，都会引起皮肤和毛发的疾病。皮脂分泌得太少了，往往会引起皮肤干燥、粗糙，严重时会使皮肤裂开，并使毛发枯萎而失去光泽。皮脂分泌太多了，除引起皮炎、粉刺等皮肤病外，同时也引起头发

脱落、毛囊萎缩等，这种由于皮脂分泌过多而产生的脱发，称为脂溢性脱发。因此脱发与皮脂腺功能是有密切关系的。

是什么原因使皮脂腺功能不正常呢？是不是油脂食物吃得太多的缘故呢？根据研究证明，在正常情况下多吃些油脂性的食物，对皮脂腺的分泌功能不会有明显的影响。但皮脂腺分泌过多，可能与体内男性素分泌过多有关。如果内分泌功能不正常，就需要进行适当的治疗。

患了脂溢性脱发，就需要采取适当的措施，首先是防止脱发的继续发展，同时还要争取部分的好转。经常参加体育锻炼和体力劳动，多晒太阳，保持大便通畅和足够的睡眠时间等是必要的。在饮食方面，要吃易消化的食物，多吃些蔬菜。脱发处的皮肤经常用手指按摩，能促进皮肤的血液流通，改善局部营养，这样对毛发的生长有一定的帮助。

（李长恒）

为什么能用头发诊断疾病？

头发是保护头皮和头颅的。除此以外，还能帮助医生诊断疾病哩。

头发怎么能诊断疾病呢？



原来，在人的体内含有四五十种微量元素，而在人的头发里竟占二十七种以上。虽然头发里含的元素种类不及血液、尿中含的多，但是头发中微量元素的含量高。例如，头发中汞的含量，为血中汞的二三百倍，其他的微量元素也要高十倍。所以检测头发中微量元素的含量多少，在医学上有着非常重要的价值。

头发能诊断哪些疾病呢？它可以用来诊断营养不良、锌缺乏、少年糖尿病、智力障碍、先天性精神异常和许多与新陈代谢有联系的其他疾病。

据科学家研究发现：患糖尿病儿童头发中铬的含量比正常儿童低。锌缺乏，会使儿童生长发育缓慢。另外，检测头发中有关微量元素，还有助于癌症的鉴别。据有关部门在食道癌、肝癌发病率高的地区调查，发现这些地区土壤、水、植物、粮食中含钼元素比其他地区低，相反含铜、锌、锰、钴、锂等微量元素则高。居住在这些地区的人的头发中，微量元素的含量也是这样。这就给防治癌症提供了依据。

吸烟与肺癌的关系比较密切，从吸烟者头发中检测到

铅、铁、锡的含量较不吸烟者高，所以，一个人最好不吸烟，烟瘾大的人也要设法逐步戒掉。

用头发测定微量元素来诊断疾病，为儿童治病提供了方便，剪几根头发同抽血化验相比，不仅毫无痛苦，并且头发比血液或尿液更容易贮存，分析起来也相当方便。

头发诊断疾病，还是一种新技术，目前还没有一个统一的标准，所以还有待于不断探索研究，相信在不久的将来，会有很大的发展。到那时，人们看病根本不需要采血化验，只需剪几根头发就行了。（吴顺德）

为什么验血可以帮助诊断疾病？

在医院的化验室里，经常有许多病人在验血。有的从手臂上静脉抽血验肝功能；有的从手指上采血化验红细胞或白细胞，项目可多啦！

为什么这些病人都要验血呢？因为验血可以帮助诊断疾病。

原来人体的血管就象四通八达的河流，分布在全身，血液就是河水，血液是一种红色粘稠的液体，由血浆和细胞两部分组成。血浆里面有许多象蛋白质、酶、碳水化合物、脂肪、无机盐等物质，平时这些物质的含量都有一定

的正常范围；细胞部分有红细胞、白细胞、血小板等。血液里的各种成分都有它们各自的作用。当身体有病时，某些成分就会有数量上和质量上的改变。通过验血，就可以知道哪些成分有改变，改变到什么程度，这样就可以帮助医生诊断疾病。

红细胞好比是人体的运输兵，它负责把新鲜氧气输送到身体各个角落，让肌肉、神经、骨骼正常地工作，又把二氧化碳带到肺部，排出体外。一旦因某种原因，红细胞的数目减少或血色素降低时，运输能力就会降低，人体各部分需要的氧气就得不到满足，人就会出现气急、头晕、四肢无力等症状。而只根据这些症状医生往往还不能下结论说这是贫血引起的，因为有些疾病也可以有这种症状。验了血，假如红细胞数目减少或血色素降低，那医生就可以诊断这是贫血症，同时再多做些其他验血项目，还可以查出贫血的种类，以便对症治疗。

又如白细胞，在正常情况下，每立方毫米保持 5000 ～ 10000 个，一旦病菌来侵犯，白细胞就会在中枢神经的指挥下，包围和消灭细菌。如果侵入体内的病菌较多而又顽固，那么血液中白细胞数目就会增加，以吞噬病菌，这时病人如有发烧或局部炎症等症状，医生就可以根据白细胞增加与否，以及增加白细胞的种类，结合病人的症状作出正确的诊断。

验血不仅可以帮助诊断疾病，而且还可以帮助医生观察治疗效果。如糖尿病人，开始血液中糖含量超过正常很多（正常值为每 100 毫升血液 80 ～ 120 毫克），经过治疗，逐渐降低，小便中不再出现糖，说明治疗有效。

随着科学的不断发展，化验方法越来越灵敏，即使血液中成分有极微小的变化也可以测出，这样更有助于早期诊断疾病，早期治疗。（俞翠珠）

为什么化验大便可以诊断人体内有没有寄生虫？




在学校里，卫生老师定期要求学生交送大便去化验。学生们不是都在很好地学习和生活吗？既能吃、又能睡，不痛不病，为什么还要检查大便呢？

原来，自然界里有许多生物，它们不能独立生存，而要靠寄生在别的生物体内，吸取营养维持生命。这种靠损人利己为生的生物，我们称为寄生虫。凡寄生在人体内的寄生虫，就是人体寄生虫。

一般说来，寄生虫寄生在人体内，给人带来的危害往


往是慢性的。由于病情发展时间较长，而且不很明显，所以容易被我们忽视。当病情发作时，人们才大吃一惊。这些寄生虫天长日久地寄生在人体内，不断吸取人体的营养，有的还不断产卵繁殖，积少成多，结果削弱了人体的抵抗力，影响了身体的正常发育，有时还会引起慢性中毒造成早衰、寿命缩短，甚至发生生命危险。因此，及早发现和预防寄生虫，及时治疗寄生虫病，对保障人们的身体健康，尤其对青少年来说，是十分必要的。




蛔虫卵　　钩虫卵　　鞭虫卵

如何及早地发现我们体内有没有寄生虫呢？化验大便是一种常用的方法。特别是肠道寄生虫，如蛔虫、钩虫、鞭虫和阿米巴痢疾原虫等，一般都可以用检查粪便的方法来诊断。因为这些寄生虫直接寄生在人的肠道里，它们产下的虫卵或包囊等可随粪便排出，用显微镜观察化验大便，即可诊断有无寄生虫。还有一些寄生虫，虽然不直接寄生在肠道里，但是它们的虫卵通过一定的途径，最后也进入肠腔内。如血吸虫，先是寄生在肠系膜的血管里，雌虫产卵时移行到肠壁的附近，把卵产下，虫卵随着毛细血管流

入肠壁，然后穿过肠壁进入肠腔内；又如寄生在肺脏内的肺吸虫，它的虫卵伴随痰液咳出，病人常常把痰咽下，这样就把呼吸道中的虫卵带进消化道；还有寄生在肝脏的肝吸虫，它的虫卵是通过胆管进入肠腔的。因此，这些寄生虫的虫卵也都可以通过化验大便找出。



阿米巴




血吸虫卵

正因为化验大便能发现寄生虫的虫卵，所以人们就可以根据各种寄生虫虫卵的形态特点来诊断人体内有哪些寄生虫，以便对症下药，及时治疗。（岑楣芳）


什么叫细菌，什么叫病毒？

细菌是一种单细胞微生物，它的体积微小，我们的肉眼不能直接见到，一般用显微镜才能看到它的个体。由于菌体形态呈杆状、球状和弧状，所以就分别称杆菌、球菌和弧菌。细菌的大小通常用微米（1 微米等于千分之一毫米）计算。球菌的直径为 0.5 ～ 2 微米，杆菌的长度为 1

～ 5 微米，宽度为 0.5 ～ 1 微米，1000 个杆菌排列在一起才一粒米那样长。细菌由细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核所组成。最外层是细胞壁，坚韧而有弹性，从而保持了细菌外形。细胞壁里面紧贴着细胞膜，是一种半透膜，可以调节细菌内外物质的交换。细胞质是粘稠的胶体物质，主要成分是蛋白质、酶和水，是细菌进行新陈代谢的场所。细胞核在最中间，主要成分为核酸物质，是细菌生长繁殖的重要结构，与遗传变异有密切关系。有些杆菌在菌体中间或末端可以生成圆形或椭圆形的芽胞，这种芽胞壁很厚，含水量少，一般的理化作用不易透入。因此，芽胞杆菌对高温、紫外线、干燥环境和化学药品具有较强的抵抗力，进行消毒灭菌时温度要提高到 120 ～ 140℃ 以上，才能达到灭菌要求。细菌和其他微生物一样，具有生长、发育、繁殖、死亡等基本生命活动过程，细菌的繁殖速度很快，每 20 分钟就可由一个分裂成为两个，几小时就可繁殖亿万个细菌。




白喉杆菌




葡萄球菌

在自然界中，存在着很多种类的细菌，它们分布在空气、水、泥土和其他一切地方，其中很多细菌是有益于人类的，在工农业生产上的利用范围正在日益扩大，如用细菌生产新型青霉素、维生素、菌苗、细菌农药和细菌肥料等等。还有一些细菌是危害人类健康的病原菌，如肠炎、菌痢、伤寒、霍乱、肺结核等疾病和其他一些炎症，都是由病原菌引起的，一般都采用各种磺胺类或抗菌素来治疗，在实践中，人们正在消除和战胜病原菌的危害。另外，人体的一定部位也经常存在着一些细菌，如肠道内的大肠杆菌、鼻咽部的绿色链球菌、皮肤上的白色葡萄球菌，在正常情况下，它们对人体并没有什么影响。有些肠道细菌还有帮助消化食物的作用，对人体是有益的。



天花病毒



流行性感冒病毒

病毒是比细菌还要微小、结构更简单的微生物，它的大小只能用毫微米（1 毫微米等于十万分之一毫米）来计算。最大的病毒直径只有 450 毫微米，比最小的细菌还小一半，最小的病毒直径只有 10 毫微米，比有些蛋白质


分子还要小。因此，病毒要用电子显微镜才能看到。病毒没有细菌那样的结构，它只是各种形状的核蛋白颗粒，蛋白质包在病毒颗粒的外部，里面是核酸。但病毒同样具有微生物的一般特性：生长、繁殖、遗传、变异。病毒是一种寄生性微生物，它只能寄生，不能单独生活；动物、植物细胞和细菌菌体，都是病毒寄生生活的环境。寄生在细菌体内的病毒叫噬菌体，噬菌体在细胞体内生长繁殖的结果，使细菌破裂。噬菌体的这一特性，可以利用在临床上治病。例如，在烧伤病房，就常常用绿脓杆菌噬菌体治疗绿脓杆菌感染的创面。


病毒性疾病在临床上比较多见，它的发病数量比细菌性疾病要多得多。目前，感染人类疾病的重要病毒已发现了 50 多种。由于病毒性疾病有很大的传染性，如流行性感冒、传染性肝炎、麻疹、水痘、乙型脑炎和小儿麻痹症等，暂时还缺乏特效药物和方法来治疗，所以病毒性疾病有很大的临床重要性，已日益引起人们的重视。（吕笑芳）

为什么呼吸道传染病常在冬春季发生？


有好些细菌和病毒，喜欢到我们呼吸道里来作怪，引起感冒、麻疹、白喉、猩红热、脑膜炎、肺炎等传染病。

在冬春季节里，为什么特别容易得上这些呼吸道病？冬春季节，天气冷热变化太大，人体一时不能适应，或者从热的地方突然到冷的地方，或是运动后脱衣服以及淋雨受冻等原因，促使呼吸道抵抗力降低。人的呼吸道从鼻子、咽喉、气管到肺泡，表面都是一层完整的粘膜，它的上面还有一层纤毛，不断地发生着运动。一个细胞，可以有几百条纤毛，这些纤毛一分钟能活动几千次，把进入的细菌、异物随时“扫”出体外。平时当人体有很强的抵抗力的时候，细菌等不能通过这层粘膜进入人体，引起疾病。但是当人体抵抗力降低的时候，它们就要乘虚而入，进行捣乱，在人体里引起疾病。


白喉杆菌


链球菌


脑膜炎双球菌


肺炎菌

呼吸道有病的时候，主要症状是咳嗽、喷嚏、流涕，而大量呼吸道传染病的病菌，却躲在鼻涕、唾沫以及痰里，当病人咳嗽、喷嚏的时候，就大量喷洒出来。有人研究过喷出的唾沫星星一般可飞出二三米，颗粒越小，在空气中停留时间越长，最长的可以达到十几小时。冬春季节天气冷，大家多在房子里，人与人比夏天里接近得多，这样，

吸入这种带细菌的唾沫机会就大大增加了，特别是天气冷的时候，门窗关闭，空气不流通，污染着细菌的空气不能及时排净，更增加了传病的机会。

人的呼吸道对传染病的抵抗力和摄入维生素 C 有一定关系，维生素 C 大多存在于新鲜的水果蔬菜中，冬春季水果蔬菜少，人体摄入的维生素 C 也少，无形中降低了人呼吸道的抵抗力。


由于这些原因，呼吸道传染病在冬春季就比较多见了。（蒋君遐）

为什么肠道传染病常在夏秋季发生？


肠炎、痢疾、伤寒、副伤寒、食物中毒等等，大都是由病菌的毒素所引起的传染病。这种病虽然全年都会发生，但在夏秋季发生的比较多。

为什么炎热天气容易生肠道传染病？原来人体里血液的分布是不平均的，这里多了，那里就少了。夏季气温高，人体为了要大量驱散体温，皮肤里的血管就充分扩张，而内脏和肠子的血管却相对收缩起来。也就是说，内脏和肠子经常处在缺血状态，缺血，就会使肠子的抵抗力减弱，也就容易得病。再说，当热天大量出汗以后，人体必然会

用喝水的方式来补充因为出汗而失去的液体。多喝水会把胃酸冲淡，而胃酸却是人体杀灭随着食物进来的病菌的第一道关口，是防御肠道传染病的一道重要的屏障，胃酸冲淡了，病菌进入口腔，就会顺利地通过胃而侵入肠道。如果喝不清洁的水，当然更会吃进大量病菌。



痢疾杆菌



伤寒杆菌

夏季是瓜果的旺季，我们吃进的瓜果量要比其他季节多，而且一般都是生吃的，如果没有洗干净和经过消毒，果皮上的肠道病菌很容易侵入人体而得病。

还有，病菌生长繁殖的另一个重要条件是温度，温度越适当，繁殖得越快，20 ～ 30℃ 正是病菌最适宜的温度。在夏季，到处都是这样的温度，这正是给肠道病菌提供了另一个有利条件。正因为细菌生活的温度适宜，如果我们吃的食物污染了病菌，就更容易发生腐败，腐败的结果是细菌大量繁殖，产生毒素，使本来没有毒的食物变为有毒的食物，就会发生腹泻、腹痛、发热、呕吐等症状，这就是食物中毒了。

此外，肠道病人的肠子里，带有大量病菌，并且随着

粪便排出体外。夏季正是苍蝇活动繁殖季节，苍蝇在粪便、垃圾堆里出身，把粪便、垃圾里的病菌带到食物上，随食物又带进人体的胃肠里。

你看，夏季有这许多发生肠道病的原因，如果我们不注意饮食卫生，当然容易发生肠道病了。　　（蒋君遐）

为什么受了凉会泻肚子？




不论在夏天或冬天，受了凉，就有可能泻肚子。受了凉以后的泻肚子和一般食物中毒、肠炎、细菌性痢疾、阿米巴性痢疾等等都不同。受凉导致的腹泻有两个特点：一是腹部咕噜噜地响个不停，还伴有一阵阵疼痛；二是水泻——排泄出来的不是成形的、结团的粪便，却是稀烂的粪水和未经完全消化的食物渣滓。

寒冷是种强烈的刺激。当我们受了凉，特别是小肚子受了凉时，肠蠕动就会增加。肠蠕动增加的结果，迫使在肠子里还没很好地被消化和吸收的食物渣滓，以及大量的

水分提早排泄出来。所以肚子里咕噜噜地响，一阵阵作痛，以致排泄出来的不是干粪。因此，我们平时要注意保暖，尤其是腹部的保暖，即使在夏天，晚上睡觉时也不要贪凉，最好腹部盖块毛巾，否则就容易泻肚子。　　（盛丹菁）

为什么发高烧前先感到冷？




正常人的体温曲线是：清晨低、黄昏高、睡眠时最低。正常人的体温如果用口腔温度（舌下测定）来代表，通常在 35.8 ～ 37.4℃ 之间。

发高烧的原因很多，不过，大多数都是由于传染病引起。传染病的发热是由于细菌、病毒等微生物在人体内释放毒素，毒素刺激体温调节中枢，使体温中枢的调节发生变化的缘故。

变化的开始是散热减少，产热增加。发高热之前，总先觉得冷，这就是散热减少的结果。由于皮肤小血管收缩，皮肤血液流量减少、不出汗，皮肤温度降低，所以我们就觉得冷。感到冷的同时，常常发抖，那是增加肌肉活动以

增加产热和竖毛肌收缩的结果。热量产生多，发散少，过些时候，体内热量积蓄超过平时，体温就升高，一直要等到产热和散热逐渐平衡，体内积蓄的热量通过皮肤血管扩张，全身肌肉松弛和大量出汗发散，热度才退而体温恢复正常。如果我们好端端的突然觉得发冷，那就要当心，因为它预告高烧的来临。（盛丹菁）

为什么发烧时要多喝开水？



对于人体来说，水是最最重要的养料。人两三天不吃饭，关系还不大，但是七八天不喝水，就要死亡。所以水和人的生命是休戚相关的。

一般说来，每个人每一昼夜大约需要 2500 毫升的水。不过，人体所需的水量并非恒定不变的。拿健康的人来讲，在炎热的夏天，需要的水量就多些；剧烈运动以后，需要的水量也多些。发高烧的人，他们所需的水量也比平常要多些。为什么我们发高烧时所需的水量会比平时多呢？道理很简单，因为，发高烧的时候，体内大量水分从呼吸道

和皮肤渗出而蒸发掉。所以，发烧的时候必须多喝开水以补充不足，否则就会发生脱水现象而病上加病。除此之外，水有调节体温的功能，多喝水就能通过汗水的蒸发或小便的排泄散热而降低体温。另外，有的病是因为有致病细菌侵入造成的。多喝开水，水被胃肠吸收后进入血液，能把血里细菌所产生的毒素冲淡，并且，当水变成尿而排出时就能把它们一起带走，不让它们在身体内蓄积起来。还有发高烧的时候，体内新陈代谢多半发生紊乱而有很多危害人体的中间产物在血里出现，同一道理，水喝得多，就能把这些有害物质稀释、带走，不让它们有为非作歹的机会。

（盛丹菁）

为什么打嗝时不宜喝水？

打嗝就是呃〔è〕逆。打嗝过的人都能体会到这是怎么回事。

一般的打嗝往往是突然发生的。打嗝的人一边觉得胸前上腹部阵阵抽紧不舒服，一边嘴里不停地发出非常特别的“嗽，嗽”声音。打嗝发生得快，停止得也快，通常不过几分钟。这种轻微的打嗝，说不上是毛病。要是吃东西吃得太快或者张口大笑时吸入了冷风都可能引起打嗝。尤

其是婴儿吸进了冷空气，很容易打嗳。另外，有种持久性的打嗳与这种一般偶然发生的打嗳不同。它常常是某种疾病的反映，如胃炎、胃胀气、胃扩张、胸膜与支气管疾病等都可能伴发持久性打嗳。

不论打嗳是属于一般性的还是持久性的，打嗳的发生总是由于横膈膜的间歇性挛缩。横膈膜位在胸腔与腹腔交界处，所以，当它发生间歇性挛缩时，打嗳的人就会觉得胸前上腹部抽紧而非常不舒服。由于横膈膜的挛缩，空气突然被吸入冲击喉头的声带，所以就产生了非常特别的“嗽，嗽”声。

有人说，打嗳时只要喝几口热开水，就会停止。其实，打嗳时不宜喝开水，因为开水很可能呛入气管。照理说，喝进去的水应该通过食道入胃，为什么打嗳时喝开水，水会呛入气管呢?

要知道气管就在食道前面，而两者都上通咽喉。气管口上有个会厌软骨。当我们吞咽时，整个喉室就上升，气管出口正好被会厌软骨盖住，喝的水或者吞咽的食物就进入食道到达胃。当我们呼吸时，空气要出入气管，喉室就下降，气管口开放。打嗳是控制不住的，横膈膜间歇地挛缩，打嗳也就连续不停，气管口必须开放，让空气出入。如果在这时喝开水，喉室的上升与下降难以自主，含在口腔里的水势必会溜进气管而引起反射性咳呛。因此，打嗳


时不宜喝开水。　　（盛丹菁）

为什么冬天容易得感冒？



感冒又叫做伤风，从它的名字，会使我们想到感冒是由于感受了风寒所引起。长期以来，我们对感冒的原因就是抱着这样一种看法，而且，不但我们中国人自古以来就有这样的看法，很多外国人也是这种看法，如英国人说的“感冒”这个字，就与“冷”字联系在一起的。但是感冒还有更主要的原因。

感冒是一种传染病。人们传染上了感冒病毒，就会患感冒。病毒是一种很小的生物，不但眼睛看不见，而且比细菌还要小。那么，为什么冬天更容易患这种传染病呢?



首先，因为冬天天气冷，风也大，人们容易受到寒冷的侵袭。身体受寒以后，抵抗力减弱，病毒乘机大肆活动。

其次，感冒病毒主要是通过空气传染的。患病的人咳嗽或说话时，都有唾液的小颗粒，从口中喷到空气中来，这些唾液的小颗

粒中就含有无数的病毒，别人呼吸时，如果将这些病毒吸进去了，就会引起感冒；也可能这些病毒暂时先躲在人们的鼻子或喉咙里，只等到人们身体抵抗力减弱时，就大肆猖獗起来。冬天，室外太冷，人们总喜欢在室内生活，还要把门窗关紧，以保持室内的温暖，由于人们集中在室内，通气又不好，这就为病毒在人与人之间的传播，创造了有利的条件。

要预防感冒，首先要把身体锻炼好，尤其要增强身体对寒冷的抵抗力，经常洗冷水脸和冷水浴是锻炼身体不怕冷的好办法。

冷水脸可以天天洗，也容易坚持，冷水浴要按照一定的方法循序渐进，可以从每年夏天开始，时间可以从五分钟延长至一刻钟，洗后用干毛巾擦干身体。

感冒的人不应到公共场所去，以免传染别人。如果实在不能避免，也应戴上口罩，以免咳嗽说话时飞沫四溅，散播病毒。（余孝基）

痰多了是不是有病？

人体的生理活动，首先得依靠肺脏的呼吸。从鼻子到咽喉，从咽喉到气管，到支气管，再到微支气管，是越来

越细的管道系统，无数微支气管的末端，是一个个有弹性的小泡泡，这叫做肺泡。呼吸的作用，就是在每一个肺泡的被扩张和压缩动作下进行的。肺泡外面密布着毛细血管，吸进去的氧气，就在这里交给红细胞，红细胞把组织里带来的二氧化碳在这里排到肺泡，并且呼出体外。人体一天里呼吸三万次，一天吸进去的空气达 15 立方米，难免会把有害的物质象灰尘、细菌、有害气体同时吸到这个精细的车间里去。人体为了清除这些有害的物质，常常采用扫除和吹刷两种清除方法。



原来整个管道系统的每一个表皮细胞上，都长有几百条眼睛看不见的毛。这种毛每时每刻在向外摇动，把管道系统里的垃圾从肺泡一直送到鼻咽部。为了使管道保持经常滑润，在气管的表皮细胞里，还有一部分专门分泌粘液（润滑液）的细胞，叫做杯状细胞，杯状细胞分泌出来的粘液，实际上就是痰液的基础。住在多烟尘地区的人，会发现鼻孔里尽是煤烟，咳嗽时会咳出带灰黑色的痰，正是垃圾被清除出来的结果。有时吸入刺激性比较大的物质，人体就会采取断然的压缩空气吹刷的方法，如用咳嗽、打喷嚏来清洗管道。

现在来谈一谈痰到底是什么东西?


当肺里存在有害物质时，特别是病菌在那里繁殖的时候，那里的毛细血管就会扩张，血管里的白细胞会游出来吞吃细菌等物质。随着白细胞渗出来的还有血清，甚至红细胞，如果细菌的毒性很强，许多白细胞还会中毒死亡，死亡的白细胞、病菌、灰尘以及渗出来的血清和红细胞等加上杯状细胞分泌的粘液混合物，大量积存在呼吸道里，必然会阻塞管道，影响呼吸工作的进行，这样人体就会同样用咳嗽、打喷嚏等方式清扫管道，把它排出体外。这种咳出来的比较大量的粘液，有时候象泡沫一样的，有时候象脓一样的东西，就叫做痰。

产生痰的原因很多，有些是呼吸器官有病引起的，有些是心脏以及其他全身性疾病引起的。但不管怎样，病菌侵入呼吸道里，以致发生炎症是顶主要的原因，感冒、急性或慢性支气管炎、肺炎、肺结核、麻疹、百日咳等都会产生痰。因此，咳嗽多痰总是有病，就得寻找原因，加以治疗才对。（蒋君遐）

为什么热天容易中暑？

在炎热的夏天，往往会有人突然昏倒，人事不省，严重的还会发烧、抽筋等。这就是中暑。遇到这种事，我们

应该立刻把中暑的人抬到阴凉的地方，让他安静地躺着，把他的衣服解开，用冷水洗抹他的身体，用冷的湿毛巾敷在他的头部。如果面色苍白，昏迷不醒，就应该赶快送医院。



为什么好好的人会突然中暑呢?

虽然中暑的发生看来突然，它却是逐步形成的。因为人体每时每刻都在通过出汗向外散发着热。劳动或运动的时候，出汗多，散发的热更多。在通常情况下，大气的温度低于人体的温度，散发出的热不知不觉地消失在大气里。要是在高温的环境里或酷热的阳光下，一旦出汗发生障碍，人体内部的热，就散发不出去了。大量的热在体内

郁积，就形成了中暑的条件。有时候，因为出汗过多，体内的水分和盐分消失过多，也会引起中暑。

中暑对人的机体有很大损害，所以在夏天或高温环境里劳动、运动，必须注意防护。

预防中暑的积极办法，在工厂里，要采取降温措施，供应盐开水、盐汽水等清凉饮料。倘在阳光下工作，就必须戴草帽，避免阳光直晒头部，不能穿太紧的衣服；多洗冷水澡，帮助体温的散发；也不要许多人挤在一起，妨碍热的散发。

如果已经感到有点头晕脑胀，胸部闷塞，眼花缭乱，手脚无力，那么就应该立刻停止劳动或运动，走到阴凉的地方去休息一会，喝点盐开水、吃点西瓜，待这种不舒服的感觉充分消除以后，再继续工作。（湜介）

为什么受凉后喝姜汤可以预防感冒？

生姜是我们平时烧荤菜常用的调味品，具有很好的解除腥味的作用。你可知道，它还是一味很好的中药呢！

如果你平时身体就不太好，抗病能力较差，再加上淋了雨、着了凉，有时会带来一些麻烦，例如，怕冷、发热、头痛、咳嗽等，一旦发生了疾病，再请医生看，服药治疗，

既造成了痛苦，又影响了工作和学习。



要是你在淋雨受凉后，立刻用生姜切成片烧一碗汤，稍微加一些红糖，热呼呼地喝下去，顿时就会感到温暖、舒服，过后一般不致于发生什么疾病。这确实是一种很简便的预防方法。

生姜汤为什么有这样的好处呢?

因为生姜中含有两种成分，一种是芳香性的成分，一种是辛辣的成分。芳香性的成分是挥发油，含量约 25 ～ 30%，其中主要成分是姜油萜〔tiē〕、小茴香萜、樟脑萜、姜酚等。辛辣的成分，叫做辛辣素，是一种油脂状的液体，又叫做姜油酮，为结晶性姜酮和油液状姜烯酮的混合物，含量约 1.5%。

芳香性的挥发油，能促进血液循环，所以喝了生姜汤以后，觉得全身温暖，有预防和治疗感冒的功能。它的辛辣素能反射性地增加胃液分泌，具有健胃作用，而且还有调整胃肠功能的作用。

根据中医临床经验，生姜除了有“发汗散寒”作用外，

还可以“温中止呕”，所以对于因受寒引起的肚子疼痛、恶心呕吐等症，用生姜和一些中药配合在一起应用，确实能收到较好的效果。（江克明）

为什么会发生低热？

正常人的体温，口腔温度一般为 35.8 ～ 37.4℃。在休息状态，正常人的体温不应高于 37.5℃。如果经常高于 37.5℃，就是低热。

正常人的体温并不完全一致，一般早晨较低，下午较高；冬季较低，夏季较高；妇女在月经前和妊娠期体温也稍高。但这些都不属于低热范围，而是正常的生理变动。

引起低热的原因较多。慢性化脓性扁桃体炎、慢性副鼻窦炎、慢性胆道感染、慢性尿路感染、慢性肾盂肾炎、肺外结核等慢性感染性疾病、无黄疸型肝炎、迁延型肝炎、慢性肝炎和肝硬化、类风湿性关节炎、播散性红斑狼疮、甲状腺机能亢进等，都是常见的低热原因。这类低热病人都是有器质性疾病的。

此外，体质虚弱的人，或病后，常常会发生夏季低热（疰〔zhù〕夏）。如果在低热的同时还伴有植物神经功能失调症状：手抖、颜面易潮红、窦性心动过速、打呃、腹

胀、失眠，就可能是神经性低热。神经性低热病人有个特点，经过休息，体温、症状好转，但工作或劳动后，体温又上升，甚至突然的开门声也能使病人体温上升。夏季低热和神经性低热都是功能性低热，这类低热病人并没有器质性疾病。


低热是一种常见的症状。由于引起低热的原因很多，所以检查低热原因是一件很细致的工作。特别是对功能性低热，必须经过较长期的观察，在排除器质性疾病的基础上才能诊断。

低热的产生与人体的抗病能力有很大关系。体质虚弱，身体患病，是产生低热的基础，而疾病的发生又是体质虚弱、身体抗病能力减退的结果。因此，积极参加体育锻炼，注意饮食营养，增强体质，提高身体抗病能力，就能够有效地提高健康水平，减少低热的发生。（刘胜泉）

为什么有的人晚上要盗汗？

一个人的汗，是从皮肤表面无数汗腺分泌出来的。汗腺的分泌是日夜不断地进行着，不过在气温低时或身体活动不多时汗量很少，一经出现于体表就很快被蒸发干，这种叫“不明显出汗”，人们不大觉得，以手掌等部位比较

多。另外一种叫“明显出汗”，是由于热的刺激和情绪紧张，这种汗分布的区域比较广，最多在前额、颈、手臂和背部等。“明显出汗”的分量随着气候等不同条件相差很大，天冷和身体休息时可以减少到极少。而在天热和剧烈劳动时出汗很多。从生理学角度来看，出汗是维持正常体温所必需的，至于情绪紧张的出汗，基本上是一种具有预见性活动，与身体散热是分不开的。



至于盗汗（虚汗）又是另一回事了。这种盗汗常见于比较严重的肺结核伴有血中毒的病人，病人往往在半夜酣睡中出汗，醒觉时发现内衣已被汗液浸透了。除了肺结核病外，盗汗也可发生在其他慢性长期消耗性疾病者身上，或者因病体质较虚弱的人身上。这类病人除了有盗汗外，往往还有低热、乏力、体形消瘦及面红升火等症状。

产生盗汗的基本原因，可能是一种细菌的毒素（如结核菌）的刺激，引起汗腺分泌的异常，特别是汗孔开闭失常，使病人不能收敛汗液。因此这种盗汗不同于上面所说

的生理性出汗，它是属于病理性的。至于为什么多半发生在晚上，主要的原因可能是病人在睡觉时新陈代谢速度比较低，但汗腺的分泌由于受着毒素或其他原因的刺激照常进行，因此，病人睡觉醒来时汗液已浸透了内衣，而在白天汗液则较易蒸发。


总之盗汗既然是病理性的，病人应去医院作必要的检查，针对病因进行治疗。（陈瑟希）

为什么有的人会梦游？

睡眠的保健意义在于消除疲劳，恢复精力。入睡以后，应该是安安静静地躺着，最多翻翻身。可是有人与众不同，入睡以后，丧失一般人在睡眠中应有的静态，无意识地做着各种各样机械的动作：从床上爬起来，睁着眼睛或者半睁着睡眼，慢慢地走着摸索的步子。有的人还会登楼。有的人甚至非常敏捷而有把握地爬上墙头、屋顶和树，最后他又回到房里躺在床上，继续象普通人一样地睡觉。睡眠中的这种行动，可以持续几分钟到半个钟点不等。奇怪的是这种人在第二天早上，对昨晚自己的一切行动一点都想不起来。这种异常情况就叫做梦游。

梦游是一种病。从前认为和月光有关。事实上月光对

梦游毫无作用。因为，这种毛病在没有月亮的晚上照样发作。那么，这究竟是怎么回事呢？是神经系统有病的表现，在医学上称为“梦游病”。



根据巴甫洛夫学说，睡眠是大脑皮质抑制过程的发展。所以，正常人睡觉时，大脑皮质应当全面处于抑制状态。有梦游病的人，可不这样。他们入睡以后，大脑皮质里支配运动的那一部分脑组织病态地兴奋着。因此，在睡眠中的人，本来应该是安安静静地躺着的，却会出现各种不随意的运动。

梦游病大都是从儿童时代留下来的。这种病不常见，但是，一旦发现有这种病，一定要赶快找神经科大夫诊治。（盛丹菁）

为什么有些人会失眠？

睡眠是一种复杂的生理现象，而且很容易受各种因素的影响。如果受到某些干扰而引起睡眠不足，就称为失眠。在人们的日常生活中，失眠大致可分为三种类型：1. 开始失眠，表现为入睡困难，翻来复去，烦躁不安，浮想联翩，

辗转不眠。2. 间断失眠，表现为不安的浅睡、多梦，常常醒来。3. 早醒失眠，表现为早醒，醒来后再也不能入睡。



引起失眠的原因较多，一般可从如下四个原因去找：第一是身体原因，常见的如疼痛、瘙痒、咳嗽、气急、小便频繁、心悸等，都可能导致失眠；第二是生理原因，如工作或生活习惯的变化，卧室床铺的更改，亮光噪音的刺激，浓茶或咖啡的作用等，还有些老年人的早醒失眠，都可称作生理引起的失眠；第三是精神原因，过分的兴奋和焦虑容易造成短期的失眠，主要表现为入睡困难；长期失眠多数是由忧郁症或神经衰弱引起的；第四是药物原因，如常服用苯丙胺、咖啡碱、麻黄素、氨茶碱、肾上腺素等都可造成失眠。

在引起失眠的原因中，精神原因是最主要的。在日常生活中，人们对客观事物的认识是千差万别的，总存在着各种各样的矛盾，而有些人常常由于不能正确对待和处理这些矛盾，以致造成强烈的心理矛盾，干扰了神经系统的正常活动，导致神经系统兴奋与抑制过程的失调，表现为

容易疲劳而不易入睡，睡得不熟或多梦。这样造成的紧张状态又加重了失眠，形成失眠的恶性循环。


因此，治疗失眠要着重注意精神治疗。一旦得了失眠症，不必害怕和焦急，心情要乐观，努力学习，增强战胜失眠的信心，同时要参加体力劳动和适当的体育活动，增强战胜疾病的体质。如果家属和周围的人也能与病人配合，做些思想工作，再辅以药物安眠，破坏失眠的恶性循环，失眠就可以渐渐解决了。（汪道新）

为什么有时小便会出现浑浊现象？

肾脏是人体五脏六腑中主要器官之一。人的小便就是在肾脏内形成的，人体内的很多废物及一部分水分主要是由肾脏滤过而排出体外。这些废物中包含了很大一部分的盐分，如磷酸盐、草酸盐等。每一昼夜人体从小便排出的盐分达 5 克之多。但在一般情况下，这些盐类我们肉眼是看不见的，它们都溶解在小便里，尿液的外观也都是清晰的。但在某种情况下，这些盐分可以跑出来，使尿液变浑。这是什么道理呢?

我们不妨做一个小实验，先拿一个透明的玻璃瓶，盛半瓶清水，将食盐一点一点地放进去。开始时，放进去的

盐不一会就溶解看不见了，当你放到一定程度，盐就不再溶解而呈固体结晶状，沉淀在瓶底，这时盐水也比较浑浊，这种现象化学上叫做“饱和状态”。如果再加清水或将已有食盐结晶沉淀的盐水给以微火加热，那么盐又溶解，水也变清了；当冷却后，食盐又再次析出，使一瓶盐水变浑。可见盐的溶解量同水的多少、温度的高低等都有密切关系。



我们小便里的盐分也具有这些特性。譬如天热，出汗多，小便少而浓；或者天冷，出汗虽少，但由于某些偏食习惯，使尿内盐类成分增多，这样当小便出来后，由于气温比体温低，尿内盐分会沉析出来，使小便发浑。小孩子的新陈代谢旺盛，基础体温较成人为高，经由肾脏排出的废物也较多，在尿量减少时，排出的小便就容易变浑。冬天气温更低，尿内盐分溶解度降低，也就更容易析出发生尿浑浊现象。

由于尿内盐分不同，小便浑浊的情况也不一样。如果尿液是米泔水样或乳白色，在显微镜下可以看到长方块状

结晶；小便经加醋酸即可澄清，这可证明尿混浊是含有大量磷酸盐结晶所致。如果浑浊尿呈粉红色，在显微镜下可以看到信封状结晶，经加热后，小便即澄清正常，就是尿内含有大量草酸盐的缘故。在这情况下，只要多饮水，改变饮食后就可好转，不必进行服药治疗，更不要为此担忧是否生了“腰子病”。

如果遇到小便浑浊，加热或加醋酸不变清，或经改变饮食后仍不恢复，甚至有不舒适的感觉，小便时刺痛或刚尿出时即很浑浊，就应及时去医院检查。因为长期大量过多的结晶尿，会刺激泌尿道而引起小便次数增多，排尿困难；同时遇有异物或泌尿道有炎症性产物时，则会使盐类在泌尿道内沉淀而形成结石。　　（杜敏联　史锁洪）

为什么有的青少年夜里会遗尿？






一般小儿到 2 ～ 3 岁时，白天就能够比较可靠地主动排尿，夜间不再遗尿。如果孩子到了 3 ～ 4 岁，仍不能控制排尿，在夜间熟睡时梦中尿床或白

天不自主地小便，这种现象医学上叫做“遗尿症”。一般男孩较女孩遗尿者为多。

遗尿症在 4 ～ 8 岁的儿童多见，以后逐渐好转，到青春发育时比较少了，但是有个别人到成年，甚至结婚以后还会遗尿。



引起遗尿的部分原因是由于泌尿生殖器的局部刺激，如包茎或包皮过长、外阴炎、先天性尿道畸形、膀胱炎及尿路感染、蛲虫症等，医学上把这类遗尿叫做器质性遗尿症；另一部分原因是由于神经中枢的病理改变，以致排尿调节能力失调所致，医学上把这类遗尿叫做功能性遗尿症。造成遗尿症大部分原因是功能性的，这些孩子并无引起遗尿的器质性疾病。根据统计，这类遗尿占 60% 以上，尤其多见于过分宠爱的神经质的小孩。还有的小孩在白天过度兴奋、玩耍疲劳、惊吓恐惧等，也会引起夜里遗尿。


如果孩子发生遗尿，不妨先去医院检查一下，找找遗尿的病因。如没有疾病，就要靠父母来训练和耐心的教育，并给以适当的药物治疗。对儿童要进行鼓励，增加其


信心。如果大孩子或成人夜遗尿，也切忌责难或讽刺奚落，以免精神紧张，造成恶性循环。如遇顽固遗尿症，中医针灸有着独特的疗效，只要树立信心，遗尿肯定是可以治好的。（史锁洪）

为什么饭前便后不洗手容易得蛔虫病？

俗话说："病从口入"，蛔虫病就是吞入成熟的蛔虫卵而得的。然而虫卵怎样会到口里呢?

有些小朋友因为大便之后和吃东西前没有洗手的习惯，手指上的蛔虫卵就会通过手的传递而进入口里。此外，没有洗净的瓜果，没有煮熟的蔬菜也可将蛔虫卵带入人体。蛔虫卵的抵抗力很强，它在酱菜和咸菜中也腌不死。酱菜、咸菜最好炒过再吃。






蛔虫卵很小，肉眼看不见，必须用显微镜才能看到，要是蛔虫卵粘在你的手上，你也不知道。当你无意中把它吞下后，就在你的肠子里发育生长，约经过 60 ～ 75 天就可以发育为成熟的蛔虫，并在你肠子里东钻西钻，摄食你吃下去有营养的东西。成熟的雌蛔虫每天不断地产卵，一条雌虫每天可产卵 20 万个左右。虫卵又随着你的大便排出体外，当天气较暖和时（25℃ 左右），蛔虫卵在潮湿的泥土里约一个月即可发育成熟，又有可能让另一个不爱清洁的人把它吞下去。

蛔虫的感染很普遍。蛔虫卵大量存在粪便中，随着庄稼施肥，虫卵会散布开来。虽然蛔虫卵都是散布在地面，但是它经常伴随着尘土被风刮起，到处飞扬。因此，你的手总有粘到蛔虫卵的可能。至于喜欢在地上玩耍的小孩，手上粘着蛔虫卵的机会就更多了。所以我们说爱清洁讲卫生，吃东西前洗手，就可以少得蛔虫病。　　（李雅卿）

为什么得了蛔虫病会肚子痛？

得了蛔虫病的孩子常闹肚子痛。这种病人胃口倒是很好，可就是不见长胖，反而逐渐瘦下去，脸色变得难看。这就是蛔虫在肚子里作怪啦。




为什么蛔虫病会引起肚子痛呢？蛔虫长约 15 ～ 25 厘米，它寄生在人们的小肠里，吃已经消化的或半消化的营养物质。蛔虫病人肠子里寄生的蛔虫数目多少不一，少的只有几条，多的可达几百条。数目过多时，它们在肠子里乱动，会引起腹痛。有时候虫子虽不多，但是虫子本身也可以刺激肠子，使肠壁痉挛引起腹痛。

此外，蛔虫还有一股钻劲，喜欢在肠子里乱钻，有时候可钻到胆管、阑尾、胰脏等脏器；或者彼此互相盘缠在一起，扭成一团把肠道堵塞住了。这些原因所引起的腹痛都很厉害，使人难以忍受，需要马上送医院治疗。延误了时间，甚至会影响人的生命安全。

肚子里有了蛔虫，应该及时吃驱蛔药，同时注意个人卫生和不吃生冷的食物，如果让它留在肚子里，它会影响我们的健康。（王立德）

蛔虫钻胆是怎么回事？

人体内蛔虫多了，虫体扰动，就可能患蛔虫钻胆这种病。这是一种很痛苦的病，只见病人大汗淋漓，手捧上腹，辗转反侧，大声呼痛，甚至有时因剧烈腹痛而晕厥过去。有时，这一阵子发作过后，疼痛渐缓；可是，不久类似的剧痛又会重演。这是怎么回事呢?



这个病在医学上叫做胆道蛔虫病，是因为蛔虫钻到了胆管里造成的。蛔虫要从肠子钻到胆总管里，首先要通过一扇门——胆总管开口处的胰胆管壶腹。一旦蛔虫头部钻进胆总管时，就引起壶腹周围的括约肌产生强烈的收缩。这一收缩，造成了上腹剧痛，好象肠子收缩引起肠绞痛一样，我们把这类腹痛叫做胆绞痛。括约肌的收缩有时把蛔虫的虫体夹住，虫体势

必要挣扎脱身，虫体越是挣扎，就越刺激胰胆管括约肌的收缩，上腹痛就越加剧烈，甚至使病人在床上打滚或不省人事。

括约肌的收缩能力象橡皮筋一样总是有限度的，一旦超过了这个限度，便会感到疲劳而松弛，虫体就脱身而出，腹痛也就缓解，甚至消失。

由于蛔虫本身有喜爱钻孔和喜碱的特点，胆总管的开口在十二指肠内是唯一的小孔，胆汁又偏偏是蛔虫所喜爱的碱性溶液，因此不久蛔虫又向胆总管里钻，造成了反复发作的胆绞痛，也有部分蛔虫钻进了胆总管内，甚至死在胆总管内，引起胆总管发炎，甚至阻塞，造成了高热及皮肤、眼白发黄。这时就需要手术根治。


当然，胆胰管括约肌本身的病变造成了收缩能力差，也为蛔虫钻入创造了有利条件，但主要原因还在蛔虫身上。

因此，千万别小看一条小小的蛔虫，它有时却可以造成非常严重的后果。

为此，我们必须养成饭前、便后洗手的卫生习惯，一旦得了蛔虫病必须及时治疗。　　（陶加咏）

为什么有的小孩夜间肛门奇痒？

有些小孩白天玩得很好也很正常，为什么每当晚上睡着了的时候，就表现烦躁不安，特别喜欢用手去抓肛门呢?



晚上如果你细细地检查他们的肛门周围，就可以看见有活动的、白色线头似的蛲虫。这些虫子是从肛门里爬出来的。肠里长有许多蛲虫的小孩，在他们所排出的大便表面，往往也可以看到这些象白色线头、会活动的虫子。

蛲虫是乳白色的，雌虫较大，长 8 ～ 13 毫米，尾部

尖细；雄虫较小，长 2 ～ 5 毫米，尾部弯曲。它们寄生在人的升结肠和盲肠附近，有时也寄生在阑尾里。雌、雄蛲虫在人的盲肠附近交配后，雌虫要开始排出虫卵，即由大肠内移行到人的肛门附近来产卵。雌虫产卵多在夜间入睡以后，这时肛门由于受到虫子刺激，就感到奇痒。

由于肛门很痒，所以患儿常爱搔痒，虫卵即粘着在手指上、指甲下，或落到周围衣、裤、被褥上，或随尘土飞扬，如不注意个人和环境卫生，虫卵就会随着食物被吞下去而得病。因此一个人受感染后，还可以不断地再受感染。


患蛲虫病后，应赶快去医院治疗，同时要特别注意环境卫生和个人卫生。病人的被褥应用沸水浸泡洗净后再用。患病的小孩睡眠时应穿整裆短裤，以免搔痒时手指粘附虫卵造成重复感染，也可以避免虫卵散布在被褥上传染他人。每天换下的短裤应先浸泡在沸水中杀死虫卵后再洗。更应该养成饭前便后洗手的良好卫生习惯。（赵启昌）

为什么得了钩虫病脸会发黄、全身无力？

钩虫病是钩虫（象绣花针大小）寄生在人的小肠里所引起的一种疾病。这种疾病在农村中流行得很广泛，它的俗名很多，有的地方称它为“懒黄病”或“黄胖病”，有的

地方称它为“桑叶黄”。

钩虫病是怎样得来的呢?



钩虫

原来在钩虫病人肠子里的雌虫每天产很多虫卵，随大便排出体外，在温暖、潮湿的地里很快发育孵化，在一周内发育成感染性幼虫。如果有人赤脚下地，皮肤和它接触，它就很快钻进皮肤进入人体，顺着小血管随血液进入心、肺，经过肺泡到支气管和气管，再转到喉头，接着被咽入消化道，最后定居在小肠上段，并发育成成虫。这种虫子的头部有数对牙齿，能咬住人的肠壁吸取血液。钩虫的吸血量有多有少，一般每条钩虫每天平均吸血 0.02 ～ 0.2 毫升（约半滴到 5 滴）。一条钩虫的吸血量虽然并不算多，但是它常常喜欢换地方，这样肠子里就会有许多伤口在流血，而且这些钩虫的嘴里还会分泌出一种使血液不能凝固

的物质，使伤口流血不止。

一个钩虫病人，肠子里有相当数目的钩虫时，每天就会损失大量血液，要是再加上所吃的食物中缺乏造血所需要的物质，如铁质和蛋白质等，这样入不敷出，就很容易形成贫血，这种贫血也被称为“血亏”。血一亏，人就变得脸色焦黄，没有精神，而且经常头晕耳鸣，全身无力，气急心跳，人懒洋洋地老是不想动。如果病情再重，人就越来越软，甚至卧床不起，脸和腿都肿了，用手指一按皮肤就有一个窝儿，放开手以后要过好长时间才能回复过来，这种现象医学上叫做水肿。


钩虫病是一种慢性疾病，它的危害性不象急性传染病那样容易引起人们的注意。然而钩虫病流行的地区，常可使当地人民的健康水平日益下降，劳动能力日渐减退，严重影响生产和学习。可见钩虫病危害劳动人民的身心健康和社会生产是极其严重的，所以得了钩虫病应及时到医院治疗。（徐亚雄）

“大脚疯”是怎样引起的？

在南方的农村中，有时可见到有的人的腿很粗，厉害的可以粗得象大冬瓜一样，而且左右不对称。粗腿的皮肤

往往很粗糙，有的还凹凸不平，摸上去觉得很坚硬，这叫象皮腿，俗称大脚疯或粗腿病。患了象皮腿，不但显得十分难看，而且影响人的劳动力。

发生象皮腿是因为病人得了一种丝虫感染的寄生虫病所引起的。丝虫病在热带及温带地方流行，它是由一种白色细长象丝线一样的寄生虫引起的，这种虫叫丝虫，它需要以蚊子作为传染媒介。丝虫寄生在病人的淋巴系统内，可以使淋巴管和淋巴结发炎，大多发生在四肢，尤以下肢为多见。发作时会发高热，皮肤上可见到红线，肢体会粗肿，如果时常发作，腿就会逐渐增粗而变成象皮腿。由于丝虫的种类不一样和它寄生的部位不同，所以有的病人发生象皮腿，有的病人不发生象皮腿而发生阴囊积水，阴囊象皮肿，有些病人的小便会混有白色牛奶一样的东西，这些症状都是丝虫病引起的，不过象皮腿比较常见。（孙德建）



幼丝虫

为什么不能在有钉螺蛳的水中捉鱼或洗澡？

在回答这个问题之前，我们先来谈谈什么是钉螺蛳？它和血吸虫病有什么关系？


钉螺蛳是一种很小的螺蛳，只有 0.5 ～ 1 厘米长，褐黄色的螺蛳壳一端钝圆，一端尖细，壳上有 6 ～ 9 圈螺旋，有点象机器上的螺丝钉。钉螺蛳是水陆两栖的，最喜欢栖息在潮湿多草的地方，我国南方十多个省市的一些农村和城郊都有它的孳生地，在长江中下游沿岸的湖草滩和芦苇滩，在平原地区的某些河道、灌溉沟和稻田，山区的一些溪沟和田塘等地方，往往可以找到孳生的钉螺蛳。

那么，钉螺蛳和血吸虫病有什么关系呢？

原来，钉螺蛳是传播血吸虫病的帮凶！血吸虫的虫卵随着病人的粪便到了水里以后，就孵出一个肉眼不容易看见的、全身披着纤毛的幼虫，我们称它毛蚴。毛蚴在水里游动，一定要钻到钉螺蛳身体内才能发育成带有尾巴的幼虫，不然它在 1 ～ 2 天内就死掉了。带尾巴的幼虫，我们叫它尾蚴。血吸虫尾蚴的身体很小，需要用显微镜才能看到，它的尾巴上有个小分叉，在水里可以游动。一只钉螺蛳一次可以放出上千条尾蚴，并且可以持续放尾蚴两三

年。尾蚴从钉螺蛳体内出来后，就浮在水面上，当人的皮肤碰到这种水时，尾蚴很快就钻到人的身体里，发育成血吸虫成虫，使人得血吸虫病，严重地影响人的身体健康。所以，血吸虫病一定要有钉螺蛳才能蔓延开来：凡是有钉螺蛳的地方，水面上就可能有尾蚴，接触这里的水就可以使人得上血吸虫病。

看到这里，大家就知道为什么不能到有钉螺蛳的地方去捉鱼、捞蟹、戏水和洗澡了吧！



也许有人会说，在下水捉鱼、摸蟹或洗澡以前，先在岸边找一找有没有钉螺蛳，拣那些找不到钉螺蛳的地方下去，不就安全了吗？

其实这也是不安全的。因为钉螺蛳很小，不是很容易找得到的；尾蚴又可以随着水的流动漂到没有钉螺蛳的下游，同样会使人得病。所以在仍有血吸虫病流行的地区，最好不要随便接触河、沟、田、塘、湖草滩和芦苇滩等处的水。

（蔡士椿）


为什么疟疾发作时发冷发热？



疟疾发作时，一般病人总是先发冷、后发热，再出汗而退烧。为什么疟疾发作时有这种发冷发热的症状呢?

疟疾，是被疟蚊叮咬感染上疟原虫之后发生的一种疾病。疟原虫是一种生活在红细胞内的寄生虫，它吞食红细胞里的物质作为养料，经过一定时间的生长发育，通过分裂繁殖，一个疟原虫可以分裂成20多个小疟原虫。疟原虫成熟之后，包藏着它们的红细胞外膜被钻破，于是小疟原虫和它的新陈代谢废物，就从红细胞中散布到血液里面。因为疟原虫从生长到成熟的时间是比较一致的，所以差不多在同一个时间，会有几千万个红细胞受到破坏。由于这些虫子和废物都不是人体内正常情况下存在的物质，所以对身体来说是有毒的。这些物质随血液循环而到脑部，刺激了脑部的体温调节中枢，于是

病人的体温就开始上升，但在体温上升初期，全身的皮肤血管收缩，此时皮肤苍白，颜色发青，存在于皮肤上感觉冷热的神经得不到血液带来的温暖，虽然盖三床棉被，也还是冷得发抖。这种收缩大约持续半小时，其后血管扩张，带来大量高热的血液，使病人脸色潮红，全身滚烫，这时病人热得难受。其后，小疟原虫重新钻进正常的红细胞中，那些毒素也被人体解毒机能所解除，汗腺开始分泌汗液，热被汗水蒸发所带走，病人的体温就下降。




疟原虫因为成熟期不同，有的是 46 ～ 48 小时成熟一次，称为间日疟。有的是 72 小时成熟一次，称为三日疟。疟原虫每成熟一次，就破坏红细胞，放出大量毒素，所以有的病人是隔日发作一次，有的病人是三日发作一次。

还有一种叫恶性疟原虫，成熟期参差不齐（24 ～ 48 小时），毒素陆续进入血流，所以恶性疟往往没有恶寒战栗的症状，病人表现为微寒低热，或高热持续不退等多种多样的症状。


（朱福耀）

冬天没有疟蚊，为什么还有人害疟疾？

疟疾的发病与季节有密切关系。一般在夏秋季最容易患疟疾，因为疟疾是依赖疟蚊来传播的。疟蚊的样子及生活习惯和普通蚊子有些不同，它的活动时期却和普通蚊子一样，也在夏秋两季。



既然疟蚊只在夏秋两季活动，为什么冬天还有人害疟疾呢？这可能有两种不同情况：



一个人以前从来没发过疟疾，突然在冬天发起来，这是由于他在秋天得的毛病，延到冬天才发的缘故。因为，疟蚊咬了人，疟原虫进入人的血液以后，并不是立即引起发病的。它们首先被带到肝脏、脾脏和骨髓里，在那儿生长繁殖，经过一段时间的潜伏，才能使人发病。潜伏期的长短和疟原

虫的种类有关。最长的潜伏期达 20 ～ 28 天。因此，如果一个人在秋季传染到这种潜伏期最长的疟疾，就会在冬天发病。

如果一个人曾经发过疟疾，而没彻底治疗好，那么在冬天也可能复发。事实上，疟疾的治疗是很伤脑筋的，因为常见的疟原虫有间日疟、三日疟、恶性疟三种，它们的生长发育过程有一段是在蚊体内，有一段是在人体内；进入人体后，有的在红细胞内，有的在红细胞外。目前应用的抗疟药物，有些对这种疟原虫最有效，有些对另一种疟原虫最有效，有的是对红细胞内的疟原虫有特效，有的却是对红细胞外的疟原虫有特效。如果采用的药物不合适，治疗就不可能彻底。治疗不彻底，躲过了抗疟药物作用的疟原虫，继续潜伏在人体内，它们一有机会——当人体过度疲劳或受寒感冒体弱时，就重新侵入血液，而引起疟疾复发。

另外，有的疟原虫在人体内的红细胞外可以存活两年以上的时间，因而也可以在冬天发病。（盛丹菁）

为什么有些地方的人容易患“粗脖子”？

在远离海岸或高原地区的人，往往容易患“粗脖子”

病（医学上叫“地方性甲状腺肿”）。这是什么原因呢?

主要是这些地区的饮水、食盐、蔬菜、粮食，甚至土壤中含碘量很少的缘故。



碘是人体内甲状腺组织合成甲状腺素不可缺少的一种原料。甲状腺素是参与身体新陈代谢活动的极为重要的内分泌激素。人体好比是一架十分精密的机器，当体内缺少了碘，甲状腺素的生成、分泌都会减少，这时人体通过神经系统的调节机能，使体内自动产生一种“信号”，使主管甲状腺素的两个部位——下丘脑和垂体兴奋起来；这样，促甲状腺激素的分泌量就增多，作用到甲状腺组织，使甲状腺在组织结构上发生变化，使腺细胞由骰〔tóu〕子状的正方体变成高大的长柱形，以适应产生、分泌更多甲状腺素的需要。这样一来，甲状腺的每个细胞都变得高大了，整个甲状腺的体积也就增加了。因为甲状腺位于头颈的前面，所以形成了“粗脖子”。

怎样预防“粗脖子”呢?

平时比较常用的方法是采用碘化食盐或碘化饮水。碘化食盐是在食盐中加碘化钠或碘化钾，浓度约为 1:10 万。碘化饮水是在每 10 万升饮水中加碘 1 克。以前者较方便

易行。这样做不仅有预防作用，而且还有一定的疗治效果。



在治疗上，我国早在晋朝就有过海藻酒治瘿方的记载。一般多吃海带、紫菜等含碘食物，服用海藻、昆布等中药或西药碘剂，都有较好的治疗效果。（徐新民）

为什么生黄疸病的人眼白会发黄？

当我们看到一个病人，皮肤、眼白（医学上叫做巩膜）都发黄的时候，马上就会说他生的是黄疸病。其实，黄疸不是病名，只是一种症状。它可以发生于很多疾病。譬如说，传染性肝炎、胆石症、肝癌等等。

不管生什么毛病引起的黄疸，总是由于血液里胆红素浓度增高的缘故。血液内胆红素的正常浓度是每 100 毫升里含 0.1 ～ 0.8 毫克。当超过 2 毫克时，就会出现黄疸。

胆红素是从红细胞里的血红蛋白变来的。血液里的每一个红细胞都充满血红蛋白。红细胞的平均寿命是 120 天。换句话说，红细胞活满了 120 天以后就要破坏。衰老的红细胞破坏后，血红蛋白就被释放出来。假定正常人的

血液总量是 5000 毫升，血液中血红蛋白浓度是每 100 毫升 15 克，那么，血液内血红蛋白的总量是 750 克。通常情况下，红细胞释放出来的血红蛋白每一天占血红蛋白总量的 0.83%，或者 6.22 克。这么多被释放出来的血红蛋白全部是制造胆红素的原料。1 克血红蛋白可以变成 35 毫克胆红素，所以，一天就有 220 毫克胆红素产生。

血液内的胆红素由肝脏排泄成为胆汁中的色素。胆汁由胆管进入肠，经过肠内细菌作用，胆汁内的胆红素又全部变成尿胆素原。尿胆素原大部分从粪便排出。其余由肠吸收进入血液回到肝、再入胆重新兜一个圈子，而一小部分通过肾，从小便排出。由此可见，正常情况下，血液内的胆红素浓度不会增高，因为，胆红素都变成尿胆素原，而从大小便排出体外。

但是，和胆红素正常新陈代谢有直接关系的肝、胆难保不出毛病。如果肝细胞因为传染性肝炎、肝癌、营养不良、缺氧、化学性中毒等等因素而有损伤，它那排泄胆红素的功能大大降低，血液内的胆红素就要存积。如果胆管因为有结石或蛔虫而堵住，因胆管炎、胆管癌、手术后狭窄或受压迫而有一段阻塞不通，阻塞上端的胆管就发生扩张，最后胆汁反流到肝里去，再入血，血液里的胆红素因为没出路，就愈积愈多。另外还有一种情况也能造成黄疸，那就是血液本身有问题。在溶血素或其他因素的作用下，


红细胞大量破坏，释放出大量血红蛋白，胆红素远远超过了肝脏的排泄能力。肝脏尽一切能力仍然排泄不了的胆红素留在血液内，具体表现出来的就是黄疸。

不论是肝有病、胆管有病，或者血液有病引起的黄疸，生病人的皮肤发黄，眼白也必定会发黄，而且特别黄。因为，胆红素对于弹性组织有特殊的“亲和力”。它最喜欢和弹性组织在一起，而眼白和皮肤都富有弹性纤维，所以最容易发黄。（盛丹菁）

为什么肾炎病人要吃素淡食物？

肾炎的特征是浮肿。平时，有人发现眼睑浮肿，也会立刻想到是否得了肾炎。浮肿是肾炎的早期表现，如果到医院进一步检查，同时还可以发现高血压和小便异常。浮肿、高血压和小便异常是肾炎的三大症状。在影响儿童和青少年健康成长的疾病中，肾炎是比较常见的疾病，它的发病与咽喉炎、扁桃体炎、牙龈炎、中耳炎、猩红热、脓疱病等感染性疾病有密切关系。在儿童和青少年中，发病以急性肾炎为多，慢性肾炎很少，急性肾炎较易治愈，但如果治疗不当，也会转为慢性肾炎。肾炎的治疗，除休息和药物以外，饮食也是重要的治疗。

首先要限制饮食中的盐。



正常情况下，人体每天大约从小便里排出 5 克氯化钠。实际上，随着饮食中含盐量的多少，小便里排出的氯化钠就有多有少；饮食中盐量减少，小便里排出的氯化钠则少；饮食中无盐，小便里就没有氯化钠排出。因此，为了补充身体里丧失的盐分，每天必须从饮食中至少摄入 5 克食盐。但是，各人咸淡口味或饮食习惯不同，每天摄入的盐常常是超量的。特别是在夏天，随着大量出汗，人体盐分丧失较多，饮食中的盐也需要适当增加一点。患了肾炎以后，由于肾功能受到损害，使盐和水滞留在体内，不能正常排出，因此造成水肿。如果不限制饮食中的食盐，那么，体内的盐增加了，水肿必将加重，这要使病情恶化。因此，出现水肿的症状时，肾炎病人应当吃无盐饮食，并限制饮水量，待水肿好转，逐步改为低盐饮食。我国人民自古就知道，患了“腰子病”（肾炎）要忌盐，今天，现代医学仍然沿用这个原则治疗病人。

其次，要限制饮食中的蛋白质。

排泄是人体内一切物质代谢的最后过程，肾脏是人体

最重要的排泄器官。我们身体里的许多有毒物质，都是通过肾脏以小便形式排出体外的。我们每天吃的鱼、肉、蛋和牛奶等蛋白质食物，经过代谢，会在体内产生影响健康的蛋白质代谢产物（如肌酸、肌酐、尿素氮等）。在正常人，这些产物都随着小便排出体外；而在肾炎病人，由于肾功能受到损害，这些蛋白质代谢产物就会停留在体内而危害病人。因此，限制肾炎病人饮食中的蛋白质，就是为了减少体内的蛋白质代谢产物，保护肾脏，恢复肾功能，促使疾病痊愈。

长期的医疗实践告诉我们，肾炎病人要吃“素淡”的食物。“素”，就是无蛋白或低蛋白饮食；“淡”，就是无盐或低盐饮食。但是，“低”与“无”不是死板的，要根据病情灵活掌握。在肾炎的治疗过程中，饮食治疗是很重要的，直接影响着疗效的好坏。但对于慢性肾炎病人来说，盐和蛋白质则又不能限制过紧，如果浮肿、高血压不明显，就可以采用低盐饮食，同时在饮食中多补充一点蛋白质，以弥补由于长期蛋白尿而造成的体内蛋白质不足。（刘胜泉）

为什么患水肿病的人不能多吃盐？

人身体里的水，大约占体重的十分之七。这么多的水

分布在哪儿呢？除了细胞里、血液里，余下来的都在细胞间的组织液里。组织液和血浆的成分大同小异，但是组织液中的蛋白质很少。

人体细胞所需的物质取自组织液，组织液的物质来自血液。细胞所产生的废料、多余的水和热，也都排入组织液中，由组织液再转入血液。



血液和组织液的分界线是毛细血管壁。水和电解质可以自由穿过毛细血管壁，因此，组织液来自血液，也可透回血液，两者相互交流。

患水肿病的人为什么不能多吃盐呢？水肿就是全身或局部的组织液蓄积过多的病态。水肿的发生，除了由于血浆中的水分渗出血管，进入组织间积存起来之外，组织液中电解质浓度的增高，特别是钠离子浓度的增高也是个重要因素，因为，钠离子有潴留水分的作用。因此，不论是肾脏病、心脏病或营养不良症，只要患者出现水肿就应当限制食物中的盐。因为，盐就是氯化钠。盐吃多了，钠离子都留在组织液中，增高了组织液的电解质浓度，就会吸引大量水分蓄积于组织间，从而使水肿更加严重。


（盛丹菁）

为什么打针前先要把针筒里的药水射掉一点？



打针总该算是件很平常的事儿，有病的人固然常常要打针，不生病的人每年也要打防疫针。在打针时，如果你留心看一下，护士往往先要把针筒里的药水射掉一点儿。这是什么道理?

是保证治疗安全。当护士抽药水的时候，为了调整剂量，或者是想把小瓶里的药水全部抽出，针头总不免要露出水面，抽药水时，带点空气进去几乎是不可避免的事情。所以在打针前，一定要把空气从针筒里全部赶光。若不这样做，就会把空气和药水一块儿打进去。那么，打点空气到体内去又有什么坏处呢?



空气打到身体里去，会引起哪些反应，这与打进去空气的多少和打到什么地方去有直接关系。量愈多，影响也愈大，如果只有一点儿，那也许察觉不出有什么两样。打防疫针时，一般是将药水打在皮下或皮内，若是带点儿空气进去，除了感到比平

常更胀疼一些外，也不会带来更大的影响。若是把空气误打入血管里去，那就比较麻烦了。因为打进去的空气会顺着血流一直向前跑，直到口径较小的血管，空气泡挤不过去时就象个瓶塞子似的堵在那里了。这样就会阻碍血流的畅通，影响到它输送氧气和养料的功能，从而使相应组织出现缺氧和营养不良的现象，医学上，有时候称之为“栓塞”，或因之而产生的“梗死”。如果打进去的空气的量比较多，那么影响更大。这样看来，打针虽然是一件极为平常的事，若是处理不当，也会给人们带来不少麻烦。

（曹凤岗）

为什么注射青霉素之前要做皮肤试验？

青霉素是常用抗菌素之一，它能够治疗许多由细菌引起的疾病，特别是球菌一类所产生的疾病。由于它疗效较好，又比较便宜，所以已被广泛应用。为什么在注射青霉素之前要做皮肤试验呢?

在日常生活中，我们可以看到大多数人对生漆不会产生什么反应。但也有一些人一接触到生漆后，他的脸、手等皮肤就会红肿起来，有时还伴有发烧等症状。这种现象我们称为过敏反应。

同样，大多数人对青霉素治疗没有什么反应，但也有少数人（约有 5%）对青霉素有过敏反应。如果这些人打了青霉素，轻的会发生皮疹，如风疹块等，严重的会产生过敏性休克，也就是说突然血压下降，脉搏细弱，四肢冰冷，出冷汗，脸色苍白，胸闷，气短，喉头堵塞，呼吸困难，烦躁不安，甚至不省人事。如果不及时进行抢救，还可能造成死亡等严重后果。

为了避免这类反应，在注射青霉素之前，一定先要作皮肤试验，测定病人有没有过敏反应，如果没有什么反应，医务人员才能放心注射。





皮肤试验一般是用很小量的青霉素，（每毫升含 200 单位）作皮内注射。如果在 20 分钟以内，注射部位没有风团（暂时性水肿性疙瘩）出现或红肿直径小于 1 厘米时，一般就认为没有过敏反应；如果注射部位出现直径超过 1 厘米的风团，这就是阳性反应，那么青霉素就不能注射，而要改用其他药物来治疗。如果所用的药物是普鲁卡

因青霉素，那么不但要做青霉素皮肤试验，同时还要做普鲁卡因皮肤试验，因为普鲁卡因也会引起过敏反应。当这两项试验都没有过敏反应时，才可以进行注射。

有极少数人，虽然在皮肤试验时，注射部位没有过敏反应，但注射青霉素后也可出现过敏现象。还有极个别的人，对青霉素特别过敏，甚至在做皮肤过敏试验时，也发生了严重的过敏反应，这时，应立即停用青霉素。一旦出现休克，必须分秒必争，就地抢救，立即在皮下或肌肉注射 0.1% 肾上腺素 1 毫升，小儿 0.3 ～ 0.5 毫升。给患者大量饮水，使青霉素加速从小便中排泄出去，并及早送往医院就诊。（李树莱）


为什么要打预防针？



1880 年春天，在法国巴黎附近一个乡村里，流行过一次“鸡瘟”病，大批鸡群在几天甚至几小时内死亡；一群小鸡正在围着觅食的母鸡叫着跳着，忽然，两脚发软，全身抖动，倒在地上死了；黎明前还在啼晓的大公鸡，未到晌午突然鸡冠下垂，两眼紧闭，卧在地上起不来

了。整个村子，在不到三天的短时间内，一只鸡也不见了——全发“鸡瘟”病死去了。这就是历史上有名的鸡霍乱病。

这件事引起了巴黎的一位细菌学家巴斯德的注意。他来到那个村子进行实地调查研究，把死鸡肚肠里的东西放在鸡汤和肉汤中培养，发现在培养液内有许多漂动的微粒，用这注射到豚鼠或兔子身上时，豚鼠和兔子就很快死去。从这，他得出结论，“鸡瘟”是这些微粒散布开来的结果，而这些微粒正是毒性强烈的霍乱病菌。鸡霍乱之谜就是这样地被揭开了。


霍乱菌

他还不满足，进一步把鸡霍乱菌培养下去，一天、二天，一直培养到几个月，最后，他发现，这种病菌培养得时间越久，它的毒性就越低，用这种培养液注射到兔子或豚鼠身上，只在注射处有些红肿，全身有点轻微发热，却并不引起死亡。同样，凡是注射过这种培养液的动物，再和患鸡霍乱的动物放在一起，也不再传上“鸡瘟”病。培养液的注射使这些动物体内产生了抵抗力，在医学上，称为免疫力。应用这种方法，人们很快控制了鸡霍乱病的流行。从此以后，也在人类历史上，开始了预防注射的应用。

巴斯德离开这个世界已经八十多年了。八十多年来，细菌免疫学已经发展成为一项专门的学问，预防注射被应用在更多种疾病的预防和治疗中：过去认为可怕的疾病如天花、伤寒、霍乱、鼠疫等烈性传染病，有的已告绝迹，有的已在定期施行预防注射的有力措施中得到控制；过去认为难治的肺结核病，也因卡介苗的普遍接种而逐渐减少。随着医学的进步，今后相信会有更多的疾病可用预防注射的方法加以控制。（倪连）

为什么人一生要种几次牛痘？

种牛痘可以预防天花，这是大家熟悉的事实。牛痘苗是一种活着的滤过性病毒，这种病毒一进入人体，就大量繁殖。在病毒繁殖的过程中，人体就产生一系列的对病毒有害、对人体有益的物质，这种物质医学上叫做“抗体”。

人体对抗体的储存和制造的时间各种病是不同的，譬如说生过感冒，很快就可再得；也就是说，抗体保存时间极短。得过天花则可以终身不再得；也就是说，抗体保存时间极长。但以种痘来说，不同的人产生抗体的情况也不同，健康的人，产生的抗体多些；老弱的人就少些；新生婴儿产生的抗体就不及年龄大的儿童来得多，所以婴儿种

痘现在已不是脐带脱落就种，而改为出生两个月甚至一岁以后了。

还有，抗体的产量，会随着时间逐渐消失。时间越长，消失得越多，身体里残存得越少。如果身体里有足够的抗体，那么，当病毒侵入人体时，就可完全抵御不发病。如果一部分消失了，就不能完全抵御不得病；但是得了病，症状很轻，只有部分保护作用。一次成功的种痘以后，对天花具有完全保护作用的时间，大约是 5 ～ 7 年，不完全保护时间，最长可以维持到 20 年。

所以，为了使人体具有足够的抵抗力，最好是每隔 5 ～ 7 年接种一次。卫生部门规定，新生婴儿应在六个月内种一次痘，各地区每隔 6 年，要重复普种一次，正是符合抵抗力维持时间的要求。但是，现在全世界已有几年没有发生天花，联合国卫生组织已经取消种痘作为国际交往的一项必须检疫的规定，因此做妈妈的也不必急于过早要求种牛痘了。（蒋君遐）

为什么种牛痘后会发痒？

种牛痘是为了预防天花。天花是一种滤过性病毒引起的传染性极强的疾病。它的死亡率非常高。生了天花即使

侥幸不死，也免不了脸上长满麻点，极其难看。近年来，由于对天花开展了全面、积极的预防，所以，天花在全世界已告绝迹。不过目前，种牛痘仍然还是必需的预防措施。



我国在十六世纪时，已经发现了种痘能预防天花。旧法种痘是直接拿天花病人的痘浆来种，或者将痘痂干屑吹入鼻孔内，或者将痘痂湿屑塞入鼻孔内。不管怎么种法，目的都在于将天花病毒传入体内，使种痘的人感染轻症，从而产生对天花的免疫力。不过，这些方法都不可靠，被接种的人很可能发生天花重症而非轻症，并且引起天花大流行。经过医学家们的努力，种痘方法大大改进了。新法种痘再也没有什么危险性。新法种痘是将天花病毒先接种到牛身上，使天花病毒的毒性减轻，然后再应用这种病毒制成痘苗接种到我们人身上。这种痘苗就叫做牛痘苗。

种牛痘以后，一般都有痒的感觉。种牛痘后为什么会痒呢？原来，皮肤是种感觉器官，里面含有许多感觉神经末梢和各种感受器。痘苗接种后，局部受到轻度刺激，感觉神经末梢或感受器把刺激传入大脑中枢，经过大脑中枢的分析综合后，就使我们有痒的感觉。所以，不论以前

种没种过牛痘，再种的话只要起反应，都会觉得局部发痒。（盛丹菁）

为什么要在规定的时间服药？

看好病，拿了医生的处方到医院配药部或药房配药。当司药把药配好交给你的时候，往往会告诉你一天服几次，或每隔几小时服一次，一次服几包或是几片；倘是药水，则服几格。要是忘记了告诉你，也不要紧，只要看看药包、药瓶外面的说明就得了。



服药要这样严格地规定时间干什么？这里面是有科学道理的。

服药是为了要整治捣蛋的病菌。可是你不要把病菌看得那么简单，它们既顽强又狡猾哩。你服下药去，如果量少了，杀它们不死，不仅杀不死，还会增加它们的抗药性；如果量多了，说不定对身体的某些部分不利；如果你高兴的时候多服几次，不高兴的时候少服几次，病菌在熬过一个锋头之后，仍然会钻出来跟你捣蛋，你看它们好对付吗？



正因为病菌这样难对付，所以要规定一天服几次药或每隔几小时服一次以及每次服多少，这样你体内的药分就一直保持着合理的浓度，病菌不断受着歼灭、抑制，新的病菌又没有条件生长，在这种情况下，病菌无力顽抗，病就可以痊愈。

另外，还要注意，有的药要饭前服，有的药要饭后服。胃口不好，吃不下饭，那就该服点增加胃部活动、促进食欲的药；倘使胃或十二指肠溃疡，就得服能够保护胃壁、减轻食物机械摩擦的药。这些药，都须在饭前服，倘使在饭后才服，就成了“马后炮”，变得没有意义了。

消化不良，该服帮助消化的药，要消化，得有可消化的东西，这种药多数要在饭后服，如果把帮助消化的药放在空肚子时候服，就毫无作用。

有的药要求身体能迅速吸收，就需要在饭前服，因为空肚子时药物可以与胃壁直接接触；可是有的药却有着一定的毒性，或者有刺激，必须让它慢慢地、较长时间地吸收，这就需要在饭后服，使得药和食物混合在一起，和胃

壁接触的药量就可以少一些。（混介）

为什么服药时最好不要喝茶？

生了病要服药，这是挺平常的事儿。

药到了我们肚子里后，很快就被吸收，通过血管，立刻开到有细菌的地方去，或者直接对病菌作战，或者增强了人的体质，调整了人的生理机能，使身体内部产生足够的自卫能力。一旦把病菌彻底消灭干净，人的健康也就恢复了。

服药的时候，我们多用温开水来吞送。可是有人却用茶来吞送，这样的人，病总比别人好得慢。

如果你愿意，在厨房里就可以做一次顶简单的实验。用碱泡一点儿水。然后你在碱水里倒点醋进去，把它搅一搅，不一会，你就可以看到有一些东西沉淀下去了。碱是涩的，醋是酸的，这个你知道，可是当搅好以后你尝尝这种混合液体看，它既不涩、也不酸，淡而无味，跟水一样。原来是碱和酸中和了，至于沉淀下去的东西，就是原来构成碱的涩味、醋的酸味的物质，现在它们结合起来成了一种新的物质，对液体不再起作用了。

别把茶看得那么简单，以为只是几片树叶子加上一杯

水，茶里的成分可复杂呢。它有多种矿物质，有维生素，有芳香油，有咖啡因，还有单宁酸等等，少说也有十多种东西。其中的单宁酸，有很活泼的化学特性。



有不少药，如奎宁、苏打片等，都含有碱，要是碰上单宁酸，很快就会象碱碰到醋一样发生中和，于是药生成了不能溶解、也不能被身体吸收的沉淀物和水，服下去的药等于没有。单宁酸不仅容易和含碱的药物中和，就是和许多其他种类的药，也容易发生化学作用，使药效减低。

当然，有许多药物和单宁酸不起作用，但一般人不一定知道哪些药和单宁酸起作用，哪些不起作用，为了保证药效，就干脆在服药时一律不喝茶。（湜介）

为什么有些病要注意“忌口”？

“忌口”，通常又叫“忌嘴”，就是病人在生病期间或服药的同时，不能服吃某些食物的意思。

那么你知道为什么要“忌口”吗?

一般来说，“忌口”的目的主要是防止有些食物会促使病情发展，或影响疾病的痊愈。

例如，胆囊发炎的病人不能多吃动物脂肪。因为动物脂肪主要是靠胆汁来帮助消化的，而胆囊是储存和排泄胆汁的主要器官，吃了含有动物脂肪的食物，胆囊就会收缩，排泄胆汁。胆囊已经有了炎症，一旦多吃油腻脂肪，更促使有病的胆囊发生收缩，这就会引起剧烈的疼痛。再如糖尿病病人，要控制淀粉类食物，因为这种疾病是由于病人的胰岛素分泌减少，使碳水化合物的代谢功能降低，因而血液中糖分升高，小便中出现很多糖分。假使不控制米饭、面条、馒头等淀粉食物，它们就会被吸收，从而更增加了体内血液的糖分及尿糖，加重病情。血管硬化引起的高血压忌吃蛋黄、肥肉等食物，因为它们都能使血液里的胆固醇增高，而胆固醇这一类成分又是促使血管壁硬化的一种物质。失眠病人在临睡前要少喝浓茶、少抽香烟，因为茶和烟会使大脑兴奋，影响睡眠；……这些疾病的“忌口”都是符合科学道理的，值得引起注意。

此外，有些“忌口”是中医治病中长期积累的临床经验。例如，生了疔疮以后不能吃牛肉、雄鸡等“发物”，以免疔疮加剧；月经来潮时要忌吃生冷瓜果，以免引起“经痛”；患痔疮的病人要忌吃辣椒、胡椒等，以免造成大便燥结，引起疼痛出血；胃痛病人要忌吃“生冷”或“辛辣”的食物，以免加剧疼痛；腹泻、痢疾病人要忌吃油腻和不易消化的食物；……这些“忌口”有一定的参考价值，也

值得注意。

但是，并不是一生病就都要忌口，要忌口就什么都不能吃，这要根据具体情况进行分析，例如同样生了一种病，有的人需要“忌口”，有的人就不用“忌口”。象支气管哮喘病人的哮喘发作，就有不同原因，有的人是因为吃了鱼鲜虾蟹等食物而发病，有的人是闻触了花粉而发病，还有的却是感受寒凉以后而发病。对于第一种病因的病人，就要“忌”食鱼鲜虾蟹；至于第二、第三种病因的病人，就不必“忌口”了。如果笼统地一讲“忌口”就什么东西也不敢吃，这样反而会造成营养不良，减弱身体抗病能力。因此，究竟要不要忌口，怎样忌口，还是以听从医生的嘱咐为妥。（叶显纯）

为什么月经初潮的少女要注意经期卫生？

在二千多年前，祖国医学的经典著作《黄帝内经》中就有记载：“女子二七天癸至”。意思是说，一般女孩子在十四岁（即二七）左右，生殖功能逐渐成熟，月经来潮。然而也有个别 9 岁左右，还在小学跳橡皮筋时月经已经来了；也有的到 18 岁左右才来。这可能随个体差异，身体素质，地区差别，气候条件等种种关系而有迟早不同。出

现月经初潮，这是女子正常的生理现象。

但由于少年女孩年小还不懂事，又往往怕难为情，不懂经期卫生，容易引起月经病；也有的由于缺少生理卫生常识，对月经初潮时出现的月经紊乱等现象感到恐惧和紧张，弄得本人和家长都不知所措，到处求医。所以，对月经初潮的生理现象有所了解，并引起足够的重视，对保障女青少年健康地成长是很重要的。

那么，应该注意哪几点呢?

第一，由于月经初潮的女青少年，卵巢功能还未完全成熟，初潮阶段表现的月经情况很不稳定，周期超前或落后，甚至一月两行或数月一行，也有来了几次后又闭经一个阶段，以后再转为正常。有的月经量多而崩；有的淋漓不净，绵延一、二十天甚至一个月都不干净。在初潮的第一年出现此类现象，一年后趋于正常，那不一定需要治疗。除非有的经量特别多或淋漓不净而影响学习；甚至初潮已二、三年了，症况也未见好转，有的还引起贫血，如果经妇科检查，并未发现有器质性病变，这就是青春期功血，需要进行治疗。

第二，经期应适当注意休息，不要参加剧烈的体育活动。在月经期间，如果稍微感到轻度不适，参加一些轻便的体育活动还是可以的；如果量多或老是淋漓不净或痛经，那就不要怕难为情，应该向体育老师讲清楚，老师可

适当予以照顾。有的女孩子不好意思和男老师讲，那么老师应该主动关心。因为行经期间盆腔充血，这时有的女孩子本身体质较弱，剧烈活动很容易引起腰痠腹坠腹胀不适。



第三，经期勿饮生冷、辛辣刺激性食物，如棒冰、冰水之类冷饮。不洗冷水澡和到开放冷气的电影院看电影等，这些都容易使寒湿入侵，引起胞宫虚寒，致使痛经或月经淋漓不净。

第四，要注意保持外阴卫生。因为在月经期间抵抗力较弱，子宫口开着，容易引起细菌感染。所以月经带、月经纸一定要注意消毒，保持清洁卫生。有的女孩子因为怕难为情，把月经带晾在阴暗处，这一方面不卫生；另一方面阴干未干透，容易湿气内侵。所以月经带应该放在太阳下晒，这样既消毒杀菌，又比较干燥，用起来也感到舒适，又不容易受到感染。

第五，经期情绪应该愉快、心情开朗，不要为一点点小事感到气恼，这样对月经期间保持行经通畅有好处。

（乐秀珍）

吸烟对人体有哪些害处？



吸烟只是一种习惯，它对人体不仅无益，而且有害。吸烟时，在烟雾中有许多有害成分，如烟焦油、尼古丁、一氧化碳、一氧化氮、氢氰酸和丙烯醛等。这些有害物质吸入后，对人体的呼吸道、心血管、胃肠、神经系统和肝、肾等器官，都有不同程度的损害。

烟草在燃烧时所产生的烟焦油，含有致癌物质，主要是 3,4 苯并芘、亚硝酸胺等化合物。这些物质在动物实验中已证明可以引起癌症。而烟焦油对肺癌的发生有重要的影响。

烟草中的尼古丁，是一种剧毒物质，对中枢神经，先有短暂的兴奋作用，因而有人错误地认为吸烟有提神除倦之功。其实它随后带来的麻痹作用，更为持久，并可使大脑皮质机能减退或紊乱。长期大量吸烟，还会造成尼古丁中毒。尼古丁刺激植物神经系统，产生血管痉挛，引起心

率加快、血压增高，心排出血量降低，心电传导系统功能失常等症状。还可引起动脉壁增厚，是动脉粥样硬化和冠心病发病的主要因素。如果发生在供应脑的大脑动脉，则可发生脑溢血（中风）。



氢氰酸、一氧化氮和丙烯醛是引起慢性支气管炎和肺气肿发病的重要原因。

吸烟还会增加其他癌症发生的机会，如口腔癌、食管癌、胃癌、胰腺癌、肾癌等。尤其在吃饭时吸烟，可将烟草中的烟焦油和其他有害物质吞入胃内，刺激胃粘膜，是引起胃病的重要因素之一。

吸烟与患肺癌的关系密切，大量资料已证明，吸烟人患肺癌的，要比不吸烟的高 10 ～ 20 倍！吸烟者患肺癌死亡的，约为不吸烟的 8 ～ 15 倍！吸烟越多，吸进去的深度越大，发病以至死亡的可能性也越大。

吸烟除了容易发生肺癌外，由于烟草里含有烟碱（即尼古丁）和其他有害物质，对咽喉和气管粘膜长期刺激，因而引起多痰多咳，病菌易乘虚而入，引起慢性支气管炎。日子长了可能会发生肺气肿和肺心病，严重影响呼吸功能及人的寿命。据有关资料统计，重度吸烟者的慢性支气管炎和肺气肿死亡率，比不吸烟者高 20 倍！

卷烟没有完全燃烧时产生的一氧化碳，吸收到血液里后，可和血中的血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，失去输送氧的能力，发生缺氧血症，使血液中一部分血红蛋白失去带氧的能力。因为一氧化碳和血红蛋白的亲和力，比氧大 240 倍，很容易把氧排挤掉，使组织缺少氧的供应，所以一氧化碳是促使心肌缺氧的重要因素。

卷烟烟雾中，还含有大量的“烟雾微粒”。这种微粒很容易进入并滞留在人体呼吸道和肺的深部，破坏人体呼吸器官的防御机能。在公共场所吸烟，烟雾弥漫，不仅有害自己，而且伤害他人。卷烟燃烧后，在室内形成的冷烟雾中的有害物质，甚至比吸烟人吸进的热烟雾中的浓度还要大，因此，不吸烟者比吸烟者受毒更甚。

在家庭中有人吸烟，室内空气经常受到污染，新生儿、婴儿和儿童，吸入有害烟雾，会影响他们的睡眠、食欲以至生长发育。孕妇吸烟，直接影响胎儿的正常生长、发育。尼古丁被吸入体内后，通过刺激子宫、输卵管及韧带的平滑肌，可引起这些器官的收缩，发生月经紊乱等病症。怀孕后可发生流产、早产和合并症等，并可导致胎盘循环的损害而影响胎儿生长。吸烟妇女的子女，智力也迟钝。因为乳汁里含有尼古丁毒素，所以小孩常常不愿吃吸烟母亲的乳汁。

青少年正在生长发育时期，吸烟更易使身心受到损

害。吸烟的学生，会降低记忆力，分散注意力，容易疲倦，经常头昏头痛，以致学习成绩下降。吸烟对人体的危害是日积月累的，要彻底排除烟害对人们健康的危害，必须从青少年开始。

吸烟者的死亡率比不吸烟者高 70%，寿命也明显缩短，据资料，每天吸两包烟的人比不吸烟的少活 8 年多。而且，开始吸烟年龄越早，不仅死亡比例大，死得也越早。

过滤嘴纸烟虽然能滤去部分有害物质，但大部分有害物质仍能通过过滤嘴进入人体。据分析，纸烟中 70 ～ 80% 的尼古丁、90% 的砷，仍可通过过滤嘴。

既然吸烟有这么多害处，吸烟的人一定要闻者足戒，有决心将有害的吸烟习惯改掉，越早戒烟越好。为了保障广大人民的健康，在公共场所更应严禁吸烟！


近十多年来，世界各国的吸烟人数显著减少，因此各种由吸烟引起的癌症，尤其是肺癌的发病率也都相应下降。

为了我们本身的健康，为了减少对周围人们的不良影响，为了建设社会主义强国，希望大家，尤其是青少年不要吸烟！

（薛兆圣）

照 X 射线会损害身体健康吗？

现代医学在诊断和治疗中，应用 X 射线的范围日益广泛了。健康检查时要用 X 射线透视胸部。消化系统、心血管系统、骨骼系统有了病，医生如果认为需要，也常用 X 射线进行检查。有些人在照 X 射线时会产生顾虑：它会不会损害身体健康?



因为 X 射线对生物细胞有一定的杀伤破坏作用，所以人体受到 X 射线照射后，会产生一定的生理反应，过量照射后，还会造成组织破坏，影响生理机能，甚至会引起生命危险。但适量的照射，并不会影响人体的健康。因为医务人员做检查时，对 X 射线透视和摄影的所用剂量是很小的，仅限在安全剂量之内。就是按人体即使最敏感的组织也不发生任何损害的剂量来照射。如胸部透视在规定条件下几天内

总的累计时间不超过 12 分钟，胃肠检查不超过 30 分钟，腹部摄片不超过 20 次，头部摄片不超过 40 ～ 50 次，其他部位因 X 射线曝光条件较低，摄片次数可稍为增加。医生如需重复摄影或透视，也会考虑延长检查间隔时间。尤其是偶然作一次胸部透视，作一次胃肠道检查，拍一张骨骼 X 射线片或作一次血管造影，更不会引起什么不良反应。同时，为了加强防护，不论在检查或治疗时，在不必要照射的部位，特别是敏感组织部位，都用铅板或含铅橡皮加以遮盖，并且尽可能缩短曝光时间。所以，医生用 X 射线给我们检查或治疗时，可以不必有什么顾虑。（蔡宝贤）

为什么中医把脉可以诊断疾病？



中医和西医都把脉。把脉的部位也都是病人腕部桡动脉搏动最明显的部位，也同样是利用食指、中指、无名指的触觉来了解病人桡动脉搏动的情况。中医的把脉，往往要把上好一会时间，不仅要了解脉搏的强弱、跳动的频率快慢、节律的齐整等一般变化，还要

了解脉管内血液充盈的程度、血流的通畅情况，以及脉搏波动的幅度等等变化，来了解病情，作为诊断疾病的一个重要依据。


中医把脉为什么可以诊断疾病呢?

脉搏的周期性起伏，是由于心脏收缩和舒张的影响下，动脉管内压力的突然增加和降低而引起的。因此，通过脉搏的跳动变化，可以了解心血管系统的变化。如心脏每搏动一次，桡动脉也搏动一次；心脏搏动快，脉搏也快；心脏收缩力量强，脉搏也强；心脏有病时，心律不齐，心脏搏动时跳时停，脉搏也相应地出现不规则。再说，人是个整体，人体内各器官、各系统之间都有密切的联系。所以，人体内任何一个器官有病，都有可能对心血管系统发生影响而从脉搏中表现出来。例如，发高热时，心脏的搏动加快，就出现了脉搏速度超过正常频率的“数脉”；各种剧烈的疼痛刺激，使血管的紧张度增加，就会出现象按在绷紧的琴弦上感觉的“弦脉”；许多急性病初期，抵抗力较强，心脏搏动力强，就出现有力的“实脉”；许多慢性病人、大出血后的病人，心脏也虚弱、血液充盈度减低，就会出现软而无力的“虚脉”等等。

中医对把脉的研究已有几千年的历史，在长期的医疗实践中积累了丰富的经验，总结出了“脉学”的理论，并把最常见的脉搏归纳成 28 种类型，清楚地说明什么样的

脉，指示什么样的内部变化，又将手腕上的桡动脉以桡骨茎突为界、分成三段，每一段代表一个内脏，从这段脉搏的变化来了解内脏的病变。关于“把脉”的问题，受到了中西医务人员和其他学科学者的重视，目前已应用电子计算机等精密仪器进行深入的研究。（钟毅）

为什么中医看病要看舌头？



中医大夫在看病时，总是先把把脉，再看看舌头，然后分析病情，对症下药。中医大夫为什么要看病人的舌头呢？

原来，舌头是口腔里一个主要的器官，它由许多块排列方向不同的横纹肌组成。舌的表面粘膜上，长着许多细小的丝状乳头、菌状乳头和轮廓乳头，能感觉味道的味蕾就长在后两种乳头上。舌头在口腔里灵活地运动，配合着搅拌各种食物和发出各种声音。舌头所以有这样的功能，是受分布在舌头上的神经纤维支配的。舌头还通过经络和人体的五脏六腑发生直接或间接的联系。如果脏腑发生了生理或病理的变化，往往就会有规律地反映到舌头上。这些反映变化迅速，而且客观，所以对诊断

疾病、分析病情有较大的参考价值。



例如，病人舌质的颜色红少白多，中医称作为淡白舌，认为是“气血两虚”；舌色枯白、全无血色，中医称作为“枯白舌”，认为是“正气虚极”，这样的病人往往都伴有不同程度的贫血；舌质部分或全部青紫，中医称作为青紫舌，或“舌有瘀斑”，认为是有“瘀血”，这样的病人往往和缺氧、静脉郁血、毒素刺激有关。

舌的表面常长着一层东西，有人厚些，有人薄些，象地上长着的“苔衣”一样，这就是舌苔。舌苔主要是由丝状乳头分化而来的。乳头间隙中的脱落角化上皮、唾液、细菌、食物残渣及渗出的白色细胞等分布在舌头上，就形成了舌苔。舌苔色泽的变化很复杂，临床上的参考作用很大。如薄白的舌苔表示病情较轻，可见于一般感冒发热初期及恢复期的病人，多数正常的健康人也可有薄薄的一层白苔；黄苔多数是热象的表现，一些有严重细菌或病毒感染的病人，如大叶性肺炎、急性病毒性肝炎病人的舌苔，大多是黄苔；如果舌苔颜色焦黄，那可能是较长时间高热

不退的病人；如果在疾病发展的过程中，舌苔变成黑色，中医常认为是“正虚邪实”的重症，病人往往抵抗力已极度虚弱了。

舌苔色泽变化和疾病的变化有着密切的联系，因此它能起一定的提示作用。例如，急性化脓性阑尾炎的病人服中药后，舌苔由黄转白，即使其他症状及化验的好转还不明显，也可认为炎症已有减轻，可继续用中药观察治疗。相反，如果病人服中药后，舌苔由白转黄或黑，即使其他症状及化验似有好转，也不能认为阑尾的炎症有所控制，而要提高警惕，加强观察，甚至作好必要的手术准备。

当然，望舌只是诊断过程中的一个环节，绝不能孤立地对待，特别要着重观察舌色和舌苔的变化，是在什么疾病的基础上产生的，这样才能对望舌的参考价值作出恰当的估计。

望舌时，还应当首先询问一下病人原来的舌苔特点和嗜好。如有的人是先天性黑舌苔，这种人虽然为数较少，但这种黑苔不能看作为病苔；嗜烟酒的人，苔常带黄色。其次，光线强弱也可影响观察的准确性。如在暗淡的光线下，不易分清苔的黄白，正常的红润舌会被误认为青紫舌。其他，如食物的质地和颜色，也会使舌苔暂时染色而影响观察。如牛奶、豆浆常使舌苔变白、变腻滑；橄榄、杨梅使舌苔变黑；蛋黄、橘子、柿子、苹果、有色糖果及部分

药片，也可使舌苔显现黄色。此外，如伸舌过分用力，常使舌尖呈圆柱形，舌色易变红；伸舌时间过长，或刚咀嚼过食物，常可使舌色加深等等。

目前，对中医舌诊的研究，又有了进一步深入。国内外的医学科学家们已广泛采用比色表、电子显微镜、扫描电子显微镜、超声波扫描、微血管造影、电味觉分析、X射线元素微量分析、活组织切片等检查方法；有的还从遗传因素、年龄、维生素缺乏、微生物、抗菌素及其他药物的影响等等方面，来探讨影响舌苔变化的原因。


望舌在诊治疾病的过程中，原来有这么多的学问，无怪中医大夫对舌头的观察要那么仔细。因此，我们如果到医院看病前，就不要随意把舌苔刷去，也不要乱吃有颜色的东西。（钟毅）

为什么推拿可以治疗筋骨损伤？

在激烈的足球赛和游泳运动中，常常会发生腿部肌肉的痉挛抽搐——脚抽筋；在搬运重物和体育锻炼过程中，有时一不小心也会引起急性腰肌扭伤。对于这些病人，大夫往往不给吃药打针，只是用手在他们的腿部推推捏捏、揉搓几下；或在他们的腰部有节奏地按捺一阵，又将他们

的大腿向上这么一扳，很多人的痛苦就一下子给解除了。这种专门在人体的一定部位上，用各种手法和特定的肢体活动来预防、治疗疾病的方法，叫做推拿疗法。

推拿，在古代文献中叫做按摩。推拿为什么可以治疗筋骨损伤呢?



人们在激烈的运动，或用力不当的情况下，常常会引起韧带纤维和肌肉纤维的痉挛、撕裂，甚至局部瘀血，形成血肿，造成剧烈的疼痛。如果不及时进行治疗，或治疗的方法不当，就会进一步造成肌肉间的出血性粘连，造成经久不愈的慢性疼痛，影响正常的活动，甚至发展为肌肉萎缩。

推拿疗法是依靠手法来治疗疾病的，有的以按捏为主，如按法、压法、点法、拿法；有的以摩擦为主，如平推法、擦法、摩法、搓法；有的以振动肢体为主，如拍法、抖法；有的以活动肢体关节为主，如摇法、振法等等。给病人治疗时可按照病情的需要，选用一种或几种手法。

如摩法、擦法在解除肌肉、韧带纤维痉挛的同时，通过刺激可以兴奋受抑制的神经，也可抑制神经的过分兴奋，减轻病人的疼痛感，有助于痉挛的解除、肌肉正常收

缩功能的恢复。

又如按法、压法、点法等重手法，可以刺激深、浅层组织的血液和淋巴循环，使气血流通加快，既有助于改善疼痛部位的营养供应，又有利于损伤部位代谢产物的排出，使血肿和粘连的纤维疤痕得到较快的吸收，达到消肿止痛的目的。

推拿的综合手法，尤其是摇法、振法，能使慢性损伤的组织粘连得到分离，使痉挛、僵硬的肌肉、韧带纤维能得到伸展，疼痛也就随之减轻和消失。

推拿疗法在治疗软组织损伤疾病中，有这么大的治疗作用，治疗脚抽筋和腰扭伤的道理也就很清楚的了。

推拿在我国已有悠久的历史。推拿在治疗骨折中，已形成“正骨推拿”；在老年保健方面，已形成“保健按摩”；在小儿内科疾病的治疗方面，已形成“小儿推拿”。推拿治疗疾病的范围日趋扩大。

目前，国内外对推拿治疗的研究还在进一步深入。模拟各种推拿手法的机器也陆续应用于临床。推拿疗法在保障人们身体健康方面，正在发挥着越来越大的作用。

（钟毅）

小儿腹泻怎样用推拿疗法治疗？


推拿疗法是我国一种古老的民间疗法。在明清时代，推拿较多地应用于小儿疾病，它在手法和穴位方面与成人推拿有些不同，所以形成了小儿推拿的独特体系。

小儿推拿对单纯性消化不良的腹泻效果较好，如配合饮食调节，每天治疗一次，少则二、三天，多则十来天，就能治愈。其他类型的腹泻，用推拿疗法也有调整脾胃的作用。

单纯性消化不良的腹泻，是两岁内婴幼儿常见的一种疾病，表现为排便稀薄，次数增多，一天几次或十几次，有时伴有呕吐、嗌〔ài〕（咽喉窒塞的意思）乳。引起的原因，主要是饮食不当，一下子吃得太多，或是突然改变食物的品种，或者受了凉。小儿吃药打针不方便，用推拿疗法治疗小儿腹泻比较适宜。推拿疗法治疗小儿腹泻，主要是通过手法对体表穴位的刺激，调整紊乱的肠胃机能。

治疗的方法是：先用手掌贴住患儿腹部，以脐为中心，顺时针方向持续摩动 10 分钟左右；再用中指或拇指罗纹面贴在伏卧患儿的尾骨端，揉动 2 ～ 3 分钟；接着用拇指

罗纹面在尾骨到腰部中线上一遍接一遍地从下到上直线推动 2 ～ 3 分钟；最后，双手分别置于患儿脊柱两侧，食指、中指在前，拇指在后，用指面把肌肤提起，两手交替，如捻物般地从尾骶〔dǐ〕部向颈部顺次提捏 3 ～ 5 遍。除摩腹可隔衣外，其他几种手法都要直接接触患儿皮肤。为防止皮肤擦破，可蘸些水作润滑剂。



这种方法宜在饭前施行，家长、托儿所保育员也可以自己做。但发现小孩哭无眼泪，小便减少等现象，需立即送到医院治疗。（严隽陶）

什么叫针刺麻醉？

多少年来，人们一直认为开刀必须用麻醉药。解放后，我国医务人员和科学工作者，经过努力发掘，把中医与西医结合起来，在祖国医学经络学说和针刺止痛的经验基础

上，创造了一个新的麻醉方法。这就是在病人的一些穴位上扎针，使病人在清醒的状态下接受手术，叫做“针刺麻醉”，简称“针麻”。

针麻，是根据手术部位、手术病种等，按循经取穴、辨证取穴和局部取穴等方法，选取适当的穴位。手术前一般按麻醉常规给予辅助用药，进针后需要 15 ～ 30 分钟的捻转诱导，得到了麻醉的效果后即可开始手术，手术中间还需手法捻针，刺激强度以能达到镇痛效果，而又能为病人所耐受为适宜。手术完毕，即可将针取去。这就是针麻的一般操作过程。

那么，针麻有哪些优点呢?

临床实践证明，针麻有很多优点。首先，它不需要麻醉药，因而就没有某些麻醉药物的副作用，尤其适用于不宜进行药物麻醉的病人；第二，病人在清醒状态和生理功能保持正常的情况下达到痛觉迟钝或减轻，能主动配合手术；第三，手术后恢复也较快。概括说，针麻安全、简便、经济、有效。因此，特别适用于山区、农村和战争环境。

目前，针麻在我国已有选择地用于各种手术。从刚出生的婴儿到八十岁的老人，从头颅到胸腹，身体各个部位的病症，在针麻下开刀，都有获得成功。但其效果以颈部的手术为好，并且也因个体差异而不同。现在，世界上也有许多国家正在研究针刺麻醉。



随着针麻的推广，针麻的临床效果不断得到提高，操作方法也不断得到改进。例如，针麻的取穴方法，除了选取四肢、躯干部穴位外，又有专取耳廓穴位的耳针麻醉，以及鼻针麻醉、面针麻醉等。操作方法除采用手法捻针外，又有用电脉冲刺激、穴位注射、指压等。这样大大丰富了针麻的内容，并使针麻能在不同的情况下适应各种不同的需要。

为什么针刺能用于手术麻醉呢?

我国针灸古书上早已记载着好多穴位是可以止痛的，譬如说，手上的“合谷”穴能止牙痛；腿上的“足三里”穴能治腹痛等。那么，针刺止痛的道理是什么呢？祖国医学认为疼痛的原因是经脉中的“气血”运行发生阻滞，“不通则痛，通则不痛”。针刺可以疏通经络，调节和推动气血的运行，因而疼痛也就获得解除。针刺还有调节人体生理功能的作用，这种作用古代医书称为“调气”。在祖国

医学里，“气”指的是各种生理现象，如血液循环、呼吸运动、胃肠的蠕动以及物质代谢等。假如这些生理现象由于某种原因而引起紊乱，针刺就可以起到调整的作用。


从针刺的止痛和调节人体的生理功能，人们得到了启示：针刺既然能止痛，那么能不能制止手术创伤所引起的疼痛呢？能不能调节手术过程中某些生理功能的紊乱呢？我国的医务工作者在广大病员的支持和合作下，通过千万次的针麻实践，战胜了思想和技术上的重重障碍，这两个问题已获得了比较满意的效果。



用电脉冲刺激

针麻是麻醉学术中一个新的领域，当然还存在一些不足的地方，譬如，手术中的镇痛效果不十分完全，肌肉松弛也不够，以及内脏牵拉反应等问题。然而，针麻的产生和发展，推动了人们进一步探索经络学说等中医基本理论的实质，并对现代生理学、生物化学、解剖学等提出了新的研究课题。进一步揭示和掌握针刺麻醉的理论原理，将有助于针麻质量的提高。（徐明光）

为什么会生阑尾炎？



阑尾腔内粪石


阑尾炎，俗称“盲肠炎”（这是错误的命名），在祖国医学上叫“肠痈”，是一种常见的外科疾病。

阑尾位于右髂窝内（相当于右下腹处）。它的形状象一刀斩断的半条蚯蚓，断头接在盲肠的内后方而与盲肠相通，尖端游离并且封闭。阑尾的长短粗细差别较大，一般直径为 0.5 厘米，长 5 ～ 9 厘米，但也有长达 20 厘米，粗至 1 厘米以上的。

阑尾不但会发炎，而且很容易发炎。

阑尾为什么会发炎呢?

因为：第一，阑尾管腔很小，很容易被粪石或寄生虫卵阻塞。而且阑尾细长而游离，容易扭曲而梗阻。第二，供应阑尾的动脉是终末分支，没有侧支循环。如果阑尾通盲肠的那一端堵塞，阑尾粘膜的分泌物不能排出，腔内压力必然大大增高而使阑尾壁的血运发生障碍。阑尾营养状态不良，肠内的致病细菌就会乘机侵入，引起阑尾发炎。



阑尾一旦发炎，主要症状是肚子痛。开始时往往是上腹部或肚脐周围痛，很象胃痛，经过几小时以后，疼痛逐渐转移到右下腹，这种转移性腹痛是急性阑尾炎的特点，约 70 ～ 80% 的病人有这种典型症状。至于腹痛的性质和轻重，主要决定于阑尾发炎的程度，所以，各人情况不同。

生阑尾炎的人，除了腹痛以外，还常常恶心呕吐。如果用手摸摸肚子还是软的，只在右下腹（阑尾点）有压痛，体温或热度不高，这说明阑尾的炎症还比较轻，属于单纯性阑尾炎。如果阑尾发炎比较严重，已经化脓、坏死或已穿孔，那么肚子痛得更厉害，压痛的范围也会扩大，同时伴有高烧，按摸肚子时腹壁肌肉紧张，或者在右下腹能摸到肿块。不论是哪种阑尾炎，血液中的白细胞总数都会增高。

得了阑尾炎，应该及时进行治疗。轻者，可用中草药、针刺，或用抗菌素控制。重者，就得动手术，把化脓、坏死或穿孔的阑尾割掉。（盛丹菁）

为什么会生痔疮？

曾有句俗话说："十人九痔"。这说明痔疮的发病率很高，是一种常见的慢性疾病。


为什么人会生痔疮呢?

在人体肛门附近分布着痔静脉，如果痔静脉回流不畅而曲张、变粗，就形成痔疮。痔疮可以分为三种：在肛门里的痔静脉丛曲张和变粗，叫内痔；在肛门外的痔静脉丛曲张和变粗，叫做外痔；如果肛门内外都是曲张和变粗，并且彼此相连，就叫混合痔。

好好的痔静脉丛怎么会变得曲张和粗大呢?

这是由于痔静脉血液回流发生障碍引起的。直肠、肛门在人体的下半身，分布在这些部位的静脉血液是从下往上的回流，本来就不太容易。如果某种原因增加了静脉回流的阻力，久而久之，则导致曲张、变粗。例如，便秘（大便不通）时，干燥发硬的粪块紧紧地塞在血液回流的通道上，使血液回流不畅，于是静脉就会发生曲张、变粗。所以，有习惯性便秘的人，或是坐着或站着时间较久的人，都容易使痔静脉回流不畅、充血、受压而形成痔疮。得了痔疮，容易引起肛门发炎、疼痛和出血，出血严重时会造

成贫血，影响工作和学习。






痔疮是可以预防的。首先，应养成每天定时大便的良好习惯，避免发生便秘或慢性腹泻。大便干燥发硬时，不宜依靠吃泻药通便。平时应多吃些含纤维素多的蔬菜，如青菜、芹菜等，少吃辣椒等刺激性食物，同时不要吸烟喝酒。每天早晨空腹饮 500 ～ 1000 毫升水，也可以治疗便秘。其次，要经常注意保持肛门清洁，用温水洗涤，久坐、久站以后，要适当进行活动，这样有利于痔静脉血液的回流。如果发现肛门或直肠有慢性炎症，则应到医院及时治疗，以减少痔疮的发生。（吴顺德）

为什么会有平脚？

在赤着脚走过的路上，每个人都会留下脚印。脚印中间总是有一个半月形的残缺，这个残缺就是人们的足弓。在无论怎样崎岖不平的道路上，人们照样能够行走，就是足弓的作用。没有足弓，医学上称“平足症”。平足症的人走路时留下完整的脚印，而且因为足弓塌陷，压迫足底血

管神经，就可能产生足底麻木、疼痛和脚底发冷等症状。由于足弓塌陷，足部缺乏弹力，也就不能长时间站立、长距离行走、弹跳和负重。



平脚　　正常脚


因此，足弓对我们来说，是很重要的。它给人以足够的弹力，是人体最好的防震装置，借以避免震荡对内脏和关节的损伤。人在站立时，仅足跟、大脚趾和小脚趾趾掌关节底侧三点着地。三点着地，使身体达到最好的平衡，在任何高低不平的地面上可以定出一个平面，保持身体的平衡。并且，身体所有的负重，其重量就分散到与地面接触的三个点上。因此，人们站立、步行、跳跃、挑担，从事一切活动就会感到很方便。

足弓由跟骨、距骨、舟骨、骰骨、第 1 ～ 3 楔骨、第 1 ～ 5 跖骨、韧带和肌肉组成。凡是足骨、韧带和肌肉的异常，都可以引起平足症。例如，正在发育中的青少年，由于长期站立、长期负重、经常走远路、休息和营养不足，使足部疲劳，导致慢性劳损，肌肉和韧带萎缩，形成平足症。

另外，舟骨结节发育过长、第一跖骨过短等足骨先天发育异常，足部压伤或骨折，患小儿麻痹症、类风湿性关节炎等疾病，都可引起平足症。父母有平足，子女常也有平足。

青少年时期多参加体操、跑步和骑自行车等活动，对预防平足症有一定效果。已经发生了平足症，就不适宜再穿无鞋跟的便鞋和凉鞋，应当穿有后跟的鞋或穿矫正鞋，也可以赤足用足尖走路或用足底踏在弹簧上锻炼，增强支持足弓的肌肉。平足症治疗最好在医生的帮助下进行。（刘胜泉）

为什么会发生“落枕”？



在日常生活中，人们有时一觉醒来，感到颈部牵痛不适，头向痛侧偏斜，不能随意活动。这就是“落枕”，一种常见的软组织损伤，临床上称“颈部扭伤”。

颈部和关节、腰部一样，是容易扭伤的部位。发生扭伤的原因，常常是由于颈部位置不正或受风寒侵袭。例如，突然搬举重物、做滚翻动作时头部位置不正、睡眠时枕头过高、熟睡时头颈

部过度斜置或肩颈裸露受凉、乘车时坐在窗口迎风斜视车外景色以及在凉风中长距离乘坐敞篷汽车等等，都是引起颈部扭伤最常见的原因。

颈部扭伤后，轻的感到颈部牵痛，头不能自如活动。重的局部有轻微肿胀，疼痛压痛明显，可伴有头昏、精神不好、食欲减退、烦躁不安等全身不适症状。由于扭伤部位的肌肉不同，疼痛牵引的部位也不同。胸锁乳突肌扭伤时，可引起胸骨旁牵引痛；颈长后肌扭伤时，可引起脊背部牵引痛；斜方肌扭伤时，可引起肩部牵引痛。这时，颈部活动明显受到限制，影响工作和睡眠、饮食等日常生活。



颈部扭伤是软组织损伤中较轻的一种损伤，病程较短，一般 3 ～ 6 天便可自行恢复。治疗原则是舒筋、止痛、解痉挛。中医伤科在治疗颈部扭伤方面，具有独特的疗效。（刘胜泉）

为什么青少年容易发生脊柱弯曲？

俗话说：“坐有坐相，站有站相”。这对青少年保持正确的姿势，使身体正常生长发育是很重要的。



有些青少年，由于长时期坐的姿势不正，往往造成脊柱的畸形发育。姿势不正，有客观的原因，也有主观的原因，如有些少年儿童不是好好地坐着，而是习惯地用一只手臂支着头斜靠在书桌上看书，这样，长时间地以单侧上肢作支柱而使脊柱偏倚；也有的是因长期一侧肢体负重，如固定一侧肩挎、手提书包，或长时间单手拎水、单肩挑担等，躯干为保持平衡而偏倚；或者长时期坐在教室前排两侧，为了看清黑板，常要歪头侧肩而造成偏倚；结果都会引起脊柱侧曲。也有的是因课桌过低，两肘不能自然平放在桌面上，以致看书时躯干重心向前，头向前倾，引起脊柱异常后凸而形成圆背，甚至驼

背。少数人长时间坐在教室前排，距黑板太近，头过于后仰或长时间的过分挺胸，使正常脊柱胸曲消失而造成直背畸形。

脊柱异常弯曲畸形不仅影响体态的健美，而且还会影响人体心肺等重要内脏器官的发育，有脊柱弯曲畸形的青少年，他们的活动力往往受到限制，容易疲劳，肺活量减小，心血管功能和血循环受到妨碍，因此，对青少年来说，都应从小注意保持正确的姿势，以利长好身体。

为什么青少年容易发生脊柱异常弯曲呢?

我们不妨先做一个简单的试验：将两根同样长的嫩柳枝和枯老柳枝弯成两个圈，并分别扎好，几天后松开，你会发现嫩柳枝比枯柳枝弯得厉害。由于儿童和青少年正在生长发育阶段，骨组织的特点是水分较多，而固体物质和无机盐成分较少，基本的骨组织是由富有韧性的结缔组织纤维束组成，仅有很少的骨化板层结构，所以青少年，尤其是儿童的骨骼也和嫩柳枝一样，可塑性很大，容易弯曲变形。随着年龄的增长，骨骼不仅增长，而且变得粗壮、硬化。如果在少年儿童时期姿势不正，日久后就易变成固定性的骨骼变形，等到年龄大了，矫治就很难收效。成人的骨骼已完全骨化，象枯柳枝一样，不容易发生偏倚畸形，即使长时间姿势不正，最多引起肌肉劳损产生酸痛。

为了防止脊柱异常弯曲，必须从小养成良好的姿势习

惯，除了注意坐势、立势以外，还要注意各种劳动的姿势。学校应积极开展有利少年儿童脊柱正常生长发育的体育运动和课间活动。老师要经常及时地纠正学生在学习过程中出现的不良姿势，要定期给学生调整坐位，尤其是坐在教室前排两侧的学生。要嘱咐学生轮换两肩挎书包或采用双肩背带式书包。对已经形成不正确姿势的学生，则需要在医生和老师正确指导下，较长时间地用系统的矫正体操进行治疗。

至于极少数驼背患者，那是因为小时候得过佝偻病，长期忽视治疗而造成的持久性脊柱变形，或因患脊柱骨痨病等引起驼背，则更应注意治疗，以防加重。　（史镇洪）

为什么老年人容易发生骨折？

一个人的高矮决定于他的下肢骨和脊柱的长短。我们常听人家说：“这个孩子又长高了。”其实，他们是在说这个孩子的骨头增长了。人的骨头不但会长，它的质也会发生变化。

婴孩刚生下来，骨头都是柔软的。随着孩子的生长发育，他的骨头也就伸长、变粗和变硬。从婴孩到成人，骨头每天都在长大，直到定型为止。成年人的骨头比较坚韧，

而老年人的骨头脆而硬。由于老年人的骨头又脆又硬，所以，容易发生骨折。为什么老年人的骨头会又脆又硬呢?

骨骼由无机物和有机物构成。无机物以钙盐为主，而钙盐中又以磷酸钙最多，其次是碳酸钙，氯化钙和氟化钙很少。无机物使骨骼具有坚固性，在成人约占三分之二。有机物主要是骨胶原（骨粘蛋白），使骨具有弹性，在成人约占三分之一。

骨骼定型以后，组成骨骼的各种成分仍然不断地进行新陈代谢，各种钙盐的比例也随着年龄的增长而变化。老年人骨头中的无机物相对增多，并且碳酸钙大大增加，而磷酸钙却相应减少，具有弹性的有机物所占的成分逐渐降低，所以，他们的骨头变硬变脆，易于折断。　（盛丹菁）

为什么骨折后会长好？

在日常生活中，骨折是常遇到的损伤。骨头断了一般都能长好，但也有少数骨折后不能连接。

为什么骨折后能长好呢？人们往往认为一定是医生“妙手回春”。其实不然，医生所能做的只不过是将骨折两端放在较满意的位置上罢了。骨头长好，还是要靠骨头本身的愈合本领。

原来每根骨头表面覆盖一层很薄的膜，医学上称之“骨膜”。当骨头折断后，这层骨膜组织中的细胞就活跃起来，不断增生和产生新生骨，新生骨由少到多，由近及远，最后象一座桥一样，跨越骨折断端，骨折也就愈合了。



虽然骨折是自然愈合的，但经过人们对骨折治疗的不断实践，已能初步掌握骨折愈合的规律，使骨折按时或加速愈合。

骨折愈合要靠骨头本身的修复能力，但外加条件对骨折愈合也起到一定作用。例如，儿童骨折愈合就比大人快，婴儿的股骨骨折只要 3 星期就连接好，但大人至少需 3 ～ 4 个月。但年龄也不是唯一的因素，20 岁的人和 40 岁的人骨折愈合速度就无明显差别。骨折后的固定，不论是石膏或小夹板都很重要。有些不耐心的人，过早去除石膏或小夹板，如同拔苗助长一样，使骨折固定不足或固定不恰当，造成骨折不连接。

也许有人会想：既然固定有这么大好处，那就多固定一些时间吧！可是过久的固定反而不利，因为持久的不活动，会使肌肉萎缩，关节活动不灵，带来不必要的后遗症。

又如不同部位的骨折，也有不同的愈合时间，成人的手指的骨折在正常情况下 2 ～ 6 周就能愈合了，而上臂骨折则需 2 ～ 3 月。即使同一根骨头，由于骨折部位的不同，愈合时间也不同，肱〔gōng〕骨（上肢与肩相连的长骨）近端骨折，3 周就能长牢，而肱骨的中间部分骨折则需 2 ～ 3 月。只要正确掌握骨折的部位、类型等特性，以及骨折愈合规律，骨折一般都能很好地愈合。（陆宸照）

为什么断手可以再植？

皮肤破了可以长好；骨头断了，也可以接好。手断了，还能接上去吗?




人体组织在有血液循环的情况下，具有自行修复的能力。但是，如果失去血液供应，那么这部分组织不但失去修复能力，而且还要死亡。多少年来，由于没有办法恢复断离肢体的血液循环，因而只能将断手抛弃，以后再装上假手。

1963 年 1 月 2 日，上海市第六人民医院的医务人员，

把一位青年工人的一只完全断离的右手成功地接好了。不但断手得到存活，而且还恢复了感觉与良好的活动功能，不久就回到原来的工作岗位，用接上去的断手重新为社会主义建设积极劳动了。这不仅是我国医学史上的先例，也是世界医学史上的一件大事。1963 年，在罗马召开的国际外科会议上，一致认为这是世界上最成功的断手再植。

断手到底是怎样接上去的呢?



人的手是由骨骼、血管、神经、肌肉和肌腱以及皮肤这五个主要部分所组成。骨骼构成肢体的支柱；血管维持血液循环，供给养料，带走废物；神经传回皮肤所接受的感觉并传达大脑发出的命令使肌肉作出各种动作；皮肤还是保护人体内部各种组织的第一道防线。这五个部分，组成了一个统一的整体。接手时，首先要将轧坏的组织切除，然后用不锈钢制的螺丝钉将断骨固定在一起，使断离的手有了支架。其次要尽快的接通血管，目前一般应用带有缝

针的比头发还细的尼龙丝，将主要的静脉与动脉分别作精细缝合，保证血液循环通畅，这是断手能否存活的关键。以后再将主要的神经与肌腱分别一一正确缝合，使感觉与活动功能能有良好的恢复。最后缝好皮肤创口。手术以后，还要注意观察变化和进行各种治疗。两星期以后，才算接活。接活以后，还需要经过半年甚至一年的艰苦锻炼，才能逐步恢复原来手的功能。

是不是任何断手都可以接上去呢?

那也不是。因为接手时首先要把轧坏的那部分组织切除，如果整个手的完整性都已受到严重破坏，那就不能再接了。其次，手断下的时间不能太长，因为在没有血液供应的情况下，细胞只能生存很短的几个小时，超过这一时限，断手就会发生不可挽回的坏死，那时即使再把它接上也不能复活。正如折下的花枝枯死了就不能再插活一样。但如果将断下的肢体立即加以冷藏，使细胞对养料的消耗减少，细胞就可以多活一些时候，这样，断血时间比较长的断肢也就有可能接活了。在目前的动物实验中已能将断血 108 小时的狗腿接活。另外，在断手接上后立即应用“高压氧” 治疗，可以大大增加血液的含氧量，使濒临死亡的细胞得到充分的氧供应而回复生活力。应用这些方法，已能使断离 36 小时的手再植成功。

在断肢再植的基础上，我国医务人员还进一步创造了

肢体移位再植和上肢恶性肿瘤段切除远侧肢体再植等手术，使断肢再植不断取得新的发展，并在世界领域内继续处于领先的地位。

例如，将小指接到拇指的位置上，左足接到右足或足趾接到手上，这样可以使比较不重要的肢体发挥更有效的作用。将患有恶性肿瘤的一段肢体整段切除，把切下来的没有肿瘤的一段手重新接上去，这样看上去手虽然比原来短了很多，但是仍能保留有用的功能，比完全截去装一个假手要好得多。


断手指再植虽然看起来要比断肢再植简单，但是手指的血管很细，其直径一般小于 1 毫米，只有火柴梗的四分之一左右，缝接的难度很高，而且血管腔太小，缝好后不易保持血流畅通。因此，医务人员必须应用特制的器械和非常细的带针尼龙丝，在手术显微镜下作极为精细的缝合，手术后还要应用药物来防止血管被凝血块阻塞，保持血流畅通，手指才能存活。

最后，断肢再植目前还只限于应用本人自己的肢体。因为应用别人的肢体虽然在手术技术上并没有什么困难，但由于人体对别人的组织有一种特殊的“排异反应”，即使一时接得很好，不久还是要坏死脱落。目前医学界正在努力寻找消除这种反应的方法。如果这个问题能获得解决的话，医生就可以根据需要替没有手或没有脚的人接上真

正的手或脚了。 （鲍约瑟）

小腿抽筋会伤害身体吗？

小腿抽筋，是指人体下肢小腿后侧的肌肉所发生的痉挛现象，人们在日常生活中是经常碰到的。小腿为什么会抽筋？小腿抽筋会不会伤害身体？



平时，我们走路，用手握物，都是在大脑指挥下发生的行为，在没有大脑指挥的情况下，肌肉受到刺激会不会起反应呢？让我们做个实验来说明一下吧：将新鲜青蛙的腿，一端固定，另一端悬空，用电流刺激，可以看到肌肉的收缩。不仅如此，如用镊子去钳，敷上化学药品，或用冷和热去刺激，也同样可以引起肌肉的收缩。

这就是说，活的肌肉具有这样一个生理特性：它不仅可以在大脑的指挥下发生收缩反应，也可以以它固有的独立的感受性，接受外界刺激发生收缩反应。

人们小腿抽筋的情况就是这样。

平时，人们小腿抽筋，大多是由于受凉或小腿肌肉负担过重，过度疲劳而引起的。譬如，夜间睡眠下肢露在外面，游泳、举重、爬山时间过久，发生小腿抽筋的情况就比较多。

运动前缺少充分准备，小腿肌肉不能适应突如其来的变化，也常常诱发抽筋。如不作充分准备就下水游泳，再加上冷水的刺激，很容易迅速发生抽筋。这种情况是很危险的，往往使人下沉，以致溺死。

小腿抽筋也是失水、脑膜炎、脑部肿瘤、霍乱等病症在临床上的常见症状。

小腿发生抽筋以后，疼痛很剧烈，但一般很快在几秒钟或几分钟的时间里消失。有些人，疼痛时还可以在小腿肚上摸到一个硬块，待硬块消散，疼痛也就消失。

小腿抽筋没有特殊的治疗方法，发生以后，可以用手自下而上轻轻按摩，也可以用热毛巾敷，或者干脆迅速站立起来，使小腿肚的肌肉拉直，不让它收缩。不过这样做，在刚站起来时必须忍耐一阵极短促的剧痛。

小腿抽筋不会直接伤害身体，但是，它能扰乱人们的正常活动，造成很多不便。尤其发生在游泳时，也能产生意外的伤亡。

为了预防小腿抽筋，睡眠应注意保暖，即使在热天也

要注意。睡前可以轻轻按摩下肢，使血液畅通，并且饮适量开水。多补充一点水分到身体里去，对防止小腿抽筋有一定作用。另外，如果去游泳，入水以前要做好充分准备，使小腿肌肉能适应强烈的收缩动作。（刘胜泉）

肌肉可以搬家吗？

一个人的身上共有七百多块大大小小的肌肉，它们主要的功能是活动全身所有的关节，以完成工作和生活上所需要的各种动作。如果一旦由于得了某种疾病（如小儿麻痹症），或因外伤使肌肉的功能破坏，就会造成生理上的缺陷。如果是发生在下肢，就不能行走或行走时拐腿；如果发生在上肢，则手就不能高举或手指不能伸屈。过去，这些疾病被认为是不治之症，无法医治。但随着科学的发展，尤其是外科手术中手术显微镜的应用，采用肌肉移植的方法，已能将这些不治之症治好了。

手术显微镜，能将原来手术中肉眼看不见或看不清楚的血管和神经，放大数倍和数十倍，这样，吻接血管和神经就很方便了。肌肉移植就是采用这种显微外科手术进行的，把搬来的肌肉接活后，原来不能活动的关节就能恢复原来的功能。

肌肉移植首先是由澳大利亚一位科学家用病人本身胸前的一块胸大肌连同血管神经一起搬到这个病人的左上臂上，吻接血管和神经，使原来不能屈伸的左肘关节恢复了功能，治好了一个左上肢神经损伤的病人。这说明肌肉是可以“搬家”的，而且搬到新的部位能存活，并能发挥它原有的作用。

1973 年，我国就开始应用肌肉搬家的方法来治疗小儿麻痹后遗症及肌肉因外伤而造成的缺损。使不少上肢和下肢瘫痪的病人恢复了健康，有的病人在手术后都有不同程度的改善，所以说肌肉搬家是一种行之有效的外科手术，今后还将不断发展。

由于人体有一种特殊的“排异反应”，所以到目前为止，肌肉搬家只能由本人身体的肌肉连血管神经一起搬，还不能用别人的肌肉来移植。（陶锦淳）

为什么烫伤后不可以乱涂红药水或紫药水？

日常生活中，有的小孩不小心烫伤了，为了防止细菌感染，有些家长急忙用大量红药水或紫药水涂在烫伤创面上，然后再送医院。其实，这样做不好，反而会给医生诊断和急救带来困难。

烫伤的程度决定于烫伤的范围（面积）和深度（皮肤受损伤程度）。正常皮肤碰到各种热的东西（如开水、热粥、热油、铁水、火焰等），即可引起不同程度的皮肤烫伤。由于温度不同，以及接触皮肤时间的长短，造成皮肤烫伤后所表现的颜色不一样。烫伤的伤势一般可分成一度、二度浅、二度深和三度四种不同程度的烫伤。这四种烫伤的治疗方法、愈合过程和后果也都是不一样的。

烫伤后，医生先要根据皮肤的颜色来判断烫伤的深度和面积，以制定治疗方案。一旦在烫伤的皮肤上涂满了红药水或紫药水，不但烫伤部位染上了红色或紫色，甚至连健康的皮肤也被大片染上颜色，使人难以辨认。特别是小孩，有时竟涂成个“红娃娃”。这样医生就不能正确地鉴别烫伤的深度和面积，给诊断带来困难，造成错误。另一方面，红药水（即红汞）中所含大量的汞被创面吸收后，还会引起汞中毒，反而给治疗带来更多麻烦。所以，烫伤后不能随便涂药，特别是那些不易洗掉的颜色，如红药水、紫药水等药物。

懂得了这些道理，我们在平时一旦遇到烫伤事故发生，就应尽快脱去烫伤人的衣裤、鞋袜（尤其是冷天穿棉毛衫、绒线衣等裹身的衣裤），用冷水冲洗数分钟（它的作用是使局部温度降低，减轻损伤程度），然后再用一块干净毛巾或被单包裹（以防空气中细菌感染），立即送附

近医院抢救。

至于平时生活中发生的局部小范围的浅度烫伤，如红肿（一度伤）、小水泡（二度浅伤），则不一定要到医院治疗，只要经冷水冲洗后，涂些蓝油烃，用清洁纱布包扎一下就行了。（徐惠贞）

为什么人烫伤后，有的要包扎，有的不要包扎？

有些人面部不慎烫伤了，立即到医院去治疗。结果医生不给涂药也不打针，光给擦洗一下就好了。而有些人手或脚被烫伤后，医生则给他包扎得严严实实。这是为什么呢?

这是因为烫伤后，这一部分的皮肤已经“坏死”，而坏死的皮肤很容易生长细菌、腐烂和发霉。对烫伤皮肤处理的要求，是要它不感染（发炎）、愈合快和不留任何疤痕。为了使烫伤创面不感染，我们应尽快地使它干燥或者涂上些能控制感染的药。

在治疗病人的过程中，为了使烫伤创面不感染，必须根据病人的具体情况，采取不同的治疗方法。在通常情况下，根据病人的烫伤部位、面积及感染程度，可采取暴露（即不包扎）和包扎两种方法。

暴露法，通常用于头面部、颈部、背部和臀部等不易包扎部位的烫伤。一般用消毒药水清洗后，不再用药，让它自然干燥，结成一层干痂；或者用热风迅速吹干，使创面上细菌大大减少。这样，在它下面的正常皮肤就会慢慢生长，在 2 ～ 3 个星期内，创面就能逐渐愈合脱痂。

包扎法，一般用于四肢或小儿躯干部位的烫伤，特别是在冬天，包扎后仍可穿上衣服，以防冻坏身体。但包扎还得要保护创面不受感染，所以在创面经消毒处理后，要敷一层油质纱布，外加厚层干燥消毒纱布进行包扎。包扎时必须注意外层纱布不能渗湿，否则，细菌容易沿着潮湿的纱布孔隙侵入创面，引起感染。对于已有感染的创面，可涂上磺胺嘧啶银等抗菌药物，再进行包扎。

这两种治疗方法，有时还可以互相变动，这就需要根据具体情况而定了。（徐惠贞）









