



十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社









医学

3

▸ 心脏手术



▾ 体外冲击波碎石机




▾ 血压表





◂ 人体化工厂



▸ CT 诊断仪



▴ 营养丰富的食物



十万个为什么

医　学

❸



少 年 儿 童 出 版 社

编　　辑

插图　胡永光 蔡康非等

装帧　张之凡 张慈慧

责任技术编辑　袁国强

续编前言

《十万个为什么》自 1961 年问世以来，久销不衰，至今累计印数达 5000 多万册，开创了我国科学普及知识读物长销、畅销的先例。30 多年来，少年读者虽已更迭了好几代，但它仍受到普遍的欢迎。与此同时，我们还不断地收到全国各地读者的来信，希望能将《十万个为什么》继续编下去。读者的热情支持，对我们，是最大的鼓励，并且成为我们编辑《十万个为什么》续编本的动力。经过几年的努力，终于能向热切期待着的广大读者，奉献上这崭新的《十万个为什么》续编本。

《十万个为什么》续编本共 10 册，因为是续编，所以仍按原来的九大学科分类，并接续原来各学科分册的编号出版，即数学 (2)、物理 (3)、化学 (3)、天文 (2)、地学 (2)、气象 (2)、动物 (3)、植物 (3) 和医学 (3)(4)。这一辑续编本 10 册和原来的 14 册合并，组成 24 册一套完整的《十万个为什么》。

《十万个为什么》续编本，在文章的体裁和风格上与原来的 14 册保持一致，在题目的选取和内容的编排上，继续注重知识性和趣味性，并且力求贴近生活，符合青少年读者的求知要求；同时，我们特别注重结合近年来世界科学技术的新发展，增加了许多传播新科学、新技术的题目和内容，激发读者进一步探索周围世界的兴趣。

参加续编本编写工作的作者，有不少是原来 14 册《十万个为什么》的老作者。我国一些著名的科学家还分别参加了各个分册的审订工作，对此，我们表示衷心的感谢。

希望读者读了续编本以后，对我们的编辑工作提出宝贵意见，帮助我们进一步提高这套书的质量。

编 者

1992 年 10 月

目　　录

为什么说在生命活动中起主导作用的是蛋白质 1
为什么人必须饮水 2
为什么人会衰老 4
为什么人工心脏能代替人的心脏 6
为什么人工肾能代替人的肾脏 7
为什么器官移植前要进行组织配型检查 8
为什么体外震波可以击碎体内尿结石 10
脑电图是怎么回事 11
心电图是怎么回事 12
为什么人的正常体温能恒定在 37℃ 左右 13
为什么人体口腔、腋下、肛门的温度不一样 15
为什么不生病不等于身体健康 16
为什么人的面色可以反映健康状况 17
为什么看舌苔能帮助诊断疾病 18
为什么有些人皮肤比较黑 20
为什么春天人容易困倦 21
为什么疲劳后眼圈会发黑 22
为什么脾脏也是有用的器官 23
为什么说肝脏是人体里的“化工厂” 24
为什么过多晒太阳对人体有害 26
为什么心脏有杂音不一定是心脏病 27
心脏会不会生肿瘤 28
为什么寒冷容易诱发心脏病 30
什么叫高血压病 31

低血压就是贫血吗 32
血压是恒定不变的吗 33
为什么青少年也会得高血压病 34
为什么两臂的血压不同 36
为什么过量吃盐会水肿 37
为什么过量吃糖会发胖 38
胆囊手术切除的人胆子会小吗 39
饭后奔跑会引起急性阑尾炎吗 41
为什么有些人多脚汗 42
为什么要眨眼睛 43
为什么强光也会引起近视 44
为什么不是人人适宜戴隐形眼镜的 45
为什么婴幼儿也会患青光眼 46
为什么不会有相貌完全相同的人 47
为什么“左撇子”总是极少数 48
为什么鼻子会发红 50
为什么鼻毛剪不得 51
为什么人会感到疲倦 52
为什么人要睡觉 53
为什么人会越睡越懒 54
为什么会发生脑溢血 55
为什么“中风”病人总是一边瘫痪的 56
为什么多动手指能健脑 58
做梦会不会伤精神 59
为什么要制怒 60
为什么会“人吓人，吓煞人” 61
为什么近亲不能结婚 62

为什么不要强忍大小便 64
为什么验小便可以帮助诊断疾病 65
为什么噪声有害健康 66
为什么沙浴、泥浴能治病 68
为什么剧烈运动后不能洗冷水浴 69
为什么运动员禁止服用兴奋剂 70
患贫血的人能参加体育运动吗 71
练举重会屏出“小肠气”吗 73
为什么说“睡前洗脚，胜吃补药” 74
为什么不能开着电扇睡觉 75
为什么久坐久站脚会发胀 76
为什么领带、腰带不宜过紧 78
为什么少女不宜穿紧身衣裤 79
为什么少女也要戴胸罩 80
为什么少女不宜穿尖头皮鞋 82
为什么妇女不宜骑男式自行车 83
为什么少女的内裤老是会湿腻腻的 83
为什么洗发、烫发不宜过勤 85
为什么要“饥不洗澡、饱不理发” 86
为什么不宜经常看通宵电影 87
为什么老年人的皮肤会起皱 88
为什么不可拔眉毛 89
为什么面部疖子不可挤 91
为什么不能用手揉眼睛 92
为什么要正确选择牙刷和牙膏 93
为什么偏嚼有害健康 95
为什么人的唾液具有多种生理功能 96

为什么不要随便乱用化妆品 98
多用染发剂会得皮肤癌吗 99
为什么夏天多发皮肤病 100
为什么“脚癣不算病，治好反生病”的说法不科学 101
为什么姑娘脸上会生“桃花癣” 102
为什么“牛皮癣”不是癣 104
为什么吃好早餐能全天精力充沛 105
小孩子吃鱼子会变笨吗 106
为什么冠心病人不宜吃得过饱 107
为什么有时吃东西会觉得口苦 109
水果连皮一起吃好吗 110
为什么多吃粗粮好 111
吃笋会刮掉肚子里的油水吗 112
为什么夏天不宜多吃冷饮 113
为什么饮酒后有的人容易醉，有的人不容易醉 115
为什么饮酒会妨碍消化功能 116
为什么儿童不宜饮酒 117
为什么肝脏病人不宜喝酒 119
急性肝炎病人的饮食有禁忌吗 120
为什么孩子不宜多食爆米花 121
为什么不宜多吃巧克力 122
为什么发烧时不想吃东西 123
为什么中小学生上午课间大休息时要加餐 124
为什么常吃泡泡糖有益 126
常吃素油好不好 127
为什么在剧烈运动前不宜吃高脂肪、高蛋白质食物 129
鸡汤补还是鸡肉补 131

为什么说“生癌不能吃鸡”是错误的 132
为什么维生素 A、D 不能多服用 133
为什么不能生吃菱、藕、荸荠 135
为什么多吃脂肪食物会诱发肿瘤 136
为什么吃了黄泥螺和某些蔬菜会引发日光性皮炎 137
为什么不宜过多服用含铁补剂 138
为什么不要乱吃补药 139
为什么儿童不宜服用人参蜂皇浆 141
为什么有些药物会引起大小便变色 142
为什么用药不当会引起发烧 143
为什么药物不能随便合用 144
为什么有些药物不能擅自停服 147
为什么不要乱用外用药物 149
为什么碘酒与红药水不能同用 150
为什么腹痛不能随便使用止痛药 151
为什么不宜直接对着药瓶喝药水 152
为什么病菌会产生抗药性 154
为什么吃药、打针能治病 155
服用西药要不要忌口 157
为什么有些中草药要加工处理后才能用 158
为什么烧煮中药时，有些药煮的时间要长，有些药煮的时间要短 160
为什么中暑高热不宜使用发汗药 162

为什么说在生命活动中起主导作用的是蛋白质？

我们人的机体，含有丰富的蛋白质。

人的机体，归纳起来，是由五种物质组成的，即 60 ～ 70% 的水，25 ～ 30% 的有机物（包括蛋白质、脂肪、糖），以及 5% 左右的无机物。再加上一些维生素（它并不是构成人体物质的本身），组成了人体生命活动的六大物质基础，或称六大营养物质。

而在这六大物质中，要数蛋白质最为重要了。可以这样说，没有蛋白质就没有生命。

为什么这么说呢？这可以从人体中蛋白质的数量和它的多种功能加以说明。

首先，蛋白质是所有细胞的主要组成部分，约占人体干重（除去 60 ～ 70% 的水）的一半，即 15 ～ 20%。蛋白质在人体中不仅含量高，而且种类多。组成人体蛋白质分子的基本单位是氨基酸，有 20 种。



就是这 20 种氨基酸，组成了人体所含的几万种蛋白质！这是由于各种蛋白质所含的氨基酸数目不同、排列不同、构型不同的缘故。这几万种蛋白质分布在人体的各个部位、各个器官、组织以及细胞里，在那里发挥不同的生理功能。

其次，蛋白质在人的生命活动中是起着主导作用的：新陈代谢是生命延续的重要途径，蛋白质以酶和激素的形式出现，起着调节新陈代谢的作用，因此没有蛋白质，就无法进行新陈代谢、

心脏收缩、胃肠蠕动等活动。此外人在进行工作、学习、劳动、体育等活动时，都是同肌肉收缩分不开的，而肌肉收缩就是以肌肉中一种具有收缩功能的蛋白质为物质基础的；血液要维持胶体渗透压，就要靠蛋白质（如白蛋白、球蛋白）；呼吸时，氧和二氧化碳的运输，是靠血液中红细胞内的血红蛋白来完成的；皮肤和毛发都是蛋白质构成的，起着保护身体的作用；蛋白质和核酸结合，构成核蛋白，在机体生长、繁殖以及遗传上，起着主导作用；血浆中含有一种抗体，是一种具有防御功能的蛋白质，能保护机体免受细菌和病毒的侵入……等等。可见，蛋白质在人的生命活动中，确实是起着主导作用的。　（劳宏燮）

为什么人必须饮水？

水是生命的源泉。除空气之外，水是人生存最必需的物质，是人体的重要组成部分，一个体重 50 千克的人，水就占 33 千克左右。水包含在人身体各个器官和组织里。人的肌肉里，水分占一大半，含水比较少的要算骨骼，可是每 1 千克骨骼里也有 250 克水呢。

健康成年人每天生理上大约需要 2 ～ 3 千克水。这些水都是通过食物和饮料、茶水进入人体，经由胃肠道消化吸收，成为组成血液、淋巴液、细胞组织液、消化液、唾液、泪液、汗液和尿液等的主要成分。人体内的消化、吸收、营养输送和废物排泄等机能，都需要水来维持。

血液中含的水分很多，约有 50% 左右。身体吸收的营养物质，须溶化在血液里，才能输送到身体各个器官组织，而身体各处的细胞组织在新陈代谢过程中产生的废物，也要溶化在血液里，才能运送到身体各个排泄器官排出。如果血液没有大量的水，就无法溶化这些东西，完成不了“输入运出”的任务。

人的汗液含有 98% 的水。出汗有调节体温的作用，因为出汗蒸发

可以带走身体里的热量，特别是在高温条件下，通过发汗，可以维持人体的正常体温。如果身体里缺乏水分，那就出不了汗，体温将会升得很高，严重损害健康。此外，汗水还能把身体里的一些废物带出体外。

唾液的作用是湿润食物，便于吞咽，并且使口腔保持滋润，说话、唱歌才不致于发生困难。唾液的 99% 是水。口腔每天约分泌 1 ～ 1.5 升唾液，人如果少喝了水，唾液就明显减少，并且会感到口渴难忍。




消化液也是进入人体的水分的主要“产品”，它包括胃液、胆汁、胰液和肠液，每昼夜总的分泌量约 6 ～ 7 升。消化液的作用是使进入胃肠道的食物变得稀烂，容易消化，有利于肠壁吸收。消化液在胃肠道参与消化的过程中，它自身含的大量水分，除极小一部分和粪便结合从肛门排泄出去外，其余大部分都和营养物质一起经由肠壁的毛细血管吸收回归循环系统。

排出水分最多的是尿液。肾脏将身体里的代谢废物和多余水分以尿的形式排出体外，每天约产生 1 ～ 1.5 升尿液。在排除代谢废物和尿液时，如果体内没有足够的水，这些代谢废物就不能溶解，会在肾脏里沉积形成肾结石。尿液的多少与进入体内的水分多少有关，多喝水便能保持小便畅通。

人如果得不到足够的水，对健康的危害是非常严重的，首先产生口渴感觉，时间一长，就会脱水，症状是尿少、眼窝凹陷、嘴唇干燥；严重脱水时，体重减轻，体温调节不起作用，诱发脱水热，产生昏迷、酸中毒。一个人得不到食物，只要有水吃，可活 30 天左右，如果 7 天不喝水，便无法生存下去。可见人的生命与水的关系是多么密切，明

白了这些道理，就该养成每天多喝水的好习惯。　　（柯依）

为什么人会衰老？



有人说，人从一出生，就开始走向他的人生终点——死亡。这句话虽然对刚出生的婴幼儿来说，未免说得过早了，但事实上确是这么一回事。一切生物到了地球上，都要经历出生、成长发育、衰老、死亡这样的过程。人也是如此，至于这段历程是长是短，也就是说寿命，那就各各不同了。自古以来，不少人都想长生不老，但那是枉费心机的；衰老、死亡，对任何人都是公平的，连不可一世的秦始皇，尽管他吃了不少“长生不老”药，最后还得走上他的人生归途。

那么为什么人会衰老呢?

这其实同机器一样，使用的时间长了，就会因磨损而老化。人好比一架机器，经过七八十年、八九十年，甚至百把年，机体的各组织、各种器官都会老化。就以心脏来说吧，每分钟搏动 70 多次，一天 10 万多次，一年 3650 多万次，如果 80 年，就是 30 亿次！你想想，就算是一架上好的机器，30 亿次运转下来，哪有不受损耗的道理。心脏是这样，那么脑、肺、肝、脾、肾，眼睛、耳朵、牙齿、消化系统、骨骼系统，等等，七八十年用下来，情况也差不多。所以，人的衰老是必然会发生的。

当然，上面说的还只是比较表面的解释，人会衰老，还有更内在

的生理上的原因。经科学工作者研究，可以归纳三个方面的因素：一是细胞数量的减少，二是组织弹性的减退，三是钙的分布出现了异常。

人在平时，细胞是不断地在进行新陈代谢的，一部分细胞减少了，但存活下来的继续成熟和繁殖，因而弥补了细胞数的减少，这叫做代偿作用。但是到了老年，就不是这样，代偿能力逐渐差了，机体各部分的细胞逐步减少。大脑细胞减少，造成智力、记忆力减退；小脑也是这样，所以老年人动作缓慢，还容易跌交；心肌细胞减少，代之以纤维组织，因此收缩力减弱，心脏功能的贮备减少，容易发生心力衰竭；其他各种组织、器官都是这样，随着细胞新陈代谢的“入不敷出”，功能都大大减退了，眼花耳聋就是衰老的一个最明显的现象。

引起衰老的第二个重要因素，是组织弹性的减退。皮肤皱缩，缺乏收缩能力；肺弹性减退使肺活量减小，相反，肺中残余气增多；特别严重的是，主动脉和各分支动脉的弹性不足，造成血压升高……就是连眼睛晶体的弹性也会减弱，引起老花。组织弹性的逐步减退，是衰老很关键的原因。

再一个原因就是钙的分布出现异常。最典型的是，到了老年，骨骼中的钙逐渐减少了，因而容易骨折；而在一些组织中，如主动脉、冠状动脉、脑动脉壁等等，钙却大量增加了，出现了钙沉积的现象，使这些心血管系统的组织逐渐缺乏弹性和收缩能力。该有钙的地方缺钙，不该有钙的地方多钙，这种钙分布的异常现象，也是人衰老的重要原因。

以上这些，还只是从人体本身的角度来谈衰老的问题，至于自然环境、社会环境引起人产生衰老的各种因素，那又是另外的一回事了。

（劳宏燮）

为什么人工心脏能代替人的心脏？

以前，有部德国神话影片，叫做《冷酷的心》，讲的是善良的彼得由于被恶魔“荷兰鬼”调换了一颗石心，从此变得冷酷无情。这虽然是个童话故事，但不禁让人联想到一个问题：人可以调换一个“假心”吗？



近代，许多科学家都在争先恐后地研究“假心”——人工心脏的制造，他们希望用人工造的心脏去挽救患心脏病人的生命。

走在研制人工心脏前列的要数美国犹他大学的贾维克博士，他研制的贾维克 7 型人工心脏，博得了医学界的一致好评。这是怎样的一颗人工心脏呢？原来，它采用聚氨基甲酸乙酯和铝等作为原料，制成两个腔室：一个腔室代替人的左心；另一个腔室代替人的右心。每个腔室的下边都连着一根导管，导管通向体外，通过向导管里注入空气或吸出空气，使得腔室里的一层隔膜来回活动，好比正常人心脏一样，随着隔膜的活动，“泵动”血液维持人体的血液循环。

贾维克设计的这个人工心脏，作过大量动物实验，在小牛胸腔中稳定和有效地工作了 221 天。1981 年 9 月，经批准正式用于人体。1982 年 12 月 1 日深夜，美国盐湖城一位 61 岁的退休牙医克拉克因心脏病生命岌岌可危。犹他大学的德弗利斯等医生，为克拉克施行了人类第一次人工心脏装置术，手术整整进行了 7 个半小时，奇迹终于出现了，

克拉克居然在贾维克 7 型人工心脏帮助下活了下来，依靠体外空气压缩机不停地泵入吸进空气，人工心脏工作得很好。但是很可惜，最终因人工心脏的阀门焊接处开裂出了故障，克拉克活了 112 天后死去。可是，这毕竟是人类第一次使用人工心脏的成功记录。

1984 年 11 月 25 日，贾维克 7 型人工心脏第二次成功地应用于人体，病人叫施罗德，52 岁因严重心脏病已生命垂危，仍然是德弗利斯等医生为他安置了人工心脏，结果施罗德依靠人工心脏活了 622 天。

目前，人工心脏的研究工作仍然方兴未艾，除贾维克 7 型外，其他型号也不断涌现。通过人工心脏的使用，已挽救了不下数十例病人的生命。当然，这项医学成就还有待进一步提高和改进。可以预见，它的发展前景十分喜人。（姚德鸿）


为什么人工肾能代替人的肾脏？

人体的肾脏担负着排泄尿液的重任，身体里的许多废物通过尿液排出体外。万一肾脏有了病不能正常工作，或者由于中毒、失血等其他因素造成肾脏不能发挥作用，生命就有危险了。那么，怎样来挽救这些人的生命呢？必须采用人工肾！

说起人工肾的原理并不复杂，假如有一种半透膜，膜的一边流动着血液，另一边流动特殊的药液，那么血液与药液就能互相渗透，利用这个科学原理，可以用药液把血液中多余的物质与废物清除掉。同时，药液还能往血液里补充人体需要的物质。人工肾就是采用这样的原理来制造的。人工肾里的半透膜叫透析膜，特殊的药液叫透析液。

1913 年，美国巴尔的摩市的艾贝尔等人，首先采用火棉胶制成简单的人工肾，成功地清除了动物血液中某些废物。1923 年，德国学者乔 · 哈斯，再次用火棉胶管作透析膜，管里流动着病人血液，管外流

动着盐水，治疗过一些晚期肾脏病人。1934 年，荷兰医生考尔夫，对人工肾作了更多的改进，采用赛璐玢膜作为半透膜，并对透析液的成分也进行专门研究，终于制成了一台能实际应用的人工肾。



人工肾的种类大致有三种：一种是蟠管型人工肾，用赛璐玢膜制成弯曲盘旋的蟠管，管里流动病人血液，管外流动透析液。第二种是平板型人工肾，用三块聚丙烯平板，每两块平板之间安放两层赛璐玢膜片，血液在两层膜片之间通过，膜片与平板之间流过透析液。第三种是中空纤维人工肾，用一万根以上醋酸纤维或铜仿纤维制成直径 200—300 微米的多孔纤维管，血液在纤维管中流动，透析液在纤维管外流动。定时采用人工肾治疗，可帮助病人清除血液内的废物，替代肾脏工作。我国目前许多医院里都备有人工肾，并成功地治愈了大量的病人。


（姚德鸿）

为什么器官移植前要进行组织配型检查？

1952 年 12 月的一天，法国巴黎一家医院收治了一位从高处坠落的 16 岁木工，名叫马里乌。开刀一瞧，右肾已跌得粉碎，只能切除掉，更使医生惊讶的是，他压根儿没有长左肾，马里乌顿时成了没有肾脏的人，生命危在旦夕。在病人母亲再三恳求下，医生同意把马里乌母亲的一只肾脏切下来，移植到她儿子身上。移植手术结束几分钟后，这个肾脏就开始制造尿液，医生们欣喜若狂。可是好景不长，手

术后不久，这个移植肾突然停止工作，马里乌最终还是失去了生命。

事隔 4 年，美国波士顿的几位医生，又遇上一个 28 岁名叫理查德的晚期肾脏病病人，他的两只肾脏全病坏了，只有进行肾脏移植才能挽救生命。正巧，理查德有一个同卵双胞胎的哥哥名叫罗纳德，他愿意献出一只自己的肾脏给弟弟。奇迹出现了，理查德接受肾脏移植后竟活了下来，而且整整活了 7 年。后来由于其他原因而死亡，临死前移植肾的功能依然很好。



同样是肾脏移植，为什么前后两次的移植结果截然不同呢？经过深入研究发现，马里乌和他母亲由于器官之间组织类型不那么相配，结果发生了“排异反应”，马里乌的身体要竭力赶走原本不属于他的肾脏，所以移植失败。相反，由于理查德和罗纳德这对同卵双胞胎，两人器官组织类型完全一样，不存在“排异反应”，所以移植便成功了。


那么，什么是组织类型呢？原来，人与人之间除血型不同外，在白细胞和其他组织细胞膜的表面，有一种抗原物质，如果两个人的这种抗原物质完全相同，就是说他们俩的组织类型相同。反之，就是组织类型不同。我们都知道，不同血型的人是不能随便输血的，必须配好互相适宜的血液才行。同样道理，当组织类型不同的器官被移植到人体内时，身体为了维护本身体内环境的统一，就会产生排异反应来赶走或消灭这个“外来物”。因此，凡是作器官移植之前，医生总是尽量物色组织类型彼此相近的人来进行，再加上使用一些防止“排异反应”的药物，移植成功率就会提高，这也

就是为什么在移植前要进行组织配型检查的道理。　　（姚德鸿）

为什么体外震波可以击碎体内尿结石？

从本世纪八十年代初起，医学界开始使用了一种新型的治疗尿结石的设备，那就是体外震波碎石机。它是由德国慕尼黑超声研究中心学者布伦德尔和他的同事们，经过 10 年坚持不懈的努力，创造成功的。体外震波碎石机借助水震波的震荡力量使尿结石变成粉末碎屑，然后随尿液排出体外。这样可以使病人免受开刀之苦。1982 年德国医生乔塞首先成功地用于病人治疗，从此体外震波碎石风靡于世。

体外震波碎石机的原理并不复杂，震波由一组高压电容在 1 微秒（1 微秒等于 1/1000 毫秒、1 毫秒等于 1/1000 秒）的短促时间里放电产生，通过一根电极将这种放电产生的震波释放出来，震波又以水作为传递媒介，并且经过聚焦，将分散的力量集中起来，瞄准人体内的尿结石，就可以将它们击碎。难怪治疗时病人有的半躺在一个水槽里，有的治疗部位外边放一个水囊，目的都是希望通过水将震波传递到结石上去。



震波真有如此大的威力吗？坚硬的尿结石怎么会被击碎呢？有材料表明，在每平方厘米上，震波力量可达 300 ～ 400 千克，而一般尿结石耐受打击的压力强度，最多也不过每平方厘米 90 ～ 100 公斤，尿结石当然会被击碎了。

有人会问，坚硬的尿结石会被击碎，那么，人体在震波打击下不是也会粉身碎骨吗？奇妙就在这里，尿

结石击碎了，人体却不受影响。原来，人体的大部分组织里都含有大量水分，因此，它们也就能够像水一样顺利地让震波传递过去。但是尿结石就不同了，它不含水分，震波无法通过水的传递越过去，于是尿结石就被击碎。

目前，大多数的尿结石，包括肾、输尿管或膀胱的结石，都可以通过体外震波碎石治疗。病人睡在体外震波机上，有的要上麻醉，有的甚至不需要麻醉，尽管进行上千次震波冲击，也不会产生疼痛。当然，事先要通过 X 线或者超声波找准好尿结石的位置。越是瞄得准，碎石的效果越好。有的经过一次治疗就行，有的需要重复几次。被击碎的碎石会陆续随尿液排出，不太大的尿结石在 2 ～ 3 周内也可以排干净。我国是从 1985 年起开展该项治疗，至今已治愈了好几万人，效果良好。

（姚德鸿）

脑电图是怎么回事？

脑子也是一座“发电厂”，脑细胞的活动会产生电流。经测定，脑子产生的电流极其微弱，电压很低，只有几十到几百微伏，1 微伏为 1/1000000 伏特。一般城市用的交流电电压是 220 伏特。人的脑子产生的脑电压仅是市电电压的 1/20000000，所以是一座“微型发电厂”。

脑电图是借助特制的电子仪器，将脑子的微弱电流放大成几百万倍后描记在记录纸上所呈现的曲线图。

脑电图表现的曲线，有 β、α、θ 和 δ 4 种基本波型。

β 波的频率 14 ～ 30 次/秒，波幅 20 ～ 50 微伏。是人在清醒状态和运动兴奋时出现的脑电波。


α 波的频率 8 ～ 13 次/秒，波幅 50 微伏，是人在疲劳情况下，蒙胧入睡时出现的波形。

θ 波的频率 4 ～ 7 次/秒，波幅 100 ～ 150 微伏，是睡着后的波形。

δ 波的频率 0.5 ～ 3 次/秒，波幅 200 微伏，是熟睡情况下的脑电波现象。

脑电图可以用来研究不同生理情况下的脑活动，也可以用来诊断大脑疾病。例如大脑半球患有肿瘤、脓肿等病变，清醒状态下可在某个部位出现不该出现的 θ 波或 δ 波，所以说它是医生的好助手。

（姚德鸿）




心电图是怎么回事？

人体组织也像发电机一样，会产生电流。不过，这种电流不是由摩擦产生的，也不是因磁场感应而来，而是由身体上的细胞活动引起的。人体的组织由无数的细胞紧密而有规则地排列组成。在细胞与细胞之间狭小的空隙里，存在着许多液体，细胞内部与细胞外部的液体中又有不少带着电荷的离子，例如钾离子、钠离子、氯离子等。细胞处于安静状态时，细胞内部主要是钾离子，外部主要是钠离子。当细胞受到某些刺激开始工作与活动时，这些带电离子就会在细胞膜上穿进穿出，电流就随之产生。

各类细胞都有各自不同工作任务。眼睛视网膜有视觉细胞，对光线比较敏感，它们受到不同刺激时就会产生电流。皮肤上的感觉细胞，肌肉里的运动细胞，脑子里的神经细胞……都会产生电流。心脏的心肌细胞，随着心脏的跳动，也会产生电流，医学上叫做心电。

要测定每一个细胞产生的电流大小是困难的，但是测定一组细胞产生的电流的总和，还是有可能的。



把心脏收缩与舒张活动时心脏所发出的电活动，运用特殊的仪器放大后描记下来，画成一条心电曲线图，那就是心电图。

那么，标准的心电图是什么模样呢？它叫 PQRST 曲线波：P 是指心房在收缩，QRS 表示心室收缩，T 是心室收缩后复原的波型。心脏每分钟如果跳上 80 次，那么就会出现 80 个 PQRST 曲线波，心跳规律如果正常，PQRST 曲线波彼此之间出现的间隔的时间就相同。

心电图主要用来诊断心脏疾病，如果心跳不规则，PQRST 曲线波彼此之间出现的间隔时间就不相同，或早或晚很不规律。如果心脏肥大，PQRST 曲线波型就会明显改变。所以给患者做心电图已成为检查心脏病的基本方法。（姚德鸿）


为什么人的正常体温能恒定在 37℃ 左右？

体温，是身体深部温度的简称。人和高等动物一样，都能保持各自一定的深部体温，不受外界环境温度变化的影响。

健康人的体温一般恒定在 37℃ 左右，年龄、种族、地区的差异不大，不过，一天 24 小时内稍微有点变化。通常总是清晨 2 ～ 6 点时低些，下午 2 ～ 8 点时高些。

人体的温度从何而来？首先来自饮食营养。食物入胃，经过消化、吸收等一系列变化后，所含的一部分糖、脂肪和蛋白质即在体内氧化

（燃烧）而产生热量，供给人体活动能力，升高人体温度。所以，人必须饮食。如果不吃不喝，时间长点，不但浑身无力，而且躯体冰凉。冬天气温低，冷得厉害，多吃点东西会暂时觉得暖和些，就是食物氧化产生热量的明证。其次，来自体内不断进行着的新陈代谢。所谓新陈代谢是指人体一方面不断从外界环境中摄取氧气和营养素，将它们变成体内新的物质；另一方面又不断分解体内的旧物质，释放热量并把分解产生的废物排出体外。体内新陈代谢越快，释放的热量愈多，所以，体育运动后，浑身发热，一时性体温上升。



那么，热量持续产生，人的体温怎么会恒定在 37℃ 左右的呢？正常体温的维持完全是神经和体液调节的结果，由大脑内的体温调节中枢挂帅，担任总指挥，司令部设在大脑底部的下丘脑；周身循环的血液负责传送热量；具有散热和保温两种相反功能的体表皮肤具体执行。当体内产热增多，体温升高到一定程度时，体温调节中枢受到刺激，当即进行调度，促使皮内血管扩张，血液循环量增多，血液将吸收的热量运送到体表，皮肤温度升高，同时汗液分泌增多，多余的热量便能通过辐射、传导、对流和蒸发等方式向外界环境发散。如果体内产热不足，体温有所下降，体温调节中枢收到告急信号，便更换指令，皮内血管因而收缩，血液循环量减少，汗液也停止分泌，散热就此减少，体温得以保持在一定水平。正常情况下，产热和散热处于动态平衡，因此，人的体温能恒定在 37℃ 左右。

需要补充说明的是，人体各部的温度有差异。身体表面由于散热较多较快，温度比深部组织低，且易随环境温度的变化而变化。体内各器官的代谢率不一样，故而温度也不同，代谢率高的器官，温度高。好

在全身血液不断循环，可将温度较高处的热量疏散至温度较低处，所以，人体各部分的温度相差不多。（盛丹菁）

为什么人体口腔、腋下、肛门的温度不一样？

正常人的体温是比较恒定的，平时稳定在 37℃ 左右，不会因外界温度的变化而变化。这是由于下丘脑里专管体温调节的神经“司令部”作用的结果。当然，大脑皮层对体温的调节功劳也不可抹杀。



但是，人体从内脏到体表各部位的温度，却是参差不齐的。人体深部的脏器组织，由于代谢活动旺盛，血量丰富，血流平缓，产生的热量不容易向体外发散，它们的温度相对比较高，当然也稳定。如肝脏的温度就接近于 38℃。同时，人体血液循环会带走一些热量，起着协调脏器间温度的作用，使它们温度比较接近。如肛门温度与身体内部的温度最接近，而且不容易受外界温度的影响，所以比较准确，正常范围为 37.5℃ 左右，但测量时不很方便。平时，只有给婴儿测体温时才使用。人体体表与神经末梢所在部位，由于辐射、传导、对流和蒸发的作用，温度明显低于肛门的温度。例如腋下的温度正常范围为 36 ～ 37.4℃；而人的口腔，因没有内脏器官的代谢活动旺盛，所以温度低于内脏。但口腔又不像皮肤那样可直接向外界散热，它的温度会高于腋下，正常范围为 36.6 ～ 37.6℃。

因此，腋下温度低于口腔 0.5℃，而口腔温度又低于肛门 0.5℃，在

计算体温时，需将这些因素考虑在内。（汪宗俊）

为什么不生病不等于身体健康？

不知你是否有过这样的经验：有时，自己往往觉得很疲劳，浑身说不出的不舒服，记忆力非常差等。去找医生检查，倒也查不出患了什么病。这是怎么回事?

从医学角度说，健康是指身体强壮、生理和心理活动正常、精力充沛、对自然和社会环境有良好适应能力的状态。疾病则是指具有一系列特征性状的病理过程。

照以往的理解，一个人没有生病那么就是一个健康的人。但是目前国外医学家认为，在健康和疾病两种状态之间，存在着一种非病非健的“第三状态”。处于第三状态的人，虽然自我感觉不好，但还不具备某种疾病的特征。本文开头提到的那种情况就属于第三状态。

第三状态观点的提出，是人类对新的疾病范围和医学模式不断认识的结果。换一个角度说，第三状态实质上是一种“亚疾病状态”，或者说是某些疾病的早期症状，它具有向疾病转化的倾向，如果不及时加以注意的话，这种转化几乎是必然的。

第三状态经常出现的症状有：常患感冒；突然发生窒息感；早搏、心悸；头重、头昏；记忆中断，易忘事；耳鸣；咽喉疼痛；口臭较重；食欲下降；肩臂易僵硬酸痛；疲劳不易消失；不易入睡或易醒；体重减轻；精力不易集中；等等。

第三状态的产生与身心疲劳过度、沾染不良嗜好（如吸烟、酗酒）、饮食习惯和饮食结构不合理、人体生物钟紊乱及处于某些疾病恢复期有关。

预防和消除第三状态，促使其不向疾病转化，这点很具有现实意

义。首先，要注意劳逸结合，不要过度疲劳，避免染上不良嗜好，饮食习惯和饮食结构要尽量合理，要保持精神乐观。其次，一旦出现第三状态的症状，应配合必要的医学检查，确定是否是疾病所致，因为许多疾病也会引起类似第三状态的症状。如果确定不是疾病所致，而是过度疲劳所引起，则应适当休息；如果是由于心理负担过重所致，则应排除造成紧张的根源，身心放松，并丰富业余生活，培养兴趣爱好。可以选择参加音乐、字画、球类、气功、种花、养鸟等活动；假如是不良嗜好所致，则应果断戒除。

所以，在进行健康自我检定时，不要忽视第三状态，它的出现往往是一种信号。有效地控制第三状态的转化趋向，使它向健康方向发展，这将是今后一个时期医学上的重要任务之一。（刘正兴）

为什么人的面色可以反映健康状况？

中医学有句名言："望而知之谓之神"。意思是高明的医生，通过观察一下病人就能知道得的是什么病，真像神仙一样。这类事情还真有例子。

传说春秋战国时代名医扁鹊，一眼看出齐桓公身上潜伏着致命的病，劝他医治，齐桓公却不听从，反认为扁鹊用吓唬人的办法显示自己，最终果真病入膏肓不治身死。

东汉末年名医张仲景有位交往很密的朋友叫王粲，接触中，张仲景看出他隐藏有"疠疾"，劝他服药，王听后感到很突然，认为自己无病，很不高兴地应付几句走了，以后真的死于"疠疾"。

难道这些医生真有神仙的本领吗？当然不是。因为不少疾病会引起病人面色的变化，只要仔细观察，便能对所患疾病作出初步估计。身体五脏六腑的情况和身体里气、血运行的好坏，都可由面色反映出来，

所以说，面色是反映健康状况的一面天然“镜子”。



正常人面色白里透红、滋润光滑；情绪激动和体育运动后会格外红润，平静后又能很快恢复常态。

当然面色发红，未必一定健康，特别是情绪并不激动，也没有进行体育锻炼，面色却依然通红，这可能是一个高热或高血压病人。肺结核病人每当傍晚时会低热发烧，面孔两颧部可出现涂胭脂般娇艳红色，医学上叫潮红。轻度煤气中毒时，脸上会泛起一层樱桃红色。

面色发黄，一般会想到是不是得了肝炎，因为肝炎可引起黄疸。其实，肝病、肝硬化、胆囊炎、胆石症、疟疾、钩虫病等面色也会发黄。就是营养不良，也会面黄肌瘦。

面色发青，多半是心、肺有病，例如肺炎、肺气肿、气胸等疾病，可直接引起呼吸功能障碍，氧气吸入不足，二氧化碳又不易呼出。某些心脏病，也会间接引起肺部血液郁积，影响呼吸功能。

面色发白，很可能是贫血，或者是□忍受某种疼痛，许多慢性病也可引起面色苍白。如果有出血情况时，脸色更苍白了。

面色发黑，也许是患了肝脏疾病，尤其是肝硬化。另外，有一种叫做肾上腺皮质功能减退症的病，面色和全身皮肤都会变得黝黑。

从以上例子中，我们不难看出医生看病是十分讲究察颜观色的。

（姚德鸿）

为什么看舌苔能帮助诊断疾病？

去医院看病时，常常会遇到这样的情况，医生除了测体温、切脉搏等等之外，还要看看病人的舌苔。难道看舌苔能诊病吗?

是的，看舌苔对诊断疾病是有帮助的。特别是中医，很重视舌质和舌苔的变化。因为舌苔的各种变化，与身体内部的病状是很有关系的。所谓“舌为心之苗”、“脾脉连舌本”、“肾脉挟舌本”等等的说法，就反映了身体内部各个内脏器官与舌头是相关连的。



医生观察舌头，主要从三个方面的状况来着眼的，一是舌苔的颜色，二是舌头的厚薄，三是舌头的干湿。正常人舌头的颜色红润，而且不深不浅，舌质柔和滋润。如果舌色和舌质与正常人的有所不一样了，那么身体总有哪些方面不舒服了。凡舌质坚硬或深红色，厚、干的，病多数属于实热性的；而舌质浮肿或淡白色，薄、湿润的，病多数属于虚寒性的。如舌苔出现黄色，很腻，称黄腻苔，那么这类病人多数消化功能紊乱、有炎症或发烧；又如舌苔出现黑色，称黑苔，那么这个人一定患有重病。

当然，舌苔虽然能帮助诊断疾病，但只能作为辅助手段，不能光凭舌苔下断论，尚需用其它主要诊断手段，来确诊是什么病。

医生除了观察舌苔、舌质来帮助诊病外，另外，问病人的味觉变化，也可以作为诊病的参考。如果一个人感到味觉异常了，就应该引起医生和本人的注意。味觉异常有这么几种：口苦，往往是肝胆热、肠胃热的症状，有时癌症病人还会在吃甜东西时都感到舌头发苦；口甜，古人有“脾热口甜”的说法，脾胃实热、肝脾痰火内蕴的人，舌头常觉得甜，糖尿病人也常觉口舌发甜的；口淡，肠炎、痢疾等消化系统的病人属口淡者；口酸，是胃炎和消化道溃疡病人的反映；肾火上浮、慢性咽喉炎急性发作的患者，常感到口咸；而口辣则多见于肝火偏旺、

肺虚痰热、高血压、神经官能症、绝经期综合征患者中。


对于舌苔、舌质以及舌味的异常变化，我们自己也可以留心观察，以便及时发现病征，及时求医。（劳宏燮）

为什么有些人皮肤比较黑？

我们中国人不是黑种人，为什么有些人的皮肤却是黝黑黝黑的呢？原因主要有以下几个方面：

第一方面是遗传因素。人有高矮胖瘦之分，皮肤颜色也会有些区别。原来，皮肤所以会显出颜色，取决于皮肤里黑色素细胞的多少，同时与黑色素细胞分泌的黑色素量有关。假如黑色素细胞多或者分泌的黑色素多，皮肤颜色就比较黑些。皮肤里这些黑色素细胞的多少是天生的，与遗传因素有关。父母皮肤较黑，生下孩子皮肤一般也较黑，就是这个道理。再说，在人体脑部长有一个脑垂体，它会分泌许多内分泌激素，其中有一种叫做黑色素细胞刺激素，会刺激皮肤里的黑色素细胞产生黑色素，这种激素分泌多，皮肤颜色就容易发黑。脑垂体这项分泌工作的强弱也与遗传因素有关。

第二方面是紫外线因素。阳光中的紫外线或者高温环境下紫外线照射，能促使皮肤里的黑色素细胞产生黑色素，有利于防止日光或高温对皮肤的损伤，同时也使皮肤变得黝黑。



第三方面是疾病因素。如果得了肾上腺皮质功能减退症（又叫阿狄森氏病），肾上腺皮质激素分泌就减少，而这些激素对于脑垂体制造的黑色素细胞刺激素起抑制作用，因此当肾上腺皮质激素分泌减少，黑色

素细胞刺激素工作不会受到阻碍，皮肤颜色就容易变黑。如果得了肝脏疾病，尤其是肝硬化，肝脏处理雌激素的能力会下降，雌激素也能影响黑色素的形成，使黑色素增多。

另外，如果营养不良，例如食物中缺少维生素 C，也会使黑色素增加。相反，维生素 C 含量丰富就可阻止黑色素产生。

倘若是遗传因素引起的皮肤发黑，就没有什么办法可以改变；如果是紫外线照射造成的，那么脱离紫外线后一段时间，皮肤会转白些；如果是疾病引起皮肤变黑，关键在于治疗疾病和补充营养。（姚德鸿）

为什么春天人容易困倦？

中国有句古话叫做：“春眠不觉晓”。意思是春暖花开的季节，人常感到困倦，一觉睡去不想醒来。春天原本是万物复苏，生机勃发的时光，人为什么反而会困倦欲睡呢?



原来，人体的血液循环有一定的规律，每个脏器的血液供应也有一个相对稳定的数量。例如一个体重 60 千克的人，在安静状态下，供应脑子的血液数量约为每分钟 750 毫升，供应皮肤的血液数量约为 450 毫升。一个人是否感到困倦，与脑子里的血液供应量够不够，有密切的关系。倘若脑子的血供量达不到一定的数量，人就容易昏昏欲睡。而造成“春眠不觉晓”的现象正是由于脑子与皮肤血液供应量发生较大变化的缘故。

漫长的冬天，寒风呼啸，人体自身的防御功能会使皮肤里的毛细血管广泛而又持久地收缩，这样就省下了供应皮肤的血液，省下的血液便额外地供应给内脏器官，脑子里的供血也增加，所以在寒冷状态

下人反而不易入睡，容易清醒。到了春天，天气变得暖和起来，皮肤里的毛细血管舒张，更多的血液流进毛细血管里来，热量便通过皮肤散发出去，夺走了一部分原先供应内脏的血液，脑子的供血量就减少，人也就容易困倦。血液供应量的这种变化，在冬去春来的交替阶段，气温明显变化时候，最为显著。直到春天过了一段时间，人体适应了气温变化，这种困倦现象反倒不明显了。

春困不是病，也并非睡眠不足。产生这种现象时，只要脱掉一件衣服凉快一下；用冷水毛巾洗一下脸，或去室外活动一下，倦意就会消失。当然，加强体育锻炼，提高心脏收缩能力，改善血液循环，则更有利于脑子较快地适应这种季节性的血液循环变化，春天容易发困的现象，自然就会减轻或消失。（姚德鸿）

为什么疲劳后眼圈会发黑？

有不少人，每逢疲劳后，特别是睡眠不足或熬夜以后，两眼的眼圈会发黑，这是怎么回事呢？现代医学发现，人疲劳后眼圈发黑有两种情况：

第一种情况是并非由疾病引起的；过度疲劳或睡眠不足，造成眼皮长时间的紧张收缩，会引起眼圈皮肤里的毛细血管广泛性充血。而眼圈皮肤的皮下组织很疏松，毛细血管充血量较多，血液回流不畅，加上眼圈皮肤又很薄，于是眼圈出现青黑色。对于这类非疾病性情况，只要注意休息，美美睡上一觉，这种眼圈发黑现象会很快消失；如果轻轻地用手指按摩眼圈皮肤，帮助里面的毛细血管血液回流，发黑现象也会减轻或消失。

另一种情况是体内某个脏器有了病，最有可能是肾脏病；肾脏的细胞组织内有一种黑色素，肾功能衰弱后，黑色素就会显露出来，使

眼圈发黑。另外内分泌或心血管方面的疾病，也会引起身体里血液循环紊乱，眼圈皮肤毛细血管长久充血，造成黑色素沉淀。

总之，眼圈发黑是一种“信号”，它告诉你疲劳过度，该注意休息；更可能是一种“警告”，通知你可能得了某种疾病，赶快去医生那儿检查一下身体吧！

（姚德鸿）




为什么脾脏也是有用的器官？

脾脏，长在人体的左上腹部，暗红颜色，大约有拳头般大小。当孩子还在娘胎里时，脾脏是身体里独一无二的造血“工厂”，担负着为胎儿制造血液的重要工作。可是出生后，人体里的骨胳不断生长，骨胳内部的骨髓便成为一座崭新的造血“工厂”，几乎包办了所有的造血工作，于是脾脏的地位一落千丈，长期来被人认为只是身体里一个血液“仓库”，仅仅起着贮藏血液的作用，有与没有都无关系。真是这么回事吗?

脾脏在人体里的作用，是在近代推行器官移植的外科手术以后才有了全新的认识。以前，病人移植了旁人的健康器官，由于接受的不是自己身体里的东西，往往会发生排异反应，身体里的许多淋巴细胞和许多免疫防卫抗体物质，会出面“干涉”外来的器官，千方百计想把它赶走。当然，器官移植是为了挽救病人生命，医生是不允许这种排异反应继续发展下去，想方设法要阻止排异反应发生，有的是用药

物控制，有的干脆做手术把脾脏切除掉。切除脾脏的确有扭转排异反应不良局面的作用。这是为什么呢？因为脾脏里不仅贮藏着大量的淋巴细胞，而且还会产生不少免疫球蛋白。这些免疫球蛋白恰恰是制造对抗移植器官的抗体的原料。把脾脏切除后，身体里失去相当数量的淋巴细胞，抗体生产量也明显减少，对于保护移植器官，防止排异反应十分有利。



为了器官移植成功，“丢车保帅”，切除掉脾脏是作为一种治疗方法。但是，反过来也清楚地说明，脾脏在人体里担负着重要的“防卫”工作，对于提高人体的抵抗力发挥很大作用。许多研究发现，切除掉脾脏的人，身体抵抗力降低，容易发生各种各样的感染，而且这些感染来势凶猛，死亡率高。

由此可见，人体的脾脏并非是没有用的器官，医生们对脾脏切除已采取格外慎重的态度，即使脾脏因外伤而破裂，也设法给予修补，除非不得已时才切掉，目的是为了保存这位人体的“卫士”。（姚德鸿）

为什么说肝脏是人体里的“化工厂”？

肝脏长在人体的上腹部，形状大致呈三角形，红褐颜色，重量达1500 克左右，中央有一个肝门，里面有大血管和胆管通过。胆囊紧紧地依附在肝脏的下面，有一根细管与通向肝脏的胆管相连。

肝脏可算是人体的“化工厂”，那么这个“工厂”里的“车间”又是怎样的呢？显微镜下，可以观察到肝脏里面鳞次栉 [zhì] 比地排列着

一个个肝小叶，这就是“车间”。肝小叶一律呈棱柱形状，一排排的肝细胞围绕着“车间”中央的一根中央静脉，像阳光四射那样呈辐射状排列着。肝细胞周围长着无数的毛细血管和毛细胆管。整个肝脏的肝小叶总数可达 50 万个。



说肝脏是座“化工厂”，那是当之无愧的。看看它从事哪些工作就可明白了。

第一项工作是制造胆汁。这项工作由肝细胞负责，每日产量 500—1000 毫升，制造的胆汁流入到肝小叶周围的毛细胆管里，再集中起来流到肝门的胆管里，一部分流入胆囊贮藏起来。每当脂肪类食物进入胃肠道时，胆囊将胆汁输送到肠子里去帮助消化；而另一部分胆汁直接由肝脏进入肠子。胆汁的主要成分是胆盐和胆色素，其中胆盐可以帮助消化，尤其是消化脂肪食物。胆色素能使胆汁变成金黄色，进入肠子使食物变黄，难怪最终排出的大便是黄色的。

第二项工作是进行营养物质新陈代谢。葡萄糖、氨基酸、脂肪等养料被肝脏里的肝细胞一一处理后变成肝糖元贮藏起来，所以肝脏又是糖分的“大仓库”，每当身体需要时就将这些糖分输送出去。

第三项工作是解毒。吃进去的食物或药物中，如含有些微毒性物质，肝细胞会给予解毒处理，变有毒为无毒，保证了人体安全。

第四项工作是防御。肝脏里有无数的防御细胞，它们会吞吃进入人体肝脏里的细菌、病毒，也对人体起保护作用。

肝脏“化工厂”万一“生病”时，自己也会报警，例如患上肝炎时，肝细胞大批损坏，一种叫做谷丙转氨酶的物质会增高，平时这种酶数量有一定标准，用来对蛋白质进行加工处理，肝细胞损害时，这种酶的数量便会异乎寻常地增加。又如得了肝癌，另一种称为甲胎蛋白的


物质会增多。因为健康的肝细胞是不制造甲胎蛋白的，而肝癌细胞却会大量生产这类身体不需要的物质。所以化验测定谷丙转氨酶、甲胎蛋白的数量便能判断这座“化工厂”是否出了故障。　　（姚德鸿）

为什么过多晒太阳对人体有害？

阳光和人类的生活有着密切的关系，尤其是日光中的紫外线能杀灭各种细菌，防止多种疾病的发生。孩子得了佝偻病，医生也会嘱咐让孩子多晒晒太阳，因为日光可使儿童皮肤中的一种化学物质转化为维生素 D，能促进骨胳的发育。然而，过量的日晒，特别是裸露在强阳光下的曝晒，会伤害人的皮肤，引起各种“日晒病”。

日光浴在欧美十分普遍，近年在我国的沿海地区也开始流行。人们袒胸裸背，穿着泳衣，睡在沙滩上，将身体晒得黝黑。然而，皮肤晒黑了实际上就是人体受到伤害的一种反映。一般在烈日曝晒数小时后，皮肤上就会出现红斑，有烧灼感，严重的还会起泡。这是由于紫外线刺激了表皮细胞，使真皮毛细血管扩张而形成皮肤红斑。皮肤红斑须经过 3 ～ 4 天才渐渐消退，皮肤脱屑，色素沉积，皮肤就变为棕褐色了。医学上称为“晒斑反应”，其实就是阳光对皮肤的一种损害。

过多的日光浴有可能引起皮肤癌。在德国，人们都有晒太阳的嗜好，因而带来的后果是严重的。据慕尼黑放射卫生研究所的资料统计，统一前的联邦德国每年有 10 万人得皮肤癌，其原因就是晒太阳太多。过多的日光紫外线会破坏人体的皮肤细胞，分泌出液体，并产生红肿现象，接着死亡的皮肤便开始脱落，



并可引发恶性的黑色素瘤。因此，经常晒太阳或大面积皮肤暴露于太阳下的人，如果发现身上有橡皮状的色素块，其形状不规则，边缘突起，应提高警惕，请医生及早诊治。

过量的阳光照射还可降低皮肤抵抗力，破坏具有抵抗外来细菌和异常细胞入侵的皮肤组织，容易发生皮肤感染。有些病毒性皮肤病，如单纯疱疹会变成高突于皮肤的疣。

过多晒太阳还容易使皮肤老化。因为长时间接受日光照射可使表皮细胞失去水分，于是表皮增厚和角化；真皮中有弹力的纤维断裂、变性，皮肤就变得粗糙、干燥，失去弹性，老化并发黑。因而一个 30 岁左右的日光浴爱好者，其额部可以过早地出现皱纹；20 来岁的年轻姑娘眼角也会出现明显的鱼尾纹。


由此可见，晒太阳的时间不宜过长，更要避免在阳光下曝晒，以免损害皮肤的健美，影响身体健康。（贝润浦）

为什么心脏有杂音不一定是心脏病？

有些人从医生那里得知自己的心脏有杂音时，便惶惶不可终日，以为自己患了心脏病。其实，心脏有杂音并不等于心脏出了什么问题，反之，心脏无杂音也不一定心脏无病。

为什么说心脏有杂音并不就是心脏有病呢？这还得从心脏杂音的产生机理说起：正常人体的心脏，分为左右心房和左右心室，右心室连接肺动脉，左心室连接主动脉。心脏好比一只动力泵，它一刻不停地搏动，将血液输送给体内各个部分。心脏杂音是由于血液在心脏和血管内周而复始的循环过程中受到某些因素的影响而产生的，例如发热、贫血、心脏里有异常通道、心脏瓣膜狭窄或关闭不全等，致使血流加速或血流紊乱，产生漩涡，使心脏肌肉或血管壁发生震动所致。

这就如同小溪流水一样，在水流缓慢时听不到流水声，而流经瓶颈口、分流口或水流加速时就会听到流水声。




儿童的胸壁薄，心跳快，尤其在兴奋、紧张和运动时，血流加快，血流通过心脏和大血管时引起局部组织的细微震动。用听诊器检查健康儿童的心脏可听到比较柔和的杂音，这种杂音的产生并非是心脏结构上的异常所致，所以称为功能性或生理性的，对人体健康没有任何影响。功能性杂音，都是收缩期杂音，杂音产生在局部位置，杂音柔和，音调低，持续时间短。改变身体的位置，例如，从卧位变坐位时杂音的性质有改变，深吸气时杂音减轻等。据有关资料的统计，正常儿童中至少有二分之一有功能性心脏杂音。这种功能性杂音大都在接近青春期时逐渐减轻或消失。

因此，当体格检查时发现心脏有杂音，首先不必紧张，应请有经验的心脏科医生仔细地全面检查，根据杂音的部位、性质、音调以及传导方向等作出是生理性杂音还是病理性杂音的判断。必要时还得借助于专用检查仪器设备、如 X 线摄片、心电图、超声心动图等检查才能作出正确的结论。（唐建华）

心脏会不会生肿瘤？

人体内的五脏六腑都会生肿瘤，心脏当然不例外。不过，和其它脏器相比，心脏肿瘤的发生率不算高，而且主要是继发性的。所谓继发性，意思说是从别处转移来的。继发性心脏肿瘤多从邻近的淋巴组

织直接蔓延而来，往往是支气管癌、乳腺癌、急性白血病（血癌）、恶性淋巴瘤等的晚期表现。至于心脏本身长出来的肿瘤，即原发性心脏肿瘤却很少见，大约只有继发性的 1/16。原发性心脏肿瘤的发生率虽低，品种却多。恶性的，像肉瘤、淋巴瘤、浆细胞瘤、间叶瘤等；良性的，有粘液瘤、横纹肌瘤、纤维瘤、脂肪瘤、血管瘤、淋巴管瘤、畸胎瘤等，真是五花八门。



心脏生了肿瘤会怎么样？只要简单讲讲心脏的结构及功能就能体会其后果的严重性了。心脏是个空腔器官，然而，心壁相当厚。心壁主要由心肌构成，心肌内衬心内膜、外包心包膜。心脏的内腔被房间隔和室间隔分成左右两半，互不相通。每半侧心脏又被房室瓣一隔为二。上面较小的叫心房，下面较大的叫心室。房室瓣是个能开关的活门，但只可向心室开，只允许心房里的血液流入心室而不准返流。左心室和主动脉相通，通口上有主动脉瓣；右心室和肺动脉相通，通口上有肺动脉瓣。这两个瓣的作用在于防止血液从动脉返回心室。此外，左心房和肺静脉连接，接受肺脏回血；右心房和上、下腔静脉连接，接受头颈部和上肢、躯干和下肢以及内脏的静脉血。心脏就这样和遍布全身的血管系统（包括动脉、毛细血管、静脉）连成一个密闭的管道。血液为什么能在此管道内流动，从而发挥运输、调节体温、维持体内酸碱平衡等功能呢？完全有赖于心脏（主要是心室肌）的收缩和舒张，像水泵那样一压一放，使血液不断从心脏排入动脉，又不断从静脉回到心脏。从心脏的结构和功能可知，如果心脏生了肿瘤，必然影响心脏搏动，削弱血流的动力。要是肿瘤大，瘤蒂长、活动度大，在心脏舒缩过程中移至房室瓣、主动脉瓣或肺动脉瓣的瓣口时，会阻塞血流。倘若肿瘤有碎片脱落，碎片随血漂动进

入动脉，会阻塞动脉。脑动脉栓塞时，引起昏迷、偏瘫、失语；肺动脉栓塞时，引起胸痛、咯血。假使肿瘤内出血、变性或坏死，会出现发热、疲乏、消瘦、食欲减退、关节酸痛等全身反应。

总之，心脏不但会生肿瘤，而且一旦生了肿瘤，真是性命攸关。

（盛丹菁）

为什么寒冷容易诱发心脏病？

每到寒冬腊月、北风呼啸的日子，心脏病的发生率会突然增高。一些有心脏病的人，到了冬天，症状也会莫名其妙地加重。

拿目前心脏病发生率最高的冠心病来说，由于供应心脏本身血液的冠状动脉有阻塞，造成心脏本身血液供应不够，会出现心绞痛或心肌梗塞，这种症状在冬天频繁出现。现代医学已经证实，低温气候，尤其是气温低于 0℃ 时，寒冷的刺激，不但会使身体各处血管收缩，也会使心脏上的冠状动脉强烈收缩，于是阻碍了心脏本身的血液供应。再说，寒冷的刺激会使身体内一种叫做儿茶酚胺的物质数量增加，这种物质不但会增加血管收缩机会，而且还会使血液中专管凝血功能的血小板凝集起来，造成血栓，进一步阻塞冠状动脉，使心绞痛或心肌梗塞频繁发生。

还有另外一些心脏病，例如先天性心脏病、风湿性心脏病或者肺源性心脏病等，也最怕冬天。这些病人抵抗力本来就很差，一遇到寒冷刺激，很容易得感冒、肺炎、气管炎，不但有咳嗽、多痰等现象，而且整个呼吸道，尤其左右两肺都会广泛性充血，血液容易在肺里边淤滞起来，肺恰恰是“清洗”二氧化碳，吸收新鲜氧气的地方，而肺里的血液淤滞后就会使心脏向肺部输送血液的任务变得繁重，这样必定会加重心脏的负担，因而心脏病也就容易发作了。

因此每到寒潮来临或有冷空气活动的日子，心脏病人应该特别注意防寒保暖，少去公共场所，防止感冒或传染上呼吸道疾病。　　（姚德鸿）



什么叫高血压病？

血压是血液在血管内流动时，对血管壁所产生的压力。当心脏收缩时，推动血液在动脉里流动所产生的压力，称为“收缩压”；当心脏舒张时，血液不再被挤入血管，但原先被膨胀的动脉依赖它的反弹力，仍推动血液不断向前，这种反弹的压力称为“舒张压”。

如果一个人的血压过低，体内的重要器官心、肾、脑等就得不到充分的养料和氧，废料会堆积起来排泄不出去；相反，如果血压太高，长期得不到控制，脑动脉血管就会硬化，极容易引起脑溢血。所以保持血压正常，对身体健康是十分重要的。



人脑脑干的桥脑和延脑是调节血压的中枢，此外，肾脏和内分泌腺的活动也有调节血压的作用。血压有时会暂时性超过正常范围升高，譬如进行激烈运动、从事繁重体力劳动、机体大量失血、情绪剧烈波动、神经极度紧张等，都会使血压上升。这是机体在自身出现某种紧急状态时作出的代偿反应，只要这些因素消失，超出正常范围的血压就会回复到正常水准，所以这种高血压不是病。只有当一些能促进血压升

高的内外因素剧烈和持久作用下，如直系亲属遗传、肾脏病、持续性神经紧张、饮食高盐，机体正常的血压调节机能便会遭到破坏，血压不断升高，超出正常范围后持续不降，这才是高血压症。

高血压有两种，一种称为“症状性高血压”，还有一种叫“原发性高血压”。前者的特点是有明确的病因，实际上它是某种疾病的一种症状。例如肾脏病、某些心血管病（主动脉缩窄等）、某些内分泌病（甲状腺功能亢进、肾上腺皮质功能亢进）。患了这些病，都伴随有这种高血压。“原发性高血压”并不是由于机体某个器官得了病以后发生的。一些医学专家认为这是患者自身血压调节功能紊乱引发的高血压。两种高血压症，“症状性高血压”较易治疗，只须“有的放矢”地用药物或手术消除引发高血压的某种疾病就行；“原发性高血压”患者约占高血压患者总数的五分之四以上。因为它没有明确的用药“目标”，医生一般只对机体内起血压调节作用的器官，给一些加强它们调节功能的药物“治疗”。（柯依）

低血压就是贫血吗？

有些人认为低血压就是贫血，或者认为贫血者的血压一定偏低。事实是怎样的呢？先让我们举两个例子。如肾脏病到了后期，差不多都有严重的贫血，可是这些病人的血压，不但不低，反而明显增高；又如有些瘦长体型的人，测血压常常偏低，但化验红细胞和血红蛋白，却大都正常，甚至偏高。可见低血压和贫血不能划上等号，因为它们本来就是两个完全不同的概念。

血压是由心脏的收缩力与排血量，以及动脉管壁的弹性，和全身各部位小动脉的阻力所形成，它是推动血液在动脉里能不断流动的动力。而贫血仅指血液中红细胞数量的多少。正常人每毫升血液中，男

性应有 400 万～ 550 万个红细胞，女性应有 350 万～ 500 万个红细胞。红细胞内含有红色的血红蛋白，所以血液看起来呈红色。贫血病人，由于红细胞数量减少，血液的颜色看起来就淡，反映在外表上就显得脸色苍白。但是，贫血者体内血液的总量并不少，仅仅是血液中红细胞的浓度被冲淡了。好比一瓶兑了水的红墨水，仍是满满的一瓶，只是颜色淡了一点。



测量血压，主要是了解心血管的功能和血液容量的多少，并不能反映血液中红细胞数量的多少，所以测得低血压的人，不要以为就是患了贫血。

（周小寒）


血压是恒定不变的吗？

一个人在不同时间、不同情况下测量血压，常常会发现血压有时高有时低，这是因为正常人的血压并不是恒定不变的，任何可以导致心脏和血管舒张、收缩改变的因素，都可促使血压发生变化。

当情绪波动或精神紧张时，由于交感神经的兴奋，肾上腺素分泌增加，便会引起心脏排血量增加和末梢血管收缩，促使血压上升。运动也会影响血压，因运动时全身肌肉需血量增多，增加了心脏的排血量和肾上腺素的分泌量。运动停止后，升高的血压就很快回复到原状。在休息时，身体处于静止状态，代谢活动降低，血液的需要量减少，心脏跳动减慢，导致心脏的排血量减少，血管的紧张程度也降低，所以血压比活动时要低。在睡眠时，身体处

于相对静止状态，因此血压比休息时更低。在站立时，为了能使头部保持充分的血液，交感神经反射性地兴奋，以保持血压不降或略为上升，但有时也有下降的。外界温度的改变也会影响血压，如冬天气候寒冷，身体为了保持体温的恒定，身体某些部位的血管，特别是皮肤血管收缩，以减少热量的散发，由于血管收缩，血压便有所升高。相反，夏天天气炎热，为了使热量向外界散发，血管舒张，血压便会下降一些。一天 24 小时内，血压也有正常的生理性变动，饭前饭后的血压也有变化，一般早晨血压最低，午后逐渐升高，但也有早晨血压升高的。

此外，男性和女性的正常血压也有差别，一般男性比女性略高。正常血压也随年龄增长而略有升高。



由于正常人的血压受各种因素的影响而随时发生变化，因此，如果仅是一时地发现血压有升高现象，不能认为就是得了高血压病。真患高血压病的人，由于身体调节血压的功能有障碍，因此在各种因素影响下造成的血压变动，就比正常人更大。

（柯依）

为什么青少年也会得高血压病？

一般来说，年纪大的人要比年轻人容易得高血压。高血压病发病的百分率随年龄的增长而明显地增加。但据国内外资料统计，世界上每 100 人中就有 10 人患高血压病，其中 20 ～ 29 岁青年的发病率为 3 ～ 6% 左右。我国武汉地区的一份调查资料也发现，中学生（13 ～

17 岁）发病率为 2.22%，大学生（18 ～ 25 岁）为 4.6%。由此可见，高血压病人中，不仅老年人多，青少年也不少见。

青少年为什么也会发生高血压呢？原因是多方面的。

一些青少年高血压病人常常伴有明显的高血压遗传因素及家族史，即父母有高血压病史，据大量医学资料统计，高血压病人中有家族史者可达 59%。



有的青少年患的是继发性高血压病，它发生于其它疾病之后，通常可以找到明显的病因，如急性或慢性肾小球肾炎、肾盂肾炎、肾动脉狭窄。还有一些肾脏和内分泌疾病如多囊肾、肾上腺嗜铬细胞瘤、肾上腺皮质醇增多症等，这一类病人除了血压增高以外，同时还存在原发疾病的症状。这类高血压也叫做症状性高血压。

由植物神经功能不稳定引起的高血压病，在青年人高血压中占有相当大的比例，它常常与情绪紧张有关。一些注意力需要高度集中，精神紧张而体力活动又少的职业，如司机、会计、电报员等，易患此类高血压病。此外，长期受到城市和工厂的噪音干扰，对视觉、听觉形成慢性刺激的环境，也有可能导致血压增高。因为精神过度紧张，使大脑皮层功能紊乱，血管收缩中枢长期处于兴奋状态，因而引起全身小动脉血管痉挛。血液通过这种痉挛变细的小血管所受到的阻力增加，血压自然要升高。此时除了血压升高以外，还常伴有心悸、多汗等症状。一旦情绪稳定，紧张因素去除，血压可降至正常。

有些处在青春发育期的少男少女，也会发生暂时性的血压增高，俗称“青春期高血压”。人进入青春期以后，体态、功能、性的特征都

有明显的变化，脑垂体、性腺和甲状腺等内分泌活动比较旺盛，促使全身肌肉、骨胳、心肺等组织器官迅速地发育成长。但是，心脏的成长，比其它器官组织要缓慢些，这样，心脏的负担无异相对加重，而青年人的血管又比较狭细，血液通过狭细的血管，就要靠心脏加大力量，再加上青春期的青年往往情绪不稳定，多种因素加在一起，血压便容易升高了。（翁德立）

为什么两臂的血压不同？

血液在血管内流动，和水在平整光滑的水渠内流动一样，通常是没有声音的。但当血液通过被压迫和弯曲的血管时，就像水流经过狭窄高低或弯曲的河道会形成漩涡一样，会发出声响。测量人体动脉血压的血压计就是根据这个道理设计的。


测量血压，有时会出现两臂血压略有高低的情况，这是由测量血压的方法造成的差别，并不说明你的血压有问题。目前医生测量人体的动脉血压，大都采用间接测量法。所用的血压计由气球、袖带和检压计 3 部分组成。袖带的橡皮囊通过两根管子分别与气球和检压计相连，三者形成一个密闭的管道系统。人的血压并非恒定不变的，而是每时每刻都受到各种生理的、心理的、外界刺激等因素的影响而有所波动。即使是同一侧手臂，由于每次心跳输出的血流量略有不同，每次测得的血压也略有高低差异。再说，由于我们现在量血压是采用间接测量法，心跳的间隙时间和血压搏动声传到医生耳朵里的时间过程都会使血压显示的度数出现一些不同，尤其左臂与右臂相比，左臂更为接近心脏。所得的测量度数有一些差异就更是在所难免了。

那么，两臂血压有不同，究竟以哪个数值为准呢？一般来说，两臂的血压值如果都在正常范围内，就不必计较它们的差值，因为这对

判断血压与疾病的关系没有什么意义。如果遇到一侧手臂的血压在正常值的上限，如 18.6/10.6 千帕，而另一侧手臂的血压高出了正常值，如 20.0/12.2 或 20.8/12.8 千帕，这时，应该让受测者休息后再复查，并设法消除受测者的紧张情绪。复查时要注意比较两侧桡动脉搏动的情况，尽量做到测量准确。

通常情况下，两臂血压的测值可相差 2.2 千帕左右，至多不会超过 2.6 千帕。有的医生将两臂的血压测值度数相加，再除以 2，取其平均数，这样也能正确反映血压的客观情况。

（贝润浦）




为什么过量吃盐会水肿？

食盐，化学名称叫做氯化钠，是由氯与钠两种元素组成的。正常人每天吃上 5 ～ 6 克食盐，对于维持生命足够了。如果经常过多地吃盐，要引起浮肿。

我们都知道，人体的最基本单位是细胞。细胞里含有较多量的钾元素，而细胞外周围的液体中，含有丰富的钠与氯元素。正常情况下，细胞内外各类元素比例适度，保持一定的平衡，人才不会生病。如果吃盐太多，细胞周围的液体中钠与氯元素的数量会明显增加，而细胞里钾元素还照样不变，原来细胞内外保持的元素平衡关系被打乱了，细胞外元素浓度高，细胞内元素浓度低。物理学上有一个基本现象，就是哪一边浓度高，就产生较强的渗透压，要吸取浓度低一侧的水分，于是细胞里的水分就源源不断地被吸取到细胞外边的组织间隙中，于是

就会发生水肿。

其实，日常生活中有些现象就能说明这个问题，比如：久放的盐钵外面，往往凝结上许多水珠，这就是由于盐钵的陶瓷钵体具有较高的渗透性会不断吸收空气的水分，凝结成水珠。所以当人体里这些被吸收的水分囤积在组织间隙中时，就会引起水肿现象了。



多吃盐不单是水肿问题，由于水与盐在体内囤积得太多，血液里水与盐的数量也会明显增加，心脏进行血液循环的负担就会加重，引起高血压。所以吃盐较多的人，要减少食盐量，才有利健康。

（姚德鸿）

为什么过量吃糖会发胖？

谁都知道，多吃脂肪食物的人会变成胖子。但是，你可曾知道，多吃糖也会让人发胖吗?

科学家做过这样一个实验：用糖喂养鼠和兔，而不给它们吃任何脂肪食物，这些喂进动物体内的糖，事先都加入放射性同位素物质作为标记，过上一段时间后，动物长得很胖，在它们体内丰富的脂肪组织里，用仪器测到了大量的放射性同位素物质。这个实验充分说明，这些脂肪是由糖分转化而来的。

现代医学告诉我们，人发胖必然是身体里脂肪组织过多缘故。

多吃脂肪食物人会发胖，多吃糖也会发胖，那么，糖究竟是怎样

转变成脂肪的呢？其中复杂的生物化学反应还没有弄清楚，已经知道身体里有一种叫做乙酰辅酶 A 的物质，是负责这项转化工作的。



对于维持人体生命来讲，必须依靠三大营养物质：蛋白质、脂肪和糖。每克蛋白质和糖都可以产生 4 卡能量，每克脂肪可产生出 9 卡能量。平时在食物充分情况下，蛋白质主要负责人体组织结构的形成与修复，所以是人体建筑材料。脂肪往往作为能量的“仓库”，万一饥饿或身体需要大量消耗能量，食物供应又跟不上时，就会动用“仓库”能量去维持生命，一旦要长期动用脂肪“仓库”能量，人就会一天天消瘦下去。

糖是日常维持人体能量需要的基本营养物质，进入人体的糖分产生能量后基本上都被身体利用消耗掉。假如吃糖，数量超过消耗能量的水平，多余的糖分用不掉，就转化成脂肪囤积在身体里，日子一久人就变胖了。

由此可见，不要认为只有多吃脂肪食物人会发胖，多吃糖也会让人变成胖子的。（姚德鸿）

胆囊手术切除的人胆子会小吗？

我们先不直接回答这个问题，而来了解一下胆囊的结构和它的功能。知道了这点以后疑问也就能自然解答了。

胆囊长在人体右上腹部，正好位于肝脏下面，通过一根称为胆囊管的细管与旁边的胆管连接。胆管上通肝脏，下连肠子，是运输肝脏

生产的胆汁进入肠子的通道。位于这样一个交通要道旁的胆囊，它的作用可大呢？它有四项本领：第一项是储藏胆汁，肝脏每天生产 500 ～ 1000 毫升胆汁，经胆管向外运输时，中途经胆囊管转入胆囊贮藏，当脂肪食物进入胃肠道后，胆汁重新从胆囊里出来，进入肠子去帮助消化脂肪。第二项是浓缩胆汁，胆囊可将胆汁浓缩 4 ～ 17 倍，这样可增加胆汁贮藏数量，第三项是调节胆管压力，通过胆囊收缩与扩张，调节胆管里压力，帮助控制胆汁的流入和排出。第四项是分泌粘液为胆汁流动起润滑作用。可见，胆囊的整套本领主要是胆汁排泄的“辅助部门”。

由于胆囊是排泄胆汁的一个“辅助部门”，所以，即使开刀把它切除掉，对人体影响也不大，因为邻近的胆管照样可继续排泄胆汁到肠子。如果一定要说有什么影响，那就是胆囊切除的人，不宜过多地吃脂肪食物，或者不宜一次性大量地吃脂肪食物，否则胆汁的供应一时会跟不上，容易发生上腹部闷胀或消化不良现象，但程度并不严重，对健康也无妨碍。



至于胆囊切除后会“胆小怕事”，这完全是毫无科学根据的无稽之谈。从上面列举的胆囊种种功能可以看出，胆囊与人的胆量大小沾不到一点儿边。一个人胆量的大小是与大脑皮层最高神经“司令部”统帅下的精神、心理状态密切相关，也与一个人的社会经历有着联系。事实也是这样，作过胆囊切除手术的人多得很，但他们的胆子也并没有因


此变小。　　（姚德鸿）

饭后奔跑会引起急性阑尾炎吗？

有人说，饭后奔跑会引起急性阑尾炎，这说法有道理吗？让我们来做一些分析。

阑尾是一段很小的蚯蚓状的“小肠子”，长在盲肠上，一头通盲肠，另一头是盲端，总长不过 8 ～ 10 厘米，内腔很小，万一粪块、蛔虫之类堵在阑尾腔里，细菌乘虚而入，就会引起急性阑尾炎。于是有人认为，饭后大量食物进肚，一奔跑，食物不是容易堵进阑尾腔里吗？

乍一看，似乎真有道理，其实并非如此。首先，吃进去的食物，在 2 ～ 3 小时内基本上都逗留在胃里，以后才慢慢分批进入肠子，不可能一下子到达阑尾。其次，阑尾长在小肠和大肠连接处的盲肠上，胃里的食物抵达这里必须经过几米长的小肠，需要好几个小时。再说，肠子里的东西并不是很容易“跌”进入阑尾的，阑尾里的蛔虫是主动钻进去的；阑尾里的小粪块是在粪块刚到阑尾开口处，正巧遇上肠子的一阵收缩被硬挤进去的。所以，单凭奔跑是不可能将食物挤进阑尾腔内的。由此可见，饭后奔跑会引起急性阑尾炎的说法并不科学。



但是，饭后的确是不应该剧烈运动，否则对身体有害处。因为饭后大量食物囤积在胃里，胃受重量的影响会出现下垂现象，如果再加上奔跑，就会增加下垂程度，时间一长容易得胃下垂症。

饭后食物在胃里，依靠胃的运动将食物挤磨与粉碎，并通过分泌胃液对食物进行加工处理，加以消化。如果饭后奔跑，身子与胃部受到震荡，这样，消化食物的工作就受到干扰。另外，饭后胃肠道需要大量血液供应，以利于消化，这时需要动用身体其他部位的血液去供应胃肠道。如果饭后奔跑，骨胳、肌肉等运动器官也需要大量血液供应，就要抢夺掉胃肠道所需要的血液，影响了消化功能的正常发挥。

（姚德鸿）

为什么有些人多脚汗？



有些人多走路或跑步后脚汗出得很多，汗水把鞋袜浸湿，怪难受的。脚汗较多的原因是多方面的，大致有这样几个：有的是生来足部汗腺比较丰富，也就是特别会出汗，这往往与遗传因素有关，正如人有高矮胖瘦之分一样。有的是支配足部汗腺的神经分布丰富和敏感，而支配汗腺的神经是分布在皮肤上的交感神经，每当行走、跑步，甚至精神紧张、情绪激动时，交感神经便处于高度兴奋状态，汗腺也随之大量分泌汗液。有的则是因为穿的胶鞋不透气，分泌的汗水不能及时蒸发散失才造成的。

有什么办法对付这种“汗脚”现象呢？可采取下面这些办法：

穿着棉制品袜子，吸水性强，脚汗容易蒸发；穿着布鞋或皮鞋，不宜穿着不透气的胶鞋，并在鞋内铺上一层丝瓜络或垫上一层棉制品鞋垫；鞋内适当撒上一些粉剂，例如爽身粉或氧化锌粉，以便吸收水分。

脚汗严重的人，可以采用一些局部止汗的办法，例如用 5% 明矾溶液、3 ～ 5% 甲醛溶液或 0.5% 醋酸溶液涂抹足部多汗处。或者使用普鲁本辛、阿托品之类药片，磨成粉后取少许涂搽在足部多汗处。这些方法都能使脚汗减少。（姚德鸿）

为什么要眨眼睛？

我们每个人，不论男女老少，每天都在不停地眨眼睛，除了睡觉时候。正常人，大概每分钟眨眼 10 次左右，每次历时 0.2 ～ 0.4 秒。正因为眨眼的速度那么快，所以，当人们形容事物的突然变化时，常会说：眼睛一霎，老母鸡变鸭。

眨眼实际上是眼睑里的眼轮匝肌快速收缩的表现。别以为眨眼是桩微不足道的小事，它可是高等动物才有的一种生理性神经反射，而且要算人类发育得最完善。既然这个神经反射如此高级，肯定有它的重要意义。眨眼具有两大功能，首先，涂布泪液，使泪液能充分发挥保护眼球作用。泪腺位于眼眶外上方的泪腺窝内，由大小不等的腺小叶组成，约有 10 ～ 20 个排泄管开口于结膜囊内。通常以为人只有在哭泣、过分激动或灰尘掉进眼里时才有泪水。其实，泪腺从不停止分泌泪液，而且泪液不断排入结膜囊内，流经眼球表面，集中于眼内眦，最后通过鼻泪管进入鼻腔，只不过量少，因而人们不觉察而已。眨眼使泪液能均匀地涂布在眼球前方的角膜和结膜上，从而保持湿润。角膜必需经常浸在泪液里，否则就会变干燥、变浑浊而不透光，使人看不清，甚至失明。另外，眼睛前部暴露在空气中，灰尘、烟雾、细菌易于侵入，泪液可起冲洗结膜囊作用，维持眼球表面清洁，而且泪液中的溶菌酶又可抑制细菌繁殖。其次，眨眼是为了调节视网膜及眼外肌活动。视网膜是眼球球壁的内层，是神经组织，能感受光线刺激并

发出神经冲动，沿视神经传入中枢，产生视觉。眼球因眼外肌收缩而发生转动。如果我们老是睁眼不闭，视网膜和眼外肌就得不停地工作，眨眼可使它们获得暂时休息。



综上所述，为什么要眨眼睛这个问题也就明白了，答案是——为了保护眼睛。

（盛丹菁）

为什么强光也会引起近视？


眼睛是人体一个奇妙的器官，它有辨别光线强弱、颜色及物体远近、大小、形态的能力。在正常情况下，对强弱不同的光线与远近不同的物体，眼球都会作相应的调节，好像照相机一样，调整光圈，使见到的物体更清晰。

一般认为光线不足、长期过度使用眼睛，是造成近视眼的主要原因。为了保护视力，有人便增加室内照明度，连大白天也明灯高照，甚至有人在阳光直射或耀眼的灯光下看书，结果近视眼却有增无减，这是什么原因呢？原来，在强光进入眼帘后，由于强光刺激视网膜的感光细胞，再通过视神经的传导，引起虹膜内的环状平滑肌处于长久的、疲劳的收缩状态，使瞳孔缩小，限制进入眼球的光线数量。加上青少年正处于生长发育阶段，眼睛与身体其它器官一样，尚未完全成熟，容易受外界因素过度刺激而发生变化。长期的强光刺激眼睛，可造成眼球功能上的改变，于是出现眼睛的调节功能失常，而成为近视眼。

由此可见，照明的光线不要过弱，也不要太强，通常以 25 瓦的

灯泡较为适宜，灯与书本的距离不宜小于 0.5 米，灯光应来自左前方，以免右手的阴影妨碍视线，灯泡上要有灯罩，使光线柔和舒适和清晰悦目。（汪宗俊）

为什么不是人人适宜戴隐形眼镜的？



随着市场上隐形眼镜的出现，脱下框架眼镜，换上隐形眼镜的人也越来越多了。的确，隐形眼镜有比框架眼镜优越的地方。但是，对于隐形眼镜不能一味崇拜，因为，并不是人人适宜戴隐形眼镜的。据医学科学工作者计算，大约只有 2/3 的人合适，而 1/3 的人则不合适。

那末，哪些人不适宜配戴隐形眼镜呢？大致有这么几种：眼部患有炎症者，如慢性结膜炎、沙眼等，平时眼内分泌物比较多；患有急性和慢性泪囊炎者；眼睑内翻、倒眼睫毛者；眼球对隐形眼镜的材料有过敏者；居住环境不卫生，或工作环境多粉末、金属屑的……等等。这些人戴了隐形眼镜，势必加重炎症和污染。

除此之外，在少年儿童中是不提倡戴隐形眼镜的。因为小学生和初中生正处在发育阶段，眼球还要

随着年龄而发生变化，对验光的要求更高，要定期更换镜片。特别重要的是，少年儿童好动，学校里又要上体育课，又要做卫生值日，因此很容易使镜片污染。再一方面，小孩子自我管理能力差，本来脱戴、清洗、保养，对成人来说已是一件麻烦的事了，而对小孩子来说更不易做好了。所以，小学生、初中生也不适宜戴隐形眼镜。

关于配戴隐形眼镜，除了首先要请眼科医生检定适宜不适宜外，而且验光必须十分准确，因为隐形眼镜的验光项目要比框架眼镜多，而且要求更高。（劳宏燮）

为什么婴幼儿也会患青光眼？

青光眼是一种很常见的眼病，人到四五十岁以后，就须警惕这种眼病，因为，根据统计，中年以后患青光眼者的比例，约占 1%。那么，怎么又说婴幼儿也会得青光眼呢?

先让我们了解一下青光眼的病征特点。青光眼中医又叫“绿内障”，是由于眼球内压力升高引起的。我们每个人的眼球本身有一个正常的张力，叫眼内压，可以用指压法，来

感觉到眼球的软硬程度，或者用精密的仪器（眼压计）来测量。如果一个人的眼内压超过了正常范围（叫眼压高），那么就有患青光眼的可能。而引起眼压升高的原因，则是眼内房水排出困难或血管淤血。

中老年以后比较容易得青光眼，主要与眼球本身的新陈代谢有关，另外，睡眠不好、高血压、情绪波动等都会使眼压增高而产生青光眼。




至于婴幼儿患青光眼，则是先天性的，表现多为角膜大而混浊，眼球膨大，像牛眼似的，所以人称“牛眼”，眼底里可看到视乳头中央有青光眼凹陷。这种婴幼儿先天性青光眼，主要有两个原因。一是血缘性、遗传性的因素；二是在胚胎期眼前房角未发育好，致使生出来以后，眼内房水排出困难，眼压升高。

婴幼儿得了青光眼，往往表现出怕光、因疼痛而哭闹、流泪。先天性青光眼用降压眼药治疗，效果是很不明显的，必须手术治疗；或房角切开，或房角穿刺，让房水排出顺利一点，达到降低眼压，彻底治愈青光眼的目的。　　（劳宏燮）

为什么不会有相貌完全相同的人？

相貌是人体最引人注目的部位，也是人们互相识别和了解的依据。为什么人们的相貌各不相同？“塑造”相貌的动力是什么呢？

人是由父母双方的精、卵细胞相结合发育而成的。精、卵细胞中染色体的数目各为 23 个，人的相貌特征就是由细胞内染色体上的遗传物质基因控制决定的。



每个染色体都有它特定的构造和形状。经研究发现，每个染色体上的基因大约有 1250 个。目前，医学家认为人的基因数目在 100 ～ 200 万个之间，可以“塑造”出形形色色的相貌，不仅眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等五官的大小、形状和位置不一样，而且人的脸型也彼此不同，连单眼皮和双眼皮都各有不同的基因型。即使双胞胎，他们染色体上的基因排列，出现完全相同的机会，也仅有 70 ～ 80 万亿分之一的可能性。因此，长得完全一模一样的人，可以说是没有的。（汪宗俊）

为什么“左撇子”总是极少数？

在体育运动中，人们常常能发现少数用左手打球的人，人称“左撇子”。在有些竞技项目中，如乒乓、排球、羽毛球等，教练还特意培养一些“左撇子”选手，去对付那些大多数用右手打球的选手，效果往往很好。

的确，在日常生活中，大多数人都是习惯以右手为主，以左手为辅，来操持用具的，如握笔书写、捏筷吃饭、掌拍打球……但是，也有小部分人则相反，是以左手为主来操持用具的。

一般人都知道在人类中“左撇子”大大少于“右撇子”，却不一定知道两者之间的比例是多少。中外科学工作者在这方面做过一些调查

统计，大致情况是，东方人中的“左撇子”少些，欧美人中的“左撇子”比例高些。如 1980 年，中国科学院心理研究所共调查了近 2 万人，调查项目有十个方面：握笔、用筷、掷东西、刷牙、用剪刀、划火柴、穿针眼、握钉锤、握球拍、洗脸。统计的结果是，用右手的占 91% 左右，用左手的只占 1%，其余是左右手混合型的。即使把那些混合型中偏左的部分加到“左撇子”里去，“左撇子”的比例也只占 3% 不到。可见“左撇子”只占极少数。就是在“左撇子”比例相对比较高的欧美，据估计，也只占人口总数的 10% 左右。



那么，为什么大多数人习惯于用右手，而习惯于用左手的“左撇子”的比例如此小呢?

这主要是人大脑两半球的颞平面大小不一造成的。人类在进化过程中，产生了语言、思维等高级生理和心理活动，大脑两半球也分了工，左半球控制着人的右侧，右半球则管着人的左侧。从解剖角度来分析，人大脑左右半球的颞平面大小的差异是很大的，约 65% 的人是左颞平面大，24% 左右的人是两边差不多大，而 11% 左右的人却是右颞平面大于左颞平面。从中可以看出，占大多数的人，是左脑占优势。由于左脑支配右侧肢体，所以惯用右手的人占大多数；而右脑占优势的人是少数，所以“左撇子”比例小。


用右手或用左手，还与习惯和传统观念有关，比如在东方，人们一般认为，用右手是正常的，用左手总觉得有点“怪”，所以对小孩子也就自幼教他用右手了；有的人发现自己的孩子用左手，还要纠正他呢。由于这样的关系，“左撇子”自然更少了。

实验证明，婴幼儿一岁以内，还分不清主左手或主右手；要到两

岁时，才是形成主左、主右的关键阶段。要纠正必须在这个时期，不然的话，到了 3 岁时，多数的孩子用左手还是用右手，已经定局了，再纠正就不容易了；而且，在那时硬纠正，对孩子生理、心理的平衡就会有影响了，有的甚至产生不好的效果。（劳宏燮）

为什么鼻子会发红？

人的皮肤血管十分丰富，尤其是面部，血管网较其它部位更为密集。剧烈运动后，骨胳肌收缩，代谢加速，糖分解过程增加，乳酸浓度急剧上升，达到一定程度时，血管平滑肌便处于松弛状态，引起血管扩张，使鼻子发红。在冬季，面部的感觉神经受到外界冷空气的刺激，因血管舒张收缩功能失调，也可引起血管扩张，而使鼻子发红，这些都属正常现象。



如果鼻子发红久久不见消退，可能是患了某种皮肤病。如脂溢性皮炎，主要表现为皮肤油腻，或有油腻性黄痂和灰白色糠状鳞屑，边界不清，有时还发生渗液和毛细管扩张现象。酒糟鼻又称玫瑰痤疮，开始时主要表现在鼻部，特别是鼻尖、鼻翼两侧的皮肤上出现红斑，有明显的毛细管扩张，表面油腻发亮，以后红斑从时隐时现发展到不易消退，而且逐渐扩大，还会有绿豆大小突出的小疹、脓疱。它的病因错综复杂，至今尚未完全查明。但近几年来，由研究发现，多数病人与毛囊虫感染有关。毛囊虫是一种只有针尖大小的寄生虫，需用显微镜才能看清它的真面目，外形呈纺锤状，很像蠕虫，所以又称

蠕形螨。它进出毛囊孔，将皮肤表面的细菌带到受损伤的组织里，造成发炎，引起酒糟鼻。（汪宗俊）

为什么鼻毛剪不得？

为什么鼻毛剪不得？因为鼻毛与鼻子的呼吸功能有关。

人必须不停地呼吸才能维持生命。鼻、咽、喉、气管与支气管是气体进出的通道，肺乃进行气体交换的场所，它们联合组成呼吸系统。从呼吸道的整条路线来看，鼻子似乎是唯一的气体进出口，其实，谁都知道还有个备用进出口——嘴巴。当感冒鼻塞时，当跑步、游泳需要大量换气时，鼻子不管用，嘴巴会来帮忙。不过，嘴巴只能充当临时工，因为它缺乏鼻子所特有的一整套“设备”。

鼻子之所以属于呼吸系统，具有呼吸功能，那是因为鼻子能使吸入的空气变清洁、变温暖和变湿润，从而保护肺部。要知道外界空气里面不仅仅含有人体必需的氧气，还有进入肺部后会为非作歹的灰尘、粉末、纤毛、细菌等等。吸入了这些不干净的东西，怎么办呢？鼻子总不能像窗那样装上块窗纱，也不能像门那样挂上个门帘，更不能从早到晚都戴个口罩吧！因此，鼻子的前鼻腔内就安置了个“除尘设备”——鼻毛，作为第一道防线。空气进入鼻孔时，如果夹带灰尘、粉末、纤毛、细菌等有害物，鼻毛会马上执行任务，挡住它们，不让过关。所以，鼻毛愈密、愈粗、愈长，工作能力愈强。要是鼻毛既少又短且稀疏，有害物就易于漏网脱逃，窜进后鼻腔。不过，没关系，还有第二道防线——鼻腔粘膜。鼻腔粘膜经常分泌一些浆糊样的粘液，能把流窜的漏网物质粘住不放；那不断摆动的粘膜纤毛也会像扫帚一样把它们扫向鼻孔，被手绢、毛巾擦掉。

鼻毛如此忠心耿耿，不分昼夜地守卫着呼吸道的两扇大门——鼻

孔，维护人们的健康，所以不能把它们剪掉。（盛丹菁）

为什么人会感到疲倦？

晚上睡觉的时候，人体是处在相对静止的休息状态，一旦起床后，就要进行各种活动。因此，白天总是处在活动的状态之中。人在进行各种活动的时候，要消耗掉一些能量和营养物质；而消耗的多少，往往同人活动的剧烈程度成正比。轻度的活动，消耗少，剧烈的活动，消耗就多。我们都有这样的经验，体力劳动者，一天工作下来，会感到疲劳；长途步行、激烈的体育比赛以后，人的疲倦感觉更加明显。脑力劳动者的情况也一样：科学家、工程师、作家，当他们完成一项发明，设计好一张图样，或者写完一部作品后，往往会觉得疲劳到极点，整个身子像垮了一样。

实际上，人同机器有某种相似的地方。机器运转的时间长了，也会有“疲倦”感，那就需要保养保养，拆拆洗洗、加加油。

人会产生疲倦，实际上是神经系统过度活动的一种保护性作用；或者说是一种保护性的信号传递：告诉大脑，各种生理活动需要休整了，能量、营养需要补充了。

那么，具体点讲，引起人产生疲倦感的各种生理因素是哪几个方面呢?

一是人机体方面的疲劳。如肌肉长时间的收缩运动，使得肌肉收缩能力降低了，这叫收缩性疲劳。而肌肉中，最容易疲劳的是神经肌肉接头（是它把神经冲动传递给肌肉的）。神经肌肉接头的疲劳，称作传递性疲劳。肌肉部分的收缩性疲劳和传递性疲劳，又会影响人的中枢神经，使中枢神经的兴奋能力大大减低，这样又出现了中枢性疲劳。

二是人体各部位生理现象内在的疲劳因素。如血液里葡萄糖消耗

得差不多了；能源分子糖元供应不上了；大脑和血液中氧供应不够充分了；肌肉里应急能源磷酸肌酸用光了……等等，于是疲倦产生了。人就像机器一样，运转时间过长，有点转不大动了。

对于疲劳的消除，普通人都是懂得的：只要适度的休息和能量、营养的补充即可。

至于另外一种疲倦，如看书、写字时间过长引起的眼睛、手部疲劳，那是局部器官的问题，只要调整一下活动项目和适当休息就行了。

（劳宏燮）



为什么人要睡觉？

睡觉是人生活中的一个重要组成部分。健康的成年人，一天用于睡眠的时间，大约须要 6 ～ 8 小时，如果一夜不睡，或者睡眠不足，那么第二天就会浑身乏力，无精打采，甚至饭吃不下，工作不想干。由此可见，睡觉虽然是一件平常的事，却是生活必不可少的。

人一天的活动，不论是从事简单的活动还是复杂的活动，都会给身体带来疲劳，使大脑皮层的活动发生变化，兴奋过程减弱，抑制过程不断加深，直至最后越来越深重的抑制向全部大脑皮层扩散，并进一步影响皮层下部分，引起困乏，从而进入睡眠。

睡眠的本质就是抑制。抑制过程和兴奋过程具有同等重要的意义。睡眠一方面使人活动时在体内积累的代谢废物如二氧化碳、乳酸、尿素等继续分解排泄；另一方面，使身体获得充分的能量，用来修补和恢复人体在活动中或患病时所造成的损害，从而在神经系统高级部位

的调节下，使人体不断地获得新的精神和体力。如果睡眠不足，会加重疲劳，使活动能力下降。长期睡眠不够，将导致身体对疾病的抵抗力减弱，人就非常容易得病。



知道了人必须睡觉的道理。就要注意睡得好。睡眠效果的好坏，不仅取决于睡眠时间，而且更主要的是取决于睡眠的质量。深沉的熟睡，睡眠效果最好。不安宁的浅睡，睡眠效果就不好，醒后常常表现出倦怠、精神萎靡、体力不足和记忆力、注意力减弱的现象。因此短时间的熟睡比长时间的浅睡好。为了睡得好，也要讲一点睡觉的科学；临睡前不宜吃得太饱，不要喝浓茶和咖啡，不要吸烟；而要洗热水浴或用热水洗脚，会有利于加深睡眠。另外，还要养成有规律的睡眠习惯，每天按时睡觉、按时起床。这样能使人较快地入睡和按时觉醒。早晨醒来以后，不要在床上久卧不起，这是一个不好的习惯，会使人活动迟缓，并影响身体健康。


（柯依）

为什么人会越睡越懒？

睡眠是人必不可少的生理过程。它既是消除疲劳的主要形式，又是保护健康、维持生命的有效手段。

入睡后，人的大脑皮层处于抑制状态，除了闭合眼睛，“封锁”膀胱和肛门，不让随意排便外，全身肌肉都处于松弛状态；呼吸减慢，心脏的搏动缓慢，血管中的血流速度减慢，血压降低，这就使人的生理活动过程减慢，新陈代谢减弱，从而消除劳动后的疲劳。所以，人经

过深沉而恬静的睡眠以后，就会感到精力充沛。



然而，睡眠时间也要适当。如果长时间的睡眠，将会使人的大脑中负责睡眠的那个部分负担过重，使皮肤和肌肉、微血管等依然处于弛缓舒张状态中，血流缓慢，体表血液供应量增加，而流入大脑微血管的血液相应减少；中枢神经系统的兴奋性减弱，抑制功能相对增强。这样不但疲劳后的身体得不到充分恢复，相反还会使人越睡越感到昏沉沉、懒洋洋、四肢无力。所以，人的生活起居要有规律，不能贪睡，需要养成早睡早起的良好习惯，并在清晨到室外锻炼，使大脑的血氧供应量增加，神经系统的兴奋性增强，从而提高学习效率。

（汪宗俊）

为什么会发生脑溢血？

脑溢血俗称“中风”，是一种病情凶险，死亡率较高的脑血管疾病，常常突然发生，重的立刻跌倒在地，昏迷不醒；轻的虽然神志还能保持清醒状态，但会出现半身肢体瘫痪等症状。

高血压是导致脑溢血的“罪魁祸首”。

如果一个人得了高血压，不求医治疗，造成高血压长期得不到控制，脑部动脉血管会逐渐硬化，造成血管管腔狭窄或者发生严重痉挛，这时与动脉血管相应部位的脑组织便渐渐缺少血液供应，以致软化、坏死。其中的脑内小动脉血管失去了脑组织的支持，加上血管本身也

因为硬化，产生动脉瘤的可能性更大。在这种情况下，如果再突然受到情绪激动、过度兴奋等的影响，促使血压骤然升高，于是脑动脉瘤便破裂出血，血液流入血管周围的脑组织，影响脑组织的功能。这种病症，医学上称为“脑溢血”。

由高血压引起的小动脉血管硬化不是一朝一夕形成的，开始的时候，小动脉血管只是功能性收缩，随着病情的发展，血压长期居高不下，便能使小动脉血管管壁病变，逐渐硬化。另外，血压长期升高，还会出现血液脂肪质代谢紊乱，较大动脉血管渐渐发生粥样硬化病变。这两种病变就为发生脑溢血准备好了条件。



脑溢血一旦发生，只要发现早，抢救迅速、及时，那么经过积极的对症治疗，是有希望逐步恢复健康的，但相当大一部分人，不是抢救不及死亡，就是留有半身肢体瘫痪、口眼歪斜或丧失言语机能等后遗症。

要防止脑溢血，首先要积极防止和治疗高血压病。（柯依）

为什么“中风”病人总是一边瘫痪的？

20 世纪 80 年代初期，美国有一位世界著名的女舞蹈家阿格尼丝·戴米尔，率领了一个舞蹈团，正准备在纽约市亨特学院的演出厅演出时，她在后台突然感到右半身不能动弹了。人们慌忙地将她送进了纽约市立医院，医生给她作了 CT 检查，发现左脑有一条血管已经破裂，血液正在从裂口渗出来。戴米尔中风了，右半身完全瘫痪了。

中风，是老年人的一种常见病，是目前各种疾病中死亡率最高的。70 年代末，我国北京、上海等 14 个城市中，脑血管病的死亡率已居首位，它同恶性肿瘤一样对生命构成了严重的威胁。因此，医学界对预防和治疗脑血管病是非常重视的。

也许你在生活中见到过这样的现象：患中风的人，发病后，往往不是左身偏瘫，就是右身偏瘫，睡在床上不能动弹；即使是那些病情轻的（称小中风），经医治后，也不能完全恢复；不是左肢偏瘫，便是右肢不便。有时，在公园里能看到那些拄着拐杖、慢慢行走锻炼的老人，多数就是中风后已经有所好转，正在继续治疗的病人。



中风总是半身不遂的原因须从脑的组织和中枢神经的支配方式谈起。脑是人体的司令部，是生命的中枢所在地；脑血管（脑动脉和脑静脉）是往返于心脏和大脑的“交通线”。如果这些交通线发生了故障（出血或堵塞），那么轻者造成残疾，重者死亡。正因为中枢神经是交叉分配的，即左脑主宰右侧躯体的功能，右脑主宰左侧躯体的功能。因此，脑左半球里的血管出事时，人的右体就会失去知觉，而脑右半球里的血管发生故障了，人的左边身体就会发生瘫痪。不仅如此，除了一边的手脚瘫外，一边的眼球也可能失明；如果脑血管毛病发生在优势的脑半球（一般人的优势脑半球都在脑左半球），还会失语呢。那么也许有人会说，有没有左右脑半球都出血或都堵塞呢？这种情况还是绝少见的，因为脑血管的故障一般总是发生在最薄弱的环节，一旦某个地方出血，那么其他地方受到的压力就会暂时得以“缓解”。所以，中风总是一边出问题的。

说到这里，还得补充几句。中风虽是老年人的常发病，但年轻人

同样也会发生的。当然，老年人以出血性中风为主，年轻人以缺血性中风（堵塞）为多数。因此，年轻人同样不能麻痹大意。　（劳宏燮）

为什么多动手指能健脑？

人类的祖先古猿，没有手与足的区别，经过千万年的进化，是劳动促进了上下肢的分工。上肢劳动较多，动作逐渐复杂，便变成了双手。手脚的分工，是人类进化的里程碑，人通过双手去实现创造性的思维活动，去创造并使用工具，这是人与一般动物的本质区别。生理学家研究证实，人体的某一部分器官如果长期得到锻炼和使用，与其相关的组织也会因此而比较发达。手的活动受大脑指挥，经常使用会使手指越来越灵巧，人的大脑也更加发达。与古猿相比，现代人的脑量增长了 2 ～ 3 倍。

人的双手被称为智慧的门户，由于手的灵巧性和频繁的劳动，使它对大脑神经的影响，远远超过两条腿活动时对大脑神经的影响。特别是青少年时期，如果经常锻炼手指的活动能力和技巧，就能使自己更加聪明。那么有哪些活动手指的方法能健脑益智呢?

一是学习拉提琴或弹钢琴。按照乐谱拉提琴和弹钢琴，不仅能使手指受到训练，而且和谐优美的旋律对脑细胞也会产生良好的刺激。


二是练习打算盘。打算盘不仅要用手指去不断拨动算盘珠，而且要用眼睛看数，用脑子计数。据报道，在使用电子计算机比较普遍的一些国家，算盘也未被淘汰。学生们在课外时间里练习打算盘，已成为一种提高智力的好方法。

三是进行球类运动。如健身球、排球、篮球、乒乓球等，这些活动项目都有利于手指活动。

四是乘车或候车时，用手的中指、拇指或食指去触摸若干不同数

值的硬币，识别它的价值和正反面，锻炼脑与手指配合而不用眼睛的辨识能力。

五是分别用左右手食指并中指和中指并无名指交替弹击桌面，既快速又有节奏，每分钟弹敲 60 ～ 70 次，要求每次练 3 分钟，每天练 3 次。这种方法可通过手指的快速活动锻炼大脑的敏捷反应。（贝润浦）



做梦会不会伤精神？

每当夜幕降临，人们入睡以后，奇异的梦幻常常会降临。梦乡的景象，真是光怪陆离。梦境中那别开生面的大千世界，与觉醒时截然不同。人在梦中可体验到各种感觉，看到似乎是超现实的场景。

如果一个人每天睡眠 8 小时的话，那么，他生命的三分之一是在床上度过的。而 8 小时的睡眠通常可分成 5 个各为 90 分钟左右的周期，每一个周期中，有一段时间眼球出现快速运动，另一段时间则不出现，一般很有规律。在出现眼球快速运动时把人叫醒，他就会诉说“刚才在做梦”；而在非快速运动时叫醒，则就无做梦体验。由此可见，人人都会做梦，每夜都做梦，有人统计，人的生命的十五分之一是在梦境中度过的。但大多数的梦都不能回忆，只有在眼球快速运动期醒来时的梦才能够回忆起来。

做梦会不会伤精神？科学家为此做了实验：将 20 个身体健康的人分甲、乙两组，每晚让甲组的人与往常一样大做其梦，而当仪器显

示乙组人员在做梦时，立即将其唤醒。10 余天后，乙组成员全变得性格消沉、脾气暴戾。以后让他们恢复做梦的权利，那些异常症状就消失了，他们的情绪又恢复正常。由此可见，做梦是人的生理需要。

日本山梨大学研究人员发现，人脑中存在着两类相反的生化物质——促眠肽，一类能促无梦睡眠，另一类能促有梦睡眠。日本研究人员已成功地分离出了有梦促眠肽，并将它用于动物，使睡眠的有梦期延长，结果动物的平均寿命大大提高。医生们还发现，痴呆症者的无梦期较长，结果寿命大多较短。他们的研究提示了做梦与寿命的长短似乎有某些关系。



还有国外的神经学家研究证明，脑细胞中除了“正规”军以外，还有“后备”军。后者在人清醒时不活动，而当人入睡后，为了防止衰退，它们就进行“演习”，于是，便产生了梦境。脑子越发达，产生梦的机率也越多。因此说，做梦不仅不会伤精神，而且是有益的生理现象。


（贝润浦）

为什么要制怒？

发怒，是人对客观事物不满或个人的意愿、活动遭受挫折时产生的一种情绪紧张状态。发怒有生气、激愤、大怒、暴怒等不同程度的表现。发怒是一种不利于身心健康的情绪。因为事无巨细，时常发怒，会影响工作和人际关系。人在发怒时，对事物会产生厌烦情绪，表现为对人对事“没好气”；而在暴怒时，则更要寻找发泄对象，迁怒于人

或器物。因此，日常生活中，一个易发怒的人，往往难以合群，无法与人融洽相处。

从心理卫生角度看，一个人常为小事犯颜动怒，是心理不健康的表现，而且，暴怒可以引发许多疾病。人在发怒时，交感神经的兴奋性增强，心跳加快，血压上升。如果原来就有心脑血管疾病，暴怒之下，很容易发生心律严重失常，甚至因脑血管破裂而猝死。在我国历史上，东吴大都督周瑜就是被诸葛亮三气之后发怒而身亡的。在现实生活中，因为暴怒而促使疾病加重或暴死的事例也屡见不鲜。



此外，经常发怒的人由于机体的免疫功能受到影响，植物神经功能受到干扰，所以神经官能症、胃与十二指肠溃疡、糖尿病、甲状腺功能亢进、月经失调、神经性皮炎、肝胆病、精神病、癌症等多种疾病的发病率和死亡率明显高于正常人。

所以，经常容易发怒的人，要学会控制自己的情绪，改掉暴躁的脾气，提高自己的思想修养，适应各种人事环境，尽量避免发怒。（贝润浦）

为什么会“人吓人，吓煞人”？

俗话说：“人吓人，可以吓煞人”。这话并非危言耸听。

有这么一件事。一天夜晚，江苏某地农村，有几个小青年聚在一起讲鬼故事，人人听得毛骨悚然。夜半人散，其中有一个女青年独自回家。正当她惴惴不安地匆匆赶路时，突然从路边的竹林里跳出一具“白衣僵尸”向她扑来，她当即惊恐万分，没有叫出声来就倒地而死了。

事后查明，这是她的同伴反穿了羊皮大衣恶作剧所引起的悲剧。



人吓人，为什么会吓死人呢？这与人体内一种叫儿茶酚胺的物质的分泌量突然增多有关。儿茶酚胺包括肾上腺素和去甲肾上腺素，主要由肾上腺所分泌。当人体处于极度惊恐的状态时，肾上腺会迅速释放大量的儿茶酚胺，促使心跳突然加快、血压升高，心肌代谢所需的耗氧量急剧增加。这对于原有冠心病、高血压病、心肌炎或心功能不太健全的人来说，往往会引起心律严重紊乱；有的可使心脏突然停跳；还有的会并发心肌梗塞或心肌破裂而导致猝死。

有人曾用显微镜观看了 15 名在受到惊恐后死亡者的心脏，结果发现心脏细胞都遭到了破坏。还有人对 190 名因心脏病突发而从死亡线上救活过来的病人进行病史追踪；发现其中 25 人（占 1/8）在发作前曾遭受过极度惊吓等激烈的情绪波动。这也证实了惊恐确能使人丧命的生理原因。

因此，绝对不要对别人开恐怖吓人的玩笑，以免吓出人命。对心血管有疾病的人来说，在遇到意外情况时，要注意控制自己的情绪，也可立即服少量的镇静剂，以缓解惊恐时剧烈的生理反应。　（贝润浦）

为什么近亲不能结婚？

我国 1980 年颁布的婚姻法明确规定，三代以内的旁系血亲禁止结婚。所谓三代以内的旁系血亲是指从祖父母、外祖父母同源而出的

男女，例如兄弟姐妹（包括同父异母，同母异父）和他（她）们的子女，都不能通婚。换句话说，凡是堂兄弟姐妹或表兄弟姐妹，都属近亲，法律禁止他们之间结婚。

近亲为什么不能结婚呢？有的人身上患有某种疾病，他（她）的生殖细胞上就有可能含有某种病的基因，医学上称为致病基因。也有的人看上去很健康，没有疾病的症状，但他（她）的细胞里隐藏着有害的基因，医学上称为隐性有害基因。这种有害的疾病基因，不管本人有没有发病，可以一代一代传下去，医学上就称为遗传病基因。

男女结婚时，一方有遗传病基因，另一方没有这种遗传病基因，这对夫妻所生的孩子就不容易得这种遗传病；近亲结婚时，由于双方的父母有相近的血缘，精、卵细胞上很可能带有来自同一祖先的某些相同的遗传病基因，夫妻将相同的致病基因结合在一起，“亲上加亲”，就会使所生子女出现某些遗传病。据统计，表兄妹之间约有 1/8 的基因可能相同，如果表兄妹结婚，就有 1/8 的可能使子女得遗传病。男女双方血缘越近，遗传病对后代的影响也越大。



近亲结婚因为遗传因素可使所生子女的先天性畸形、痴呆、隐性聋哑等疾病发病率大大增加。据埃及一项调查表明，在埃及，无脑儿和脊柱裂发病率在非近亲婚配中只有 0.57%，而在近亲婚配的后代中却为 1.46%。上海郊区某乡有一对表兄妹结婚后生了一个女孩，刚出生时只有 1 千克重，10 年过去了，她也只有热水瓶那样大小。长至 18 岁，这位“热水瓶姑娘”躯干长不过 20 厘米，比热水瓶高不了多少，体重也只有 8 千克。她双手腕关节畸形，握力很差，上肢长 20.5 厘米，下肢长 30 厘米，脚长 8 厘米，头围也

仅 39.5 厘米，每天只吃 150 克的食物。她从 17 岁开始，每月都来月经，会叫爸爸妈妈，具有喜怒哀乐的表情，但仍不能独立行走，大小便不能自理。这就是近亲结婚带来的苦果。

目前已发现的遗传病约有 4000 多种，最常见的与遗传有关的痴呆患者，全国约有 500 万人，精神病患者约有 1000 万以上，其中精神分裂症约有 500 万。其他如盲、聋等生理缺陷和残疾患者全国约 3000 万人。最近卫生部公布的全国出生缺陷监测结果显示，出生缺陷有 111 种，总发生率为 13.08‰。也就是说，全国每年可因农村和边远地区的近亲结婚而出生 30 万异常胎儿，这是一个多么惊人的数字。如果不加控制，对民族昌盛、国家繁荣十分不利。所以，我们要严禁近亲结婚。

（贝润浦）


为什么不要强忍大小便？

人的尿液贮存在膀胱里，当积聚到一定量的时候，膀胱涨满，就会通过神经把信息传递给大脑，人就产生想小便的感觉，把尿液排泄出去。如果强忍憋急了的小便，且不说多么难受，大量的尿液充盈膀胱，就会使膀胱肌肉变得松弛，以后就会影响膀胱肌肉的收缩功能，造成排尿无力，淋漓不净，或者经常有剩余尿排不出来。尿液是细菌的良好培养液，膀胱内的温度又是最适宜细菌繁殖，如果尿液在膀胱内贮留的时间过长，细菌大量繁殖从而引起泌尿系统的感染，出现尿频、尿急、尿痛和血尿。所以，每当你想小便时，千万不要长时间强忍。

按照人体生理卫生的要求，最好每天解大便一次，以利于消化系统有节律地运转。有不少青少年大便没有规律，有时大便便意来了，因为贪玩，还强忍着，使便意消失，这样会影响肠子的排泄功能，肠蠕动变得迟钝，以后可能很久不再会有便意。这样，粪便在肠内停留时

间过长，由于水分被吸收，积存肠内的粪便就变得又干又硬，即使大量饮水，也不能使粪便再变软通畅。有些青少年经常便秘，或大便时非常吃力，拉下的粪便像栗子，又燥又硬，细查原因，大都是平时大便没有规律，并且有强忍大便的习惯。

强忍大便还会引起其他疾病。譬如，粪便在肠中停留时间过长，就会压迫肠壁的静脉，使肛门直肠周围的静脉血液不易回流到心脏，肛门直肠附近的静脉发生血液瘀滞，就易形成痔疮。原有痔疮的人，强忍大便会使得痔疮出血更加严重。同时，粪便过硬，大便时就要拼命屏气用力，这会增加腹腔内的压力，使原来有脱肛症状的人更加痛苦，大便后坠出的肛门较难回纳。



此外，原有高血压和冠心病的中老年人，更不能强忍大便，要保持按时大便的习惯，促使大便通畅。否则，造成便秘时再用力屏气排便，会使血压升高、心肌缺血缺氧，诱发脑血管破裂或心肌梗塞，那就危及生命了。

（贝润浦）

为什么验小便可以帮助诊断疾病？

小便是人体的一种排泄物，在肾脏内形成，经输尿管流入膀胱。当尿量积到一定程度时，会刺激神经，使膀胱收缩，将尿液排出体外。正常成人每昼夜排出的尿量一般有 1500 毫升左右，呈淡黄色，其中 96 ～ 97% 是水，3 ～ 4% 是固体物，包括代谢产物尿酸、尿素、肌酐和无机盐氯、钠、钾等。肾脏在分泌尿液的过程中，会保留人体所需要的

各种物质，将不需要的物质排出体外。因此，正常人的小便，它的颜色、数量、比重、酸碱度和各种物质的含量，基本上是比较稳定的，一般不含有糖和红细胞，蛋白质的含量极少，用普通方法不能测出。当肾脏患病时，由于肾小球的过滤机能和肾小管的重吸收机能、分泌机能发生异常改变，或肾脏感染细菌，可以引起小便颜色、数量、比重和小便成分的变化，并产生肾脏疾病的一般症状，如多尿、少尿、无尿、排尿困难、尿急、尿痛、血尿、蛋白尿、管型尿、菌尿等。因此，通过对小便的各种化验，例如尿常规检查、尿液细菌培养、尿沉渣检查和多种肾功能的检查，就能初步诊断出肾脏疾病的病因、病变程度，或者掌握用药以后的治疗效果供医生治疗作重要参考。

事实上，不仅肾脏病人的小便要验，其他许多不是肾脏的疾病，如高血压、糖尿病、骨髓瘤、溶血性贫血和丝虫病等，患者的小便也可以反映出这些病的特点，如糖尿病人的小便里有糖，骨髓瘤病人的小便里有特殊的凝溶蛋白质，丝虫病人的乳糜尿，所以对这些病人来说验小便也是必要的。（柯依）



为什么噪声有害健康？

随着现代工业、交通运输事业的迅速发展和城市人口的急剧增加，城市中的噪声正以惊人的速度日益增强，已成为继废气、污水之后的城市第三大公害。

表示声音强弱的物理量叫“分贝”。有些自然界中的声音，如树叶

的沙沙声、细雨的淅淅声、海浪向岸边轻轻拍打的声音，一般都不超过 40 分贝。这种声音，听起来不觉刺耳，给人以安谧感与平衡感，使人的身心得到松弛。按国际标准规定，城市室内允许的声级为 42 分贝，而我们平时使用的家用电器的声级都比较高。比如：电风扇是 40 ～ 50 分贝；电冰箱是 34 ～ 52 分贝；洗衣机是 60 ～ 80 分贝；电视机是 50 ～ 80 分贝；收音机、收录机都为 70 ～ 90 分贝。至于电车、汽车、火车、摩托车、印刷机、机床、锻铁厂等发出的声音，可达 100 分贝，而纺织车间的机器声则更高，可超过 100 分贝。

科学家研究发现，一般人在声强超过 40 分贝的环境中，睡眠受影响；达到 50 分贝，入睡困难；超过 60 分贝，影响人们的工作、谈话和娱乐；当噪声超过 85 分贝时，就会感到吵闹，并给听觉细胞带来损伤，严重的可造成不能恢复的耳聋。当噪声超过 115 分贝时，如成片集中的汽车喇叭声、凿岩机声和大炮声，人听到后可立即造成耳聋。



长期处在 70 ～ 80 分贝的噪声环境中，可使人的微血管收缩，导致供血不足，肢端发生营养障碍，并引起冠心病、血压升高或不稳、心律不齐、心前区不适、心悸等。噪声还可造成中枢神经功能紊乱、大脑皮层兴奋和抑制失去平衡。如出现头晕、头痛、失眠、多梦、全身乏力、耳鸣、胸闷、平衡失调等症状。如出现精神障碍，则可表现为恐惧惊慌、易激怒、情绪不宁、困惑不安、愤怒或自卑，严重的会出现精神忧郁、精神错乱，甚至诱发或复发精神病。有这样一个例子：1985 年圣诞节前两天，美国内华达州有两名青年，万斯和贝尔纳普，如痴似醉地收听收音机里的音乐节目，他们将音量调到最大，疯狂的噪音顿时使他俩精神失常，发疯似地将室内一切家具陈设统统砸烂，随之

又用手枪开枪伤人，最后双双自杀，成为轰动西方社会的新闻。

噪声还会使妇女内分泌失调而出现月经不调、流产或早产；噪声能严重影响胎儿和儿童的生长发育，并损伤听神经功能。引起胃肠功能障碍，产生食欲不振、恶心、呕吐、消化不良等症状，并使溃疡病的发病率增高。噪声还能导致肝硬化。强烈的噪声还能立即致人死命，1959 年，美国有 10 人“自愿”做噪声实验者，当飞机在这 10 名实验者头上以 10 ～ 12 米的高度飞行后，他们竟全部死亡，其中 6 名立即死亡，4 名数小时后死亡。

由此可见，噪声是无形之敌。为保护人们的健康，必须立足于控制与预防，如设法降低工业生产、建筑施工和交通运输所产生噪声；减少或消除家用电器的噪声等等。（贝润浦）

为什么沙浴、泥浴能治病？

我们的祖先很早就开始用沙埋来治疗疾病了。他们在劳动之余，喜欢将手、胳膊及足、腿埋在热的沙里，用以消除疲劳和病痛，后来这一古老而神奇的方法，逐渐成为独具特色的沙疗，俗称沙浴。

在进行沙浴前，病人先准备好足够的饮料、瓜果及防暑药品。沙浴时，病人脱掉外衣，戴上墨镜，先躺在帐篷下约 40℃ 的沙丘上，使身体逐渐适应，然后在医生指导下，将患病的部位埋入深达 10 厘米以上的沙粒中，每天 2 ～ 3 小时，一般连续 10 天左右为一个疗程。它对风湿性关节炎病人的疗效最佳；对慢性腰腿痛、坐骨神经痛、肩周炎、脉管炎等病人，也有显著的疗效；对偏头痛、慢性消化道疾病的疗效，令人满意。

沙浴的奥妙在哪里呢？主要是热的气候和沙粒的高温通过沙的压力，使热向人体深部组织传导，从而扩张血管，改善血液循环，增强

新陈代谢，提高抵抗力。有些沙粒中还含有很高的磁铁矿，加上气候干热，较强的红外线，通过灼热柔软的细沙作用于病人的身体，达到治病的目的。

但是儿童、老人、体弱的病人，以及有活动性肺病、严重高血压、心脏病的人，都不宜用沙浴治疗。另外接受沙浴治疗的病人，要有坚强的意志与毅力，因沙埋时如同置身于大蒸笼内，汗如雨下，口干舌燥，要不断喝饮料、吃水果，才能防止中暑和坚持治疗。



泥浴又称泥疗，则是另外一番景象。病人将患有疾病的部位埋于特定的泥浆内，这种泥浆具有消炎、散肿、镇静等作用，还能改善睡眠，提高机体的抗病能力。经研究发现，这种泥浆内含有大量的腐殖酸，（包括黄腐酸、棕腐酸和黑腐酸），具有止血、抗菌、抗肿瘤等多种治疗功效。

（汪宗俊）

为什么剧烈运动后不能洗冷水浴？

赤日炎暑，当你在高温下剧烈运动而满身大汗时，如果去洗一个冷水浴，想必会通身感到凉快。但是，在凉快的时候，疾病也可能会伴随降临。

剧烈运动时，体内新陈代谢加速，热量消耗增加，废物也随着汗水排出。此时如洗冷水浴，汗孔遇冷关闭，汗液不能排出，代谢废物积聚体内，影响机体新陈代谢，就会损害健康。

剧烈运动时血液循环加快，心跳加速，血液散布到全身体表的血管，以适应肌肉运动的营养和散热的需要。此时若受冷水刺激，皮肤肌肉血管遇冷收缩，大量血液突然回聚心脏，就减少了肌肉血液供应而加重了心脏负担，容易损害心脏。



在人的正常生理状态下，呼吸道粘膜上寄生着多种病毒和细菌，但由于人体的正常免疫抵抗功能，这些病毒和细菌不能为非作歹。剧烈运动后体温升高，如果突然受冷水刺激，体温又会急剧下降，冷热温差过大，容易引起鼻咽部毛细血管急剧收缩，使人体免疫抵抗力下降，于是原来寄生在呼吸道粘膜上的病毒和细菌就乘机活跃起来，向上呼吸道发起进攻，于是就会得咽喉疼痛、鼻塞感冒、咳嗽发烧等上呼吸道感染的疾病。

因此，剧烈运动后应略作休息，然后洗个温水澡。如果要洗冷水浴，必需待出汗停止，机体消除疲劳后才能进行。（贝润浦）

为什么运动员禁止服用兴奋剂？

1988 年，汉城奥运会上，参加男子 100 米短跑的加拿大田径运动员本 · 约翰逊，由于从他当场排出的尿液中查出兴奋剂——合成代谢类固醇的残留物，冠军被取消了，还受到停赛两年的惩罚。

从医学角度看，体育运动的宗旨在于强壮体质，增进健康，任何妄图借助药物提高比赛成绩的做法，都有悖于这一宗旨。况且，健康人采用这些药物会损伤器官，危害健康。因此，这些药物也就叫做运动违禁药物。

运动违禁药物种类很多，不下百余种，归纳起来主要有如下几类：



中枢兴奋药：例如咖啡因、利他林、士的宁等，对中枢神经系统有广泛兴奋作用，能振作精神，减少疲乏感，消除睡意。但是会带来神经过敏、失眠、眩晕、心悸、血压增高等不良后果，而且还会成瘾。

肌肉兴奋药：例如新斯的明、吡啶斯的明、尼瓦林等，能一定程度地兴奋运动肌肉，加强肌肉收缩力量。但是又会产生心跳减慢、恶心、呕吐、皮疹等副作用。

合成代谢类固醇：例如癸酸诺龙、康力龙等，有点类似男性激素的作用，可以增强新陈代谢，增加蛋白质合成，增进内分泌功能。但是会引起浮肿，损害肝脏。

利尿药：例如丁尿胺、氯噻酮、利尿磺胺等，利用这些药物的作用增加排尿量，通过排尿将身体里新陈代谢废物尽快排出；或者让肌肉运动产生的废物尽快排出，有利提高肌肉的力量和耐力；还可以通过利尿尽快排出体内的其他违禁药物。但是，利尿药又会引起身体里水和盐类代谢紊乱和酸碱平衡失调。

为了保证运动员的健康，现代运动会都设有检测中心，以揭露和阻止像本·约翰逊违禁那样的事件发生。（姚德鸿）

患贫血的人能参加体育运动吗？

人体血液里的红细胞是负责输送氧与二氧化碳的“运输工”，它们

通过装备在细胞内的血红蛋白（又叫血色素），去结合氧或二氧化碳，为身体组织和器官输送新鲜氧气，同时及时把组织、器官里产生的二氧化碳运走。正常人的红细胞数量，每立方毫米血液中，男性为 400 万～ 550 万个，女性为 350 万～ 500 万个；血红蛋白含量，每 100 毫升血液中，男性为 12 ～ 16 克，女性为 11 ～ 15 克。倘若红细胞数量或血红蛋白含量低于这些标准，就患上了贫血症。

患贫血症的人能参加体育运动吗？回答是不适宜参加剧烈或长时间的体育运动，而只适宜于进行一些运动量不太大的体育锻炼。



因为患了贫血症，说明血液里红细胞数量和血红蛋白含量比正常人少，也就是负责运输氧与二氧化碳的“运输工”比正常人少。每当进行运动量大的剧烈体育锻炼时，身体里的新陈代谢变得非常旺盛，能量消耗增加，组织与器官的需氧量明显增大，特别是与运动密切相关的肌肉组织，每一平方毫米大小的肌肉里，大约有 400 根毛细血管，平时仅开放 30 ～ 270 根，运动时大量开放，数量要比平时多出 20 ～ 50 倍，目的是让肌肉能增加氧气的供应。面对明显增加的需氧量，应该有足够的红细胞与血红蛋白来完成任务。可是，患贫血症者恰恰就是这些“运输工”显得不足，不能充分完成供氧及输出二氧化碳的任务。结果身体就面临缺氧的局面，人会出现头昏、恶心、心跳、气短等现象，反而对身体健康不利。

但是患贫血症的人，并非不能从事体育锻炼；在配合治疗贫血症的同时，可以从事运动量不太大的体育锻炼，例如短距离慢跑、散步、广播操、气功、太极拳等，以不产生头晕、目眩、心跳、气短、耳鸣、

恶心等症状为限度。事实上，适当的体育运动可以增强体质，改善食欲，有利于贫血症的治疗。（姚德鸿）

练举重会屏出“小肠气”吗？

先说说“小肠气”是一种什么样的疾病。“小肠气”是腹外疝的俗称，指的是腹壁上有缺损或薄弱点，导致腹腔内脏器官（特别是肠子）向外凸出的一种病变。常见的“小肠气”有腹股沟疝、股疝、脐疝等。不管何种“小肠气”，它的形成总不外乎两个条件：一个是上面提到的腹壁有缺损或薄弱点，因为人体腹壁上的腹股沟区域，股部或脐部等处，本是娘胎里带来的薄弱点，所以这些部位发生“小肠气”机会最多；另一个是腹腔内高压的冲击，例如咳嗽、便秘以及小孩哭吵等，都是腹腔内压力增高的常见原因。


有人会问，练举重不是要使劲屏气用力才能将沉重的杠铃举起吗？这样一屏，会不会因为腹腔压力的突然增高而产生“小肠气”呢？这就要看运动员是怎样练的了。如果练举重是有指导、有步骤，循序渐进，举的重量由小到大，使腹壁肌肉得到锻炼，逐步适应腹腔内压力的提高，这样是不会发生“小肠气”的。相反，倘使不懂得科学锻炼，一味蛮干、逞能，举的重量增加过快，而腹壁肌肉不适应这种突然用力过大的状况，那末，“小肠气”很可能会被屏出来。

为了防止练举重屏出“小肠气”，举重时必须注重科学的训练方法：第一，不先忙着举杠铃，而是先练腹肌，目的是增强腹肌力量，并能承受腹腔内压力的突然增加。第二，要量力而行，不能举过重的杠铃；第三，举重前事先佩戴一根阔腰带，帮助增加腹壁的力量，提高举重时，腹腔内高压冲击的承受力。

最后应该提出：尚未发育成熟的孩子，腹壁还没有长结实，所以

不适宜练举重；老年人腹壁肌肉已经开始衰退，变得软弱，加上慢性支气管炎引起咳嗽和习惯性便秘的机会很多，腹壁容易受到腹内高压冲击，所以也不适宜练举重，否则真有屏出“小肠气”的危险。（姚德鸿）

为什么说“睡前洗脚，胜吃补药”？



人的双脚，不但要支撑整个身体的重量，而且还带动整个身体移动。据计算，一个人一生中大约要行走 10 万公里，相当于绕地球两周半。

脚在人体活动中担负着繁重的工作，保护脚的健康，对工作、学习和生活是十分重要的。睡前洗脚是自我保健的一种方法，有益于全身健康。



洗脚，不仅是一种传统的卫生习惯，而且可预防足癣等疾病，用热水洗脚可起到吃“补药”的作用。用 60 ～ 70℃ 的热水洗脚能刺激末梢神经，调节植物性神经和内分泌系统，促进血液循环，供应更多的养料和氧气，及时排除积存的废料和废气，加快新陈代谢，起到消除疲劳、改善睡眠

和提高记忆力的作用。

根据中医经络学说：人体的五脏六腑都在脚上有相应的穴位，双脚共有 66 个穴位，占全身穴位的 1/10。经常洗脚并按摩脚上的穴位，能防治局部及全身的许多疾病。如双脚受凉后，为啥容易引起感冒等疾病呢？因为人的双脚与心脏的距离较远，供血能力差，脚的皮肤温度稍低，而脚与上呼吸道粘膜之间却有着密切的神经系统联系。脚部受凉就会反射性地引起呼吸道粘膜内的毛细血管收缩，造成血流量减少，纤毛运动减慢，因而，机体抵挡病菌、病毒的能力明显减弱。这时，原来潜伏在鼻咽部的病菌趁虚而入，并大量繁殖使人致病。一旦发生感冒后，每日用热水洗脚 2 ～ 3 次，可促使鼻咽部粘膜充血较快消退，感冒症状减轻。


此外，热水洗脚还可消除疲劳，预防长途跋涉或劳动所引起的下肢酸痛。睡前用热水洗脚，还能调节大脑皮层的功能，使脑神经处于松弛安静状态，使人安然入睡。因此，“睡前洗脚，胜吃补药”的说法是有一定科学道理的。（吴顺德）

为什么不能开着电扇睡觉？

电扇确实有助于通风散热、降低室温。但是，上床睡觉时切忌让电扇开通宵吹风送凉。最好在睡意朦胧时，就起身把电扇关掉。当然如使用有定时器的电扇也就更好。那么，开电扇睡觉有什么害处呢？

冷血动物的体温会随外界温度的变化而改变，外界温度升高，体温也升高；外界温度降低，体温也降低。人和冷血动物不一样。人体具有调节体温的特异功能，使产热和散热保持动态平衡，所以，正常情况下，体温始终恒定在 37℃ 左右。气候再热，体内食物的氧化、各器官组织的新陈代谢以及肌肉活动等等，照样会产生热量，只是散热

方式有所变更。除了呼吸、排尿与排便能带走一小部分热量外，人体的热量主要通过以下 4 种方式散发，即辐射、传导、对流和蒸发，其中蒸发是人体散热的重要方式。当外界温度低于 25℃ 时，辐射、传导和对流是人体的主要散热方式。要是外界温度升高到 29℃ 以上，唯有蒸发最能散热。



在气温高，出汗多的情况下，长时间开着风扇猛吹睡觉，随汗液的大量蒸发，体表温度迅速下降，散热逐渐减少，可是外界气温并未降低，反而逐渐丧失凉爽感觉，结果因体温调节中枢神经来不及调节，便容易着凉感冒。其实，白天工作时开电扇吹风，也不宜让风对着自己直接吹个不停，应该让电扇摇头吹好。（盛丹菁）

为什么久坐久站脚会发胀？

学校里的课程安排得再紧凑，总有课间休息。虽然休息时间不长，一般只不过 10 分钟而已，但是很能解决问题，学生可以活动活动。演出时间较长的话剧、歌剧等等，也有幕间休息，目的在于让观众离座活动活动。要是都不安排休息，让学生、观众就这么坐上几个小时，结果会怎么样？除头脑发胀之外，个个都会感觉脚发胀。

然而，与久坐相比，长时间站立不动的久站就更不行。大概不少人有这种体会，例如列队等候表演团体操、迎接贵宾或接受检阅，不

消一两个小时，两只脚就发胀，时间再长些，足背还会肿兮兮。为什么久坐久站脚会发胀呢？道理很简单。

首先，人体是水做的。这话当然有点夸张。不过，在人体的组织成分中，确实水的含量最高。正常成人体内的水分约占体重的 60% 左右，年龄愈小，体内所含水分的比例愈高。




其次，人体内的水是流来流去的。人体内水分的总量和分布必须保持恒定，并且不断流动才能保证血液循环及各种新陈代谢过程的正常进行。血浆中的水分和细胞与细胞之间的组织间液是怎么流来流去的呢？血管分为动脉、毛细血管和静脉。动脉是将血液从心脏输送到毛细血管的管道。静脉是将血液从毛细血管运回心脏的管道。毛细血管则是连接小（微）动脉和小（微）静脉的微血管，它们在组织内反复分支成网。毛细血管的管壁很薄，血浆中的水分、电解质和营养物质透过毛细血管壁进入组织间隙，生成组织液；而组织液中的水分、电解质和废物，也可透过毛细血管壁回流到血管内。组织液不断生成又不断回流到血中去，从而达到动态平衡。

第三，如果由于某种原因使组织液生成过多或回流障碍，组织间隙中就会滞留过多液体。下肢活动时肌肉收缩，挤压包裹在肌肉中间的静脉，下肢静脉内的血液就被挤向心脏。如果长时间坐着不动，没有肌肉的挤压，下肢静脉内的血液不易流回心脏。要是长时间直立，由于地心引力的作用，血液更加淤积在下肢静脉中，使静脉内压力增加，毛细血管内压力也随之升高。毛细血管液体静压力升高，血浆中的水分就加速向组织间液转移。下肢组织间液回流少而生成多，滞留过多

的结果是先使人感觉脚发胀，然后出现脚肿。　　（盛丹菁）

为什么领带、腰带不宜过紧？

现在穿西服的人越来越多了。穿西服就要结领带；就是不穿西服，有的人也会打上一条领巾，以增加美观。但是，你可知道，在结领带上，还得讲究科学和卫生呢？有的人为了使自己配戴的领带挺刮一点，便把领带结勒得很紧。要知道，领带过紧是很不好的，日子久了，对眼睛的影响很大。国外有人做过一些调查，那些领带结得过紧的人，往往会出现眼睛容易疲劳、视力减退、看物模糊的问题。这是因为过紧的领带压迫颈部的动脉血管，使血流不畅通，流向眼部的血液减少了，双眼就会出现视力减退的现象。为此，有人提议：首先，领带不宜打得过紧；其次，在到了工作地点后，如果不立即参加正式的社交活动，最好把领带暂时放松一下。你不是在外国电影、电视中看到过这样的情景，许多男士在办公室里都是把领带放松一点荡在颈上的。



领带是这样，腰带更是不宜束得过紧了。有些青年人为了使自己显得苗条一点，把腰带勒得紧而又紧，这样做是非常有害的。腹腔里的内脏器官很多，如胃、肠、肝、肾等，裤腰带勒得过紧了，会压迫胃、肠道消化器官，使它们不能正常蠕动，结果引起消化滞缓、食欲减退和便秘。同时，腰带过紧，腹部血管被挤压，一方面会阻碍动脉血液往下输送，加重心脏负担；另一方面又会使下部静脉血液难以很好地回流，长此

以往，很可能诱发下肢静脉曲张和痔疮的发生。

不仅领带、腰带不宜过紧，同样的道理，还有领口、袖口、内衣、围巾、胸罩等等，也不宜结得过紧，不然的话，除了引起以上一些不良后果外，还会引起眼部血液的回流，使眼压升高，以致造成青光眼。

注意衣着配戴，适宜宽松，将有利于你的健康。　　（劳宏燮）


为什么少女不宜穿紧身衣裤？

人的一生，自出世至发育成熟，然后衰老，可分成几个时期。各时期间并无绝对年龄界限，且因环境、营养、遗传等因素的影响而有个人或群体差异。不过，一般说来，12 周岁一过，幼年期就结束。由幼年向成年过渡的阶段，称为青春期，约自 12 岁至 18 岁。一旦跨入青春期，女童就“晋升”为少女。

少女不宜穿紧身衣，这是医生的忠告。众多理由中最主要的一条是紧身衣不利体格发育。青春期间，身体迅速发育，性功能也逐渐成熟。根据生理发育的特点，青春期尚可分为初期、中期和后期。初期以体格发育为主，身高突增，平均每年增长 5 ～ 7 厘米，除骨骼增长外，全身肌肉及脂肪也大大增加，故体重明显上升，平均每年增重 5 公斤。中期以内外生殖器官（第一性征）及第二性征（标志性别的其它特征）的发育为主，同时出现月经。后期则身材体格基本定型，生殖器官发育趋向成熟。跨入青春期中期后，女性的性腺——卵巢发挥生理功能，每月有一个卵泡发育成熟而排卵，并分泌雌激素和孕激素。在雌激素、孕激素及其它一些激素的协同作用下，乳腺发育，乳房组织内脂肪积聚，乳房渐渐丰满，乳头增大凸出，乳头及其周围的乳晕有色素沉积。乳房发育是女性最显著的第二性征。如果穿紧身套衫，必须穿紧身内衣，内紧外紧影响乳房发育，可导致乳头内陷。所以，当乳房微微隆起

后，还是选购宽松内衣、宽松套衫为好，以免怕羞不敢挺胸而躬身驼背。待等乳房发育到一定程度已基本定型后（大约 16 岁左右），应佩戴胸罩支托乳房，使它不致于因本身重量下垂而影响血液循环，有碍继续发育，不利将来当妈妈后的哺乳。此时如果爱穿合身的套衫，尽管随意穿。

青春后期，脂肪逐渐积聚于会阴部、臀部，骨盆增宽变大而形成女性体态。如果赶时髦过早穿上紧身裙或牛仔裤，尤其是长期穿着，会影响骨盆发育，长成绿豆芽式的女郎。丧失女性曲线美还在其次，关键是不利婚后的分娩。



长期穿着紧身衣裤，除了不利体格发育之外，还可能引起一些毛病。由于衣着过于紧身，尤其是晴纶、尼龙等针织品，透气差，汗液难蒸发，容易引起皮炎、汗疹、毛囊炎，甚至体股癣。牛仔裤裆短，裆缝摩擦，还会诱发外阴炎和阴道炎，少女更不宜穿着。


（盛丹菁）

为什么少女也要戴胸罩？

在青春发育开始时，少女最早出现的第二性征，就是乳房的发育。因此，人们常以乳房发育作为女性发育的起点。乳房长大隆起是女性的性特征，也为日后哺育后代准备了条件。

在 9 ～ 16 岁期间，少女乳房开始发育，常伴有轻度胀痛。先是

乳头突出，之后 2 ～ 3 年内，乳腺增生，里面的脂肪、血管逐渐增多，乳房逐渐隆起；接着，乳头四周棕色的乳晕明显增大，整个乳房充分发育，一般到 18 岁时定型，结婚生育后可略有增大。乳房主要由乳腺管、乳腺泡和脂肪组成，没有大束的肌肉，所以乳房本身无支托作用，如不注意护理，容易下垂。



佩戴胸罩是一种保护乳房的好方法。从年龄上讲，少女 16 岁左右乳房发育基本定型，即可选用合适的胸罩佩戴；从乳房成熟度讲，一般在乳头突出、乳晕上芽苞状突起消失、乳腺鼓起显著时，即可选用合适的胸罩。少女及时佩戴胸罩，能保护和扶托乳房，使乳房的血液循环通畅，对乳房的发育、抗病能力和生育后分泌乳汁有益；能减少行走或劳动时乳房的上下震荡，既避免乳头在内衣上的剧烈摩擦损伤，又可防止乳房组织的松弛下坠。同时，胸罩还能帮助乳房堆积脂肪，显出女性乳房的自然美。

佩戴胸罩时，大小、外形的选择很重要。过紧要压迫乳房影响血液循环，限制乳房发育；过松又起不到扶托乳房的作用。因而以不紧不松正好罩着两侧乳房为宜，乳房较小的少女，不宜采用较厚的胸罩或填塞棉花、海绵的方法将胸部隆起，否则对发育中的乳房也有阻碍作用。胸罩最好用纯棉布料，柔软吸水，有利于皮脂的分泌排泄和吸汗，背带要有弹性，或有调节长短的纽扣，勤洗勤换，保持整洁。睡眠时要解下胸罩，体育活动或体力劳动时可将背带适当扣紧，以免乳

房因震荡摩擦受到损伤。 （贝润浦）

为什么少女不宜穿尖头皮鞋？

当今皮鞋的花色品种可真多，橱窗里陈列的样品琳琅满目，方头、圆头、尖头，一应俱全，除了高跟、中跟、坡跟，还有平跟。买什么样的鞋好呢？少女们最好别挑那种头尖尖的、尤其是后跟高高的皮鞋。挺漂亮、挺时髦的，为什么不能穿？道理很简单，年轻姑娘长期穿尖头皮鞋，会影响足骨的继续发育，还会造成足的姿态性畸形——踇外翻，以及由此引起的一连串足疾。

足骨总共 26 块骨头，可分成三组。第一组是趾骨，14 块，踇趾只有 2 块，其余趾各 3 块。第二组是跖骨，5 块横排，紧接在趾骨后。第三组是跗骨，7 块，像七巧板那样排列在跖骨后。



穿了尖头皮鞋，特别是穿后跟高于 3 厘米的尖头皮鞋后，受害者主要是踇趾。足的前端老是壅塞在皮鞋的尖端里，久后踇趾在肌肉的牵拉下，必然向外侧移，它的第二节趾骨基部逐渐将后面的第一跖骨头推向内侧，跖趾关节因而发生半脱位，内侧关节囊附着处可有骨赘形成。第一跖骨内翻，踇趾斜向外侧造成的足畸形，称为踇外翻。一旦踇趾外翻，第一跖骨头的突出部分因长期受鞋帮的磨擦，局部皮肤增厚，皮下产生滑囊，会得损伤性滑囊炎，并引起肿胀触痛。严重时，踇趾的跖趾关节还会得骨关节病。第二、三跖骨头的足底面皮肤也因鞋底的机械性摩擦生出老茧。此外，第二趾根部趾骨关节处的背面皮

肤因受鞋帮磨擦还会形成鸡眼。鸡眼也是皮肤角质层过度增生的结果，但与老茧不同。鸡眼不突出于表面，却像图钉那样向皮肤深处突出，坚硬的尖端（就是鸡眼芯）压迫真皮乳头层内的神经末梢，可引起剧烈疼痛。

长穿尖头皮鞋的后果如此严重，希望年轻姑娘不要图一时漂亮而自找罪受。（盛丹菁）

为什么妇女不宜骑男式自行车？

据说男式车的结构比女式车合理，质量也较好，所以，很多妇女都乐意购置男式车。但是妇女还是骑女式车为妥。为什么？谨防会阴部骑跨伤。男式车有横档，上下车不方便，尤其是夏季穿裙子时，会阴部易于碰撞损伤。妇女会阴部血管特别丰富，一旦会阴部受伤皮肤破损，血往外流，倒还容易引起警觉。要是皮肤不破，而皮下、粘膜下的血管破裂，会形成外阴或阴道血肿。假如再不当回事，没及时就医检查，血肿会沿阴道壁无限向上扩展成广泛腹膜后血肿，更严重的是内失血过多，会威胁生命。

妇女应骑女式车之外，还得放低坐垫。坐垫低，蹬踏脚板时，不会扭动臀部，可避免会阴部磨擦伤。坐垫低，万一急刹车时，可迅速由前面下车，或者两脚踏地，避免摔倒跌仆。另外，骑车速度宜慢不宜快，除“安全第一”之外，慢速可避免过于用力，使盆腔过度充血，引起月经过多、白带多。（盛丹菁）


为什么少女的内裤老是会湿腻腻的？



内裤老是湿腻腻，莫非得了什么怪毛病吧！别胡思乱想，那是因为阴道里老是有少量粘性液体——“白带”流出来的缘故。要是月经尚未来潮，出现白带是女孩进入青春期的信号。此话怎讲？要从女性生殖器官发育讲起。

女性生殖器官发育由性腺，即卵巢的发育启动。女婴出生时，子宫两旁那两个小小的卵巢内含有众多原始卵泡。到幼年期末，大概十一二岁左右，下丘脑（位于脑底部）开始产生促性腺激素释放激素，调节脑垂体分泌与释放促性腺激素。在脑垂体促性腺激素的刺激下，卵巢内的原始卵泡发育，并分泌雌激素。在雌激素的作用下，内、外生殖器就开始发育。在内、外生殖器发育的同时，白带出现，而且，白带往往出现在月经初潮之前。

讲了半天，“白带”究竟是什么东西呢？主要由阴道粘膜渗出物、子宫颈管内膜分泌物以及少量子宫内膜和输卵管内膜的分泌物混合组成，其中还夹杂一些阴道上皮脱落细胞、白细胞和乳酸杆菌等。青春期初，白带的来源主要是阴道粘膜渗出物，大多呈白色稀糊状，无气味。月经初次来潮的年龄有早迟，一般在 13 ～ 15 岁之间，相当于青春期的中后期。此时，如果卵巢发育成熟并有排卵，白带的质与量即随月经周期而变化。月经过后，白带量少、稀薄，以阴道渗出液为主；两次月经中间那两、三天（相当于排卵期），白带多，较粘而透亮，以子宫颈内膜分泌物为主；随后，白带又变混浊粘稠而量减。



总之，白带的出现意味着青春焕发，白带的周期性变化乃女性的正常生理现象。不过，正常情况下，白带的量不会太多，一般仅觉阴部湿润而已。要是白带的色、质、量及气味异常，必须及时就医诊治。异常白带是多种妇科病的共同征兆。（盛丹菁）

为什么洗发、烫发不宜过勤？

谁不希望自己有一头秀发？头发不仅能保护头皮及脑部，而且新颖美观、庄重大方的发型，还会对人的仪表、容颜、精神有着很大的影响，如何保养头发，保持其自然美，提倡洗发、烫发不宜过勤，这是护发的一个关键问题。



头发终年暴露在身体外面，沾染了许多脏东西，有些人皮脂腺分泌旺盛，或者头发上经常搽头油、上发蜡，更容易沾染灰尘。洗发是清洁头发的重要手段。但还应因人而异，由于每个人的头发性质不同，工作和生活环境有差异，头发弄脏的程度不一样，洗头的周期也应不同。一般说来，油性头发 3 ～ 4 天洗一次，中性头发每星期洗一次，干性头发 10 ～ 12 天洗一次。头发不脏每周洗一次就可以了。如果头发很脏，可多洗几次。妇女头发较长，灰尘多在表面，洗发间隔的时间可以稍长些。如果洗发过勤，加上用碱性肥皂，反而会损伤头皮，因为人体的头皮能分泌一种可以抑菌的皮脂，大量的皮脂被清洗掉以后，反而有碍头皮的健康。

年轻的姑娘特别喜欢烫发，但应注意头发不宜常烫，半年烫一次即可，不可相距太近。如果烫发时间和次数过多，会损伤头发结构。烫发水中含有碳酸氢钠和氨水等物质，再加电热，头发会变得枯黄，容易脆断、变形。此外，洗头以后也不宜使用强烈的电吹风，更不要使用温度很高的火钳或电热梳。这是因为当温度超过 80℃ 时，头发中的蛋白质会遭到破坏，使头发失去弹性和光泽。（翁德立）

为什么要“饥不洗澡、饱不理发”？

民间有句俗语叫做“饥不洗澡、饱不理发”，人们不禁要问：人的饥饱状况与洗澡理发究竟有什么关系呢？

“饥不洗澡”，说的是在空腹、饥饿或饭前不要去洗澡。这是因为浴室内温度较高，洗澡时身体皮肤血管扩张，加上出汗较多，会散发掉大量热量，消耗过多的能量。空腹、饥饿或饭前去洗澡，就容易发生低血糖休克，血压下降和晕厥。并产生头晕、眼花、大量出汗、心悸、手抖症状。但是，吃得过饱去洗澡也不好，饭后胃肠道中的食物需要大量的血液去帮助消化，若饭后马上去洗澡，会使周围皮肤血管扩张，血液流向体表，胃肠道血液就相对减少了，不利于食物的消化。因此，洗澡的最佳时间，应选择在餐后 1 ～ 2 小时为宜。


“饱不理发”也有道理，就是说不要在吃饱饭以后马上去理发。因为在理发时坐在椅子上端端正正，一点也不活动，腹部也往往憋着气，会有一种饱胀不适的感觉，这样也就会影响胃肠的蠕动和消化功能。因此，在刚吃过饭以后，应稍事休息或散步片刻，再去理发则比较合

乎卫生。 （翁德立）

为什么不宜经常看通宵电影？

看电影可以增长知识，接受教育，丰富文化生活，每周看上一两次是无可非议的，但是有些青少年看电影着了迷，经常看通宵电影，那就不好了，它会给你的健康带来有害的影响。

青年时代是个长身体的时期，生活应有规则，要保证充足的睡眠时间。如果你长时间沉湎于看通宵电影，通宵达旦，这样人体的生活规律会受到干扰，神经系统功能发生紊乱，容易头昏脑胀、失眠、心悸、胃口不佳。因为整夜看电影，通宵不眠，或偶尔朦胧入睡，使人感到昏昏沉沉，迷迷糊糊，第二天如果又得不到很好休息，补偿睡眠不足，就会影响学习和工作，上课没精打采，工作中出差错或事故。



另外，通宵电影院里的空气污染是十分严重的，且不谈患有伤风感冒、支气管炎的人进入这一公共场所，在影院里的空气中散布大量的病菌和病毒，成为急性呼吸道传染病的传播之源；即使近千的健康人蹲在一个场子里七八个小时，呼吸时排出的二氧化碳和身上散发出来的汗臭味及脚臭味，加上不自觉者在场内吸烟的烟臭味等等，会使人感到恶心，叫人难受。

过长时间地看电影看录像，对眼睛也不利。看电影、录像时，银幕上的光线和四周黑暗的环境形成强烈对比，对眼睛能产生一定的刺

激，时间长了眼睛容易产生疲劳。夜间长时间的看电影，还要消耗大量合成视紫红质的原料维生素 A，如果不能及时补充，长此以往对视力也会有影响。有些青少年朋友喜欢持续长时间地看武打片、侦探片，这种习惯不好，它可使人神经长时间处于紧张状态，容易诱发各种身心疾病，如神经衰弱、高血压、溃疡病等。如果是中老年人经常看通宵电影，则对健康的危害更大，过度疲劳可使百病丛生，电影中过分紧张、恐怖的刺激场面可诱发心绞痛、中风，这对原有心脏及脑血管疾病的人来说，则更为不利。（翁德立）

为什么老年人的皮肤会起皱？


老年人的皮肤总归是皱巴巴的，而且愈老愈皱。当然，胖一点的、保养得好点的，皮肤会滋润些、皱纹少些。要讲清楚年纪老了，皮肤起皱这个问题，还需从皮肤的结构说起。

包裹人体全身的皮肤由表皮、真皮和皮下组织三部分组成。表皮在最外面，由多层上皮细胞组成。由于新陈代谢，新生的细胞不断从深部向表浅生长；衰老的细胞则逐渐角化，变成扁平的角质层，形成皮屑，不断从表面脱落。真皮在表皮下面，皮下组织又在真皮下面，主要是脂肪组织。真皮和皮下组织里面都有神经、感受器、淋巴管、汗腺和毛囊，毛囊周围还有皮脂腺。

皮肤表面本来就有无数高起的皮嵴 [门] 和陷下的沟纹，不过，由于皮肤的组织结构随年龄的增长而发生变化，皮嵴和沟纹的表现不同。小孩的皮肤组织结构很松，外加最表面的角质层很薄，所以，皮嵴和沟纹几乎看不见，摸上去皮肤又滑又嫩。

青、壮年人，表皮角质厚且富含水分，皮肤弹性足，结缔组织致密，皮下脂肪丰富，故而皮肤绷紧、柔韧、富于弹性，表面的皮嵴和

沟纹清晰，但是平伏，再加上皮脂腺和汗腺的分泌机能旺盛，皮肤显得滋润。



人到中年，50 岁过后，皮肤及其附属器——皮脂腺、汗腺就开始萎缩退化。60 岁后，皮肤衰老速度加快。老年人，表皮变薄，角质层变干、脆，水分易于蒸发；皮肤弹性降低，结缔组织不足；皮下脂肪减少，这么一连串的衰老变化使皮肤又松弛又薄，表面的皮嵴和沟纹因而变深，皮肤就起皱了。老年人的皮肤还很容易拎起来，放下后却很慢很慢才回复原状。此外，皮肤缺少皮脂与汗液的滋润，变得干燥、多屑与粗糙，甚至触觉、痛觉、温觉等浅感觉功能也会有所减弱。

另外，还有个现象，可能你已经注意到了，那就是奶奶和爷爷的年龄虽然相仿，但奶奶的皮肤却皱得早、皱得厉害。为什么男女有别？因为女子的性腺——卵巢，要比男子的性腺——睾丸功能衰退得早。而皮肤是性激素作用比较突出的靶器官，妇女绝经以后，体内性激素愈来愈少，皮肤失去性激素的支持也就愈来愈萎缩退化了。　（盛丹菁）

为什么不可拔眉毛？

眼睛是人类的“心灵之窗”，作为眼睛的附属物——眉毛，对人体健康和表达感情，都具有重要的作用。中国古代把样子长得好的男子眉毛称“剑眉”，女子眉毛称“蛾眉”。成语有“眉飞色舞”、“眉来眼去”，足见眉毛在表情达意方面的作用。但是，现在有不少女青年为了

打扮自己，喜欢将自己黑黑的眉毛拔掉，再用眉笔重新画一条适合自己面型的眉毛，岂知拔眉毛是一种有害自身健康的做法。

眉毛位于眼睛的上方，左右对称，形似条索状。看起来，眉毛并无多大用处，其实，它对眼睛起着重要的保护作用，如果我们人为地除去这道天然防线，就会产生以下几种危害：



眉毛被去除后，来自头顶、额部的汗珠、雨水和灰尘等容易进入眼睛，导致眼睛发炎、充血肿胀，影响学习和工作。

眉毛拔除后，眉毛局部组织受到不良刺激，毛囊口开放，细菌就可以乘机侵入引起局部的蜂窝组织炎。

拔眉毛时，眉毛局部组织受到刺激，血管和神经功能会不同程度地受到伤害，从而影响眼睛及周围组织的正常工作。

眉毛的位置高低，对某些疾病的诊断有一定的帮助，如颜面神经麻痹时，麻痹一侧的眉毛较低；眉毛过稀可能患粘液性水肿或脑垂体前叶功能减退症；麻风病病人眉弓的三分之一处眉毛异常稀疏。如果我们人为地把眉弓部位的眉毛拔除，这些异常特征不再存在，就会影响医生对疾病的判断。

总之，我们应该保护好眉毛，保护眉毛就等于爱护自己的眼睛，所以，奉劝那些经常拔眉毛的人，千万不要再干这类违反人体生理的傻

事。（唐建华）

为什么面部疖子不可挤？

疖子是一种常见的皮肤化脓性炎症，是由金黄色葡萄球菌侵入毛囊或皮脂腺引起的。

有的人嘴唇上生了个疖子怕影响美观，会用手去挤压，想把脓液挤出来，加快疖子的愈合。谁知，没过两天就出现高热，嘴唇明显肿胀，又红又硬、疼痛难忍，以后半边脸也肿起来了。这些严重的症状就是自己挤压疖子引起的，如不及时治疗，会有生命的危险。

挤压面部疖肿怎么会导致如此严重的后果呢？供给颜面和口腔的血液来自颈外动脉的分支，这些动脉都有静脉伴行。血管的小分支在面部交叉纵横、形成密集的血管网，因而口腔和颌面部的血液供应特别丰富，尤其是以鼻根部到两侧口角之间的区域，医学上称之为“危险三角区”。这个区域有着丰富的淋巴管、血管网。它们和颅内血管、海绵窦都相通。另外，由于面部静脉的静脉腔内没有防止血液反流的瓣膜，如果挤压这些部位的疖子，疖子中大量的细菌便可通过淋巴管、血管扩散到大脑内，就会引起海绵窦栓塞、脑膜炎和脑脓肿等严重后果。轻者出现寒战、高热、头痛等；重者表现为两眼球进行性突出、视力模糊、失明、昏迷，就会有生命危险。

面部长了疖子，正确的处理方法是，首先要注意休息，保持局部清洁卫生，不要用脏手或脏毛巾去擦洗，碰撞。禁止挤压和针刺。疖子初起时每天用碘酒涂抹数次或外敷鱼石脂软膏。一般疖子成熟后常自行溃破，排出脓液和坏死组织后，逐渐地愈合。对于有发热，疖子


明显肿大或数量多者，应去医院看病，请医生来处理。　　（唐建华）

为什么不能用手揉眼睛？



在日常生活中，常会遇到灰尘、沙粒、煤屑或飞虫等误入眼里，使人觉得眼睛不舒服、疼痛、流泪和睁不开眼等，于是就很自然地用手去揉眼，企图解除这些不适的症状。其实，这种随便的小动作，对眼睛却可产生严重的损伤。

用手揉眼，对眼睛来说至少有两大坏处，其一是磨擦造成的机械损伤；其二是传播病菌，引起眼睛感染。



先说机械损伤。眼球的表面是角膜，角膜的感觉非常灵敏，当有灰尘、沙粒或飞虫等异物进入眼睛，刺激了角膜，马上会出现眼睛疼痛和流泪等反应。如果此时我们用手去揉眼，造成异物与角膜之间的摩擦，就容易损伤角膜组织，假如异物已嵌在角膜上，那么，揉眼动作更会促使异物更深地嵌入角膜而不易脱落，加重病情，影响视力。

再谈眼睛感染。人的双手平时接触各种东西，自然会沾上脏物。人的双手上总是密布着成千上万个细菌。只要双手的皮肤完好无损，在有杀菌作用的皮肤酸性分泌物保护下，这些细菌便无可乘之机，不会侵入人体

捣乱。但是，我们用脏手去揉眼睛情况就不同了：这些细菌会随着手与眼睛的接触而进入眼睛里。眼睛里的温度适中，血管丰富，营养条件很好，细菌很容易在这里生长繁殖，引起眼睛的感染。尤其是当角膜有擦伤破损时，细菌更易经伤口乘虚而入，引起角膜炎等。假如葡萄球菌钻进睫毛根部，使毛囊皮脂腺发炎化脓，发生麦粒肿，俗称“偷针眼”。若是一种叫衣原体的病原菌进入眼睛就会患沙眼。

因此，一旦眼睛有不适或有异物进入眼睛时，千万不要用手去揉眼睛。正确的方法是，眼睛轻轻地闭上片刻，然后用手轻轻地向前提起上眼皮，使眼皮和眼球之间的空隙增大些，一般附着在表面的异物常能随着眨眼动作和泪水的冲洗而自动排出。若不行的话，在初步确定异物的所在部位后，操作者将双手清洗干净，用手指将上眼皮或下眼皮轻轻翻过来，仔细地寻找异物，发现异物后用干净的手帕或湿棉签将异物轻轻地擦掉。必要时应去医院请医生处理。（唐建华）

为什么要正确选择牙刷和牙膏？

口腔保健，是个人清洁卫生的一个很重要环节，而牙齿卫生尤为要紧。牙刷和牙膏则是牙齿卫生保健的两个必不可少的用具。

有的人以为，反正我做到天天刷牙就行了，至于用什么样的牙刷和牙膏，似乎是无关紧要的。其实这种看法是很不全面的。天天刷牙固然重要，但是对口腔卫生来说，这还只有“一保险”；如果牙刷和牙膏选择得当，那就有了“双保险”了。

先来说说牙刷。首先，要根据不同的年龄选用大小适合的牙刷；其次，牙刷的毛不宜太密，同时太软了不行，太硬了也不行，牙刷的毛要选软硬适中的；另外，牙刷的头部要选短小一些的，可以让它在口腔里灵活转动，各处都可以刷到，因此牙刷头部太大的就达不到这个

目的；还有一个很重要的方面是，每根刷毛的尖端要选处理成圆钝形的，那些刷毛尖端尖尖的，是要刺伤牙龈的；最后一项就是牙刷柄不要太短了，不然使用时不能自如。



说到这里，也许有人会说，选用牙刷还这么复杂，为什么不让生产厂家，根据这些要求来生产牙刷，何必还要使用者费心思呢。这话有一定的道理。卫生部和轻工业部早就作出过关于“保健牙齿”的规定：柄长而直、刷头为 2 排 12 束毛、毛长 2.5 厘米。还规定了成人、儿童使用的规格。但是，在目前生产管理尚不够严格的情况下，市场上总有那么些次品、不合格品在销售。为了你的牙齿，在选购时还是注意一点为好。

在使用牙刷方面，还有一点也很重要，就是牙刷本身的清洁问题。有人对刷牙倒挺重视的，但是对牙刷本身的卫生却很不注意，刷完牙以后，牙刷随便乱放，结果牙刷上细菌繁殖，起到了适得其反的坏效果。为此，牙刷用后，要天天洗净，而且要放在通风处，刷头朝上。外国有许多牙科医生甚至有这样的建议：每个月换一把牙刷。我们如果条件不够，则要定时洗涤一下牙刷，如用肥皂液洗，或用福尔马林熏蒸牙刷。

现在再来说说牙膏。要根据各人牙齿的具体情况选用不同性质的药物牙膏。龋齿（蛀牙）要选用防龋型的含氟盐牙膏，如氟化钠牙膏、氟化亚锡牙膏；牙龈炎、牙周炎、牙龈红肿出血，选用对症的药物牙膏；牙齿酸痛的，则可用脱敏型的防酸牙膏、脱敏牙膏、氯化锶牙膏等。

在使用牙膏方面，还有人建议：一种牙膏不要长期使用，最好隔一段时间换一种。这也是不无道理的，因为，这样可以减轻口腔内细菌的抗药性。

让我们大家都来正确地刷牙，正确地选用牙刷和牙膏。祝你保持一口洁白、整齐的牙齿！（劳宏燮）

为什么偏嚼有害健康？

正常人进食时，口腔咀嚼食物是由咀嚼肌顺序收缩，配合上下牙齿进行的对称性的运动。食物在咀嚼过程中被切割、磨碎，并与唾液充分混合，形成便于消化吞咽的食物团。咀嚼的同时也促进了咀嚼肌和牙齿的正常发育。然而，生活中有不少人由于一侧牙齿缺失、有蛀洞或牙齿间缝隙宽，容易嵌塞食物而习惯于用另一侧牙齿来咀嚼，医学上把这种咀嚼方式称为偏嚼。这是一种坏习惯，对人体健康的危害很大。



经常偏嚼势必造成偏用一侧的咀嚼肌发达，而另一侧的咀嚼肌则相对萎缩，从外观面形来看，偏嚼一侧的面部肌肉发育良好，显得丰满，而另一侧的面部肌肉发育就较差。严重的会造成面部两侧发育不对称，连鼻子也会偏歪，影响美观。

经常偏用一侧牙齿咀嚼食物，常用的一侧牙齿就会负担过重，牙面容易磨损引起牙质过敏或牙髓炎。表现为经常出现牙齿酸痛。相反，不常用的一侧牙齿，因缺少

适当的食物磨擦，牙周组织比较薄弱，容易积存牙垢，引起龋齿和牙周病。

经常偏嚼，由于只有一半牙齿在发挥切割、磨碎食物的作用。以致于食物在得不到充分咀嚼的情况下被囫囵咽下，这样就会增加胃的负担，久而久之，就造成胃病。

咀嚼食物本是两侧下颌关节同时有节奏、均匀地运动，但是，在长时期偏嚼的情况下，因咀嚼一侧的下颌关节负担过重，影响了下颌关节结构的稳定性，容易引起下颌关节功能紊乱。表现为说话、咀嚼或张口时下颌关节酸痛，并常发生“咯咯”的响声，严重影响工作、学习和进食。

因此，对于经常偏嚼的人来说，要立即改掉这种坏习惯。若是一侧牙齿有缺失或有龋齿等疾病，应去医院治疗。（唐建华）

为什么人的唾液具有多种生理功能？

曾经听到过这么一个笑话：有一个长者看到两个吵架者正在互相对骂，一方骂一句，呸！向对方身边的地上吐一口唾液，另一方也骂一句，呸！还以一口。他们就那样，呸！呸！骂个不停，吐个不停。那位长者见了，说：“多可惜呵，唾液是宝贵的，你们再这样对吐下去，把黄金都吐光了。”当然，长者的话主要是带讽刺性的，但唾液是宝贵的，倒是真话。

人的口腔里始终保持着湿润，这就是唾液不断分泌的结果。我们暂不说唾液怎么个宝贵法（换句话说，就是它的功能），先来介绍一下唾液的来源。

唾液是由大大小小的唾液腺分泌的，通过导管排入口腔。小的唾液腺遍布口腔粘膜深处，有唇腺、舌腺、颊腺、腭腺；大的唾液腺有

腮腺、下颌下腺、舌下腺等。成人每天平均要分泌 1000 毫升左右的唾液。看，相当可观吧。所以，人在一天中，总是时不时地在嚥唾液的，只是因为注意力集中在工作、学习、游乐等上面，没有感觉到罢了。



那么唾液的作用仅仅是滋润一下口腔吗？不！唾液的功能多着呢？它是人能够得以健康的一位大大的功臣呢。且让我们把唾液的功能一项一项地数来。

唾液中绝大部分的成分是水，其他主要是唾液淀粉酶、蛋白质，还有免疫球蛋白、氨基酸、激素，以及钠、钾、氯等无机物。

首先，我们可以称唾液为“溶解剂”，它有湿润和溶解食物的功能。当食物进入口腔，唾液就和上去了，通过咀嚼，食物和唾液充分混和，溶解了开来，不仅便于吞咽，并且为食物进入胃部后更容易消化，创造了条件。

其次，唾液是“滋润剂”。我们说话、发声，要靠声带、咽喉、舌头、牙齿、嘴唇，但是没有唾液，要顺顺利利地说话，那是不可能设想的；特别是在进行长篇发言或做报告时，唾液的滋润作用决不可少，有时唾液来不及分泌，还得不断地靠喝几口水来弥补呢。

再次，唾液是“清洁剂”或“消毒剂”。唾液的这个功能，对人来说尤为重要。唾液可以清除口腔中的食物残渣和异物，保持口腔清洁；唾液中含有溶菌酶和免疫球蛋白 A，具有杀菌消毒的作用，能随时随地消灭口腔内的细菌。

另外，唾液又是“消化剂”。唾液中的碳酸氢钠和粘蛋白，进到胃后，可中和过多的胃酸，并附着在胃粘膜上，形成一层保护层，以增强胃的消化功能。

最后，值得特别提一下的是，唾液对食物中的致癌物具有解毒作用。如对黄曲霉素，唾液可以大大降低它的致癌能力。所以，有人甚至称唾液为“天然防癌剂”。一些医学科学家提议，每口食物起码应该咀嚼 30 秒钟，让唾液与食物充分混和，这不仅有助于消化，还可以充分“瓦解”那些致癌物质。

唾液是宝贵的，珍惜你的唾液吧。（劳宏燮）

为什么不要随便乱用化妆品？

谁不想美容？许多化妆品可以帮助美容。但是化妆品必须合理使用，切勿随便乱用。

首先，化妆品的原料和制成品，必须对人体无刺激性，不会引起过敏反应；砷、汞、铅等有害物质的含量必须限制在允许范围之内；同时不允许含有任何致病的细菌。在这些条件基础上，化妆品还必须有美化人体，保持清洁或保护皮肤毛发健康的作用。但是在市场上出售的化妆品仍有不少不符合上述要求，因化妆品使用而发生过敏反应，如皮肤发痒、荨麻疹、糜烂、出水等现象时有发生。倘若不分青红皂白地乱用，难免会发生问题。

其次，人的皮肤毛发有中性、油性、干性等区分，每个人不一样。而化妆品又可分为含油脂较多、水分较少的油包水型制品以及含水分较多，含油脂较少的水包油型制品等两类。皮肤和毛发呈油性的人不宜采用油包水型化妆品，要用水包油型制品。相反，皮肤和毛发呈干性的人，不宜采用水包油型制品，可采用油包水型制品。

再说，化妆品使用还与季节有关。春末夏初季节，天气温暖湿润，适宜用含粉质或霜类的化妆品。盛夏酷暑，天气炎热，如也用这些化妆品就不合适了，要改用含水多、含油少的水剂类化妆品。至于寒冬

腊月，皮肤干燥，一般宜用含油略多的化妆品。

最后，还有一个年龄问题。年轻女性皮肤细嫩，可用蜜类、粉霜类制品；中年人皮肤干燥，适宜用脂类化妆品。



由此可见，尽管市场上化妆品琳琅满目，并非随便取来就可使用。先要看质量，还要根据每个人皮肤毛发性质、使用季节、使用者年龄等多方面情况，正确选择，否则会产生不良后果，所以不能掉以轻心。（姚德鸿）

多用染发剂会得皮肤癌吗？

谁不希望有一头柔软、光泽的乌发，豆蔻年华者是如此，中老年者又何尝不是如此。

当头上出现缕缕银丝的时候，往往会给人的心理投下一丝衰老的阴影，叹息时间的脚步跑得太快。为了唤回一些失去的青春，有些人使用染发剂，染得的一头乌发确实可使人容光焕发，看上去年轻不少呢。

目前国内外使用的染发剂中，较多的是以苯胺类芳香族有机化合物作为主要成分，其中化学成分有 20 余种，约 1/2 可使细胞产生畸形变化，尤其是一种名叫 2-4 氨基苯甲醚毒性最强，可诱发癌变。据国外研究，这种染发剂如果连续使用 10 年，只要人的皮肤吸收其 1%，就可能导致癌变发生。

当然，因使用染发剂导致癌症的病例并不多。这里有两个很重要的条件，一是要看这些致癌物质的浓度、接触的紧密程度、应用时间

的长短；二是要看接触者本身的健康状况、免疫功能的强弱等。这两条，特别是后一条，在癌的发生、发展中占着很重要的位置。



因此，为了预防染发剂诱发癌症，最好不要长时期使用一种染发剂；在健康情况比较差和患病期间，不宜频繁使用染发剂；使用染发剂过程中出现过敏反应及接触性皮炎时，应停用，否则会引起不良的后果。此外，头皮有破损时，也应停用，以免染发剂中的致癌物质侵入头皮而引起病变。

（贝润浦）

为什么夏天多发皮肤病？

夏天是各种皮肤病最容易发生的季节，所以皮肤专科门诊及各医院的皮肤科，在夏季最忙了。那么夏天为什么多皮肤病呢？这主要是由于夏季气温高、人出汗多和人皮肤外露等原因造成的。

由于在夏季人们穿着比较少，皮肤外露的时间比较长，外露的部位又比较多，因此，各种接触性皮炎大都在这个季节里发生，如有的人接触了动物毛皮、植物花粉、化学药品等，都会出现皮肤瘙痒、红斑、丘疹、水疱等皮炎现象。还有，又因为皮肤外露，不少人很容易得虫咬皮炎。最典型的是，有人睡了新的或隔年没洗刷干净的凉席，被隐藏在席子纤维里的小虫子咬后，也会成片成片地起红斑、红块，奇痒难熬。

除了皮肤外露是夏季容易得各种皮肤病的原因外，出汗多也是一个很重要的因素。人体除嘴唇等极少部分没有汗腺外，全身皮肤都布满了丰富的汗腺，总共约有几百万个汗腺。夏天气温较高，出的汗，常

常来不及蒸发掉便渗透到皮肤表皮的角质层里，造成角质层膨胀，堵塞汗腺口。当汗腺继续分泌汗液时，就会使汗腺扩张破裂，刺激末梢神经，引起瘙痒。加上夏天细菌容易繁殖，更给皮肤病“火上加油”了，所以那些原来患有各种皮肤病的人，如神经性皮炎、过敏性皮炎、体癣、牛皮癣、疥疮等，在夏天往往会加剧。



儿童多发的脓疱疮，更是夏天的常见皮肤病了。虫咬、痱子等引起的瘙痒，小孩用手瘙很容易把皮肤抓破，还有因皮肤暴露而意外碰伤，受到病菌感染。小孩皮肤细嫩，抵抗力差，就很容易发生脓疱疮。

所以，夏季是各种皮肤病的多发季节。为此，除了染上了皮肤病要及时治疗外，在夏天要特别注意各种个人卫生，把发生皮肤病的可能性，减低到最小的程度。

（劳宏燮）

为什么“脚癣不算病，治好反生病”的说法不科学？

在日常生活中，时有这样的情况发生：一些患有脚癣的人，当脚癣减轻时，往往身体某些方面感到不大舒服，或者感冒了，或者别的部位有些炎症了；反过来，有些人当患有比较严重的疾病时，原有的脚癣却不痒了，似乎不发了。

于是，有些人从以上的情况中，得出了一个不科学的结论，说什么“脚癣不算病，治好反生病”，“脚癣不要紧，有了大病化小病”，“生点脚癣好，脚癣把生大病的毒带走了”，等等。

这些看法十分错误，是不了解脚癣发生的原因和危害，以及不懂人体卫生基本知识造成的一种误解。

脚癣（包括手癣）是发生在指、趾及掌面的霉菌病，叫真菌感染。自然界存在着一种浅部真菌，它十分喜欢寄生在角质蛋白丰富的地方，如皮肤的最外层和指（趾）甲上，尤其是指（趾）甲上。而指甲与趾甲比较起来，真菌更喜欢寄生在趾甲上，因为那里的环境比较温暖、潮湿。所以脚癣多生在脚趾窝里，就是这个缘故。

那么，脚癣与身体健康究竟有没有关系呢？应该说没直接的关系；人生病时，脚癣不痒了，是因为人生病时机体会动员自身的保卫系统，如升高白细胞数量，以抗抵细菌的入侵，同样对脚癣的真菌也起抑制作用，使它们暂时不那么“猖獗”，因此有人就误解了，以为脚癣不发就要生病，于是就任凭脚癣去发展，好像这样就不会生别的病了。



这样做的结果，有时往往适得其反。因为脚癣还是应该积极治疗的，否则会有并发症出现，严重的会引起小腿丹毒（即“流火”），以及大腿根的淋巴发炎。另外，脚癣不治，除了是个人不讲卫生外，还有传染给别人的可能，如通过游泳、洗澡等的接触传染。

（劳宏燮）

为什么姑娘脸上会生“桃花癣”？

在桃花初放的早春季节，有些年轻姑娘的脸上常常出现一块块大

如钱币的斑块，干痛发痒，还可见到细小的脱皮，民间把它叫做“桃花癣”。

桃花癣似癣又非癣，但是在医学上把真正由真菌引起的浅表皮肤病才叫做癣，而桃花癣的病因并非由真菌引起，而是几种皮肤病如单纯糠疹、脂溢性皮炎、春季皮炎的统称，因此，把它称作为“癣”实在是名不符实。



单纯糠疹是通常发生在儿童及青少年面部的桃花癣，发病之初可见大小不等圆形或椭圆形，颜色略带淡红的斑片，边缘不很清楚，以后逐渐变成浅色斑，表面干燥，覆盖有少量灰白色糠秕状的鳞屑，用手搔抓则更明显。生这种病的人，一般无自觉症状，有时稍有搔痒感，但因生在面部，常影响美容而令人烦恼。有些人把这种单纯糠疹叫做虫斑，因为其中有部份病人的发病确与肠道寄生虫有关。另外，过多的风吹日晒，皮脂分泌过多、消化不良等因素，也有一定的影响。这种皮肤病除了春季以外，其它季节也可见到。防治的办法很简单，平时多吃一点水果蔬菜，口服一些 B 族维生素，避免过多的风吹日晒，及时驱虫治疗，对预防本病的发生有一定好处。如果已经发病，局部可涂搽有关药物。

还有两种也被称作桃花癣的皮肤病，是脂溢性皮炎和春季皮炎，多发生于年轻姑娘的脸上，有多少不等、大小不一的红斑、丘疹和鳞屑。脂溢性皮炎的发病与人体内分泌功能紊乱、爱吃辣椒、烧酒等刺激性食物，胃肠功能差，消化和吸收不良、维生素缺乏，脸面涂擦质差的润肤品以及风吹日晒等因素有关。而春季皮炎的发病常与太阳中

的紫外线有关。防治的关键在于去除这些不良的致病因素，忌吃辣椒和酒，平时应适当多吃点水果蔬菜，在炎症的早期，局部可用药物湿敷。急性期过后，可外用维生素 B_6 霜膏或肤轻松软膏外涂。同时，应内服一些抗组织胺药物，如苯海拉明 25 毫克或扑尔敏 4 毫克，一日三次。皮肤干燥疼痛者还可用鱼肝油软膏外涂。也可静脉注射葡萄糖酸钙，以降低机体的敏感性，适量地补充维生素 B、C，有助于皮炎的消退。（翁德立）

为什么“牛皮癣”不是癣？

我们平时所称的癣，如脚癣（脚湿气）、手癣（鹅掌风）、头癣（癞痢头）、体癣（金钱癣）等，都是由一种叫真菌的微生物引起的。凡是由真菌引起的皮肤和毛发的病变，一般统称为癣。

有一种被叫做“牛皮癣”的皮肤病，虽然名称中有“癣”字，其实它纯属“张冠李戴”，这种病与“癣”是全然不沾边的。经现代医学科学研究鉴定，验明所谓牛皮癣的“真身”不是由真菌引发的，在它的皮疹里，半个真菌的影子也没有查到过。所以，把它划到“癣”的行列中去，实在是一桩“千古冤案”。在电子显微镜下，所谓牛皮癣的皮疹是片状的，鳞屑多，呈银白色。于是称这种病为“银屑病”。过去把“银屑病”称为牛皮癣，是对这种皮肤病的发生原因不了解，往往以病的表面形态或现象来取一个名称；因为银屑病患者的皮肤形态特征，非常像生牛皮，斑驳毛糙，而奇痒难熬又十分像生了癣。于是，就把这种病叫做“牛皮癣”。以前的医生治疗“牛皮癣”用的自然都是针对“癣”的药物。既然银屑病不是真菌引发的，治“癣”药的疗效是可想而知的了。

银屑病的致病菌究属何方毒菌呢？至今还未有定论，有的细菌学

家认为这种致病菌有些像链球菌；有的病毒专家认为是一种病毒感染；也有的生理学家认为患这种病是与患者本人机体的新陈代谢失调有关；还有的医学专家认为与内分泌功能障碍有关……虽然大家都提出了一些有关的证据，但至今还没有一种为大家公认的病因。既然找不到确切的致病原因，当然也不可能有任何一种专治此“癣”的特效药。不过有关医学科学家正在继续研究和探索中。目前，多采用中西医结合方法治疗。（柯依）

为什么吃好早餐能全天精力充沛？



早餐对于人的一天生命活动来讲，最为重要。早餐吃得好，整天可以精力充沛，早餐吃得不好，一天会懒洋洋。

我们知道，从头一天的晚餐到第二天的早餐之间，整整间隔了 10 多个小时，胃已完全处于空虚状态，人也有饥饿感觉。代表人体营养状况之一的空腹血糖含量，在早晨醒来时处于最低状态，一般是每 100 毫升血液中 80 ～ 120 毫克，这时是应该进食补充能量的关键时刻。如果早餐吃不好，或者吃得很少，甚至匆匆忙忙不吃早餐去上学或工作，已经很低的血糖含量会不断下跌，如果跌到每 100 毫升血液中只有 70 毫克含量时，人会明显感到饥饿。万一再跌下去就会发生低血糖休克，出现昏迷现象。同样道理，一个人如果处于血糖含量较低状况下，身体各脏器功能会变得迟钝，尤其是神经系统功能会一蹶不振，表现为精神萎靡，思路混乱，注意力不集中等，必定会影响学习与工作。



如果早餐吃好了，人体从食物中及时得到足够的能量，血糖含量可以保持正常，并且不会下跌，人的精力会显得充沛，神经系统功能健全，学习与工作劲头十足。尽管到了中午和晚上，肚子还是会饿，但由于早餐打好了基础，所以只要吃上些东西，仍然可保持精力充沛和良好的体力，使生命活动显得很有规律，胃肠道的工作很有秩序。假如经常早餐吃不好，一天的营养供应没有基础，全靠中、晚餐来弥补，生命活动会紊乱，胃肠道的工作也会失调。像这样，偶然一次问题不大，如果经常如此，身体健康就会受影响。

那么，怎样吃好早餐呢？有两个要领，一个是早餐进食的热能量至少要占全天所需热能量的 30 ～ 40% 左右，例如学生日常活动，每天每千克体重需要的热能量大致为 189 焦耳，50 千克体重的学生一天就要 9450 焦耳热能量。早餐占的热能量按比例需要 3780 焦耳；另一个是早餐进食的食物须包含蛋白质、脂肪与糖等 3 种成分，不要单纯是糖类食物。这样做，使人体得到的营养成分保持全面，对健康有利，同时，蛋白质、脂肪，比糖分更耐饥些，以支持上午较繁重紧张的工作和学习活动。

（姚德鸿）

小孩子吃鱼子会变笨吗？

有些上了年纪的人看到孩子吃鱼子，往往加以阻止，说什么，孩子吃鱼子会变笨的。其实这是一种完全没有科学道理的说法。

全世界鱼类约有 20000 多种，我国的海洋和内陆江河、湖泊里就有鱼类 2000 多种。自古以来，鱼就是人类重要食物之一，我们平时常

吃的鱼就有黄花鱼、鲤鱼、草鱼、带鱼、墨鱼、鲫鱼、青鱼等，不但鱼肉味道鲜美，营养丰富，就是许多鱼类的鱼子也同样肥美可口，富含营养。从总体上来讲，鱼子中的蛋白质含量可达 15 ～ 20% 左右，吃进肚里后容易被人体吸收，而且这类蛋白质的化学组成与人体肌肉的化学组成很接近，所以对于健壮身体有好处。鱼子里还有 5—10% 的脂肪可以给人体提供能量。此外，鱼子还含有糖、维生素、钙、磷等物质。举个例子，每 500 克黄花鱼的鱼子中，含有蛋白质 81.5 克、脂肪 44.5 克、糖 15 克、钙 5 毫克、磷 15.3 毫克，各种维生素近 10 毫克。由此可见，鱼子的营养水平的确是很高的。

孩子正处在生长发育的关键时刻，因此在饮食中注意补充足够的营养十分重要，吃一些鱼子对于长身体有好处，不但不会使人变笨，相反，营养水平的提高对大脑的发育非常有利，因为鱼子中的蛋白质、钙、磷、维生素等都是大脑发育所需要的物质。



烧煮过的鱼子很鲜美，孩子们是很喜欢吃的，但一次不宜吃得太多，以免消化不良，而且要吃新鲜鱼子。有毒鱼类，例如河豚鱼的鱼子则绝对不能吃。（姚德鸿）


为什么冠心病人不宜吃得过饱？

冠心病是目前最为常见的一种心脏病。原来，人体的心脏如果将其位置倒放看看，个头与模样很像一顶“皇冠”，而长在心脏上的血管，宛如皇冠上的串串珠链，所以这些血管美其名为冠状血管，凡是

这些血管由于脂肪类物质沉积阻塞引起的毛病，就叫做冠心病，最典型的表现是心绞痛和心肌梗塞。

冠心病人是不宜吃得过饱的，道理有如下几点：

吃得太饱，大量营养物质进入体内，就会转化成数量很多的热量，例如 1 克蛋白质或糖，可产生大约 17 焦耳热量，1 克脂肪可产生大约 38 焦耳热量。冠心病人每天饮食总量应控制在每公斤体重 105 ～ 126 焦耳水平，而不要太多。否则，热量太高，剩余的食物便会转化成脂肪，这些脂肪经过肝脏处理，转变成胆固醇及甘油三脂，引起血脂水平上升，使冠心病加重。



吃得过饱，甚至暴饮暴食，还会出现突发性血内脂肪含量增高现象，血液的凝固性会顿时增加，容易诱发血栓，冠状血管一旦被血栓堵着，心绞痛、心肌梗塞随时便会发作。

冠心病人进食，既要防止过饱，更不宜饮酒。因为酒精成分可刺激脂肪组织释放出脂肪酸，使体内甘油三脂含量增高。这又是加重冠心病的重要因素。

过量饱餐后，胃肠道需要丰富的血液帮助消化食物，这就要求心脏尽可能地加强跳动，向胃肠道输送足够血液，结果加重了心脏负担。冠心病人的冠状血管本来就不太通畅，心脏往往无法胜任这种负担。

另外，大量食物进到胃里，不仅使胃体膨胀，还能导致胃上面的横膈上升，使心脏的运动受限制，进一步影响了心脏功能。

更严重一种情况是，个别人饱餐后胃壁受到大量食物刺激，会引起反射性恶心、呕吐，并刺激迷走神经，引起该神经兴奋，结果造成心跳减慢，甚至心跳停止。

其实，不但是冠心病人，其他心脏病人，甚至所有的健康人，都不要吃得过饱。（姚德鸿）

为什么有时吃东西会觉得口苦？

在人的舌头上面，长有一种叫做味蕾的结构，里面有味觉细胞，会品尝甜、酸、苦、咸、辣等各种味道，让人吃起东西来津津有味。但是，有时候会出现这样的情况：吃东西不但无味，反而觉得口苦，这是为什么呢?

如果不是生什么病的话，吃东西觉得口苦，主要是唾液分泌减少的缘故。一种是在肚子饱的情况下，再继续吃东西就会感到没有味道。因为这种饱胀刺激会通过神经反射，抑制一个人的食欲，抑制唾液的分泌，使嘴巴发干。这时，吃起东西来就有苦的感觉了。另一种是刚剧烈运动或劳动以后吃东西，这时候唾液分泌量很少，而且由于运动或劳动消耗体力的缘故，人往往会张嘴呼吸和快速呼吸，口腔中大量水分被蒸发掉，原先口腔中感觉不到的苦味就被感觉到了。一旦发生了这种口苦情况处理的方法是：一日三餐后不要立即再吃别的东西，隔几小时等胃里食物排空后口苦的感觉就会好转；运动或劳动后也不要马上吃东西，休息一会，喝少量水或漱漱口，再吃东西就不会口苦了。

如果是生了什么病，而吃东西口苦，其原因一方面是由于生病影响了食欲；另一方面则是由于生病后舌头表面的舌苔发生变化。有的变成黄苔，有的变成腻苔，有的厚厚一层，有的干脆光剥脱落，这些舌苔的变化，自然会影响味觉功能，往往表现为进食时感到口苦。通过治疗，舌苔状况恢复后，味觉功能会好转。至于，口腔方面有病，例如唾液腺肿瘤、口腔粘膜病、舌部疾病等而引起的吃东西口苦，那就

须要针对这些疾病作专门治疗了。（姚德鸿）

水果连皮一起吃好吗？



经常会看到一些大大咧咧的人，吃水果时不洗一下，用手那么一擦算是清洁过了，便大口咬嚼起来。这不仅是不讲卫生的问题，还有一个水果皮是不是可以吃下去的问题。

过去，有些人认为水果营养丰富，水果皮里的营养也不少，吃下去不是很好吗？即使有些水果皮不好吃，如像桔子皮，也拿来泡水喝。其实，这样做是不妥当的。

随着现代农业的发展，果树生长结果全过程基本上都是施化学肥料的；特别是在果树栽种以后，为了防止病虫害影响，还要定期喷洒农药。这样，水果皮上难免会沾上不少化学肥料或农药。据测定，苹果和梨的皮中，六六六、DDT 等农药的含量，要比果肉的含量高出 20 ～ 50 倍。又如，蕃茄表皮上常沾有“1605”等剧毒农药。更有些水果，农药可以渗透到果皮的蜡质层中去，一般清洗还洗不掉哩！所以，水果连皮一起吃不是一件好事，应该避免。

那么，有些水果如葡萄、草莓、樱桃、橄榄、大枣等不能削皮吃，又怎么办呢？应先将水果用凉水洗一下，再将水果放在高锰酸钾溶液中浸上 10 分钟，再用冷开水冲洗一

下再吃，这样就达到了既杀灭果皮表面的细菌，又消除残留农药的目的。　　（姚德鸿）

为什么多吃粗粮好？



1896 年，一个名叫艾克曼的荷兰医生，被派到当时属于荷兰的东印度去研究那里广泛流行的脚气病。那时候对这种病的病因还不清楚。有一次，艾克曼意外地发现，那儿的鸡也都得了脚气病。这个情况使艾克曼从鸡饲料的成份中去寻找答案。他发现健康鸡的饲料是以谷糠为主要成分的。于是他决定用米糠喂养这些患了脚气病的鸡。果然，鸡的脚气病痊愈了。接着，他再用磨去糠皮的精白米喂养这些刚恢复健康的鸡，果然又再次患了脚气病。艾克曼终于揭示了一个秘密：机体缺乏 B 族维生素是得脚气病的一个重要原因，而米糠中含有丰富的 B 族维生素，磨去糠皮的精白米是没有这种宝贵的维生素的。艾克曼的研究给人以新的认识，那就是吃粗粮比吃细粮好、吃糙米比吃精米强、吃标准面粉比吃精白富强面粉营养丰富。

事实也是如此，糙米含蛋白质、脂肪和 B 族维生素的量比精米要多，其中尤以 B 族维生素数量之多更为突出。标准面粉与精白面粉比较，标准面粉含的脂肪、B 族维生

素也比精白面粉为多。再说，另一些粗粮，如玉米粉，它所含的蛋白质、脂肪、糖分、B 族维生素等与糙米所含的几乎相仿，其中脂肪成分还多些，更含有丰富的胡萝卜素，这是连糙米都不及的。又如红薯，它含有丰富的维生素 A、钙、磷，比稻米含的还多。



国外有位名叫威杜逊的科学家，他在 1969 年发现用含麸皮的面包代替用精白粉做的白面包作为主食，那么尿液里钙的含量就明显减少，这使得患尿结石症的可能性也减少。后来，有人干脆就用吃麸皮的办法来治疗尿结石症。1982 年日本学者大川顺正发现米糠也可以减少尿液中的钙含量，也可以作为治疗尿结石症的特效药。原来，麸皮和米糠都含有一种叫植酸的成分，在肠子里与食物中钙结合形成植酸钙。这样，人体中的钙随尿液排出的量就减少了。想不到粗粮中的麸皮和米糠还能防治尿结石症。

总之，粗粮是营养丰富的宝贝，多吃粗粮身体好。　　（姚德鸿）

吃笋会刮掉肚子里的油水吗？

笋，是一种肉嫩、味鲜的食物，有冬笋与春笋的区别。冬笋由于尚未出土就被挖取，比春笋更为鲜嫩，所以笋是人们喜爱的食品。但是有人说笋没有营养，多吃会刮掉肚子里的油水，真有这回事吗?



有资料表明，笋含有不少营养物质，例如蛋白质、氨基酸、脂肪、糖分、胡萝卜素、B 族维生素和维生素 C 等，其中糖分占 2 ～ 4%、脂肪占 0.2 ～ 0.3%、蛋白质占 2.5 ～ 3%。此外还有不少钙、磷、铁、镁等元素。所以笋并非是没有营养的。

吃笋会不会刮掉肚子里的油水呢？笋含有大量纤维素，进入人体肠子后，纤维素能吸收水分膨胀起来，刺激肠子活动，产生排便性刺激，有利于大便通畅。对于健康人来说，本来身体里油水并不多，即胆固醇、甘油三脂等数量正常，所以都已被身体所吸收利用了，吃笋再多也不会对它们产生影响。相反，冠心病、动脉硬化等病人，这些人脂肪类物质过多，已超出了人体的正常需要量，身体不能再吸收利用了，对于这些过多的脂肪物质，可通过笋的纤维素刺激，促进排便，以降低体内的脂肪物质的数量。所以，多吃笋可以防治冠心病、动脉硬化等疾病。

医学上有许多事都是相对性的，笋刮油水问题就是这样，在人体各项指标正常情况下不会发生，而当体内有过多脂肪物质存在时，笋却是真的能“刮油水”。然而这倒是一件对健康有益的好事。（姚德鸿）

为什么夏天不宜多吃冷饮？

赤日炎炎，挥汗成雨的夏天，如果能吃上一些冷饮，确实使人凉快舒服。但是有的人为了贪图痛快，一口气吃上好多，岂不知这是会损害自己健康的。

夏天，室外气温很高，人体只要稍稍活动，肌肉收缩产生的热量

就会使体温上升。所以夏天体温一般要达到 37.5℃ 左右。当大量冰冻的饮料或冰棍、冰淇淋进入人体后，由于它们的温度与体温相差悬殊，口腔、食道和胃等消化道的血管受到冰冷的冷饮刺激后会发生收缩，并导致全身的皮肤血管收缩。皮肤血管一收缩，体内多余的热量不能通过出汗从毛孔排出体外，人就会不舒服；而消化道血管收缩，会影响消化功能，甚至引起腹痛、腹泻，尤其是孩子胃肠道功能尚未健全，冷饮吃多了很容易引起腹泻。

冷饮会阻止各种消化腺的分泌，使唾液、胃液、胆汁、胰液与肠液数量减少影响消化功能。由于冷饮促使口腔内唾液减少，这对口渴来说，想靠痛吃冷饮解渴，那是肯定要失望的；冷饮中一般都含较多糖分，如果是冰淇淋，还含有大量牛乳，甜腻的味道，产生更加口渴的感觉。



许多冷饮都含有丰富的蛋白质，蛋白质经过代谢最终生成尿素，随尿液排出。每 5 克尿素需要 100 克水相伴。所以冷饮越吃得多，消耗的水分越多，不利于身体健康。

另外，甜腻的冷饮多吃后，会影响正常的食欲，尤其是少年儿童，常不想吃饭。

因此冷饮不宜多吃，更不能一下子吃上许多。剧烈运动或劳动后不要立即吃冷饮，应先休息片刻让血液循环平静些再吃。

饭前饭后不吃冷饮，以保证消化道能获得足够的血液供应，完成消化过程。

吃过冷饮后，应随即漱口，洗刷掉残留在口腔内的甜腻的乳、糖残渍，这样不但口腔感到舒爽，也可减少口臭。胃肠功能不好、胃肠道有慢性病，或者经常有腹痛、腹泻的人，更不宜多吃冷饮，以免刺

激胃肠而加重症状。 （姚德鸿）

为什么饮酒后有的人容易醉，有的人不容易醉？

饮酒后，不同的人会有不同的表现。酒量小的人，只要喝上几口酒，面就会发红，有的甚至还有头晕、心跳、气喘等不舒服感觉。而酒量大的人，少量饮酒时，面色毫无变化，一旦喝醉了，面色才会发青。那么，为什么人的酒量有大小，有的容易醉，有的又不容易醉呢?



尽管酒类品种繁多，但万变不离其宗，它们都含有乙醇，俗称酒精，只是含量不同罢了。饮酒后，酒精经胃肠道吸收，通过血液送到肝脏和其它组织。酒精在人体内的代谢主要是由肝脏完成的。科学家研究发现，人体内有两种生物酶和酒精的代谢息息相关。一种生物酶叫酒精脱氢酶，它能使酒精分解为乙醛；另一种生物酶叫乙醛脱氢酶，它使乙醛再分解为水和二氧化碳，排出体外。决定人的酒量大小的就是乙醛脱氢酶。

如果某些人的乙醛脱氢酶功能不齐全，转化乙醛的能力就比较差，以致造成乙醛在体内不断积蓄，对身体会产生很大影响。它能使体内特别是脸部的末梢血管扩张，因而使饮酒的人出现脸庞和颈部发红，甚至全身发红。由于末梢血管扩张引起血压下降，为了保持平衡，便分泌肾上腺素，使血管收缩，从而心跳加快，血压上升。所以，不会饮酒的人，由于乙醛脱氢酶的功能不齐全，就会出现饮酒后脸红、心跳、头晕等现象。

反之，会喝酒的人，身体内的乙醛脱氢酶功能齐全，能迅速将乙

醛分解。他们少量饮酒后，脸色无变化。若过量饮酒，血压会下降，为了使血压回升以保持平衡，就依靠收缩毛细血管，这样末梢血管中的血流不畅，就会引起脸色发青。

由此可见，乙醛脱氢酶的功能状况，是决定一个人的酒量大小、会不会喝酒的重要因素。这对于乙醛脱氢酶功能不全的人倒是一件好事，因为喝了少量酒，就引起头晕、脸红、心跳等反应，势必会限制饮酒量，使身体健康无恙。反之，这对于乙醛脱氢酶功能齐全的人反而是件坏事，由于少量饮酒不会出现酒醉前的信号，结果就容易饮酒过量，甚至酩酊大醉，轻者进入呕吐和昏睡状态，严重者有时因呼吸中枢被麻痹而导致死亡。

此外，酒量大小、易醉与否还与性别不同及人种差异，有着密切的关系。如男子的酒量比女子大；欧美白人和非洲黑人的酒量比黄种人大。（汪宗俊）

为什么饮酒会妨碍消化功能？

每逢喜庆假日，亲朋好友相聚时，美酒助兴，的确能增添欢乐气氛。但是饮酒不宜太多，否则对人体有害，特别是会妨碍正常消化功能。倘若留心观察一下那些长期嗜酒、饮用烈性酒和酒量很大的人，消瘦者居多数，这是与消化功能受影响有关。那么，饮酒为什么会妨碍消化功能呢？有两点理由：

首先，酒精成分对胃和肠子功能有直接影响。酒精入肚后，很快就在胃和上段小肠中被吸收。酒精成分会直接作用于胃肠道的粘膜，造成粘膜的充血和水肿，使得胃肠无法很好地胜任消化食物的工作，尤其是妨碍肠子粘膜对营养物质的吸收，许多营养物质会白白从粪便中丢失掉。再说，在酒精成分的直接刺激下，胃和肠子的运动程度增加，

食物不能按正常规律在胃和肠子里逗留上足够的时间，没有经过充分消化和吸收，便被排出体外。难怪嗜酒成瘾的人得慢性腹泻者很多见。

其次，酒精成分对胃和肠子功能有间接影响。在人体内，食物的消化吸收离不开消化液的帮助。肝脏分泌的胆汁，胰腺分泌的胰液，以及胃肠本身分泌的胃液、肠液，都会对消化功能的好坏带来举足轻重的影响。酒精成分会影响这些消化液的正常分泌，尤其会使这些消化液中的消化酶，例如蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等的成分发生改变，降低它们的消化能力。这一切都会间接地影响胃肠道对食物的加工处理和对营养的吸收。



饮酒影响消化道吸收的物质很多，包括蛋白质、糖、脂肪和多种维生素等。时间一长，会给身体健康带来危害。俗话说："饮食为健康之本"。因为饮酒而妨碍食物的消化与吸收，可是件得不偿失的事。

（姚德鸿）

为什么儿童不宜饮酒？

有些大人往往为了好玩，或者为了从小培养小孩的所谓男子汉气，常常在饭桌、宴席上，怂恿孩子品尝大人喝的酒；而有些小孩子则出于好奇，也会拿起大人的酒杯，咂上几口，而大人又不加阻止。爱喝酒，其实并不是天生的，特别是儿童，那是环境影响的结果。像上述这样的情况，往往会过早地促使儿童养成喝酒的习惯。要知道，儿童喝酒是有百害而无一利的。

首先，儿童各部位的组织器官都还处在很娇嫩的状况，特别是消

化系统。因此，不能有过多的刺激性东西让它去承受。酒无疑是很刺激的，酒精对内脏，特别是肝、胃的伤害更甚。儿童喝酒，要让娇嫩的肝脏去解除酒中的酒精毒，转氨酶就要大大升高，使肝细胞受伤。人的肝脏是人体十分重要的又是很容易得病的器官，如果从小肝脏功能就有所降低甚至损伤，那后果是不堪设想的。儿童喝酒除了对肝脏不利外，还要伤胃。大家知道，酒精会刺激胃酸的大量分泌，日子久了就会导致消化不良，甚至发展成为胃炎和胃溃疡。



其次，儿童喝酒会降低免疫力。酒后毛细血管扩张，散热增加，抵抗力就下降，特别是年龄小的儿童，感冒、肺炎就要惹上身了。

再有就是儿童喝酒，还会伤脑，使他们记忆力下降，影响学习；严重的要影响大脑的正常发育。这种坏影响会是长期的，使儿童智商下降。

最后，更值得提醒的是，儿童饮酒，还会带来一个很可怕的后果，即影响性发育。国外有一个科学家做过实验，证明酒精对男性发育期的睾丸有很大的损害。损伤得轻的，可使雄性个体的性成熟延缓；损伤得重的，可使生精细胞和曲细精管遭到破坏，将来有不育的危险。而对女性呢，儿童期喝酒也会影响性腺的发育，使内分泌紊乱，一旦到青春期来时，就会出现月经不调、经期水肿、痛经、头痛等现象。

（劳宏燮）

为什么肝脏病人不宜喝酒？

正常人平时适量地喝一些酒，有益于健康。但是，肝脏病人饮酒就会对身体产生不良的影响。



人体的肝脏宛如一座“化工厂”，我们吃下去的东西大多要经过那里加工处理，喝下去的酒也是一样。不管何种酒，都含有一定数量的酒精。人体对酒精吸收的速度很快，大约在喝酒后 5 分钟，血液里就有酒精出现，但它在肝脏里处理和在体内排泄的速度却与吸收大相径庭，好像山洪暴发一般，来势快，退得慢。

我们明白，如果对一个肌肉受伤的举重运动员，硬要给他增加举杠铃的份量，只能加重他的负担，加剧他的伤势。肝脏病人，因病忧郁，借酒消愁，或者嗜好饮酒，就如同对受损的肝脏重压“杠铃”一样，雪上加霜，影响它的恢复。同时，酒精对肝细胞也有毒性。由于患病的肝脏本身解毒能力已经打了折扣，因此喝酒后，酒精在体内停留的时间就会比正常人来得长，因而对身体的有害作用时间也就会延长。

肝脏病人饮酒容易造成营养不良，引起脂肪肝，这也是这些病人不宜喝酒的一个重要原因。一般来说，进餐时喝了酒，便会减少进食量。经常饮酒甚至会影响食欲，造成营养不良。肝病患者本身消化功能比较虚弱，胃口不会太好，但他们却更需要蛋白质、维生素等营养

物质，以利于康复。假如常常喝酒，会进一步影响食欲，使得身体营养不良，蛋白质缺乏，能量来源减少，入不敷出。人体这时就会动员体内的脂肪进入肝脏作为能量源，因此进入肝内的脂肪也就增多了。但是遗憾的是，由于此刻肝脏缺少了蛋白质这一有力的助手，它的处理利用脂肪的能力下降了，再加上肝细胞受损、维生素短缺等原因，进多出少，过量的脂肪就在肝内堆积起来，使肝脏肿大，形成脂肪肝。脂肪肝能导致肝脏硬化，使病情向坏的方向发展。因此，肝脏病人或肝炎恢复期的患者，为了身体健康，还是以不“贪杯”为好。（詹家明）

急性肝炎病人的饮食有禁忌吗？

人的肝脏是一个“化工厂”，直接参与人体蛋白质、脂肪和糖类的代谢变化。患肝炎时，不仅这种代谢功能发生障碍，而且胃液及消化酶的分泌也减少，胆汁排泄受阻，又影响了蛋白质和脂肪类的消化和吸收。所以既要补充足够的营养，又要避免饮食过多而增加肝脏负担。


肝炎病人宜吃低脂肪食物，每天烹调油不超过 20 克，脂肪总量不超过 40 ～ 60 克。每餐不宜过饱，食量以七八成为宜，如食后 2 小时仍感饱胀难受，显然已经过量，应当再减食。饮食应选择口味清淡、营养丰富的食品。主食以糖类为主。因为糖类容易消化、吸收，可使肝脏的代谢负担达到最轻的程度，并能增加肝细胞内糖原的储存。

急性肝炎腹胀病人，豆制品类食物宜少食或不食，以减少胃肠胀气；对一些高蛋白的营养品，也应控制或限制。如鸡蛋，每天不宜超过两个；瘦猪肉，每天不宜超过 100 克。甲鱼和黄鳝、海参、淡菜、螃蟹、鱿鱼、蹄筋、羊肉、胡桃肉，以及人参类滋补品，都不宜在肝炎急性期食用。因为这些食品大多富含蛋白质，会增加肝脏代谢的负担。

由此可见，急性肝炎不宜过多进食营养品，特别是对高蛋白的饮

食应该有所禁忌和控制。（贝润浦）

为什么孩子不宜多食爆米花？



爆米花作为孩子的零食，在民间已流传很久。但是，孩子常吃爆米花，对健康和发育不利。我们知道，加工爆米花时用的加热金属压力容器含有铅的成分。铅是一种银白色、有一定毒性的金属，当加热到 400 摄氏度时，它会以铅蒸气的形式大量逸出。爆米花加工时温度很高，铅就可能溶于爆米花内。有关部门曾作过测定，爆米花中铅的含量为 2.45 毫克/千克。国家有规定，糕点含铅量不得超过 0.5 毫克/千克，酱菜、豆制品含铅量也不应超过 1 毫克/千克。显然，爆米花的铅含量比允许的规定值高 2 ～ 5 倍。



铅进入人体后，具有蓄积作用，并可沉积于骨胳内。如果经常大量食用爆米花，有的孩子会出现慢性铅中毒症状，譬如头昏、头痛、疲倦、全身无力、四肢肌肉和关节酸痛、睡眠不安、口中有甜味、食欲减退、阵发性脐周隐痛和便秘等，严重者可影响大脑功能并且出现贫血。

儿童正处于生长发育时期，身体器官功能还未健全，对铅的排泄能力较差。如经常食用含铅量高的爆米花，就会使较多的铅积蓄体内，影响骨胳和智力发育，损害大脑功能。不仅损害现在的身体健康，还

会对成年后的生理功能产生潜在的影响。

所以，孩子不宜多食爆米花。（贝润浦）

为什么不宜多吃巧克力？

巧克力在国外被誉为“现代快速能源”、“爱的粮食”。它进入人体内，能迅速产生大量的热能。孕妇在临产前吃几块巧克力，有助于增强产力，对分娩有利。美国纽约某精神病研究所的专家认为，热恋中情人的脑子被一种叫苯乙胺的物质所覆盖，从而产生美好的情绪。而含有苯乙胺的巧克力，能促使美好情绪的增长。因此，巧克力在热恋男女青年中备受推崇。在我国，随着人们生活水平的提高，巧克力已成为家喻户晓的食品，特别在儿童中，嗜好巧克力是一种较普遍的现象。



但是，多吃巧克力，会损害儿童的健康发育。巧克力都以可可豆为主，再配以可可脂、白糖、全脂奶粉、磷脂以及盐等原料所制成，它所含营养素的比例并不符合儿童生长发育的需要。根据人体对蛋白质、脂肪、糖类的要求，饮食中蛋白质应占 10 ～ 15%，脂肪应占 30 ～ 35%，糖类应占 50 ～ 60%。巧克力中脂肪的含量较高，而蛋白质和糖类的含量很少。而且巧克力脂肪，不容易被消化，食后饱胀感很强，会打乱儿童的正常进餐习惯，影响食欲。巧克力不含纤维素，不能刺激胃肠的正常蠕动，多吃后容易泛酸产气，引起腹胀与腹痛。巧克力脂肪、糖分过多，孩子多吃后会长得过于肥胖，体内脂肪大量堆积，增加心脏的负担，体质会渐渐衰弱。

因此常吃巧克力的孩子，会造成脂肪太多不吸收，蛋白质和营养物质缺乏，于是就出现营养不良、消瘦、厌食、恶心、软弱无力、抵抗力差、发育迟缓等现象。

此外，巧克力中含有一种溴化合物，它和巧克力中的咖啡碱共同作用，不仅会使儿童过度兴奋而不愿睡觉，并且对儿童大脑有不良的影响。巧克力中还含有一定量的草酸，它能干扰机体对钙的吸收，影响儿童的骨胳生长。

由此可见，多吃巧克力会影响儿童的健康和发育，做父母的，还是少给孩子吃为好。（贝润浦）

为什么发烧时不想吃东西？

发热是人体防御疾病和适应内外环境温度变化的一种反应。每个人在其一生中都曾出现过发烧现象，发烧影响食欲是一般的卫生常识，但是，其中的道理，却未必人人都知道。

人体在发烧时可引起全身一系列的反应，表现为新陈代谢加快，营养物质和氧的消耗大大增加，通过皮肤和呼吸道损失的水分也明显增多。这些改变最先影响到的就是人体的消化系统，造成口腔唾液、胃和肠道消化液分泌减少，消化酶活力降低和胃肠蠕动缓慢等，从而影响了病人的食欲。

口腔唾液分泌减少后，病人总觉得口干，位于舌头上的味觉细胞就变得不灵敏，吃东西，尤其是干的食品会感到干燥无味，这样食欲自然降低了。其次，食物经过口腔初步咀嚼后进入胃肠道，再由胃肠道内大量的消化液及消化酶对食物中各种营养成份进行加工处理。但是，人发烧时胃肠道消化液分泌减少，消化酶不仅数量少，而且功能亦降低，就会影响食物的进一步消化处理。再加上病人胃肠道蠕动功

能减弱，食物在肠道中运行缓慢，这样，吃下去的食物因得不到及时充分的消化吸收，而长时间地停留在胃肠道内，于是病人会感到有饱胀感，自然也就不想进食了。

此外，发烧的刺激和引起发热的病原菌所分泌的毒素，还可以直接作用于人体的中枢神经系统，尤其影响专管食欲的中枢神经“司令部”，使食欲减退。



为了使发烧病人及早康复，除针对病因进行药物治疗外，发烧病人的饮食调养也很重要，尤其应注意补充足够的水分，因为发烧时人体内水分损失增多，加上服用退热药物后，大量出汗会失去较多的水分，如果不及时补充水分，就会影响皮肤蒸发散热，体温就不易下降。同时，发烧时身体产生的代谢产物也必须有足够的水分帮助，才能排泄掉。另外还要注意的是，发烧病人的饮食应以清淡，容易消化，少油腻为佳，如牛奶、粥、挂面和蛋汤等。千万不要为了补充营养而过份地勉强病人进食，尤其是高脂肪的食物。

（唐建华）

为什么中小学生上午课间大休息时要加餐？

目前，我国上海、北京、天津、武汉和南京等省市的中小学校都在推广课间加餐，即由学校组织，在每天上午第二与第三节课的课间大休息时间，给每个学生吃上一份糕点、馒头、面包、牛奶或豆浆等方便食品。这种课间加餐的方法，可以及时补充消耗的能量，对于提高青少年的营养水平和健康水平都有着积极的意义。

为中小学生课间加餐，主要是根据我国的国情和中小学生的实际

情况而提出来的。中小学时期是长身体、增知识的重要时期。据统计，从 12 岁到 18 岁，人的体重平均增加 25 公斤，身高增长 30 厘米，这样迅速的生长发育，需要各种营养素的充分供应，不然人就会出现疲倦、消瘦和抵抗力下降，影响生长发育，甚至患病。然而，在现实生活中，一般城市孩子的家长都为双职工，早上没有时间为孩子准备符合营养标准的早餐，经常是“早餐马虎、午餐对付”，以致各种营养素，尤其是蛋白质的摄入量普遍不足。而按一般学校的教学规律，学生上午的课时多，用脑强度大，加上他们活泼好动、消化能力强，消耗大，早餐摄入的营养素满足不了半天活动的需要，因而许多学生到了上午第二节课后就会处于饥饿或半饥饿状态，肚子咕噜咕噜作响，出现胃部不适、头晕、学习注意力不集中、记忆力减退等现象，有的学生甚至在第三四节课时出现头晕、乏力、面色苍白、出虚汗等低血糖症状，这样不仅影响健康发育，也影响学习的效果。

课间加餐能够及时地弥补学生早餐营养素的不足，起到促进其健康生长发育，提高学习成绩，增进智能发育等的作用。



营养学家曾对营养状况基本相似的 10 岁学生作对比研究。他们把学生分成两组，每组都是男女各半，一组每天上午课间大休息时加餐一个营养面包，另一组不加餐。4 个月后，两个组进行比较，发现加餐组学生的身高、体重均较未加餐组要高和重。

那么，课间加餐会不会打乱学生一日三餐的习惯、影响午餐时的食欲呢？不会的，中小学生正处于生长发育旺盛阶段，对营养的需要远比成年人的需要多，况且，加餐的一份食物实际上只能起到补充早餐的不足，不会影响学生的午餐食欲。当然，如果学生的早餐已经符合营养需要，那么这一顿加餐也就不必要了。



加餐组学生　未加餐组学生

因此，中小学生上午课间大休息时加餐的制度，是很值得提倡的，如果有些学校没有这种统一的规定，那么，学生们自己也应该自行加餐补充一些食物才好。（唐建华）

为什么常吃泡泡糖有益？

提起吃泡泡糖，不少人认为，吃泡泡糖吹泡泡，既不文明又不卫生，倘若将泡泡糖吞到肚子里去，说不定还会粘着肠子。其实，这种看法是很不全面的。从科学的角度上说，泡泡糖是一种较为理想的保健食品，不论是儿童还是青年人，常吃泡泡糖不仅有助于面部肌肉的发育，而且也有利于牙齿健美，促进身心健康。

泡泡糖实际上是一种含糖少、具有柔性和韧性的糖果。口腔在咀嚼泡泡糖时，既需要有面部肌肉紧张而有规律地收缩，又得依靠牙齿之间的磨擦。经常咀嚼泡泡糖能促进面部肌肉和牙齿的发育，对人体健康至少有以下 3 方面的好处。



1. 预防龋齿。此病在儿童中发病率至少在 50% 以上。儿童易患龋齿的主要原因是，不注意口腔卫生，临睡前爱吃甜食而又不刷牙，以致食物残渣滞留在口腔、牙齿缝中，细菌乘机大量繁殖，在牙齿上形成牙菌斑而导致龋齿。如果我们的儿童能经常或饭后吃上一块泡泡糖，通过牙齿反复地咀嚼泡泡糖，既可以把嵌入牙齿之间的细小食物残渣粘出来；又能刺激口腔中唾液的分泌，大量的

唾液分泌实际上起到了冲刷、清洁口腔的作用。



2. 固齿作用。我国古时就倡导用叩齿来固齿。同样道理，经常反复地咀嚼泡泡糖，上下牙齿均衡用力的咀嚼实际上对牙齿来说是一种生理刺激，这种机械刺激起到了良好的按摩作用，它能增强牙体、牙周组织的抵抗力，起到固齿健齿的作用。

3. 促进面部肌肉发育。在当今现代生活中，五谷杂粮，粗粮逐渐被各种精制的食品所取代。儿童膳食的食物往往是软食和细食较多，大多数食物不需要过多地咀嚼就可进入胃肠道。这样，面部参与咀嚼运动的肌肉组织就得不到正常的锻炼，致使面部肌肉发育不良，长期发展下去，长大后容易发生偏头痛等病。但是，经常咀嚼泡泡糖，情况就不同了，充分地咀嚼能促进面部肌肉的正常发育，并增强面部肌肉的力量，使面部变得更加丰满。

由此看来，泡泡糖是一种有益的食品，经常吃泡泡糖有助于身体健康。但也需注意的是，吃泡泡糖时最好不要一边吃，一边吹泡泡，这样做既不文明，又不卫生。（唐建华）

常吃素油好不好？

“素油益健康，荤油长脂肪”这恐怕已是家喻户晓的一种看法。因此，父母不让孩子尝猪油炒的菜，怕孩子肥头肥脑；年轻姑娘不沾荤油的边，怕影响身材的苗条；老年人更怕荤油上餐桌，好像冠心病、高血压病会因此而加重。于是，以前受人青睐的猪油、肉膘，现在已较少有人问津了。

一般来说，植物油比动物油营养价值要高，这是因为植物油是人体必需脂肪酸的主要来源，而且熔点低，容易消化吸收。植物油和动物油相比，植物油以不饱和脂肪酸为主，动物油以饱和脂肪酸为主。不饱和脂肪酸可加速胆固醇的分解，使它成为胆酸，进而降低血液中胆固醇的含量；而饱和脂肪酸中胆固醇形成的脂肪，比较容易在动脉内膜中沉积，渐渐形成动脉粥样硬化。所以，经常吃用豆油、麻油、米糠油和玉米胚芽油等优质素油烹调的食品，的确有益于预防血管硬化和冠心病，有益于健康。

但是，由于植物油的脂溶性维生素 A、D、E、K 含量不如动物油含量高，所以也不能忽视动物油的作用，特别是已经产生脂溶性维生素缺乏症的人，如皮肤粗糙、角化、视力差、夜盲症、软骨病等患者，更要进食一定量的动物油，以增加脂溶性维生素 A、D 的吸收。



最新的研究资料还显示，长期不食荤油会损害健康和缩短寿命。有人做了这样的实验：将刚出生的小鼠分成两组，分别在饲料中加入 10% 的猪油和植物油，喂养 45 周后，两组的生存率分别为 82% 和 36%。单纯食素油的小鼠所以死亡率高，主要是由于出现了血管壁损伤，引起膀胱出血。

人体所需要的脂肪有几十种，其中的亚油酸和丙种亚麻酸，人体本身不能制造，必须经食物补充才能得到。动物性脂肪中含有丰富的丙种亚麻酸，如果人体中长时间缺乏这种脂肪，就对身体不利。据报道，长期素食者抵抗力反而差，容易发生感染、贫血、营养不良和癌症。肥肉中含有 22 碳多烯酸等长链不饱和脂肪酸，而这种脂肪酸是人体神经系统和大脑细胞生长发育的重要成份，所以，青少年经常吃

含荤油的菜肴，对智力和脑发育有利。

摄入过多的脂肪和胆固醇对人体是有害的，但是，日本有份资料表明，猪肉经过长时间的炖煮，其中饱和脂肪酸会减少 30 ～ 50%。化验分析还证实，100 克肥猪肉中含胆固醇 222 毫克，熬成猪油，含胆固醇 102 毫克。而人体内的胆固醇从食物中摄取的约占 30%，肝脏本身合成的约占 70%。当食物中胆固醇减少时，肝脏就加速体内脂肪的分解，并将糖转化成脂肪，造成继发性高血脂症，所以长期吃素油的人也会发生高血脂症和动脉硬化。此外，单吃素油和素食还易患胆结石，英国某医院曾对 800 个人分两组实验，一组不限制饮食，另一组用素油代替荤油，结果发现素油组患胆结石的比随意饮食组高两倍。研究证明，长期吃素油会影响胆汁成分而易患胆色素类结石。

因此，常吃素油对健康也有影响，平时应该荤、素油搭配着吃，素油与荤油搭配比例以 1:0.7 较为适宜。（贝润浦）

为什么在剧烈运动前不宜吃高脂肪、高蛋白质食物？

中学生运动会在某校大操场热火朝天地进行着，广播里不断播放着冠亚军的名单。“砰”的一声枪响，1500 米赛跑起点线上冲出了 6 名健儿，矫捷的身影就像离弦的箭。两圈以后，365 号运动员渐渐地被拉在后面，人们看到他面色苍白，气喘吁吁，突然，他捂着肚子踡坐在跑道线上。医护人员马上飞奔过去急救，把他抬下了运动场。365 号运动员本是中长跑好手，经常在比赛中夺魁，这次怎么中途退场了呢?

原来，这位运动员的母亲为了儿子能在比赛中取得更好成绩，特地在中午送来排骨、牛肉、鸡蛋、大虾、鸭腿等有多种荤菜的高质量午餐，以加强营养和能量。谁知道，吃了如此高脂肪、高蛋白质的食

物较难消化，反而加重了肠胃的负担。当机体剧烈运动时，脏器在腹内的活动度也增大，必然牵拉腹腔韧带上的神经，如果胃肠因饱食而充盈，就会增大牵拉的力量而引起腹痛。另一方面，进食高脂肪、高蛋白质食物后，需要充足的消化液和血流量来帮助消化道消化，此时剧烈运动，血液被调节到肌肉系统，相对减少了对胃肠道的供血，胃肠肌缺血会发生收缩痉挛，引起腹痛。此外，在运动时由于重力因素，不容易消化的食物坠积于盲肠部，该处神经血管受到牵拉，可使右下腹发生胀痛。这就是 365 号运动员比赛中途突然腹痛退场的原因。



据测定，人体氧化吸收每克脂肪所需的氧气为 2 升左右，氧化吸收每克糖和蛋白质的氧气分别为 0.8 升和 0.95 升左右，可见氧化 1 克脂肪所需要的氧气，远比氧化同量的糖或蛋白质来得多。因此用脂肪作为供能物质还会增加运动员的负担，使氧的需要量大幅度增加，于是势必减少肌肉组织的供氧量，这就会影响运动员的爆发力和耐力。而且脂肪过多还可使体内酸性产物增多，加速肌肉的疲劳感，不利于高强度运动。

蛋白质虽然可以提供机体能量，但一次性摄入太多对身体也不利，它会使蛋白质代谢产物——尿素和尿酸等增加，加重了肾脏排泄废物的负担，因而不利于机体的高强度运动。

一般说来，为了增强运动员的体质，比赛前应该吃得好些，如蛋白质、脂肪、维生素等，都不可少。但是，在比赛前的一顿饭，应该少吃富含脂肪、蛋白质的肉类，特别是肥肉。运动员平时膳食中，蛋白质、脂肪和碳水化合物 3 者的比例，如按重量计算应为 1:0.8:4；对耐力性的运动项目如长跑等，碳水化合物的比例还可增加，如 1:1:7。

尤其是在比赛前几天，膳食的质量就应有所提高，多吃糖类食物以增加体内各种营养素的储备量。糖类食物的主要来源是大米、面粉、豆类、糖果、水果、蔬菜、瓜类、土豆等，这样有利于运动员赛出好的成绩。（贝润浦）

鸡汤补还是鸡肉补？

鸡汤补还是鸡肉补？这是个颇为有趣的问题。我们时常可以听到有人这样说：啊哟！你体质太虚弱了，快买只鸡煮点汤补补身体吧！其实，这是个误会。误会的原因可能有两点：一是鸡汤的味道特别鲜美，也许是对鲜美的偏爱吧；另一个原因可能是受素食的影响。那些粮食、豆类、蔬菜都含有丰富的维生素，而维生素极易溶解于水中，所以，不论是米汤、面汤还是菜汤，都含有丰富的营养。为了防止浪费，营养学家常常强调这些汤类的营养价值。有些人便以此类推，把鸡汤的营养价值也给抬高了。



当然，鸡汤的营养也是不错的，但与鸡肉比起来，就大为逊色了。据营养学家研究，一般肉类食物汤里的营养成分并不高，主要的营养还在肉里。就拿蛋白质来说，肉汤里所含仅为肉中所含的 7% 左右，其他营养成分如脂肪、无机盐等，肉汤里的含量也不多。拿我国人民目前的饮食习惯来说，能量和维生素的主要来源在于主粮和蔬菜之中，因此，必须强调米汤、面汤和菜汤的重要性。但人们吃荤菜的主要目的，是为了补充蛋白质和其他一些营养成分，因此，吃荤菜时必须以吃肉为主，当然汤也应一并喝进。

除非有些病人，刚刚动过胃、肠、胆道手术，或者患胃、肠、胆道、胰腺等消化器官类的炎症还尚未恢复，这时进食大量蛋白质、脂肪类食物，消化器官不能承受，也只能以汤为主，能吃多少算多少，不足的营养成分可由其他方式补充。也有些病人，消化吸收功能尚可，只是食欲不振，或者食量较小，他们喜欢喝鲜美的鸡汤，而不愿啃鸡肉。为了增加这些病人的营养，可把鸡肉剁成碎末，让肉末煮入汤中，或用压力锅或蒸鸡锅进行加工，把鸡肉、鸡骨中的营养“压”入、“蒸”入鸡汤中，以提高鸡汤的稠度，增加鸡汤的营养价值。

不过鸡汤总是汤。鸡汤固然鲜美，其营养价值总比不过鸡肉。

（周小寒）

为什么说“生癌不能吃鸡”是错误的？

生癌的人不能吃鸡，这句话流传已久。因此，癌症病人的家属为病人准备菜肴时，往往只烧鸭不煮鸡，甚至只炒鸭蛋不炖鸡蛋。

生了癌，真的不可以吃鸡吗?

现代医学从不强调食物的禁忌。中医学确有“忌口”之说。一是饮食忌口，告诫病家别吃会加重病情的食物。例如，上腹饱胀、胃口不好时，忌甲鱼、蟹类，因为甲鱼滋腻，蟹性寒凉，容易碍胃；发热口干、咽喉疼痛时，忌羊肉、辣椒等热性食品，以免热上加热；感冒咳嗽时，忌黄鱼、海鲜、毛笋等易“发”的食品，否则咳个不停。二是服药忌口，嘱咐病家勿吃与中药药性冲突或可阻碍药物



发挥作用的食物。例如，甘草、桔梗、乌梅忌猪肉，麦冬忌鲫鱼、醋等。

“癌”这个字在祖国医学书籍里是找不到的，可能属于“症瘕”、“积块”一类，但从没提到过“症瘕”、“积块”要忌鸡。那么，流言从何而起呢？据说一些专家到江苏启东进行流行病学调查时，发现当地的鸭只只正常，而鸡却生肝癌的居多，就此传出鸭比鸡好，而以讹传讹说什么患癌症的人不宜吃鸡，其实并无确凿的科学根据。

癌症是一种消耗性疾病，不少病人死于过度消耗所致的全身衰竭。因此，在各种治疗措施中，营养治疗占有十分重要的地位。食物宜清淡而富于营养、宜新鲜而易于消化。要保证一定的数量，尤需注意质量，以保证有足够的蛋白质供应。过多忌口是导致癌症病人营养不良、加速衰竭的原因之一。鸡和鸡蛋都是蛋白质的良好来源，不仅蛋白质含量较高，而且都是优质蛋白质，因为组成蛋白质的必需氨基酸比值较接近人体需要，且吸收利用率高。再说，鸡和鸡蛋还含有丰富的维生素和无机盐。所以，不让生癌的人吃鸡、吃鸡蛋是错误的做法。

（盛丹菁）

为什么维生素 A、D 不能多服用？

维生素是一类维持身体健康必不可少的营养素，可分成水溶性（B、C）和脂溶性（A、D、E、K）两组。它们大多数不能在人体内合成，或者合成量不足，必需从食物中摄取。虽然人体需要的各种维生素量不大，但是缺乏时，可引起种种疾病。倘若因病而补充过多也不行，特别是脂溶性的 A、D，易堆积于体内导致中毒。

维生素 A 的主要生理功能在于参与眼睛里视紫质的合成；维持皮肤和呼吸道、泌尿道等粘膜的上皮细胞的正常结构；维持正常生长

发育。缺乏时，就可能产生这些症状：眼球结合膜干燥（干眼病），暗适应能力下降（夜盲）、怕光，角膜混浊，继而软化、溃疡、穿孔以致失明；皮肤粗糙、干燥、脱屑，看起来像鱼鳞样，摸上去如鸡皮疙瘩；易于反复发生呼吸道感染、泌尿道感染与结石；体格生长发育迟缓。



引起维生素 A 缺乏的原因主要是食物中的维生素 A 含量不足。另外，如果患有慢性腹泻、肝胆疾病等，就会阻碍维生素 A 的吸收和利用及胡萝卜素转变为维生素 A。还有某些疾病可使维生素 A 的消耗量增加，如迁延性肺炎、麻疹、结核等。

维生素 A 的一般治疗剂量为每日口服或注射 2.5 ～ 5 万国际单位。假使滥用、错用，过量摄入维生素 A 则可引起中毒。急性中毒主要表现为头痛、呕吐、烦躁或嗜睡，小儿前囟（头顶上的“天灵盖”）隆起等，也可出现眼球震颤、复视。慢性中毒的表现也有多种多样，像小儿多吵闹、食欲减退、体重不增；皮肤瘙痒、脱屑；毛发干脆容易脱落；口唇皲裂；四肢骨骼疼痛、肿胀、触痛；头痛、呕吐、肝脾肿大、鼻出血和牙龈出血。

维生素 D 的主要生理作用是促进钙、磷在小肠内的吸收，调节钙、磷代谢，促进钙、磷沉着，使牙齿和骨骼正常生长。缺少了维生素 D，儿童易得佝偻病，成人易患骨质软化症和骨质疏松症，牙齿易蛀，以及患神经性耳聋。另外，人体缺乏维生素 D 与人缺少直接接触日光、食物中维生素 D 含量不足或肠道吸收不良、患慢性肝、胆、肾疾病有关。

错误服用过量维生素 D 也会引起中毒，使钙、磷吸收增加，血中钙质过多，钙盐沉积于各器官而使功能损害。最初症状常是低热、头痛、厌食、恶心、呕吐、精神不佳、烦躁、嗜睡。然后，腹泻、口渴、

多尿、贫血、肌肉松弛。严重者，昏迷不醒。长期慢性中毒还会影响体格、智力发育及产生运动障碍。

由上所述可见，维生素 A、D 并非补药。真正需要补充维生素 A、D 的人，必须严格遵照医嘱服用，否则有害无益。（盛丹菁）

为什么不能生吃菱、藕、荸荠？

在祖国南方，有些水生植物如菱、藕、荸荠等，大家都非常乐于品尝，而且生食时格外津津有味。岂知生食这些东西，从卫生角度看是一个很不好的习惯，它会引起一种疾病——姜片虫病。

当然仅仅责怪这些水生植物，这是很不公平的，因为它的罪魁祸首是一种姜片虫。刚从粪便排出的姜片虫虫体呈肉红色，形状很像切开的生姜片。在古代姜片虫和蛔虫、蛲虫统称为“三虫”。在明代的两具干尸内，曾发现肠道中有姜片虫卵，可见它在我国流行至少有 500 多年。



姜片虫在人体小肠内产卵，从大便排出。由于我国南方常用粪便作为种植水生植物池塘的肥料。如果粪便处理不当，很容易将虫卵带入水中。虫卵在一定温度下孵出毛蚴，毛蚴钻入扁卷螺的体内，经过一系列的发育产生尾蚴。菱、藕、荸荠的根茎是扁卷螺喜欢吃的食物，当扁卷螺靠近菱、藕、荸荠的根茎时，螺体中的尾蚴就会跑出，附着在它们上面成为囊蚴。只有囊蚴才能伤害人体。

每年 7 ～ 9 月，是大部分水生植物收获的季节，也是囊蚴最多


的季节。如果生吃，附着的囊蚴容易随之吞入，发育为成虫，寄生在小肠上部，造成小肠粘膜发炎，影响消化。出现的症状为上腹部不适、胃口不好、腹泻、消化不良，严重的还会导致营养不良，面部及下肢甚至全身浮肿，儿童发育受阻。另外，虫体结团时，还可能阻塞肠子，造成肠梗阻。

因此，水生植物要提倡熟食，即使要生吃，菱、荸荠也要用开水烫 3—5 分钟，然后用刀削去皮壳，万万不要啃食带皮壳的生菱、生荸荠。（詹家明）

为什么多吃脂肪食物会诱发肿瘤？

肿瘤发生的原因多种多样，多吃脂肪食物也是其中一种。

一般人都知道，多吃油腻食物会使人发胖，还容易得冠心病、胆石症、糖尿病和肥胖症。其实，还会引起乳房癌、卵巢癌、子宫癌、前列腺癌和大肠癌等恶性肿瘤。



现代医学已经发现，女子的乳房癌、卵巢癌、子宫癌和男子的前列腺癌的发病，往往与身体里性激素代谢紊乱等有关，特别是与雌激素的数量增加过多有联系，因为雌激素中的雌酮和雌二醇有致癌作用。多吃脂肪食物后，囤积在身体里的大量脂肪，会将肾上腺产生的一种称为雄甾烯二酮的物质转变成雌酮。再说，多吃脂肪食物，肝脏会大量分泌胆汁。胆汁中有胆固醇成分，胆汁增加后，胆固醇数量也增加。胆汁进入肠子后，在肠子里细菌的作用下，会将胆汁中的胆固醇成分

转变成雌激素。身体里明显增多的雌酮、雌二醇，将成为诱发这些恶性肿瘤的“罪魁祸首”。

那么，大肠癌又怎么与过量的脂肪食物有关呢？原来，摄入大量脂肪后形成的粪便中，含有较多量具有致癌作用的叫做吲哚的物质，它会刺激大肠发生肿瘤。再说，多吃脂肪食物容易发生便秘，因为脂肪食物中含纤维素少，不能很好激发肠子活动。而便秘造成粪便与肠子的长时间接触，就容易诱发大肠癌。


除此之外，有人发现，肥食后，胆汁分泌会增多，胆汁中含有的牛磺胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸等物质也会相应增加。这些物质通过新陈代谢，变成脱氧胆酸和石胆酸。脱氧胆酸和石胆酸在肠道中产生化学反应，是诱发癌症的因素。

不难看出，少吃脂肪食物，不但可以防止肥胖和预防冠心病、胆石症和糖尿病，还可以防止生癌呢！（姚德鸿）

为什么吃了黄泥螺和某些蔬菜会引发日光性皮炎？

每年春夏之交，有些人吃了某些蔬菜，如野菜紫云英（红花）、灰菜（藜）、油菜等，再在强烈的阳光下工作或游玩，不久便会出现头痛、乏力、恶心、腹痛等现象，面部和两手背发生浮肿，出现瘀点或瘀斑，并感到灼痛、刺痛或瘙痒。严重时会在浮肿、瘀斑之上再出现水疱或血疱，并可因感染而发生溃疡，个别人喉头水肿，影响呼吸，或发烧。这种病是蔬菜加阳光引起，医学上称为“植物-日光性皮炎”。

其实，不仅是蔬菜可引起日光性皮炎，在初夏，我国沿海地区还有不少人因为吃了大量黄泥螺后又经日光照射，3 天后发生了“泥螺日光性皮炎”，人们又称为“大头风”、“土铁风”。发病时的症状，与“植物-日光性皮炎”大同小异。



泥螺和某些蔬菜为什么会引起人体的过敏反应呢？这必须具备三个条件：一是这些食物含有光感性物质，如卟啉类，对日光会发生敏感反应；二是进食上述食物必须经日光照射才能发病；三是吃这些食物的人对感光物质容易产生过敏反应。所以，这种病的发病部位多在阳光能够照射到的身体暴露部分，而且光感性食物吃得越多，越容易发病，同时症状也越严重。

为了预防食物引起的日光性皮炎，首先是凡有这种发病历史的人，最好避免食用能引起此病的那些食物。如果喜欢吃这些食物，也应采取相应措施，如吃灰菜或油菜时，可先用开水烫洗，再放入清水中浸泡数小时后烹调食用；吃黄泥螺也应加工后再食用，而且一次量不宜吃得太多；吃后要尽量避免和减少阳光的直接照射。一旦发生食物引起的日光性皮炎，应该及时请医生治疗。（贝润浦）

为什么不宜过多服用含铁补剂？

患了缺铁性贫血的人，多吃些补血铁剂或含铁多的食物，应该说是对症下药的。但是，滥服或长期过多地进食补铁药物、饮料和食物，有时也可引起一种特殊的病症——饮食性血色病。

血色病，是人体铁质代谢发生紊乱所引起的一种遗传病。遗传、某些类型的贫血（如地中海型贫血、维生素 B_6 性贫血等）、胰腺外分泌缺乏、肝硬化以及接受过多量铁剂等因素，都可造成体内铁质吸收过多的现象。如果由长期进食含铁丰富的食物、饮料及补铁药物引起的，医学上就称之为饮食性血色病。非洲班图人有用铁壶酿啤酒和煮食的

习惯，由于啤酒的酸碱度低，能使铁的溶解度增加，酒和食物中含有较多的铁，使肠粘膜吸收的铁大量增加，因而在当地流行一种“班图含铁血黄素过多症”；也是属于饮食性血色病。



成年人体内铁的含量约为体重的十万分之四，一个体重 50 公斤的人含铁约 2 克。人体对铁的消耗量甚微，每天需要补充的铁，成年男子约 10 毫克、月经期妇女约 18 毫克、孕妇约 15 毫克、小儿约 6 毫克。正常人铁的吸收与身体的需要是保持平衡的。人体内铁的含量维持在一定的正常生理水平上，主要是通过肠粘膜来进行调整的。在通常情况下，人们吃进去的铁只有 10% 能为肠道吸收，但是长期过量食铁（饮食铁每日超过 100 毫克时），肠粘膜吸收铁的能力就会失去控制，使铁吸收过多，铁与蛋白质结合成铁蛋白，逐渐释放入血液，转运至全身，并以铁蛋白和含铁血黄素形式在体内许多脏器组织中积聚。

铁在血液及组织中过多积聚的结果，在初期，颜面、颈项、前臂及足背等暴露部位可见色素沉着，皮肤呈灰棕色或古铜色；在后期，会遍及全身，肝、胰、心、肾、脾、脑垂体、睾丸等处，可产生纤维组织增生及脏器功能损害，引起肝硬化、糖尿病及心力衰竭等症状。

预防饮食性血色病，关键在于不要滥用或长期过量服用含铁补血药及食用含铁过多的食物。特别要忌用铁壶、铁锅煮酒。若已发生本病，应积极请医生治疗。（翁德立）

为什么不要乱吃补药？

中国有句古话，叫做“药补不如食补”。说明一个健康人主要依靠食物补充营养，不能依靠吃补药来增进健康。有些人认为多吃补药总是好事，于是人参、阿胶、鹿茸、黄芪等乱吃一通，结果非但没有带来好处，相反还会影响健康！

拿补药之王人参来说，就有偏热性的红参，偏凉性的生晒参、皮尾参和偏温性的白参等区别。属于火气大的人，不能服偏热性的红参，否则会引起头痛、头胀、口干、咽痛、鼻出血；火气小的人不能服凉性人参，否则会产生畏寒、头昏、眼花、泄泻。即使是温性的白参也不能服得太多，否则会产生兴奋、激动、失眠和血压升高等副作用。



阿胶是用黑驴皮熬制成的一种皮胶，对月经过多的妇女有滋补作用。可是，这种补药一般健康人服用后，反而会影响消化功能，甚至产生腹泻现象。

鹿茸类滋补品比较适用于老人怕冷和妇女体虚，而平时身强力壮的人服用后，会感到不舒服，甚至产生头胀、口干、鼻出血等现象。

黄芪对贫血、浮肿、体虚的人是比较合适的，但健康人用后却会引起面颊潮红、脾气烦躁以及胃口下降。


以上只是举了一些例子，从中可以看出，服用补药其实是一桩很有学问的事。好端端的健康人不必去吃补药，尤其儿童或青少年，生理功能良好，新陈代谢旺盛，身体各个器官的工作欣欣向荣，哪有必要去吃补药呢？何况乱吃补药还会产生副作用，不是有报道说，有些儿童吃了某些含有性激素成分的补药，结果发生性早熟现象吗？即使是适宜吃补药的人，也不能乱补一通，应该在医生指导下，根据身体情况，选择合适的补品，适量地服用，这样才真正符合医学道理。

（姚德鸿）

为什么儿童不宜服用人参蜂皇浆

近年来，一些医院里经常有一些家长带着 5 ～ 6 岁左右的女孩子前来就诊，说是女孩小小年纪便乳房增大，不知什么原因，请医生诊断。一经细问，原来是服用了人参蜂皇浆。

儿童是否可以服人参蜂皇浆?吃了蜂皇浆女孩为什么会乳房增大?



人参和蜂皇浆都是传统的名贵滋补药材，人参的功能是补元气、生津液，主要治疗虚脱、喘咳等疾病。人参还有兴奋中枢神经、降血糖的作用，小剂量能提高心脏的收缩力和频率，兴奋中枢神经，并能促进大脑功能；大剂量则能抑制心脏的收缩力和中枢神经系统的功能。蜂皇浆中含有蛋白质、葡萄糖、脂肪、矿物质、B 族维生素及激素等。它能增进食欲、消除疲劳、增强体力、延缓衰老、提高机体耐缺氧能力和运动能力。

为了服用方便和提高滋补效果，人们又把人参和蜂皇浆合制成口服液。科学研究表明：喂服人参蜂皇浆的幼年大白鼠毛皮光洁，体重增长快。同时幼鼠乳房发育比对照组提前出现。这说明人参蜂皇浆确能促进幼鼠体格发育，大剂量和长期喂药可使幼鼠性发育提前。

老年人服用人参蜂皇浆后，杀伤肿瘤细胞的功能加强，人体免疫功能加强，防病和抗肿瘤能力提高。食欲旺盛，感冒减少，精力充沛。儿童服用人参蜂皇浆后，体质明显增强，小毛病少了，人长高长胖了，但是许多孩子却过早地出现了第二性征的发育。女性儿童服用人参蜂

皇浆后 1 ～ 4 个月乳房增大，停药后大多能消退或缩小，极少数维持原样。男孩服药后主要表现为阴茎增粗增长、睾丸增大，停服后，症状消退，基本上恢复正常。

老年人、体弱多病的人服用人参蜂皇浆，一般说来是有益的。至于儿童能不能服用，应视具体情况而论，凡是身体健康的儿童，一般不需也不宜服用。那些营养不良，发育迟缓或已步入发育期的儿童，可适当服用人参蜂皇浆，以促进生长发育，但是必须在医生指导下正确服用。（刘正兴）

为什么有些药物会引起大小便变色

一些疾病会引起大小便颜色发生变化。中西医在治疗疾病时，往往都将粪便、尿液颜色的改变作为诊断的重要依据之一。

但是，一些药物也会使大小便变色。这和疾病所造成的大小便变色显然不是一回事，如果不了解这一点，一看到大小便有异常颜色，就胡乱猜想或者惊惶失措。这会干扰诊断，引起一些不必要的精神负担。

为什么有些药物会引起大小便变色？

药物被吸收进入人体，然后在体内进行分布和代谢，最后以代谢产物或者原形排出体外。除少数药物的代谢产物或原形从乳汁、肺排泄外，多数药物经尿液排泄，部分从大肠随粪便排出体外。如果这些药物的代谢产物或原形本身带有颜色的话，那么在排泄过程中，必然也会使粪便、尿液带上相应的颜色。

哪些药物会引起粪便、尿液变色？颜色是怎样的呢？

人的正常大便为黄色。服用活性炭、硫酸亚铁、枸橼酸铁铵、次碳酸铋等药物，会使粪便变黑色；应用利福平、肝素、扑蛲灵、阿司匹林等药物，会使粪便变红色；服用消炎痛、口服抗生素或食用过量

绿叶蔬菜等，会使粪便带上绿色；服用氢氧化铝等制酸药及硫酸钡等药物，会使粪便变白色；服用大黄类药物，会使粪便变深黄色；还有，夏日吃太多的西瓜，也会使粪便带上红色。

人的正常尿液为淡黄色，因饮水多、少，尿色相应呈现无色 ⟶ 淡黄 ⟶ 黄的变化。服用硫酸亚铁、灭滴灵等药物，会使尿液变黑色；服用氨基比林、酚酞、利福平等药物，会使尿液带上红色；服用痢特灵、阿的平、维生素 B_2、磺胺类药、呋喃妥因、氯喹等药物，会使尿液变为黄色或棕色；服用消炎痛等药物，会使尿液变绿色。（刘正兴）



为什么用药不当会引起发烧？

药物是治疗疾病的“武器”，但是在某些病人身上使用药物后，却引起了发烧。医学上，称这种现象为药物性发烧，原因往往与用药不当有关，大致有两种情况：一种是药物因素，可能药物不纯，混进致热的物质，刺激了人体里专门调节体温的神经“司令部”，使体温升高。另一种是病人体质因素，凡是过敏体质的人，旁人对某种药物的发烧反应能耐受，不引起发烧，而他却受不了，服了这种药物产生了发热现象。

当然，过敏体质的人也并不是所有药物都会使他发烧。目前，对有关药物性发烧的真正原因，还未完全弄明白，尚待进一步研究。

据医学文献记载，能够在某些人身上造成药物性发烧的药物还真不少呢，例如抗生素中的青霉素、链霉素、四环素、氯霉素、先锋霉

素、庆大霉素、卡那霉素；磺胺药中的磺胺异噁唑等；抗结核药中的异烟肼、对氨水杨酸钠等；中药中的银黄、四季青、当归等注射液。此外，麻黄素、阿托品，甚至连本身具有退热作用的安乃近、氨基比林等药物也会引起发烧。



药物性发烧体温多数在 38℃ 左右，偶尔也可高到 39℃ 以上。绝大部分病人起病快，在用药 1 ～ 2 小时即可发生。那么怎样才能判断是药物性发烧呢？这里有几项依据：第一，原先不是发烧的疾病，用药后出现发烧；第二，原先是发烧的病，用药后该病的其他症状都好了，唯独发烧不消退；第三，用药后除发烧外，还有皮疹、黄疸、胃肠道症状等药物过敏反应现象；第四，停药后，发烧随即在 1 ～ 2 日内消退。总之，在服药过程中，出现原因不明的发烧时，就要考虑到药物性发烧的可能。

药物性发烧是可以防止的，首先要求药物产品质量可靠，不混有杂质。其次，对于过敏体质的人，尽量少用那些有可能造成药物性发烧的药物，万不得已，非得应用时，可配合使用抗过敏药，例如苯海拉敏、扑尔敏等，这样，可以阻止药物性发烧的发生。

如果已经知道何种药物会使自己引起药物性发烧，那么应该记住这些药物的名称，今后看病时告诉医生，供医生用药时参考。

（姚德鸿）


为什么药物不能随便合用？

生了病，几种药物合用的机会很多。但是，药物不能随便合用，如

果用药不当，不仅造成浪费，还会增加药物的毒性反应，降低药物效果。让我们举一些例子来说明这个问题。

止吐药胃复安能加强胃的收缩，帮助胃里食物进入肠子，不再呕吐；普鲁本辛、胃疡平等药物能解除胃的强烈收缩，减慢胃的运动。有人常把胃复安与普鲁本辛或胃疡平合用，实际上这两种药物会互相牵制，从而减弱药物的效果。

硫糖铝用于治疗胃、十二指肠溃疡，减少胃酸分泌。如果这些病人又有胃口不好现象，在使用硫糖铝治疗同时，又去吃上一些开胃口的多酶片，这就反而不好了，因为多酶片会增加胃酸分泌，食用后也会互相牵制，而失去药物的医疗作用。



乳酶生可以开胃和帮助消化，是一种活性乳酸杆菌的干燥制剂，在服用乳酶生时，是不宜同时服用抗生素药物的（如氯霉素、红霉素或其它抗生素），否则，乳酸杆菌在抗生素影响下，就失去作用了。

气喘病要用氨茶碱，该药是碱性的。维生素可增加抵抗力，而维生素是酸性的。这两种药就不宜同时服用，否则酸碱中和会失效。

四环素与复方胃舒平不能合用。复方胃舒平中的铝、钙、镁等元素，遇到四环素后，会结合成肠子不易吸收的化合物，既减弱复方胃舒平的治疗胃病效果，又降低四环素的效果。

庆大霉素与链霉素或卡那霉素，这些药物抗菌原理差不多。对听神经和肾脏都有毒性，合用更易引起耳聋与肾功能的减退。

麻黄素可治气喘，也有升高血压作用；痢特灵治腹泻，也有升高血压作用。如果是一个高血压病人，同时用这两种药物，会使血压突然增高。异烟肼 [jǐng] 是抗结核药，对肝脏有一定毒性反应；镇静药

苯巴比妥也有肝脏毒性影响，如果一个结核病人，加上失眠，同时用这两种药就不妥当了，因为肝功能会受到影响。

中药里不能乱搭配的药物更多，例如生姜与黄芩，乌头与半夏，甘草与甘遂，丁香与郁金，人参与五灵脂等。

在中西医结合治疗中，常将中药与西药配合使用，可取长补短，以增强疗效、降低毒性，取得良好的疗效。

然而，有些中药和西药却不宜随便合用，现举例如下：

含有酸性成分的中药，如山楂丸、五味子丸和冰霜梅苏丸等，不宜与胃舒平、氨茶碱等西药同时服用，否则酸碱中和相互抵消，使药物降低作用或失去疗效。

含有碱性成分的中药，如痧气散、行军散、通窍散等，若与链霉素、卡那霉素、庆大霉素等一起使用，对耳朵的毒性大大增强，而且应用时间长了，还会引起耳聋。

含有鞣酸的中药，如七厘散、虎杖片、四季青片、复方千日红片等，不宜与四环素、土霉素、红霉素、氯霉素、富血铁片等合用，因为鞣酸会使这些西药产生沉淀，不易被机体吸收，因此而影响疗效。

含有钙、镁等金属元素的中药，如珠层片、牛黄解毒片等，不宜与四环素、土霉素等合用，否则这些金属元素能与抗生素结合，使之失去抗菌作用。

含有钙成分多的中药，如白虎汤、珠层片、竹茹石膏汤等，不宜与强心药洋地黄、地高辛等合用，因为钙也有强心作用，这样会增加强心药的毒性。此外，地高辛也不宜与六神丸合用，因六神丸中的蟾酥有强心作用，两者合用后会引起中毒。

含有大黄成分的中药，如解暑片、清宁片、麻仁丸、牛黄解毒片等，不宜与多酶片、胃蛋白酶合剂等助消化药合用，不然助消化药效果会受到影响。

含糖分多的中药，如川贝枇杷露、十全大补膏及各种糖浆、蜜丸

等，不宜与降血糖药物合用，否则两者作用相反，疗效降低。

含有酒精的中药，如虎骨酒、国公酒、风湿骨痛酒等，不宜和安定、安乃近、降糖灵、苯妥英钠同用，因为药酒中的酒精，能使这些西药在体内代谢加快，降低疗效。

当胃痛与心脏病同时存在时，如将中药胃痛散与地高辛合用，由于胃肠蠕动减慢，使地高辛吸收增加，引起中毒。

还有中药羊肝丸、鸡肝散等，不宜与痢特灵、优降灵等合用，因动物肝脏中含有丰富的酪胺，在正常情况下，酪胺易被人体内单胺氧化酶破坏，当此酶被西药抑制时，酪胺就会大量积蓄，促使去甲肾上腺素增加，可引起血压突然升高，发生剧烈头痛，心律紊乱，严重的会危及生命。

由此可见，凡是药物性质相反或影响药物吸收、代谢和排泄的中西药都不能随便合用。

医生是十分讲究搭配用药的，所以在没有医生指导的情况下，不要随便乱用药物，尤其是不能随便合用几种药物。（姚德鸿　汪宗俊）

为什么有些药物不能擅自停服？



一些慢性疾病的患者需要长期甚至终生服药。如果这些患者在未征得医生同意的情况下突然停药，往往会引起“反跳”现象。这是因为在长期或反复使用某些药物之后，机体的正常功能在一定程度上已经有所改变，患者已经适应了在该药物存在下的神经、内分泌、代谢等方面发生的相应变化。擅自突然停药，体内原来的平衡便被打

破，从而出现生理功能紊乱，使已经被控制的疾病复发甚至加剧。

可能发生“反跳”的药物很多，如治疗癫痫，需长期服用苯妥英钠及苯巴比妥，如果病人突然擅自停药，会诱发严重的癫痫持续状态，需立即急救。

长期服用安定、安眠酮、巴比妥类等镇静安眠药，突然停服会出现激动不安、震颤、恶心、呕吐甚至癫痫发作、精神失常。

长期服用心得安患者突然停药，轻者会出现焦虑、震颤、心慌、全身不适；严重可导致心律失常、心肌梗塞甚至猝死等。

降压药可乐宁、甲基多巴突然停服，会使血中儿茶酚胺浓度升高，出现血压骤升，并伴有剧烈头痛、失眠等，甚至可并发脑溢血。

糖尿病患者长期注射胰岛素，如减量太快或突然停用，可诱发酮症酸中毒、昏迷。

肝炎患者服用联苯双酯，突然停服，患者症状会产生反复，谷丙转氨酶（SGPT）会反跳，所以应在医生指导下逐步减量。

吗啡类镇痛药久用会导致成瘾，停用后，病人可出现一系列精神的和全身的症状。因此应用此类药物时，应规定药量、次数及用药期限，并限在医生指导下用药。

乙醇及乙醇制品长期服用，可造成依赖性，其症状虽比吗啡瘾轻些，但也可出现说胡话、定向力障碍和幻觉等。

肾上腺皮质激素类药物，长期应用后突然停服，会出现肾上腺皮质机能不全症状，表现为疲倦、软弱、肌无力、恶心、厌食、关节痛、皮肤脱屑、呼吸困难、低血糖、低血压等，严重时甚至会造成死亡。

要避免和防止“反跳”现象出现，首先须按照医嘱服药，不可擅自增、减量或停服。按治疗常规需停服或因毒性反应被迫停服时，一定要在医生指导下。对已经发生“反跳”现象的，轻者不需处理，机

体本身会调节和适应；重者应立即送进医院进行救治。　　（刘正兴）

为什么不要乱用外用药物？

外用药物种类很多，例如红汞、龙胆紫、碘酊、酒精……使用都很广泛，已成为许多家庭中的必备药品。这些虽然是普通的外用药，但是也不能随便乱用。那么，怎样正确使用呢？这里不妨将一些主要外用药物的用途介绍一番：



红汞，又称“红药水”，可用于小伤口的消毒，凡是较浅的割伤、擦伤都可以用。但是不能用于较深与较大的伤口，也不能涂在口腔里边。因为红汞中有汞的成分，也就是俗称水银的东西，碰到较深、较大的伤口或进入口腔，汞会被吸收进体内而引起汞中毒。

龙胆紫，又称“紫药水”，可用于皮肤或口腔等粘膜，有很好的杀菌和收敛作用。但是化脓伤口就不能用，因为龙胆紫虽能使伤口的表面结一层痂皮，其实痂皮下边还会积脓。

碘酊，又称“碘酒”，有强烈杀菌作用，但对组织有刺激作用，所以不能用于伤口或创面上，只能用于疖肿、毒虫咬伤等没有伤口的皮肤上；也不宜涂在鼻腔、口腔等粘膜上，否则刺激性太大。

酒精，化学名称是乙醇，俗称“火酒”，用于消毒的酒精浓度是75%，涂在伤口或创面上，会引起疼痛，所以只能用于无伤口皮肤的消毒。

高锰酸钾，又称“灰锰氧”，必须加入水中使其成为 0.1% 浓度水

溶液，呈淡紫红色时才能涂用或洗涤伤口，太浓会烧灼组织。另外，高锰酸钾要现配现用，配成的溶液不能久放，否则就没有消毒杀菌作用。

利凡诺：又称“黄药水”，是最常用的伤口换药药物，特别适用于化脓性伤口，有杀菌、驱脓和促使组织生长的作用。一般要用纱布或纱条蘸湿后，覆盖在伤口上才起作用，如果仅仅在伤口表面涂药效果不大。

抗生素软膏：例如金霉素、四环素、红霉素等软膏，可用于各种发炎伤口，杀菌维持时间较长，对组织没有损害。但是伤口脓水较多时不宜采用，因为软膏类药物将创面包覆住使脓液不易流出，伤口不易愈合。

外用药物的种类还有很多，总之，在没有掌握外用药的特性与作用之前不能随便乱用，应该取得医生的指导。（姚德鸿）

为什么碘酒与红药水不能同用？

碘酒和红药水都是常用的外用消毒药。在日常生活中，因不小心皮肤被擦伤、刺伤、烫伤、割伤等是常有的事，皮肤炎症也经常可见。如果在家庭中备有一些应急的外用药品，如碘酒、红药水等，上述小伤小病处理便可在家庭中进行，可起到减少出血、防止感染、减轻患者痛苦的作用。

但是，有不少人在给自己破损的皮肤伤口涂消毒药时，总喜欢将几种消毒药拿来一起用，譬如，涂了一遍红药水还嫌不够，又要再涂一遍碘酒，似乎只有“双保险”，伤口上的细菌才能彻底消灭。岂知这样做，表面看来好像很有一些科学道理，实际上这恰恰是干了一件吃力并不讨好，事与愿违的事。因为红药水和碘酒合在一起用，非但起不到伤口消毒的目的，反而会引起一些不好的副作用。



道理非常简单，因红药水中含汞，碘酒中含碘，两者同用，汞和碘会起化学反应，生成有毒的碘化汞。这不仅会使药物失去杀菌效能，而且会对皮肤粘膜及其他组织产生强烈的刺激作用，引起皮肤红肿起泡，伤口溃烂。这种碘化汞会被人体吸收，数量较多还会导致机体汞中毒。所以，红药水不能与碘酒一起使用。

（刘正兴）

为什么腹痛不能随便使用止痛药？

腹痛是很常见的一种病征，造成的原因很多，例如胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胆囊炎、胰腺炎、肠梗阻、肠炎、阑尾炎、肠寄生虫等。有些人遇上腹痛，不分青红皂白，就用止痛药。其实，这样做很不妥当，甚至是有害的。



腹痛其实是许多疾病的报警“信号”，发生了腹痛，就是告诉人们肚子里有某种疾病在作怪。另外，腹痛的情况在一定意义上讲，也可反映疾病的严重程度，一般说：腹痛厉害，病情也重些；腹痛较轻，病情也轻些。再有，从腹痛的部位，也能大致判断出病源，譬如，由阑尾炎引起的腹痛和肠梗阻引起的腹痛，在腹部痛的部位是有差别的。当然，这些都只是表面症状，还须由医生仔细检查，才能最后确诊腹

痛的病根，正因为这样，所以在还没有弄清病情以前，先忙着用上一些止痛药，甚至用有麻醉作用的杜冷丁、吗啡等强效止痛剂，一时性地将腹痛止住了，但是病根并没有解决，这种止痛作用就等于取消了腹痛的报警“信号”，往往会掩盖病情，恶化病状，如：使急性阑尾炎发展成阑尾穿孔的腹膜炎；胆囊炎发展成胆囊穿孔的腹膜炎；肠梗阻发展成肠穿孔，……等等。结果延误治疗，甚至危及了生命。所以，说得严重些，腹痛在没有弄清病因前，是不能滥用止痛药的。

万一发生腹痛，当然应该及时去医院诊治。如果一时无法去医院治疗，也应该采取一些较为安全、又不掩盖病情的止痛法。例如腹部用热毛巾或热水袋热敷；用两手轻柔和均匀地上下或左右方向按摩腹部。也可用针灸治疗，取合谷、内关、足三里等穴位。还可以用解除胃肠道肌肉痉挛的药物，例如普鲁本辛、阿托品、654—2 注射液、颠茄等。当然，临时止痛后，还得设法立即去医院请医生进一步确诊后治疗。

（姚德鸿）

为什么不宜直接对着药瓶喝药水？

有些患者喝药水时，嫌麻烦图省事，往往喜欢直接用嘴对着药瓶，“咕嘟、咕嘟”喝药水，这样做有什么不好?

首先直接用嘴对着药瓶口喝药水，难以准确掌握服药量。任何药物服得太多或太少都是不利于疾病的治疗的。有些药水具有刺激性或易于中毒，如颠茄合剂、复方樟脑酊等，服多了都会产生副作用。有些药水要兑水冲淡后才能服，这就更不可对着药瓶喝。

其次直接对着药瓶口喝药水，容易使药水受到口腔细菌的污染，使药液变质。

正确的服用药水的方式是：先按照医嘱规定的剂量，将药水倒在

茶匙中服用，然后饮用适量的开水，使药物快速全部到达胃里，经过吸收，分布，迅速有效地发挥作用。

也有些病人喜欢不喝水干吞药片，这样做害处很大。



药物只有在被人体吸收后，才能发挥作用，用以治疗或预防疾病。内服药片只有在到达胃肠，并被吸收进入血液，在血液中达到一定的药物浓度后，才能对疾病起到治疗作用。

由于不喝水，药片容易附在食道壁上，造成食道局部药物浓度过大，给食道带来刺激和损伤，会引起食道发炎和溃疡。由于不喝水，药片不容易顺利通过咽喉、食道到达胃部，也不能在血液中形成一定的药物浓度，无法起到治病疗疾的作用。由于不喝水，药片只能依靠体液来溶解。这样就影响了药物的吸收和发挥作用。

所以医生开好药后，总是嘱咐病人用温开水送服。有些药片不但要喝水送服，而且要多多喝水。比如，磺胺类药物的代谢产物，易在尿道析出结晶，造成输尿管和尿道的阻塞和损伤。因此服用磺胺类药物时，一定要多饮水。阿司匹林、APC 类镇痛药，主要作用是通过扩张血管和出汗，使发烧病人体温下降，服用时也应多喝水，否则病人出汗过多，得不到足够的水分补充，就会发生虚脱。

除药片外，药粉、药水、中药汤剂等服后也应喝点水，减少药物对口腔、食道、咽喉的刺激。

还有些患者喜欢躺着服药，或者服药后立即躺下，这种习惯很不好。根据国内外医学专家的报道，躺着服药片、药丸，如果送服的水很少，那么只有一部分药物能到达胃里，其余部分会在食道内滞留、粘附及融化，引起食道损伤甚至发生溃疡。


科学实验揭示：躺着服药而且只服一口水，那么只有 40% 的药物到达胃里，其余 60% 则粘附在食道壁上。而站着服药并且服 60 ～ 100 毫升水，那么只需 5 秒钟，药物便能全部到达胃里。 （刘正兴）

为什么病菌会产生抗药性？

在人类战胜病菌的征途上，由于发明了抗菌药物，使得那些猖獗了好几个世纪、吞噬过无数生命的致病菌遭受到毁灭性的打击。

然而，随着抗菌药物的广泛应用，却发现它们对某些疾病的治疗效果逐渐降低，甚至完全消失。这是怎么一回事?

这是细菌产生了抗药性。主要的原因是有些人乱用抗菌药物，或应用的剂量不足，使那些原先对药物很灵敏、极易被杀灭的细菌，长期处于低浓度的药物之中，逐渐适应了这种环境。



细菌产生抗药性有这么几种情况：有的细菌改变了自己的结构，比如以增厚细胞膜来加固防线，阻挡药物进入；也有的细菌自动调节体内的酶系统，改变原先的新陈代谢途径，或绕过原先被药物破坏的环节，而负隅顽抗。还有的情况更加复杂，比如某些药物能抑制细菌正常活动中必需的代谢物质，以达到杀菌目的，但是具有抗药性的细菌，却通过自身的变化，减少对这种代谢物质的需要。又如某些药物能抑制病菌生长中所需要的某种酶，以发挥杀菌作用，可是具有抗药性的细菌则针锋相对，大量产生这种酶来维持自己生命活动需要。再如具有抗药性的某种细菌，能产生一种特殊物质，使药物崩溃瓦解失去作用。像金黄色葡萄球菌就能分泌一种青霉素酶，专门破坏青霉素的化学结构，使青霉素完全丧

失效力。

令人惊异的是，有些病菌并未接触过药物，竟也会产生抗药性。比如绿脓杆菌就具有先天性的抗药性。也有些致病菌由于遗传结构或是遗传物质的变化，而形成抗药性，它们似乎能够识别结构相似的药物，使用同样方法进行对抗，这就是“交叉抗药性”。比如能对付土霉素的病菌，同样对四环素也有抵抗力。另有些致病菌通过细菌间的杂交转移，而获得抗药性。还有些致病菌一旦产生了抗药性，就在体内形成一种“抗药因子”，既可以遗传给自己的后代，也可以通过病菌表面的纤毛，作为“礼物”广泛传送，于是其它细菌也就获得了抗药性。这样危害性很大，给治病带来了极大困难。

那么，怎样使抗菌药物既能杀灭细菌，而又不让病菌产生抗药性呢？必需根据药物性质、使用范围、用量和用法，做到合理应用。而且剂量要足够，疗程要适当。可有计划地将抗菌药物分期分批地交替使用。也可联合使用两种以上药物，来防止抗药性。（汪宗俊）


为什么吃药、打针能治病？

一个人生活在世界上，难免有时要染上疾病。只要看病就医，吃药打针，不久疾病便可痊愈。即使患恶性肿瘤的病人，出现剧痛，时在今日，只要打了止痛针，用了药，也能减轻疼痛。为什么吃药、打针能治疾病?

原来不论是口服的药物，还是打针的药水，它们实际上都是一种“化学武器”——化学物质。当它们殊途同归进入人体的血液循环，顷刻各得其处，并与身体的不同部位接触，发挥各自的一技之长，从而起到治病作用。

人的疾病形形色色，像感冒、肺炎，症状也五花八门，如头痛、发

热、咳嗽。因此各类治病“武器”也应运而生，譬如有杀灭细菌的杀菌武器——抗生素；有打击肿瘤细胞的抗癌武器——抗癌剂等。并且每一类又有许多不同品种的药，好比枪就有机关枪、冲锋枪、步枪一样。



无论人们生什么病，不管吃什么药，打什么针，总是万变不离其宗——采取对因治疗或对症治疗。对因治疗是为了清除引起发病的原因的。而对症治疗则在于消除疾病的症状。例如一个小孩患细菌性肺炎，出现寒战、高热、咳嗽、胸痛等症状，医生就给病孩吃药打针。注射的抗生素一旦进入血液循环就同体内的细菌决一雌雄，最终将引起肺炎的细菌一网打尽；给病孩吃的解热镇痛药则一面作用于体温调节中枢，下令执行退热程序——皮肤血管扩张和发汗，一面到达受损伤的部位，抑制致痛物质的释放，减轻疼痛。而镇咳化痰药抑制咳嗽反射、稀释粘稠的痰液，减少咳嗽，使痰液易于咳出。随着细菌的消灭、症状的去除，肺炎治愈，身体也就能够恢复健康了。

病人吃了药或者打了针，药物是通过直接的和间接的作用起到治病的目的，像心脏病严重时产生的心力衰竭，病人因缺氧而气急、口唇发紫，还可出现水肿等症状。当口服或注射了强心药物后，药物直接接触心脏，加强心脏肌肉的收缩力，提高心脏的功能，这就是强心药的直接作用，通过强心作用可使心力衰竭病人的小便量增多，水肿消失，那便是强心药的间接作用。

大多数的“化学武器”在适当的剂量时，能像“导弹”一样识别“打击”目标，只对某些组织或器官起作用，而对其他组织或器官则作用很小或几乎没有影响，医学上叫做选择作用。强心药对心脏，就表

现高度的选择作用。

尽管“化学武器”在体内各行其道，可是总的说来，最基本的作用无非是增强或者减弱人体原有的生理功能。如果用了药物后，使原有生理功能增强的，医学上称为兴奋作用，反之用了使功能减弱的则称为抑制作用，如一个人得了失眠症，晚上睡不好觉，烦躁不安。吃了镇静药后，药物进入血液，受到镇静作用的中枢神经系统就会呈现抑制状态而达到睡着的效果。（詹家明）

服用西药要不要忌口？

服药忌口，是指用药期间需要注意的饮食禁忌。以往不少人总认为中医很讲究忌口，而西医则百无禁忌，其实不然。现举例如下：

生了贫血病，需服用富血铁片或硫酸亚铁片治疗，但不宜同时吃肥肉、肝脏、海带、花生仁、芝麻酱等油脂性食物，以免影响药物吸收，降低疗效。

用氨茶碱治疗哮喘时，不宜吃大豆、脱脂奶粉及鸡肉、牛肉、对虾、动物的肝肾等高蛋白食物，以防降低疗效。

服用健胃散、龙胆酊等健胃药，主要利用它们的苦味刺激味蕾，促使唾液和胃液分泌，以达到增进食欲、帮助消化的目的。如果吃了糖或甜食，就会使药物失去作用。

用保泰松治疗关节炎期间，不可多食咸鱼、咸肉、腌菜等含有食盐的食物，因容易引起水肿和升高血压等不良反应。

服用四环素、土霉素时，不宜吃菠菜、黄瓜、胡萝卜和苏打饼干等碱性食物；服用红霉素等药物，不宜吃鱼、肉、鸡、蛋、酸菜及酸梅、山楂、橄榄、果子汁等酸性食物，不然药物会降低杀菌效果。同样道理用苯唑青霉素钠时，也不宜饮用鲜桔汁。

强力霉素和四环素、土霉素、红霉素及西米替丁等，都不宜与螺、蚌、蟹、甲鱼、海蜇、海带、咸鱼、荠菜和花生米、核桃仁、葵花子、豆制品、乳制品等一起服用，因为这些食物中，含有钙、镁、铁、磷等矿物质，它们和药物会结合成一种很难溶解吸收的物质，以致降低疗效。



应用强心药洋地黄、地高辛时，不能吃芹菜、田螺、海带、黑木耳及乳制品等食物，因这些食物中含有钙质，会增强这些强心药的毒性。

酒醉后千万不能用安定、利眠宁、水合氯醛等催眠药，否则会发生昏迷，甚至因呼吸衰竭而死亡。糖尿病人用药期间，少量饮酒会使药效降低，大量饮酒会出现严重低血糖反应，甚而昏迷死亡。服用阿司匹林不能饮酒，因会加重药物对胃的刺激和损害作用，使胃出血量增加，造成严重后果。服用痢特灵、利血平、异烟肼、氯霉素、灭滴灵、呋喃坦啶等，都不宜饮酒，否则会出现头痛、心慌、恶心、呕吐、腹痛、腹泻及呼吸困难、神志不清等现象。

少年甲状腺功能不足，可用甲碘安、干甲状腺等药物治疗，但需限制食用豌豆、黄豆、莴笋、油菜、菠菜、萝卜和水芹菜、卷心菜、大头菜等，不然会加重病情。

此外，西药不要用茶或咖啡送服，也不宜吸烟，以免影响药物的疗效。

（汪宗俊）

为什么有些中草药要加工处理后才能用？

一提到中草药，有人以为无非是将各种各样的植物采集起来，切碎、晒干，放进药罐熬煎一下就可服用的东西。事实并非如此，绝大部分中草药都须经过加工处理后才制成适合中医处方要求的药材。看一下中医的处方，可以发现医生开列的很多药名，第一字往往有“制”、“炙”、“炒”等，如“制半夏”、“炒白芍”、“炙甘草”等。这些加上去的字其实就是指该药材的加工方式。对于中草药各种加工方法，统称“炮制”。如果有机会参观一下中药厂的加工车间，一定会让你眼花缭乱：有的药材像食品厂制作食品那样，须要入锅加热炒、炙。炒药时，分别加入适量的蜂蜜、米醋或陈酒等，或拌以麸皮、铁砂等同炒。有的药材要用水洗、漂、浸；用火炮制的称煅，是将药材放在火里烧或将药材放在铁锅里密封，烧至锅里的药物变成焦黑色；还有将药材放在热水锅中边烧边拌后，取出晒干，称为燀；此外，还有用蒸、煮法，以及加另外的药物同制的，如加工硫磺用豆腐同煮，制半夏用生姜、明矾同制。另外，有些药材须去掉油质，有的要去掉表皮，……这些都属于中草药炮制范围。

炮制中草药除了使药材洁净，便于服用外，还有利于加工复制，如质地较硬的根块，不浸就没法切片，矿物类药不经火煅便不易研粉。更重要的是炮制能改变药物的性质，使有些药物的疗效增强、有些药物的毒性和副作用可以消除或减低，保证了用药的安全。例如麻黄这味药，含有两种主要成分，它的挥发油能发汗，麻黄碱有平喘作用。如果生用，挥发油发挥作用，就能发汗解表；如果蜜炙，则挥发油散失减少，麻黄碱仍被保留，加上添进去的蜂蜜又有润肺作用，就适宜于止咳平喘。又如延胡索，含有多种生物碱，有止痛作用，用醋炮制后，使醋和生物碱发生化学作用，生成水溶性的醋酸盐，有效成分容易被煎出。再如地黄，生用能凉血养阴，蒸制以后就变为补血滋阴药。何首乌，生用有通便、解疮毒作用，蒸制以后变成补肝肾的药。还有生姜也是一味中药，加糖煎服，有发汗散寒作用，如把生姜煨熟，即成

为另一味中药煨姜，它的原来性能改变，具有温中止呕的效力，适用于治疗胃寒呕吐和腹痛腹泻。这些通过炮制而增强或改变药物疗效的例子是很多的。

至于通过炮制消除或减轻药物的毒性、副作用，则例子更多，例如巴豆能消痰和导泻，但由于其毒性很强，能刺激肠道造成剧烈腹泻，必须经过炮制，榨去它的大部分油质，就使它的药性缓和些；半夏是一味治疗咳嗽多痰的良药，但生半夏有毒，吃了会引起口舌麻木、声音嘶哑，用生姜、明矾水炮制，就不再有毒性；生川乌有很大的毒性，吃了可以发生恶心，口舌、手脚发麻，一定要用生姜、皂角、甘草进行炮制，才能成为一味治疗风湿病的佳药。

从上面这些例子来看，可知中草药材的炮制是制作中药一项必不可少的工艺；同样一味药，药效好差，除了药物本身品质原因外，还和炮制的工艺有着密切的关系。（詹家明）

为什么烧煮中药时，有些药煮的时间要长，有些药煮的时间要短？

煮中药一般被认为是很简单的事情，其实是有一定法则的。我国著名药学家李时珍曾指出："凡服汤药，虽品物专精，修治如法，而煎药者鲁莽造次，火候失度，则药无功。"可见煮药是很有学问的。

中药种类繁多，按药的性质作用大体分为解表药、滋补药和矿物药等等门类，煎煮这些不同性质的药，方法就不同。要发挥药效，煮药的方法是要讲究的。

解表药是含有较多挥发性物质的中药，所以不宜久煮。像薄荷、荆芥、防风、细辛、独活、桑叶、紫苏、藿香、白芷等等都属解表药。煎煮解表药时会闻到一股药香，这就是具药效的挥发性物质。煮解表药

加水宜少，用猛火急煮片刻，气足势猛，药力就能发挥出来。

中药处方中有一种后下药，这种药的有效成分最易挥发，所以要在其他药将煮好时，才把后下药放入，只煮片刻就可饮用，这就是后下药的用意。像砂仁、豆蔻、沉香、薄荷等属后下药。



滋补药是指补气、补血和营养类药物。像党参、当归、生地、熟地、黄芪、杞子、淮山、首乌等等就属这一类。这些药物富含淀粉和蛋白质，所以煮这类中药宜先用适当的水浸泡一两小时，再用文火缓煮。煮这类药，水宜加多一些，时间煮长一些，煎出的药汁成分就高，药效就好。

中药中有不少矿物类和贝甲类药物，如石膏、磁石、赭石属矿物质中药，牡蛎、石决明、瓦楞子、龟板、鳖甲等则属贝甲类药物，这类药物多质地坚硬，所含的矿物质和微量元素不易在水里溶解药效成分难以煮出来，所以煮时要作特殊处理。这类药如研成粗末，则须先煲一二十分钟，再放入其它药物。如未研碎，则要煲 30 ～ 60 分钟才加入其它药物，否则药效成分就难保证煎出来。

有趣的是，具有荡涤胃肠积滞功能的大黄这味中药，一身兼含两种相互制约的成分：一种为大黄蒽醌甙有刺激肠道蠕动的作用，有较强的泻下作用，另为大黄鞣酸甙有收敛止泻功能。这味药煎的时间长短，竟然产生两种截然相反的效果，因为致泻的成分大黄蒽醌甙非常娇嫩，加热时间久，即遭分解，而大黄鞣酸能在高温环境中生存，所以为了达到通大便的目的，这药就要少煎一些时间，如果服了经过久熬的这种汤药，那就会引起便秘。因此每次看完病后，最好要向医生问清楚中药的煎法，并照着去做，那么肯定会收到好的效果。

（王缉民詹家明）

为什么中暑高热不宜使用发汗药？

发汗药又称作退热药，常用的有 APC、阿斯匹林、去痛片等，在许多发热性疾病中，服用 1 ～ 2 片后，出一身汗，可使体温下降，全身肌肉、关节酸痛改善，但在中暑高热病人身上使用，往往无济于事，这是什么缘故呢?



人是恒温动物，无论是天寒地冻，或是炎热如焚，体温都保持在 37℃ 左右，这是因为我们脑子里存在体温调节中枢进行调节的结果，体温过低时，皮肤血管收缩，减少散热，肌肉颤动发抖来增加产热，使体温增高；体温过高时，皮肤血管扩张，呼吸增快，加强出汗散热降温。中暑病人由于体温调节中枢发生功能障碍，不能通过发汗途径来散热，使用发汗药来退热是无济于事的。

遇到中暑高热病人，应迅速降温至 38℃ 左右。首先应让病人迅速离开高温环境，抬到凉爽通风的场所。如条件许可，最好将病人送到备有空调装置、室内温度 25℃ 左右的房间里，或用电风扇加强局部空气流动来散热，还可以用冰水或凉水擦皮肤，在腋下或大腿根部放凉水袋或冰块，这些物理降温方法对中暑高热者确有效果。药物降温可选用冬眠灵、非那根一类的药物，一般应在医院内进行，在应用过程中应同时输液，并注意观察血压、脉搏情况。

在使用上述方法治疗的同时，可吃些十滴水、人丹、藿香正气片

等，涂些清凉油，喝些含盐清凉饮料（如盐汽水、盐茶）、薄荷茶、决明子茶、焦大麦茶、金银花露、绿豆汤等，有清热祛暑的作用。（翁德立）

