한미약품 (128940.KS)

AASLD 2026: 기대치를 상회하는 MASH 데이터

Spot Comment | 2026. 11. 06

Analyst 한승연, CFA 02)768-7802, seungyeon.han@nhsec.com

에피노페그듀타이드(7mg) MASH 2b상 유효성과 안전성 모두 우수(vs 위고비)

- 금일 새벽 미국간학회(AASLD) 2026 Late Break 초록 공개. MSD(한미약품 파트너사)의 **에피노페그듀타이드(MK-6024) MASH 2b상에서 7mg 투여군에서 위약군 대비 주평가지표 및 부평가지표 통계적 유의성 모두 만족하는 성공적인 데이터 첫 발표**. 상세한 임상 결과는 11월 9일 구두발표에서 확인 가능(구두발표 관전 포인트: 7mg, 10mg 비단조적 용량-반응 원인)

- **[데이터]** MASH F2/F3 환자 381명 모집한 52주 2b상으로, 투여군은 3개 코허트(에피노 4mg, 7mg, 10mg)과 대조군(세마 2.4mg, 위약군)으로 구성. **에피노 7mg군은 섬유화 악화 없는 MASH 해소율(주평가지표) 63%, 지방간염 악화 없는 섬유화 1단계 이상 개선율(부평가지표) 52% 기록**. 위약 대비 차이는 각각 +49.5%p, +30.4%p로 모두 p<0.001 미만의 통계적 유의성 확보. 저용량 4mg 투여군도 두 지표에서 위약 대비 통계적 유의성 확보 성공(각 p<0.001, p=0.004). 한편, 고용량 10mg은 MASH 해소에서 유의한 결과(61%, p<0.001)를 보였으나 섬유화 개선(34%, p=0.072)은 유의성 미달

- **이상반응에 따른 투약 중단율은 에피노 4·7mg 투여군 3~4%로, 대조군 세마 2.4mg 및 위약군의 1%과 수치상 유사**. 반면, 에피노 10mg은 위장관계 부작용 발생률이 가장 높고 이상반응 중단율 11%(9명) 기록. 연구진은 7mg의 유익성·위험성 균형을 가장 양호하게 평가. 10mg의 높은 중단율 및 상대적으로 아쉬운 효능 관계 확인은 구두발표 확인 가능(주요인으로 고용량 높은 이상반응 중단에 따른 ITT 기준 낮은 유효성 연관 추정. 생검 누락률, 실제 투약 노출 감량 등 내용 확인 필요)

- **[해석] 에피노페그듀타이드 7mg군은 MASH F2/3기에서 당사 당초 기대했던 유효성과 안전성 수준 모두 상회. 1)유효성 측면** 위약군 대비 MASH 해소율 49.5%p, 섬유화 개선율 30.4%p로 **기존 경쟁 GLP/GCG 경쟁 사례(서보듀타이드 등)에서 확인되는 30~40%p 개선, 섬유화 개선 15~20%p를 크게 상회.** 특히, 이번 임상에 직접 대조군으로 MASH 적응증 허가받은 세마 2.4mg군 설정, MASH 해소율과 섬유화 개선율 각 53%, 25% 확인. 에피노 7mg투여군은 세마 2.4mg 대비 각 10%p, 27%p 상회(세마 투여군은 오픈라벨, 통계적 유월성 검정력은 미확인). 최근 높아진 MASH F2/3기 경쟁 속, 상업화된 세마 2.4mg 대비 우위의 경향성은 MSD의 MASH 대규모 3상 진입에 필요한 근거가 될 수 있음

- 한편, **2)안전성 관점** 에피노페그듀타이드 7mg군 이상반응 중단율 3~4% 역시 기대치 상회하는 수준. 최근 GLP/GCG 경쟁 약물 서보듀타이드는 비만 3상 SYNCHROIZE-1에서 이상반응 투여 중단율 3.6mg 투여군 24%, 6mg 25%(위약 5%) 기록(비만 임상 결과로 직접 비교는 어려우나, 내약성 관점 에피노 7mg는 매우 우수한 수준)

MSD의 3상 진입 가능성 상향, 추가로 F4기 확장 가능성 탐색도 주목

- **AASLD 2026 초록 데이터는 MSD 3상 진입 기대감 뒷받침하는 긍정적인 데이터(유효성, 안전성 모두) 판단**

- 한편, MSD는 에피노페그듀타이드로 이번 AASLD 초록에서 공개한 F2/3기 환자군 외 추가 간경변(F4c) 2a상도 진행('26년 8월 완료). F4기 2a상은 생검이 아닌 간지방 감소 및 NIT(ELF, PRO-C3, VCTE) 평가, AASLD 초록에는 미공개(구두발표에서 초기 데이터 포함 가능성 有, 다만 보수적으로 내년 초 공개 추정). MSD는 최근 높아진 MASH 경쟁 강도 고려하여 F4기 확장 가능성 여부 특히 관심(미충족 의료수요 및 높은 약가). **이번 F2/3기에서 우수한 섬유화 개선 효과 입증 성공, 추후 F4 2a상에서 F4기 확장성 단초(생검이 아니기에 가능성 탐색 목적) 확인 시, MSD의 3상 진입 가능성 더욱 높아질 것**

표1. 글로벌 주요 MASH 파이프라인 데이터 비교 정리(GLP-1타깃)

기업	파이프라인	단계	타깃	투여	Cut Off	MASH 단계	MASH 개선 환자 비중	간섬유화 개선 비중	지방간 감소율
Novo Nordisk	Semaglutide (2.4mg)	가속승인	GLP-1	SC, QW	72주차 (P3, Par1)	F2/3	**63%(vs 위약군 34%), 위약보정 29%(P<0.001)**	**37%(vs 위약군 23%), 위약보정 15%(P<0.001)**	-
Eli Lilly	tirpepatide	3상	GLP-1/GIP	SC, QW	52주차 (P2)	F2/3	5mg 44%, 10mg 56%m 15mg 62% (vs위약군 10%)	5mg 25%, 10mg 51%m 15mg 51% (vs 위약군 30%)	46%(5mg) 41%(10mg) 57%(15mg) 위약군(10%)
베링거/ 질랜드파마	survodutide	3상	GCG/GLP-1	SC, QW	48주차 (P2)	F1~3	**47%(2.4mg), 62%(4.8mg), 43%(6mg) (vs 위약군 14%)**	**34%(2.4mg),36%(4.8mg), 34%(6mg) vs 위약 22%(p-value 미공개)**	+30% 개선 63%(2.4mg), 67%(4.8mg) 57%(6.0mg) 위약군 14%
MSD/ 한미약품	**efinopegdutide**	**2b상 완료**	**GLP-1/GCG**	**SC, QW**	**52주차 (P2b)**	**F2/3**	***MASH 해소율 61%(10mg)/63%(7mg)/56%(4mg) (vs 위약군 13%)**	**34%(10mg)/52%(7mg)/43%(4mg) (vs 위약군 21%)**	**73%(+30% 개선 82%)**
Alti-mmune	Pemvidutide	3상	GLP-1/GCG	SC, QW	24주 (P2b 탑라인)	F2/3	*MASH 해소율 59.1% (1.2mg)/ 52.1% (1.8mg)vs 19.1% (위약군)	31.8% (1.2mg) 34.5% (1.8mg) vs 25.9% (위약군) (p-value 미달)	58.0% (1.2mg) 62.8% (1.8mg) vs 16.2% (위약군)
디앤디 파마텍	DD01	2상	GLP-1/GCG	SC, QW	12주차	F1~3			**62%**(vs 8%) **76%**(vs 12%) **(30% 이상 개선)**

자료: 각 사, NH투자증권 리서치본부

표2. Efinopedutide 2b상 AASLD 발표 주요 결과

세부 항목	에피노페그듀타이드 4mg	에피노페그듀타이드 7mg	에피노페그듀타이드 10mg	세마글루타이드 2.4mg	위약
MASH 해소 및 섬유화 악화 없음	56%	63%	61%	53%	13%
반응자/분모(mITT1)	31/55	31/49	35/57	26/49	7/53
위약 대비 차이(초록 보고)	+43.0%p	+49.5%p	+47.8%p	미제시	-
차이의 95% CI(%p)	25.7~57.8	31.4~64.2	30.7~62.0	미제시	-
위약 대비 p값	<0.001	<0.001	<0.001	미제시	-
섬유화 ≥1단계 개선 및 MASH 악화 없음	43%	52%	34%	25%	21%
반응자/분모(mITT2)	32/75	39/75	26/77	16/65	16/77
위약 대비 차이(초록 보고)	+21.7%p	+30.4%p	+13.0%p	미제시	-
차이의 95% CI(%p)	7.1~35.7	15.4~44.3	-1.2~26.8	미제시	-
위약 대비 p값	0.004	<0.001	0.072	미제시	-
AE에 따른 투약 중단	두 군 3~4% 범위	두 군 3~4% 범위	9명(11%)	1명(1%)	1명(1%)


자료: 각 사, NH투자증권 리서치본부

표3. 에피노페그듀타이드 F2/3기 임상 분석 환자군 구분

구분	평가 목적	기저 Read2 기준	분석 대상	7mg군	종료 생검 결축 처리
mITT1	MASH 해소	NAS 3 이상, 지방증·소엽 염증·풍선변성 각 0 초과	263명 (381명의 69%)	49명	비반응
mITT2	섬유화 개선	섬유화 F1~F4	369명 (381명의 96.9%)	75명	비반응


자료: 각 사, NH투자증권 리서치본부

그림1. Efinopedutide 2b상 AASLD 발표 MASH 해소율



자료: AASLD, NH투자증권 리서치본부

그림2. Efinopedutide 2b상 AASLD 발표 섬유화 개선율



자료: AASLD, NH투자증권 리서치본부

종목 투자등급(Stock Ratings) 및 투자등급 분포 고지

1. 투자등급(Ratings): 목표주가 제시일 현재가 기준으로 향후 12개월간 종목의 목표수익률에 따라
   - Buy : 15% 초과
   - Hold : -15% ~ 15%
   - Sell : -15% 미만

2. 당사의 한국 내 상장기업에 대한 투자의견 분포는 다음과 같습니다. (2026년 9월 30일 기준)
   - 투자의견 분포

Buy	Hold	Sell
90.7%	9.3%	0.0%

- 당사의 개별 기업에 대한 투자의견 분포는 매 분기말 기준으로 공표하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 '한미약품'의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 " 한미약품 " 을(를) 기초자산으로 하는 ELW의 발행회사 및 LP(유동성공급자)임을 알려드립니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.