

INVESTOR RELATIONS 2026

**GLOBAL LEADER
OF INNOVATIVE
THERAPEUTIC SOLUTION
FOR UNMET CLINICAL NEEDS**


NEXTBIOMEDICAL



고분자 기술

Polymer Technology

Nexpowder™



내시경 지혈용
고분자 분말 지혈재

적응증 소화기 출혈의 지혈 및 예방

상용화 파트너



신규 개발 제품



Nexpowder™-T

API 탑재로 지혈 성능 강화

Nexsphere™



분해시간 조절
혈관 색전 치료재

적응증 간암, 자궁근종, 출혈

상용화 파트너

국가별 개별 영업

신규 개발 제품



약물 방출 색전제

물리적 색전 + 치료 성능


Nexsphere-F™




속분해성
통증 색전 치료재

적응증 관절염 및 스포츠 통증

상용화 파트너



Platform Technology



약물 전달 플랫폼

Key Technology

- 적응증별 분해시간 약물 방출 제어
- 다양한 약물 탑재 가능
- Scale-up 용이

➔ **하나의 플랫폼 (One Platform)**
다양한 혁신 제품
(Endless Innovation)

신규 개발 제품



플랫폼 기술

DDS 기반 플랫폼 기술 확장

CEO



Don Haeng Lee CEO
MD, Ph.D.

- CEO, NEXTBIOMEDICAL CO., LTD.
- Professor of Gastroenterology, Inha Univ. Hospital

"의사 시절 직접 경험한 Clinical Unmet Needs 기반
혁신형 치료제 개발부터 사업화 총괄."

Executive Clinical Leadership Team

CMO



Ziv Haskal / MD

Interventional Radiologist
Univ. of Virginia School of Medicine, US

CMA



Joo Ha Hwang / MD, Ph.D.

Gastroenterologist Stanford Univ.
School of Medicine, US



Yasuaki ARAI
MD, Ph.D

Interventional Radiologist
National Cancer Center, JP



Yuji OKUNO
MD, Ph.D

Interventional Radiologist
Okuno Clinic, JP




Siddharth A. PADIA MD

Interventional Radiologist
UCLA Health, US



Federico Collettini
MD

Interventional Radiologist
Charité Hospital, DE



Osman Ahmed
MD

Interventional Radiologist
Chicago Medicine, US



Raman Uberoi
MD

Interventional Radiologist
Oxford Univ. UK


대표제품

혁신적이고 독창적인 기술로 기존 치료재의 한계를 극복하고 있습니다



Nexpowder™

내시경 지혈재
소화기관 출혈




Nexsphere™

분해시간 조절 혈관 색전 치료재
간암, 자궁근종



Nexsphere™-F

속분해성 통증 색전 치료재
관절염 통증



파트너사



Medtronic



Century Medical, Inc.



파트너사



2026년 2분기 매출

QoQ +20% YoY +24% 수출 95%

4,936
백만원

수출 중심의 매출 증가

Nexpowder™ 80.4% Nexsphere-F™ 10.5%
Nexsphere™ 2.7%수출 비중
95.1%


R&D 집중 투자에 따른 이익 감소

FDA 허가용 임상시험 및 R&D 투자


영업손실
1,034백만원

기간별 매출 추이

(단위 : 백만원)




2Q26 제품별 매출 실적(YoY)




■ Nexpowder ■ Nexsphere & Nexsphere-F

Nexpowder



Nexsphere & Nexsphere-F



Nexpowder™ : 내시경용 위장관 분말 지혈재



- 위장관 출혈 시 내시경적 지혈 및 용종 절제 후 출혈 예방이 가능한 제품
- 높은 초기 지혈 성공률
- 낮은 재출혈율
- 낮은 파우더 분산과 카테터 막힘 현상

Medtronic

글로벌 의료기기회사

Medtronic 판매
미국, 유럽 등 사용 중



NEXT
BIOMEDICAL

Medtronic Earnings Release

2Q26



Endoscopy: HSD growth with strength in Esophageal driven by Nexpowder™ endoscopic hemostasis system, Manometry, and strong market adoption of Endoflip™ 300 system; Low-30s growth in GI Genius, Intelligent endoscopy module

3Q26



Endoscopy: 10% growth driven by Nexpowder™ endoscopic hemostasis system and continued strong market adoption of Endoflip™ 300 system leading to steady consumable growth

4Q26



Endoscopy: HSD growth driven by continued strong market adoption of Endoflip™ 300 system and Nexpowder™ endoscopic hemostasis system.

confidential

위장관 지혈 후 재출혈 10-30% 발생

재출혈 발생 원인

① 위산 분비

위산이 지혈 부위를 자극하여
지혈 부위 손상 및 재출혈 유발



② 연동 운동

위장관의 연동운동으로
지혈 부위가 벌어지거나 손상



③ 시술자의 숙련도

시술자의 숙련도에 따른
불완전한 지혈로 재출혈 발생



임상적 미충족 수요 해결


① 기존 지혈술로 지혈

클립, 전기 소작술 등으로 지혈




② 넥스파우더 도포

출혈 부위 및 지혈 부위 파우
더 타입 지혈재 도포



③ 재출혈 예방

넥스파우더가 물리적 Barrier
형성하여 위산으로부터 보호



보호 밴드 역할

- 위산으로부터 보호
- 연동운동 충격 완화
- 지혈 부위 상처 보호

The Effect of Nexpowder in Reducing Post-ESD Coagulation Syndrome in Proximal Colon Lesions: A Retrospective Multicenter Study

Won Myung Lee¹ | Jongbeom Shin² | Gyeol Seong³ | Boram Cha² | Jin Hee Maeng⁴ | Kye Sook Kwon² | Bong Min Ko¹

¹Digestive Disease Center and Research Institute, Department of Internal Medicine, SoonChunHyang University School of Medicine, Bucheon, Republic of Korea | ²Digestive Disease Center, Department of Internal Medicine, Inha University School of Medicine, Incheon, Republic of Korea | ³Digestive Disease Center, Department of Internal Medicine, Nowon Eulji Medical Center, Eulji University School of Medicine, Seoul, Republic of Korea | ⁴Utah-Inha DDS & Advanced Therapeutics Research Center, Incheon, Republic of Korea

Correspondence: Bong Min Ko (kopa9445@schmc.ac.kr)

Received: 30 January 2026 | Revised: 14 April 2026 | Accepted: 8 June 2026

Keywords: hemostatic powder | lower gastrointestinal bleeding | post-ESD coagulation syndrome

ABSTRACT

Background: Endoscopic submucosal dissection (ESD) is an established curative treatment for lateral spreading tumors and early colorectal cancer, but it can cause procedure-related complications such as post-ESD coagulation syndrome (PECS), which

may increase healthcare utilization, prolong hospitalization, and raise costs. Nexpowder (Incheon, Republic of Korea), a highly adhesive hemostatic powder applied for lower gastrointestinal bleeding, has demonstrated efficacy in preventing rebleeding. This study evaluated the effect of Nexpowder in preventing PECS after colorectal ESD for high-risk proximal lesions.

Methods: This retrospective multicenter study included patients who underwent ESD for proximal colorectal lesions from January 2024 to December 2024 for PECS high-risk lesions, excluding those with perforation, muscularis propria invasion, or severe comorbidities. Nexpowder was applied prophylactically in 35 patients (46.7%), while 40 patients (53.3%) served as the control group. Outcomes included the incidence of PECS, abdominal pain, fever, and elevated inflammatory markers requiring antibiotics.

Results: PECS occurred in nine patients overall. The incidence was significantly lower in the Nexpowder group (2.9% [CI 0.3–12.6]) than in the control group (20.0% [CI 9.9–34.2]; $p = 0.032$). All cases resolved with conservative treatment, and no surgical intervention was required.

Conclusion: The application of Nexpowder was associated with a significant reduction in the incidence of PECS after high-risk colorectal ESD. This study provides the first clinical evidence that a topical barrier agent may serve as a simple and effective preventive strategy for PECS.

Conclusion: The application of Nexpowder was associated with a significant reduction in the incidence of PECS after high-risk colorectal ESD. This study provides the first clinical evidence that a topical barrier agent may serve as a simple and effective preventive strategy for PECS.

Nexsphere™ & Nexsphere™-F : 분해시간 조절 혈관 색전재

질환에 따른 분해시간 조절 혈관 색전재 플랫폼 기술

Nexsphere™ 4주 분해



젤라틴 기반 혈관 색전재

- 구형의 균일한 입자
- 가교제 무첨가로 부작용 최소화
- 분해시간 조절 가능

적응증



간암

자궁근종

출혈

임상 논문

- **UFE(자궁근종색전)** : Radiology 게재, 장기간 추적 임상 진행
- **TACE(간암색전)** : European Journal of Radiology 게재, 서울아산병원 150명
- **cSDH(만성경막하혈종)** : SNIS 2026 구두발표

Nexsphere-F™ 2시간 분해



속분해성 관절염 통증 치료 혈관 색전재

- 골관절염 통증 치료를 위한 색전 치료재
- 속분해성으로 부작용 최소화
- 가교제 무첨가로 안전성 확보



무릎

어깨

팔꿈치

* 족저근막염, 아킬레스건염, 손목 등 근골격계에 사용 가능


적응증

임상 논문

- **GAE(무릎색전)** : Radiology 게재
- **Multiple Joint** : JVIR 게재
- **고관절, 인공관절 치환술 후 색전 등** : CVIR 등 다수 저널 확보

카테터를 이용해 혈관 내로 색전 물질을 넣어 특정 병변(암, 근종 등)으로 가는 혈류를 차단함으로써
병변을 괴사시켜 질환을 치료하고 증상을 개선하는 최소침습 시술

카테터 삽입



색전 물질 주입



혈류 차단 및 병변 괴사



1세대




간암

출혈

생명 위협 질환 중심의
혈관 색전 치료 시작

2세대



자궁근종

전립선비대증

비뇨·생식기 질환으로
적응증 확대


3세대



근골격계

근골격계 통증 치료로
적응증 혁신

4세대

경막하혈종
(SDH)

갑상선

신경·내분비 영역으로
새로운 치료 패러다임 창출

근골격계 동맥 색전술(MSK Embolization)

통증의 원인이 되는 비정상 신생혈관을 색전하여 통증을 감소

STEP 1

1 Femoral/Radial access

대퇴동맥 또는 요골동맥 접근

STEP 2

2 Guidewire navigation

가이드와이어를 이용한 병변 부위 접근

STEP 3


3 Microcatheter Tracking

마이크로카테터를 병변 부위신생혈관에 위치

STEP 4

4 Embolic Agent Injection

색전물질 주입



NBM & Ashai Intecc

완제품 수출 및 일본 독점 판매 네트워크 확보



완제품 수출 & 일본 판매 네트워크 확보



일본 독점 판매



강력한 판매 네트워크

마이크로카테터



미세 혈관 내 정밀한 접근


가이드와이어



혈관 내 기기 이동 유도


FYE June 2025 Revenue JPY

Device Division
JPY 12bn



Medical Division
JPY 108bn

Activate in over 120 countries





Overview(2025.03.31 기준)

- 설립 1921년
- 본사 일본 도쿄
- 자본금 JPY 38.7 billion(원화 기준 3,583억원)
- Fiscal year end March 31
- 사업부
 - Cardiac and Vascular Company
 - Medical Care Solutions Company
 - Blood and Cell Technologies Company
- 대표 제품
 - Catheters, Guidewire, Microspheres, etc.

사업부별 매출(FY2024)




지역별 매출(FY2024)




<https://www.terumo.com/investors/library/annual-reports>

Broadening Focus : From Knee OA to Tendon Disease, including Sports Injuries



관절염 통증 치료 시장 구조





Knee

Publication	Indication
A precision approach: selective genicular artery embolization for knee pain in chronic tophaceous gout(2025) https://doi.org/10.1093/rheumatology/keaf153	Knee pain
Transarterial embolization for medial tibial enthesitis in refractory pes anserinus tendinopathy(2025) https://doi.org/10.1007/s10067-025-07566-x	Tendinopathy
Genicular Artery Embolization Using Resorbable Gelatin Microspheres for Refractory Knee Pain: Technique, Safety and Clinical Outcome(2025) https://doi.org/10.1007/s00270-025-04274-6	Post-TKR pain
Bridging the gap to arthroplasty: genicular artery embolization and semaglutide in a patient with severe obesity and refractory knee osteoarthritis(2025) https://doi.org/10.1080/03009742.2025.2547454	Knee OA with severe obesity
Genicular Artery Embolization Using Rapidly Resorbable Gelatin-based Microspheres for Osteoarthritis-related Knee Pain(2026) https://doi.org/10.1148/radiol.253312	Knee OA



Patellar Tendinopathy

Publication	Indication
Transcatheter Arterial Embolization of Abnormal Neovessels for Patellar Tendinopathy: A Safety Evaluation(2025) https://doi.org/10.1177/23259671251337093	Patellar Tendinopathy




Hip

Publication	Indication
Transcatheter Periarticular Embolization via Brachial Artery Access in Elderly Patients With Primary Hip Osteoarthritis: A Pilot Prospective Analysis(2025) https://doi.org/10.7759/cureus.96060	Hip OA
Transarterial Embolization for the Treatment of Symptomatic Hip Osteoarthritis(2026) https://doi.org/10.1007/s00270-026-04448-w	



Others

Publication	Indication
Comparative Safety of 3 Temporary Embolic Agents in Transcatheter Arterial Embolization for Degenerative, Inflammatory, and Overuse Joint Disorders(2025) https://doi.org/10.1016/j.jvir.2025.02.031	Overuse injuries, Knee OA, Frozen shoulder, Rotator cuff tear, Foot joints, etc.
Transarterial Embolization for Refractory Overuse Sports injury: Pictorial Case Reports(2023) https://doi.org/10.1007/s00270-023-03496-w	Overuse sports injuries(Patellar Tendinopathy, Plantar fasciitis, etc.)



Total Patients in the EU & JP ≈ 840



- 글로벌 KOL의 자사 제품 임상 적용 사례 발표 및 러닝센터 운영 (KOL 7인, 11개 세션)
- 글로벌 의료기기 기업과의 전략적 파트너십 협의
- 유럽 주요 대리점과의 사업 확대 및 협력 미팅

< CIRSE Learning Center 프로그램 >

9/6(Sun)		9/7(Mon)		9/8(Tue)	
10:00 – 11:00	MSK Clinical Evidence Prof. Federico Colletini(DE)	10:00 – 11:00	GAE for Post-TKA Prof. Federico Colletini(DE)	10:00 – 11:00	Degradable Gelatin Microspheres for Conventional TACE: Clinical Outcomes of Different Time Formulation (2-Hour, 24-Hour, and 2-Week) Prof. Dong-Il Gwon (KR)
11:00 – 11:30	Hands-on 'Preparation of Nexsphere & Nexsphere-F'	11:00 – 11:30	Hands-on 'Preparation of Nexsphere & Nexsphere-F'	11:00 – 11:30	Hands-on 'Preparation of Nexsphere & Nexsphere-F'
11:30 – 12:30	Patient Selection and Clinical Evidence in Hip Embolization Dr. Pedro Marinho Lopes (PT) and Dr. Frederico Cavalheiro (PT)	13:00 – 14:00	MSKE Multidisciplinary Approach Dr. Florian Fleckenstein (DE) and Prof. Tazio Maleitzke (DK)	11:30 – 12:30	MSKE for Shoulder Dr. Sebastian Ebel (DE)
13:00 – 14:00	GAE for OA Prof. Osman Ahmed (US)	14:00-14:30	Hands-on 'Preparation of Nexsphere & Nexsphere-F'	13:00 – 14:00	TAME for Tendinopathy Using Nexsphere-F Dr. Yuji Okuno (JP)
14:00-14:30	Hands-on 'Preparation of Nexsphere & Nexsphere-F'	15:00 -16:00	Technical Aspects and Procedural Strategy in Hip Embolization Dr. Pedro Marinho Lopes (PT) and Dr. Frederico Cavalheiro (PT)	14:00-14:30	Hands-on 'Preparation of Nexsphere & Nexsphere-F'
14:30 – 15:30	Shifting the Paradigm in Fibroid Embolization: Safety, Clinical Outcomes, and Long-Term Horizon of Nexsphere™ Prof. Man-Deuk Kim (KR)				
	Resorbable Nexsphere Microspheres for UAE in Daily Practice: Advantages, Tips and Tricks Dr. Paul Noël Marie Lohle (NL)				

confidential

통증 색전 치료 미립구: Nexsphere-F™

미국 시장 진출을 위해 저명한 CMO와 함께 미국 허가용 임상시험을 추진하고 있습니다.

미국 임상시험 계획

NCT06872567



지브하스칼CMO

임상시험 개요

“지브하스칼 CMO는 색전 치료의 권위자이자 FDA 인허가 전문인으로 인허가 대응 중”

- 시험: The RESORB Trial (Resorbable Embolization MicroSpheres for Osteoarthritis Benefit)
- 목적: Nexsphere™-F를 사용한 무릎동맥 색전술의 안전성 및 유효성 평가
- 미국 15개 병원, 126명 무릎 관절염 환자대상


FDA 인허가 진행 예상 타임라인

약 70% 환자 등록

현재

Primary Endpoint(평가변수)

- WOMAC (통증 및 기능 개선)
- VAS (통증 개선)



* 타임라인은 예상 일정이며 임상 진행 상황에 따라 변동 될 수 있음



FDA 전략적 소통

01



Breakthrough
Device Designation

02



IDE CMS
(Category B)

03




TAP
(Total Product Life Cycle
Advisory Program)

Nexsphere-F™ Clinical Data: Germany

Radiology

Genicular Artery Embolization using Rapidly resorbable, gelAtin-based miCrospheres in osteoarthritis-related knEe pain (GRACE Trial) (194명)

임상 형태	전향적 임상시험
환자군	무릎 골관절염 환자 (n=194명, 시술 건수=239명)
시험군	Nexsphere-F™
시험 목적	무릎 골관절염 환자에 대한 Nexsphere-F를 사용한 무릎 동맥 색전술의 효과 및 안전성 평가



Radiology 2026; 319(3):e25331 <https://doi.org/10.1148/radiol.253312>

NRS (Numeric Rating Scale)



- 통증의 강도를 0-10점으로 평가하는 통증 지표
- 점수가 높을수록 통증이 심하며, 점수가 낮을수록 통증이 감소한 것을 의미

0 ● —————> 10
통증 없음 매우 심한 통증

KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score)



- 무릎 통증, 기능 및 삶의 질을 종합적으로 평가
- 일상적인 활동 수행 능력 평가, 점수가 높을수록 기능이 우수한 것을 의미 (ADL)
- 무릎 문제로 인한 삶의 질 영향 평가, 높을수록 삶의 질 향상 의미 (QoL)



0 ● —————> 100
극심한 증상 (최악의 상태) 증상 없음 (최상의 상태)

Nexsphere-F™ Clinical Data: Germany

CVIR

Genicular Artery Embolization Using Resorbable Gelatin Microspheres for Refractory Knee Pain
: Technique, Safety and Clinical Outcome (45명)

임상 형태	전향적, 단일기관 임상 시험
환자군	무릎 골관절염 (중증의 골관절염 및 인공관절치환술 후 통증 지속 환자)
시험군	Nexsphere-F™
시험 목적	중증의 무릎 골관절염 및 인공관절 치환술 후 지속 통증 환자에 있어 흡수성 색전 물질을 사용한 무릎 동맥 색전술의 안전성 및 기술적, 임상적 결과 평가



Peter Minko et al. CardioVascular and Interventional Radiology, 49(2), 10.1007/s00270-025-04274-6

NRS (Numeric Rating Scale)



- 통증의 강도를 0-10점으로 평가하는 통증 지표
- 점수가 높을수록 통증이 심하며, 점수가 낮을수록 통증이 감소한 것을 의미

0 ● —————> 10
통증 없음 매우 심한 통증

KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score)



- 무릎 통증, 기능 및 삶의 질을 종합적으로 평가
- 무릎 통증 정도 평가, 점수가 높을수록 통증이 적은 것을 의미 (Pain)

0 ● —————> 100
극심한 증상 (최악의 상태) 증상 없음 (최상의 상태)

JVIR

Comparative Safety of Three Temporary Embolic Agents in Transcatheter Arterial Embolization for Degenerative, Inflammatory, and Overuse Joint Disorders (155명)

임상형태	후향적
환자군	퇴행성질환(예: 무릎관절염), 염증성질환(예: 회전근개파열), 과사용으로인한질환(예: 테니스엘보우, 족저근막염등)으로 발생하는관절질환환자
시험군	Nexsphere-F™ (RM), QS-GSP, IPM/CS
시험 목적	경동맥 색전술(TAE, Transcatheter Arterial Embolization) 시행 후 통증 완화 효과&안전성 평가


Table 5. Clinical success by embolization location and embolic used

Diagnosis	IPM/CS	QS-GSP	RM	P-value
Lateral epicondylitis	37/60 (61.7%)	43/72 (59.7%)	55/69 (79.7%)	0.023
Knee osteoarthritis	21/30 (70.0%)	10/14 (71.4%)	22/30 (73.3%)	0.96
Patellar tendinopathy	7/15 (46.7%)	10/14 (71.4%)	12/15 (80.0%)	0.136
Medial epicondylitis	7/15 (46.7%)	9/17 (52.9%)	7/12 (58.3%)	0.832
Frozen shoulder	9/10 (90.0%)	5/8 (62.5%)	2/4 (50.0%)	0.227
Plantar fasciitis	3/3 (100.0%)	1/1 (100.0%)	6/7 (85.7%)	0.73
Achilles tendinopathy	4/7 (57.1%)	0	2/2 (100.0%)	0.24

Clinical success was defined as “much improved” and “very much improved” ratings in patient global impression of change at 6 months after TAE.


Safety

색전부위 통증 지속 비율
(7일 이상)



Efficacy

NRS 감소율
(Numeric Rating Scale)




van Zadelhoff, Tijmen A., Okuno Yuji. et al. JVIR. 2025 Mar 1:S1051-0443(25)00223-4.

Nexsphere-F™ Clinical Data: Hip OA (GERMANY)

CVIR

Transarterial Embolization for the Treatment of Symptomatic Hip Osteoarthritis (41명)

임상형태	후향적, 단일기관
환자군	고관절골관절염환자
시험군	Nexsphere-F™ 또는 IPM/CS
시험 목적	고관절골관절염환자를대상으로 경동맥색전술(TAE)의증기적통증완화효과및기능 개선 효과평가



Fleckenstein, F.N., Maleitzke, T., Oehme, S. et al. Cardiovasc Intervent Radiol (2026).

<https://doi.org/10.1007/s00270-026-04448-w>

NRS (Numeric Rating Scale)



- 통증의 강도를 0-10점으로 평가하는 통증 지표
- 점수가 높을수록 통증이 심하며, 점수가 낮을수록 통증이 감소한 것을 의미

0 ● —————> 100
통증 없음 매우 심한 통증

HOOS (Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score)



- 고관절 통증과 기능을 종합적으로 평가하는 지표
- 점수가 높을수록 고관절 기능이 우수함을 의미

0 ● —————> 100
극심한 증상 (최악의 상태) 증상 없음 (최상의 상태)

“세계가 인정한 **임상 근거**가 넥스트바이오메디컬의 경쟁력입니다”

Nexpowder



GUT 소화기분야
최고저널



글로벌 임상근거

- 다수의 임상투자 및 연구
- 글로벌 임상근거 축적
- 상위랭킹 논문 포트폴리오 구축



confidential

R&D 기반 혁신제품 확대

- 기존에 없는 혁신적 제품
- 독자적 플랫폼 기술을 바탕으로 혁신 제품 지속 개발 및 확장

각 분야
TOP-TIER
저널 게재
★★★★★

지속 가능한 매출 성장

- 수출 기반 매출 성장
- 글로벌 시장 진출을 통한 지속 성장 실현

Nexsphere & Nexsphere-F



- ① UFE (자궁근종): Radiology
- ② TACE (간암): European Radiology
- ③ GAE (무릎 관절염): Radiology

재무상태 요약

재무상태표

(단위 : 백만원)

항목	2023 FY	2024 FY	2025 FY	1H26
유동자산	17,968	46,888	43,267	44,236
비유동자산	11,675	11,957	15,998	19,342
총자산	29,643	58,844	59,265	63,579
유동부채	33,786	11,884	8,044	8,819
비유동부채	1,759	1,769	3,115	5,597
총부채	35,544	13,653	11,158	14,416
자본금	3,174	4,043	4,102	4,139
자본잉여금	61,632	107,234	111,130	114,506
기타자본	2,277	4,095	3,472	1,892
이익잉여금	(72,984)	(70,181)	(70,597)	(71,375)
자본총계	(5,901)	45,191	48,107	49,162

손익계산서

(단위: 백만원)

항목	2023 FY	2024 FY	2025 FY	1H26
매출액	4,882	9,542	16,477	9,057
매출원가	2,774	3,720	4,948	2,768
매출총이익	2,109	5,822	11,528	6,289
판매비	7,335	9,397	12,248	8,514
영업이익	(5,226)	(3,575)	(720)	(2,225)
기타수익	171	289	297	210
기타비용	148	174	273	355
금융수익	724	6,840	1,462	1,761
금융비용	3,043	520	1,078	169
법인세차감전순이익	(7,522)	2,860	(311)	(779)
법인세비용	-	-	-	-
당기순이익	(7,522)	2,860	(311)	(779)

Note 1) K-IFRS

Note 2) Impaired capital was resolved after May 2024 by converting redeemable convertible preference shares to common shares.

confidential



THANK YOU

(주)넥스트바이오메디컬

A global R&D company that leads innovative medical therapeutic materials