여기에서 $\cos \theta$ 는 **코사인(cosine)**이라고 하는 함수이다. 코사인은 사인(sine)이라고 하는 함수와 함께 정의할 수 있다. 사인과 코사인을 합쳐서 삼각함수라고 한다.

사인 $\sin\theta$ 의 값은 θ 라는 각을 가지는 직각 삼각형에서 빗변(hypotenuse)과 높이(opposite)의 비율을 뜻한다. 코사인 $\cos\theta$ 의 값은 θ 라는 각을 가지는 직각 삼각형에서 빗변(hypotenuse)과 밑변(adjacent)의 비율을 뜻한다.

$$\sin \theta = \frac{a}{h} \tag{3.1.16}$$


$$\cos \theta = \frac{b}{h} \tag{3.1.17}$$

삼각비

C=90°인 직각삼각형 ABC에 관하여 $\sin_{10}\cos_{10}$ 아래와 같이 정의된다.


$$\sin A = \frac{\pm 0}{$$
 빗변 $= \frac{a}{c}$ 그러므로 $\cos A = \frac{ }{ }$ 밀변 $= \frac{b}{c}$ 그러므로 $\cos A = \frac{ }{ }$ 밀변 $= \frac{b}{c}$ 그러므로 $\cos A = \frac{ }{ }$ 밀변 $= \frac{a}{b}$ 그러므로 $\cos A = \frac{ }{ }$ $= \frac{a}{b}$ 그러므로 $\cos A = \frac{ }{ }$ $= \frac{a}{b}$ $\cos A = \frac{ }{ }$ $= \frac{a}{b}$

X 3年 3月 37年 安水县, 小园外 程 4年 公约日 公公日午 马3건 安叶.



예각의 삼각비

예각의 삼각비를 구할 때 제일 중요한 건 바로 반지름의 길이가 1인 원을 그려서 생각하는 거에요.



반지름이 1인 원의 중심과 원 위의 한 점, x축을 연결해서 삼각형을 만들었어요.

위 그림에서 $\angle x$ 를 기준각으로 하고 삼각비를 구해보죠. sin, cos은 \triangle OAB에서 구하고 tan는 \triangle OCD에서 구해요. 크기가 다른 직각삼각형이라도 기준각의 크기가 같으면 삼각비는 같잖아요.

$$sin x^{\circ} = \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}} = \overline{AB} \qquad (\because \overline{OB} = 1) \qquad \overrightarrow{X} \quad \stackrel{\sim}{\mathcal{H}} \quad \stackrel{\sim}{\mathcal{$$

그러니까 예각의 삼각비를 구할 때는 분모가 되는 변의 길이가 1인 삼각형을 찾고 그 삼각형에서 삼각비를 찾으면 돼요. sin과 cos인 빗변이 분모가 되니까 빗변의 길이가 1인 △OAB에서 구했어요. tan는 밑변이 분모가 되므로 밑변의 길이가 1인 △OCD에서 구했고요.