



信息安全数学基础

第七章 椭圆曲线

熊 虎

电子科技大学



第七章 椭圆曲线



7.1 椭圆曲线密码体制

7.1.1 实数域上的椭圆曲线



7.1.2 有限域上的椭圆曲线

7.1.3 椭圆曲线上的**ElGamal**加密体制



7.1.2 有限域上的椭圆曲线



椭圆曲线密码体制使用的是有限域上的椭圆曲线,即变量和系数均为有限域中的元素。有限域 $GF(p)$ 上的椭圆曲线是指满足方程

$$y^3 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

的所有点 (x, y) 再加上一个无穷远点 O 构成的集合,其中, a, b, x 和 y 均在有限域 $GF(p)$ 上取值, p 是素数。这里把该椭圆曲线记为 $E_p(a, b)$ 。该椭圆曲线只有有限个点,其个数 N 由 **Hasse** 定理确定。



7.1.2 有限域上的椭圆曲线



定理7.1 (Hasse定理) 设 E 是有限域 $GF(p)$ 上的椭圆曲线, N 是 E 上点的个数, 则

$$p + 1 - 2\sqrt{p} \leq N \leq p + 1 + 2\sqrt{p}$$

当 $4a^3 + 27b^2 \pmod{p} \neq 0$ 时, 基于集合 $E_p(a, b)$ 可以定义一个 **Abel** 群, 其加法规则与实数域上描述的代数方法一致。设 $P, Q \in E_p(a, b)$, 则

(1) $P + O = P$ 。

(2) 如果 $P = (x, y)$, 那么 $(x, y) + (x, -y) = O$, 即点 $(x, -y)$ 是 P 的加法逆元, 表示为 $-P$ 。

(3) 设 $P = (x_1, y_1)$ 和 $Q = (x_2, y_2)$, $P \neq -Q$, 则 $S = P + Q = (x_3, y_3)$ 由以下规则确定:



7.1.2 有限域上的椭圆曲线



$$\begin{aligned}x_3 &\equiv \lambda^2 - x_1 - x_2 \pmod{p} \\ y_3 &\equiv \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}\end{aligned}$$

式中

$$\lambda \equiv \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p}, & P \neq Q \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \pmod{p}, & P = Q \end{cases}$$

(4) 倍点运算定义为重复加法, 如 $4P = P + P + P + P$ 。



7.1.2 有限域上的椭圆曲线



例7.1 设 $p = 11, a = 1, b = 6$,即椭圆曲线方程为

$$y^2 \equiv x^3 + x + 6 \pmod{11}$$

要确定椭圆曲线上的点,对于每个 $x \in GF(11)$,首先计算 $z \equiv x^3 + x + 6 \pmod{11}$,然后再判定 z 是否是模11的平方剩余(方程 $y^2 \equiv z \pmod{11}$ 是否有解),若不是,则椭圆曲线上没有与这一 x 相对应的点;若是,则求出 z 的两个平方根。该椭圆曲线上的点如表7.1所示。



7.1.2 有限域上的椭圆曲线



表7.1 椭圆曲线 $y^2 \equiv x^3 + x + 6 \pmod{11}$ 上的点

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x^3 + x + 6 \pmod{11}$	6	8	5	3	8	4	8	4	9	7	4
是否是模 11 的平方剩余	否	否	是	是	否	是	否	是	是	否	是
y			4	5		2		2	3		2
			7	6		9		9	8		9



7.1.2 有限域上的椭圆曲线



只有 $x = 2, 3, 5, 7, 8, 10$ 时才有点在椭圆曲线上, $E_{11}(1, 6)$ 是由表7.1中的点再加上一个无穷远点 O 构成, 即

$$E_{11}(1, 6) = \{O, (2, 4), (2, 7), (3, 5), (3, 6), (5, 2), (5, 9), (7, 2), (7, 9), (8, 3), (8, 8), (10, 2), (10, 9)\}$$

设 $P = (2, 7)$, 计算 $2P = P + P$ 。首先计算

$$\lambda \equiv \frac{3 \times 2^2 + 1}{2 \times 7} (\bmod 11) = \frac{2}{3} (\bmod 11) \equiv 8$$

于是

$$x_3 \equiv 8^2 - 2 - 2 (\bmod 11) \equiv 5$$

$$y_3 \equiv 8 \times (2 - 5) - 7 (\bmod 11) \equiv 2$$

所以 $2P = (5, 2)$ 。同样可以算出



7.1.2 有限域上的椭圆曲线



$$3P = (8, 3), 4P = (10, 2), 5P = (3, 6), 6P = (7, 9),$$

$$7P = (7, 2), 8P = (3, 5), 9P = (10, 9), 10P = (8, 8),$$

$$11P = (5, 9), 12P = (2, 4), 13P = O。$$

由此可以看出, $E_{11}(1, 6)$ 是一个循环群, 其生成元是 $P = (2, 7)$ 。



谢谢！