

PTP4 Zusammenfassung: Theoretische Quantenmechanik

Physik am Ende des 19. Jahrhunderts: Bekannte Wechselwirkungen ueberzeugend beschrieben: Gravitation in klassischer Mechanik durch Newton, Lagrange, Hamilton Elektromagnetismus durch Maxwell'sche Gleichungen

Ungeklarte Fragen:

- Widerspruch Galilei-Invarianz in kl. Mechanik (Geschwindigkeiten addiert) und Maxwell Elektrodynamik (Lichtgeschwindigkeit Obergrenze) aufgeloeset durch Lorentz Invarianz in Einsteins spezieller Relativitaetstheorie
- Stabilitaet der Atome (im Rutherford Modell) nicht erkluerbar
- diskrete Spektrallinien nicht erkluerbar
- Schwarzkoeerperstrahlung nicht beschreibbar (UV-Katastrophe)

Hohlraumstrahlung: Stehende Wellen im Hohlraum: Moden

Es sind $\frac{L}{\lambda}$ Wellen auf Strecke L moeglich

Anzahl abschaetzen:

Kugel ($V_{Kugel} = \frac{4}{3} * \pi * r^3$)

Zwei Polarisationsrichtungen: E und B Feld bringt Faktor zwei

Radius ist $\frac{L}{\lambda}$

$$N(\lambda) = 2 * \frac{4}{3} * \pi * \left(\frac{L}{\lambda}\right)^3$$

- *Dispersionsrelation*: $k = \frac{\omega}{c}$
- *Kreisfrequenz*: $\omega = 2 * \pi * \nu$
- *Wellenlaenge*: $\lambda = \frac{2 * \pi}{k}$