PTP4 Zusammenfassung Theoretische Quantenmechanik

Sommersemester 2017 Heidelberg

Ende des 19. Jahrhunderts beschrieb Physik ueberzeugend die bekannten Wechselwirkungen:

- Graviation in klassischer Mechanik durch Newton, Lagrange, Hamilton
- Elektromagnetismus durch Maxwell'sche Gleichungen
- Thermodynamik

Ungeklaerte Fragen:

- Widerspruch Galilei-Invarianz in kl. Mechanik (Geschwindigkeiten addiert) und Maxwell Elektrodynamik (Lichtgeschwindigkeit Obergrenze) aufgeloest durch Lorentz Invarianz in Einsteins spezieller Relativitaetstheorie
- Stabilitaet der Atome (im Rutherford Modell) nicht erklaerbar
- diskrete Spektrallinien nicht erklaerbar
- Schwarzkoerperstrahlung nicht beschreibbar (UV-Katastrophe)

Hohlraumstrahlung: Stehende Wellen im Hohlraum: Moden Es sind $\frac{L}{\lambda}$ Wellen auf Strecke L moeglich

Anzahl abschaetzen:

 $\text{Kugel} \left(V_{Kugel} = \frac{4}{3} * \pi * r^3 \right)$

Zwei Polarisationsrichtungen: E und B Feld bringt Faktor zwei

Radius ist
$$\frac{L}{\lambda}$$

 $N(\lambda) = 2 * \frac{4}{3} * \pi * (\frac{L}{\lambda})^3$

- Dispersions relation: $k = \frac{\omega}{c}$
- Kreisfrequenz: $\omega = 2 * \pi * \nu$
- Wellenlaenge: $\lambda = \frac{2*\pi}{k}$