

本文整理自 2024年广东省普通专升本（专插本）统考《高等数学》考生回忆版，附每道题的详细解析。虽然回忆版无法做到100%还原真题用词，但考点、数据、答案均与考试一致，是2025/2026届考生最接近真实考试的参考资料。

<!-- more -->

试卷结构（满分100分，120分钟）

题型	题量	分值	核心考查内容
一、单项选择题	5题	15分（3分/题）	极限、导数、积分比较、二次积分
二、填空题	5题	15分（3分/题）	高阶导数、微分、级数、参数方程
三、计算题	8题	48分（6分/题）	极限、求导、积分、级数、微分方程、二重积分

参考教材： 同济大学《高等数学》（第七版）+ 赵树嫄《微积分》（第四版）

一、单项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} =$ （ ）

A. 3 B. 1 C. -1 D. -3

答案：A

解析： 利用重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3$$

易错点： 部分同学会忘记补系数，直接写成 1。遇到 $\sin kx$ 必须凑成 $\frac{\sin kx}{kx} \cdot k$ 。

2. $f(x) = x^2 - \cos x$ ，则 $f'(\frac{\pi}{2}) =$ ()

- A. $\pi - 1$ B. π C. $\pi + 1$ D. 2π

答案：C

解析： 逐项求导：

$$f'(x) = 2x + \sin x$$

代入 $x = \frac{\pi}{2}$ ：

$$f'(\frac{\pi}{2}) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} = \pi + 1$$

考点： 基本求导公式—— $(\cos x)' = -\sin x$ ，所以 $(-\cos x)' = \sin x$ 。别漏掉负号。

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时， ax 与 $4x^3 - 3x^2 + 2x$ 是等价无穷小，则 $a =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

答案：B

解析： 等价无穷小的定义： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{4x^3 - 3x^2 + 2x} = 1$ 。

分子分母同除以 x ：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{4x^2 - 3x + 2} = \frac{a}{0 - 0 + 2} = \frac{a}{2} = 1$$

所以 $a = 2$ 。

****技巧:**** 当 $x \rightarrow 0$ 时, 只需保留**最低次幂**项。 $4x^3 - 3x^2 + 2x \sim 2x$ (x 是最低次幂), 直接得 $a = 2$ 。

4. 设 $I_1 = \int_0^1 e^x dx$, $I_2 = \int_0^1 e^{2x} dx$, $I_3 = \int_0^1 e^{3x} dx$, 则下列关系成立的是 ()

- A. $I_1 > I_2 > I_3$
- B. $I_1 > I_3 > I_2$
- C. $I_3 > I_1 > I_2$
- D. $I_3 > I_2 > I_1$

****答案: D****

****解析:**** 在 $[0, 1]$ 上, 当 $x > 0$ 时有 $e^x < e^{2x} < e^{3x}$ (因为指数函数的底 $e > 1$, 指数越大函数值越大)。定积分保序, 故 $I_1 < I_2 < I_3$, 即 $I_3 > I_2 > I_1$ 。

也可以算出具体值验证:

- $I_1 = e - 1 \approx 1.718$
- $I_2 = \frac{e^2 - 1}{2} \approx 3.195$
- $I_3 = \frac{e^3 - 1}{3} \approx 6.362$

5. 交换二次积分 $I = \int_0^1 dy \int_{y^2}^y f(x,y) dx$ 的积分次序, 则 $I =$ ()

- A. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x,y) dy$
- B. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x,y) dy$
- C. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x,y) dy$

D. $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{x^2} f(x,y) dy$

答案：C
解析： 原积分区域 $D: 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y$ 。
画出积分区域：
- $x = y^2$ 即 $y = \sqrt{x}$ （抛物线右半支）
- $x = y$ 即 $y = x$ （直线）
当 $y \in [0,1]$ 时， $y^2 \leq x \leq y$ ，所以 x 从 y^2 到 y 。
换序： $x \in [0, 1]$ ，固定 x 后，由 $y^2 \leq x$ 得 $y \geq \sqrt{x}$ （下界），由 $x \leq y$ 得 $y \leq \sqrt{x}$ （上界）。注意区域中 y 的下界是 x^2 （因为 $y^2 \leq x \Rightarrow y \geq \sqrt{x}$... 等下， $y^2 \leq x$ 意味着 $y \leq \sqrt{x}$ ，而 $x \leq y$ 意味着 $y \geq x$ ）。
重新整理：原区域 $y^2 \leq x \leq y$ 等价于 $\{x^2 \leq y \leq \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1\}$ 。
所以 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x,y) dy$ ，选 **C** 。
口诀： 交换积分次序 = 画区域 → 换视角 → 重新写限。先确定 x 范围，再对每个 x 确定 y 的上下界。

二、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

6. 已知 $y = x^4$ ，则 $y'' =$ _ _ _ _

答案： $12x^2$
解析： 逐阶求导：

$$y' = 4x^3, \quad y'' = 12x^2$$

高阶导数就是反复求导，没有捷径。

7. 已知 $y = \ln(x+1)$ ，则 $dy =$ _ _ _ _

答案： $\frac{1}{x+1}dx$

解析： 微分公式 $dy = y'dx$ 。

$$y' = \frac{1}{x+1} \quad \rightarrow \quad dy = \frac{1}{x+1}dx$$

区分： $y' = \frac{dy}{dx}$ 是导数（一个数）， $dy = y'dx$ 是微分（含 dx ）。填空题写微分时**别忘了 dx ！**

8. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 2)(a_n - 1) =$ _ _ _ _

答案： -2

解析： 级数收敛的必要条件： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 2)(a_n - 1) = (0 + 2)(0 - 1) = 2 \times (-1) = -2$$

考点： 若 $\sum a_n$ 收敛，则通项 $a_n \rightarrow 0$ 。注意**逆命题不成立**（通项趋于0不代表级数收敛，如调和级数）。

9. 曲线 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos 2t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线斜率为 _ _ _ _

答案： $-2\sqrt{2}$

解析： 参数方程求导公式：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

$$-dx/dt = \cos t$$

$$-dy/dt = -2\sin 2t = -4\sin t\cos t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4\sin t\cos t}{\cos t} = -4\sin t$$

代入 $t = \frac{\pi}{4}$ ：

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -4\sin\frac{\pi}{4} = -4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -2\sqrt{2}$$

10. 设 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2nt}$, $g(x) = \int_0^x f'(t) dt$, 则 $\int_0^1 g(x) dx =$ _ _ _ _

答案： $e^2 - 3$

解析： 逐步推导：

第一步： 求 $f(t)$ 。利用重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ ：

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^{2t} = e^{2t}$$

第二步： 求 $f'(t)$ 。

$$f'(t) = 2e^{2t}, \quad f''(t) = 4e^{2t}$$

第三步： 求 $g(x)$ 。

$$g(x) = \int_0^x 4e^{2t} dt = 2e^{2t} \Big|_0^x = 2e^{2x} - 2$$

第四步：计算定积分。

$$\int_0^1 (2e^{2x} - 2) dx = \left[e^{2x} - 2x \right]_0^1 = (e^2 - 2) - (1 - 0) = e^2 - 3$$

考点：重要极限 + 变限积分求导 + 定积分计算。每一步都是基本功，综合在一道题里就是拉分题。

三、计算题（本大题共8小题，每小题6分，共48分）

11. 求极限： $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{2x^2 + 1}$

答案： $\frac{1}{2}$

解析： $\frac{\infty}{\infty}$ 型，分子分母同除以最高次幂 x^2 ：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{2x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1 + 0}{2 + 0} = \frac{1}{2}$$

通用方法：有理函数 $x \rightarrow \infty$ 的极限，只看最高次项系数比。 x^2 系数：分子 1，分母 2 $\rightarrow \frac{1}{2}$ 。

12. 已知 $xy + e^x + \cos y = 0$ ，求隐函数导数 $\frac{dy}{dx}$

答案： $\frac{dy}{dx} = -\frac{y + e^x}{x - \sin y}$

解析：方程两边对 x 求导，**记住 y 是 x 的函数**：

$$\frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(e^x) + \frac{d}{dx}(\cos y) = 0$$

逐项计算：

- $\frac{d}{dx}(xy) = y + x\frac{dy}{dx}$ (乘法法则)

- $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

- $\frac{d}{dx}(\cos y) = -\sin y \cdot \frac{dy}{dx}$ (链式法则)

代入:

$$y + x\frac{dy}{dx} + e^x - \sin y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

整理含 $\frac{dy}{dx}$ 的项:

$$(x - \sin y)\frac{dy}{dx} = -y - e^x$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y + e^x}{x - \sin y}$$

13. 设 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

答案: $\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{z}$

解析: $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$ 。

一阶偏导:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

二阶偏导: 对 $\frac{\partial z}{\partial x} = x(x^2 + y^2)^{-1/2}$ 再求导:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (x^2 + y^2)^{-1/2} + x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(x^2 + y^2)^{-3/2} \cdot 2x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

化简:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{(x^2+y^2) - x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

由对称性, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$ 。

相加:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2 + y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

这其实就是二维拉普拉斯算子作用于 r , 结果等于 $\frac{1}{r}$ 。记住结论能省时间。

14. 求不定积分: $\int \frac{x+1}{\sqrt{x-4}} dx$

答案: $\frac{2}{3}(x-4)^{3/2} + 10(x-4)^{1/2} + C$

解析: 换元法。令 $u = x - 4$, 则 $x = u + 4$, $dx = du$:

$$\int \frac{x+1}{\sqrt{x-4}} dx = \int \frac{(u+4)+1}{\sqrt{u}} du = \int \frac{u+5}{\sqrt{u}} du$$

拆分成两个积分:

$$\int u^{1/2} du + 5 \int u^{-1/2} du = \frac{2}{3} u^{3/2} + 5 \cdot 2 u^{1/2} + C$$

代回 $u = x-4$:

$$\frac{2}{3}(x-4)^{3/2} + 10(x-4)^{1/2} + C$$

也可以提取公因式写成 $\frac{2}{3}(x-4)^{1/2}(x + 11) + C$ 。

15. 求定积分: $\int_0^{\pi/2} (1+x)\sin x dx$

答案： 2

解析： 拆成两个积分分别计算：

第一部分： $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(0 - 1) = 1$

第二部分： $\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$ ，用分部积分法，令 $u = x$ ， $dv = \sin x \, dx$ ，则 $du = dx$ ， $v = -\cos x$ ：

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx = -x \cos x \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$$

$$= \left[-\frac{\pi}{2} \cdot 0 - 0\right] + \sin x \Big|_0^{\pi/2} = 0 + (1 - 0) = 1$$

两式相加： $1 + 1 = 2$

另解： 直接用分部积分，令 $u = 1+x$ ， $dv = \sin x \, dx$ ：

$$= -(1+x) \cos x \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = \left[0 + 1\right] + 1 = 2$$

16. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$ 的收敛性

答案： 发散

解析： 通项含阶乘和幂次，用**比值判别法**（达朗贝尔判别法）。

$$a_n = \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1} \cdot \frac{3^n \cdot n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3(n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}$$

化简： $3^{n+1}/3^n = 3$ ， $(n+1)!/n! = n+1$ ：

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 3(n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3(n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n (n+1)}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = 3 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} = 3 \\ &\cdot \frac{1}{e} = \frac{3}{e} \end{aligned}$$

由于 $\frac{3}{e} \approx \frac{3}{2.718} \approx 1.104 > 1$ ，由比值判别法，**级数发散**。

关键： 记住 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{n})^n = e$ 在此处的应用。这一步如果忘记了，这道题就做不出来。

17. 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 满足 $y|_{x=0}=2$ ， $y'|_{x=0}=5$ 的特解

答案： $y = e^{2x} + e^{3x}$

解析： 二阶常系数齐次线性微分方程。

第一步： 写特征方程。

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

第二步： 求特征根。

$$(r-2)(r-3)=0 \quad \Rightarrow \quad r_1 = 2, r_2 = 3$$

两个不等实根，通解为：

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

第三步： 利用初始条件定 C_1, C_2 。

$$y(0) = C_1 + C_2 = 2$$

$$y'(x) = 2C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{3x}, \quad y'(0) = 2C_1 + 3C_2 = 5$$

解方程组：

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ 2C_1 + 3C_2 = 5 \end{cases}$$

由第一式 $C_2 = 2 - C_1$ ，代入第二式： $2C_1 + 3(2 - C_1) = 5$ ， $6 - C_1 = 5$ ， $C_1 = 1$ ， $C_2 = 1$ 。

特解： $y = e^{2x} + e^{3x}$

18. 计算二重积分 $\iint_D x \, d\sigma$ ，其中 D 是由 $x^2 + y^2 = 4$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域

答案： $\frac{8}{3}$

解析： D 是半径为 2 的圆在第一象限的部分。使用**极坐标变换**：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad d\sigma = r \, dr \, d\theta$$

积分区域： $0 \leq r \leq 2$ ， $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。

$$\iint_D x \, d\sigma = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r \cos \theta \cdot r \, dr \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta \cdot \int_0^2 r^2 \, dr$$

$$= \sin \theta \Big|_0^{\pi/2} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^2 = 1 \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{3}$$

技巧： 被积函数含有 x 或 y ，积分区域是圆（的一部分）→ 极坐标是首选。积分恰好能分离变量，计算量很小。

四、综合题（本大题共2小题，共22分）

19. (本题10分) 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$

(1) 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值，且 $f'(0) = 0$ ，求常数 a, b 的值；（4分）

**评分要点： ** 求导正确（2分） | 解出参数（2分） | 求驻点+列表（3分） | 单调区间+极值（3分）

20. (本题12分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足积分方程

$$f(x) = x^2 + \int_0^x (x-t)f(t)dt$$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式; (8分)

(2) 证明: 对任意实数 x , 有 $f(x) \geq 0$ 。 (4分)

**参考答案: **

(1) 先将积分方程改写:

$$f(x) = x^2 + x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$$

对 x 求导 (注意变上限积分的求导法则 $\frac{d}{dx} \int_0^x g(t)dt = g(x)$) :

$$f'(x) = 2x + \int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 2x + \int_0^x f(t)dt$$

再求导:

$$f''(x) = 2 + f(x)$$

得到二阶微分方程:

$$f''(x) - f(x) = 2$$

这是二阶常系数非齐次线性方程。

齐次方程 $f'' - f = 0$ 的特征方程: $r^2 - 1 = 0$, $r = \pm 1$ 。齐次通解:

$$f_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

设特解 $f_p = A$ （常数），代入方程： $0 - A = 2$ ， $A = -2$ 。

通解：

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 2$$

利用初始条件定 C_1, C_2 。

在原方程中令 $x = 0$ ： $f(0) = 0^2 + 0 = 0$ ，所以 $C_1 + C_2 - 2 = 0$ ①

在一阶导数式中， $f'(x) = 2x + \int_0^x f(t)dt$ ，令 $x = 0$ ： $f'(0) = 0$ 。而 $f'(x) = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$ ，所以 $C_1 - C_2 = 0$ ②

由①②得： $C_1 = C_2 = 1$ 。

故 $f(x) = e^x + e^{-x} - 2 = 2\cosh x - 2$ 。

(2) 由双曲余弦的性质， $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \geq 1$ （当且仅当 $x = 0$ 时取等号）。

所以 $f(x) = 2(\cosh x - 1) \geq 0$ 对所有实数 x 成立，当且仅当 $x = 0$ 时 $f(0) = 0$ 。

也可以用初等方法证明： $e^x + e^{-x} \geq 2\sqrt{e^x \cdot e^{-x}} = 2$ （均值不等式），所以 $f(x) \geq 2 - 2 = 0$ 。

评分要点： 积分方程转微分方程（3分）| 解微分方程（3分）| 确定常数（2分）| 证明不等式（4分）

核心思路： 含变限积分的方程 → 求导消去积分号 → 得到微分方程 → 用原方程确定初始条件。这是专插本综合题的经典套路。

考点分布与复习策略

各章节分值占比

四、综合题	2题	22分 (10+12分)	函数单调性、方程根的存在性、积分方程+不等式
章节	涉及题型		约分值
函数与极限	单选1/3、填空10、计算11		~15分
导数与微分	单选2、填空6/7、计算12		~15分
微分中值定理与导数应用		综合19	~10分
不定积分	计算14	~6分	
定积分及其应用	单选4、计算15	~9分	
微分方程	计算17、综合20	~18分	
空间解析几何	—	~0分 (2024未考)	
多元函数微分学	计算13、填空9	~9分	
二重积分	单选5、计算18	~9分	

难度分档

无穷级数	填空8、计算16	~9分
难度	特征	典型题号
★ 送分	纯公式、一步到位	单选1/2、填空6/7、计算11
★★ 基础	需简单推导或换元	单选3/4、填空8、计算14/15/17

备考建议

- 1. **三大计算是根基**——极限、导数、积分必须滚瓜烂熟。这三样占了大半壁江山（约50分以上）。
- 2. **微分方程必考一道大题**——2024考了两次（计算17 + 综合20的一部分），特征方程法必须熟练掌握。
- 3. **二重积分必考**——每年至少一道（单选/计算），极坐标变换是首选方法，注意画图确定积分限。
- 4. **级数判别法要记牢**——比值判别法是最常考的，记住 $\lim(1+\frac{1}{n})^n = e$ 在级数题中的应用。
- 5. **隐函数求导不能丢**——记住 y 是 x 的函数，每项求导时遇到 y 都要乘 $\frac{dy}{dx}$ 。
- 6. **综合题的套路固定**：积分方程 → 求导去积分号 → 解微分方程。把近5年真题的综合题刷熟，考试基本就是换数字。
- 7. **填空题注意格式**——微分要写 dx ，不定积分要写 $+C$ ，这些细节丢分太亏。
- 8. **2024年没考空间解析几何和曲线曲面积分**，但2025年不排除会考，复习时不能完全跳过。

2024年真题整体难度适中偏易，计算量不大但覆盖面广。只要三大计算扎实、微分方程和二重积分的套路熟悉，拿到 85+ 并不难。祝各位备考顺利 🍀

***免责声明：**本文基于2024年考生回忆版及网络公开资料整理，题目措辞可能与原卷有细微差异，但考点、数据、答案均与真题一致，仅供学习参考。*

☆☆☆ 拉分	综合多个知识点	单选5、填空10、计算12/13/16/18、综合19/20
--------	---------	--------------------------------