

ZADANIE 1: Wygeneruj trajektorię rozwiązania następujących SDE:

$$dX_t = (8 - 5X_t) dt + 3 dB_t; X_0 = 0,$$

$$dY_t = \frac{n-1}{2Y_t} dt + dB_t; Y_0 = 0,$$

$$dZ_t = \frac{1}{2} \exp(-2Z_t) dt + \exp(-Z_t) dB_t; Z_0 = 0.$$

korzystając z pakietu *YUIMA* w *R*. Ponadto dla punktu c)

- sprawdź, że $Z_t = \log(B_t + 1)$,
- sprawdź, czy symulowane trajektorie są zawsze dobrze określone na odcinku $[0, 1]$.

ZADANIE 2: Wygeneruj trajektorię dwuwymiarowego SDE (X_t^1, X_t^2) , gdzie $(X_0^1, X_0^2) = (1, 0)$ i

$$dX_t^1 = -\frac{1}{2}X_t^1 dt - X_t^2 dB_t,$$

$$dX_t^2 = -\frac{1}{2}X_t^2 dt + X_t^1 dB_t.$$

Ponadto

- sprawdź, że $X_t = (\cos(B_t), \sin(B_t))$.

ZADANIE 3: Wygeneruj trajektorię dwuwymiarowego SDE (X_t^1, X_t^2) , gdzie B^1, B^2 są ruchami Browna skorelowanymi z parametrem ρ , a

$$dX_t^1 = -\mu X_t^1 dt - \sqrt{X_t^2} X_t^1 dB_t^1,$$

$$dX_t^2 = \kappa(\theta - X_t^2) dt + \epsilon \sqrt{X_t^2} dB_t^2.$$

Ponadto

- sprawdź, co się dzieje dla przypadku gdy $2\kappa\theta \leq \epsilon^2$.

Więcej informacji nt. ostatniego zadania można znaleźć pod hasłami "Heston model", "CIR process".

Poradnik nt. pakietu *YUIMA* znajduje się na stronie yuimackage.com - po więcej informacji i przykładów polecam "Simulation and Interference for Stochastic Processes with YUIMA" w Springerze (Iacus/Yoshida).