

第九次习题课 群文件《期中 & 期末试题》

期末试题

1. 期末 2014-2015 一 4.

已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 $-1, 3, 2$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则矩阵 $A^3 + 2A^*$ 主对角线元素之和为_____。

解:

由题得: $|A| = \prod_{i=1}^3 \lambda_i = -1 \times 3 \times 2 = -6$. 所以 A^* 的特征值为: $\frac{|A|}{\lambda_i}$. 由特征值的性质:

$A^3 + 2A^*$ 的特征值为 $\lambda_i^3 + 2\frac{|A|}{\lambda_i}$. 所以 $A^3 + 2A^*$ 主对角线元素之和为

$$\text{trace}(A^3 + 2A^*) = \sum_{i=1}^3 \left(\lambda_i^3 + 2\frac{|A|}{\lambda_i} \right) = 36$$

◇

2. 期末 2014-2015 一 6.

设 $(1, 1, 1)^T$ 是矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & a & 2 \\ 2 & 2 & b \end{bmatrix}$ 的一个特征向量, 则 $a - b =$ _____。

解:

由特征向量的定义有

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 6 \\ a+2 \\ b+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda \\ \lambda \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 6 \\ a = 4 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow a - b = 2$$

◇

3. 期末 2014-2015 八.

设 3 阶方阵 A 的特征值 $-1, 1$ 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(1) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;

(2) 设 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 求 $P^{-1}AP$.

解:

由题得: $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2$.

(1) 设

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \quad (1)$$

要证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 只需证明 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, (1) 式两边同左乘 A :

$$k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + k_3A\alpha_3 = -k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3(\alpha_2 + \alpha_3) = -k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \quad (2)$$

(1) 式减 (2) 式: $-2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0$, 因为 α_1 和 α_2 是分属于不同的特征值的特征向量, 所以 α_1 和 α_2 线性无关。即

$$\begin{cases} -2k_1 = 0 \\ -k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = k_3 = 0, \text{ 代入到 (1) 式: } k_2\alpha_2 = 0, \text{ 又因为特征向量不为 } 0, \text{ 所以 } k_2 = 0.$$

综上所述: $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

(2) 由题得:

$$AP = [A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3] = [-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = P\Lambda$$

所以 $\Lambda = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

4. 期末 2015-2016 一 4.

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ a & -2 & 2 \\ 3 & b & -1 \end{bmatrix}$, 若 $\alpha = (1, -2, 3)^T$ 是其特征向量, 则 $a + b =$ _____。

解:

设 α 对应的特征值为 λ 。由特征向量的定义:

$$A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow \begin{bmatrix} -4 \\ a+10 \\ -2b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda \\ -2\lambda \\ 3\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -4 \\ a = -2 \\ b = 6 \end{cases} \Rightarrow a + b = 4$$

5. 期末 2016-2017 三 1.

令 $\alpha = (1, 1, 0)^T$, 实对称矩阵 $A = \alpha\alpha^T$.

(1) 把矩阵 A 相似对角化;

(2) 求 $|6I - A^{2017}|$.

解:

由题得: $A = \alpha\alpha^T = (1, 1, 0)^T(1, 1, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。所以

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda[(\lambda - 1)^2 - 1] = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

$\lambda_1 = 2$ 时:

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{高斯消元, 步骤略}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

可以看出, $\lambda_1 = 2$ 时: 代数重数等于几何重数。

$\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 时:

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{高斯消元, 步骤略}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

可以看出, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 时: 代数重数等于几何重数。

所以 A 可以相似对角化: 即存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$, 其中 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(2) 由特征值的性质: $6I - A^{2017}$ 的特征值为: $6 - \lambda_i^{2017}$, 所以

$$|6I - A^{2017}| = \prod_{i=1}^3 (6 - \lambda_i^{2017}) = 36 \times (6 - 2^{2017})$$

◇

6.期末 2017-2018 一 5.

若 3 阶矩阵 A 相似于 B , 矩阵 A 的特征值是 1,2,3 那么行列式 $|2B + I| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(其中 I 是 3 阶单位矩阵)

解:

A 相似于 B , 所以 A 与 B 的特征值相等。所以 $2B + I$ 的特征值为 $2\lambda_i + 1$, 所以 $|2B + I| = \prod_{i=1}^3 (2\lambda_i + 1) = 105$ ◇

7.期末 2017-2018 三 1.

设 1 为矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & 1 & -1 \\ 1 & 1 & x \end{bmatrix}$ 的特征值, 其中 $x > 1$.

(1) 求 x 及 A 的其他特征值。(2) 判断 A 能否对角化, 若能对角化, 写出相应的对角矩阵 Λ 。

解:

设 α_1 为特征值 1 对应的特征向量, 所以 $\alpha_1 \neq 0$ 由题得: $A\alpha_1 = \alpha_1$, 即 $(A - E)\alpha_1 = 0$, 即 $(A - E)x = 0$ 有非零解。所以由存在唯一性定理: $|A - E| = 0$, 所以

$$|A - E| = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ x & 0 & -1 \\ 1 & 1 & x-1 \end{vmatrix} = -x \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & x-1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = (2x-1)(x-2) = 0$$

由题得: $x > 1$, 所以解得 $x = 2$ 。(2) 把 $x = 2$ 代入得:

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -3 \\ -2 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1-c_2} \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -3 \\ -(\lambda+1) & \lambda-1 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -1 & \lambda-1 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1} (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & \lambda-3 & -2 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1)[(\lambda-3)(\lambda-2)-2] = 0 \end{aligned}$$

解得: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = -1$ 。

因为 A 为三阶, 并且有 3 个不同的特征值, 所以可以相似对角化, $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 4 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$ 。(不唯一, 只要对角线元素是这三个就可以) ◇

8.期末 2017-2018 四 1.

设 A, B 均为 n 阶方阵, 证明: 若 A, B 相似则 $|A| = |B|$, 举例说明反过来不成立。

证明:

若 A 与 B 相似, 则依定义有: 存在一个可逆矩阵 P , 使得 $A = P^{-1}BP$, 两边同时求行列式: $|A| = |P^{-1}BP| = |P^{-1}| \cdot |B| \cdot |P| = |B| \cdot |P^{-1}P| = |B| \cdot |E| = |B|$ 。

反过来描述: 如果 $|A| = |B|$, 则 A 和 B 相似。

例如: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, |A| = 1, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, |B| = 1$, 所以 $|A| = |B|$, 但是: 假设存在一个可逆矩阵 $P, P^{-1}AP = P^{-1}EP = E \neq B$, 即 $|A| = |B|$, 但是 A, B 不相似。 ◇

9.期末 2018-2019 一 4.

设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 其特征值为 1, -1, 2, A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 A^* 的主对角线元素之和即 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解:

由题得: $|A| = \prod_{i=1}^3 \lambda_i = -2$, 所以 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda_i}$, 所以 A^* 的主对角线元素之和为 $\text{trace}(A^*) = \sum_{i=1}^3 \frac{|A|}{\lambda_i} = -1$. \diamond

10.期末 2018-2019 四 2.

若同阶矩阵 A 与 B 相似, 即 $A \sim B$, 证明 $A^2 \sim B^2$ 。反过来结论是否成立并说明理由。

证明:

若 A 与 B 相似, 则依定义有: 存在一个可逆矩阵 P , 使得 $A = P^{-1}BP$, 所以: $A^2 = P^{-1}BP \cdot P^{-1}BP = P^{-1}B^2P$ 。所以 $A^2 \sim B^2$ 。

反过来描述: 如果 $A^2 \sim B^2$, 则 A 和 B 相似。

不成立。理由如下:

例如: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 所以 $A^2 = B^2$, 由相似的性质 $A^2 \sim B^2$ 但是: 假设存在一个可逆矩阵 P , $P^{-1}AP = P^{-1}EP = E \neq B$, 即 $A^2 \sim B^2$, 但是 A, B 不相似。 \diamond

11.期末 2018-2019 四 3.

设 λ_1, λ_2 是 A 的两个互异的特征值, $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1s}$ 是对应于 λ_1 的线性无关的特征向量, $\alpha_{21}, \dots, \alpha_{2t}$ 是对应于 λ_2 的线性无关的特征向量, 证明: 向量组 $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1s}, \alpha_{21}, \dots, \alpha_{2t}$ 线性无关。

证明:

由题得: $A\alpha_{1i} = \lambda_1\alpha_{1i}, (1 \leq i \leq s), A\alpha_{2j} = \lambda_2\alpha_{2j}, (1 \leq j \leq t)$ 。

设

$$k_1\alpha_{11} + \dots + k_s\alpha_{1s} + k_{s+1}\alpha_{21} + \dots + k_{s+t}\alpha_{2t} = 0 \quad (1)$$

要证明向量组 $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1s}, \alpha_{21}, \dots, \alpha_{2t}$ 线性无关, 只需证明 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = k_{s+1} = \dots = k_{s+t} = 0$ 即可。

在 (1) 式左边同乘 A :

$$k_1A\alpha_{11} + \dots + k_sA\alpha_{1s} + k_{s+1}A\alpha_{21} + \dots + k_{s+t}A\alpha_{2t} = \lambda_1(k_1\alpha_{11} + \dots + k_s\alpha_{1s}) + \lambda_2(k_{s+1}\alpha_{21} + \dots + k_{s+t}\alpha_{2t}) = 0 \quad (2)$$

(2) - λ_2 (1) 得: $(\lambda_1 - \lambda_2)(k_1\alpha_{11} + \dots + k_s\alpha_{1s}) = 0$, 因为 λ_1, λ_2 是 A 的两个互异的特征值, 所以 $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$, 所以 $k_1\alpha_{11} + \dots + k_s\alpha_{1s} = 0$, 又因为 $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1s}$ 是对应于 λ_1 的线性无关的特征向量, 所以: $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$ 。代入到 (1) 式得:

$k_{s+1}\alpha_{21} + \dots + k_{s+t}\alpha_{2t} = 0$, 因为 $\alpha_{21}, \dots, \alpha_{2t}$ 是对应于 λ_2 的线性无关的特征向量, 所以 $k_{s+1} = k_{s+2} = \dots = k_{s+t} = 0$

综上所述: $k_1 = k_2 = \dots = k_s = k_{s+1} = k_{s+2} = \dots = k_{s+t} = 0$, 所以向量组 $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1s}, \alpha_{21}, \dots, \alpha_{2t}$ 线性无关。 \diamond

12.期末 2019-2020 一 1.

设 A 是 3 阶方阵, E 是 3 阶单位矩阵, 已知 A 的特征值为 1, 1, 2, 则 $\left| \left(\left(\frac{1}{2}A \right)^* \right)^{-1} - 2A^{-1} + E \right| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解:

由题得: $|A| = \prod_{i=1}^3 \lambda_i = 2$, A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda} = \frac{2}{\lambda}$ 。

由伴随矩阵的性质: $\left(\frac{1}{2}A \right)^* = \left(\frac{1}{2} \right)^{3-1} A^* = \frac{A^*}{4}$, 所以 $\left(\left(\frac{1}{2}A \right)^* \right)^{-1} - 2A^{-1} + E$ 的特征值为

$$\left(\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\lambda_i} \right)^{-1} - 2\lambda_i^{-1} + 1 = 2\lambda_i - \frac{2}{\lambda_i} + 1$$

所以:

$$\left| \left(\left(\frac{1}{2}A \right)^* \right)^{-1} - 2A^{-1} + E \right| = \prod_{i=1}^3 \left(2\lambda_i - \frac{2}{\lambda_i} + 1 \right) = 4$$

\diamond

13.期末 2019-2020 一 5.

已知 n 阶方阵 A 对应于特征值 λ 的全部的特征向量为 $c\alpha$, 其中 c 为非零常数, 设 n 阶方阵 P 可逆, 则 $P^{-1}AP$ 对应于特征值 λ 的全部的特征向量为_____。

解:

由题得: $A(c\alpha) = \lambda(c\alpha)$ 等式两边同时左乘 P^{-1} :

$$P^{-1}AE(c\alpha) = P^{-1}APP^{-1}(c\alpha) = (P^{-1}AP)(P^{-1}c\alpha) = \lambda(P^{-1}c\alpha)$$

所以 $P^{-1}AP$ 对应于特征值 λ 的全部的特征向量为 $P^{-1}c\alpha = cP^{-1}\alpha$ ◇

14.期末 2019-2020 三 2.

已知 3 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & a+2 & 0 \\ a-2 & 3 & 0 \\ 8 & -8 & -1 \end{bmatrix}$ 可以相似对角化且 A 得到特征方程有一个二重根, 求 a 的值。

其中 $a \leq 0$.

解:

由题得:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -(a+2) & 0 \\ 2-a & \lambda-3 & 0 \\ -8 & 8 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda+1)[(\lambda+1)(\lambda-3) + (2+a)(2-a)] = (\lambda+1)[(\lambda-1)^2 - a^2] = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1+a, \lambda_3 = 1-a.$$

依题意: 有二重根且可以相似对角化且 $a \leq 0$.

讨论:

(1) $\lambda_1 = \lambda_2$, 即 $-1 = 1+a, a = -2 \leq 0$, 此时 $\lambda_3 = 1-a = 3$, 代入到 $\lambda E - A$ 得:

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 \\ 4 & \lambda-3 & 0 \\ -8 & 8 & \lambda+1 \end{bmatrix}$$

对于重根 -1 :

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \\ -8 & 8 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

对于根 3:

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ -8 & 8 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

可以看出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 即 A 可相似对角化, 即 $a = -2$ 符合题意。

(2) $\lambda_1 = \lambda_3$, 即 $-1 = 1-a, a = 2 > 0$, 不符合题意。

(3) $\lambda_2 = \lambda = 3$, 即 $1+a = 1-a, a = 0$ 。此时 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。把 $a = 0$ 代入到 $[\lambda E - A]$ 得:

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} \lambda+1 & -2 & 0 \\ 2 & \lambda-3 & 0 \\ -8 & 8 & \lambda+1 \end{bmatrix}$$

对于重根 1:

$$[\lambda E - A] = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ -8 & 8 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

对于重根 1, 其代数重数与几何重数不相等, 所以不能相似对角化。

综上所述: $a = -2$. ◇