

## 第六次习题课 群文件《期中 & 期末试题》

### 期中试题

1.期中 2015-2016 一 2.

$$\text{设 } f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}, \text{ 则 } x^3 \text{ 的系数为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

解:

方法一: 求出对应的行列式, 然后写出  $x^3$  的系数。(此方法太过繁琐, 容易出错, 不推荐使用)

用 *Matlab* 计算出来的结果为:  $f(x) = 2x^4 - x^3 - 7x^2 + 12x - 8$ . (仅供参考)

方法二: 使用定义, 课本 106-108 页。

思路: 使用行列式的定义来做。仅找出与  $x^3$  有关的项。这里取列按照自然排列, 行由自己指定 (也可以取行按照自然排列, 列由自己指定)。

第一列中: 取第一行, 第二列第三列第四列无论怎么取都不可能构成  $x^3$ 。

(注意: 在行列式的定义式中, 每一项中的几个元素必须来自不同的行数和列数, 如: 对于此题来说, 列按自然排列, 第一个元素取第一列中的第一行, 那么第二个元素只能从剩下三列中的剩下三行来取)

第一列中: 取第二行, 第二列取第一行, 第三列取第三行, 第四列取第四行。即  $(-1)^{\tau(2134)} a_{21} a_{12} a_{33} a_{44} = (-1)^1 1 * x * x * x = -x^3$  (注意下标, 列 (黑色) 是自然排列, 行 (红色) 是上边分析得来的)

第一列取第三行第四行都不能构成  $x^3$ 。

验证:  $x^2$  的系数

列取自然排列, 行按下述几个取时构成  $x^2$ : 1324 3124 3214 4231 4132 即:

$$\begin{aligned} & (-1)^{\tau(1324)} a_{11} a_{32} a_{23} a_{44} + (-1)^{\tau(3124)} a_{31} a_{12} a_{23} a_{44} + \\ & (-1)^{\tau(3214)} a_{31} a_{22} a_{13} a_{44} + (-1)^{\tau(4132)} a_{41} a_{12} a_{33} a_{24} + (-1)^{\tau(4231)} a_{41} a_{22} a_{33} a_{14} \\ & = (-4 + 3 - 3 - 1 - 2)x^2 = -7x^2 \end{aligned}$$

可以看出和方法 1 算的结果一样。

◇

2.期中 2015-2016 一 5.

若  $A$  为 4 阶方阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵,  $|A| = \frac{1}{2}$ , 则  $\left| \left( \frac{1}{4}A \right)^{-1} - A^* \right| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解:

$$\left| \left( \frac{1}{4}A \right)^{-1} - A^* \right| = \left| \left( \frac{1}{4}A \right)^{-1} - |A|A^{-1} \right| = |4A^{-1} - \frac{1}{2}A^{-1}| = \left| \frac{7}{2}A^{-1} \right| = \left( \frac{7}{2} \right)^4 |A|^{-1} = \frac{7^4}{8}$$

◇

3.期中 2015-2016 一 6. 设  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ , 则  $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解:

$$A^* = |A|A^{-1}, \text{ 所以 } (A^*)^{-1} = (|A|A^{-1})^{-1} = |A|^{-1}(A^{-1})^{-1} = |A|^{-1}A$$

$$|A| = 1 \times 1 \times 3 = 3 \text{ 所以: } (A^*)^{-1} = \frac{1}{3}A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

◇

4.期中 2015-2016 三 1.

设  $A$  可逆, 且  $A^*B = A^{-1} + B$ , 证明  $B$  可逆, 当  $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$  时, 求  $B$ 。

解:

由题得:  $A^*B = A^{-1} + B$ , 即  $(A^* - E)B = A^{-1}$ , 两边同时左乘  $A$  得:  $A(A^* - E)B = E$ , 所以  $B$  可逆, 其逆矩阵为  $A(A^* - E) = (|A|E - A)$ 。

由题得:  $|A| = 2 \times 2 \times 2 = 8$

$$B = (|A|E - A)^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & -6 & 0 \\ 0 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

◇

5.期中 2016-2017 一 5.

若  $A$  为 3 阶方阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵,  $|A| = \frac{1}{2}$ , 则  $|(3A)^{-1} - 2A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解:

$$|(3A)^{-1} - 2A^*| = |3^{-1}A^{-1} - 2|A|A^{-1}| = |-\frac{2}{3}A^{-1}| = (-\frac{2}{3})^3 |A|^{-1} = -\frac{16}{27}$$

◇

6.期中 2016-2017 二 5.

$$\text{若 } \left(\frac{1}{4}A^*\right)^{-1}BA^{-1} = 2AB + I, \text{ 且 } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 求 } B.$$

解:

由题得:  $A = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$ , 其中  $A_{11} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $A_{22} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 所以有:

$$|A_{11}| = |A_{22}| = 2 \times 1 = 2; \quad |A| = |A_{11}| \cdot |A_{22}| = 4; \quad A_{11}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}; \quad A_{22}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{4}A^*\right)^{-1}BA^{-1} &= 2AB + I \Rightarrow 4(|A|A^{-1})^{-1}BA^{-1} = 2AB + I \Rightarrow \frac{4}{|A|}ABA^{-1} = 2AB + I \\ ABA^{-1} &= 2AB + I \Rightarrow AB = 2ABA + A \Rightarrow AB(E - 2A) = A \Rightarrow B(E - 2A) = I \Rightarrow B = (E - 2A)^{-1} \end{aligned}$$

$$B = (E - 2A)^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

◇

7.期中 2016-2017 三 2.

已知  $A = (a_{ij})$  是三阶的非零矩阵, 设  $A_{ij}$  是  $a_{ij}$  的代数余子式, 且对任意的  $i, j$  有  $A_{ij} + a_{ij} = 0$ , 求  $A$  的行列式。

解:

因为  $A_{ij} + a_{ij} = 0$ , 所以可以推出  $A + (A^*)^T = 0$ 。即  $(A^*)^T = -A$ 。两边同时取行列式:

$$\text{左边: } |(A^*)^T| = |A^*| = ||A|A^{-1}| = |A|^n |A|^{-1} = |A|^{n-1} = |A|^2$$

$$\text{右边: } |-A| = (-1)^3 |A| = -|A|$$

所以  $|A|^2 = -|A|$ , 解得  $|A| = -1$  或  $|A| = 0$ 。

又因为  $(A^*)^T = -A$ , 所以有  $r((A^*)^T) = r(-A)$ , 即  $r(A^*) = r(A)$ , 所以  $r(A) = n = 3$ 。注: 此步看不懂的看课本 121 页的例 3.3.23, 记住这个例题的结论。

$r(A) = 3$ , 即满秩, 满秩即 (可逆 & 行列式不为 0), 所以  $|A| = -1$ 。◇

8.期中 2017-2018 二 2. 判断是否正确并说明理由。

设  $A, B$  为  $n$  阶可逆方阵, 则  $(AB)^* = B^*A^*$ 。

解:

正确, 理由如下:

因为  $A, B$  为  $n$  阶可逆方阵, 所以  $AB$  可逆, 所以  $(AB)^* = |AB|(AB)^{-1} = |A||B|B^{-1}A^{-1} = |A|B^*A^{-1} = B^*A^*$  ◇

9.期中 2018-2019 一 2.

设  $A, B$  为 3 阶矩阵, 且  $|A| = 3, |B| = 2, A^*$  为  $A$  的伴随矩阵。

(1) 若交换  $A$  的第一行与第二行得矩阵  $C$ , 求  $|CA^*|$ ;

解:

交换  $A$  的第一行与第二行得矩阵  $C$ , 所以  $|C| = -|A|$ , 所以  $|CA^*| = |C||A^*| = -|A||A|^{-1} = -|A|^3|A|^{-1} = -|A|^2 = -9$  ◇

10.期中 2018-2019 一 3.

已知 3 阶矩阵  $A$  的逆矩阵  $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ , 试求伴随矩阵  $A^*$  的逆矩阵。

解:

由伴随矩阵的性质:  $A^* = |A|A^{-1}$ , 所以  $(A^*)^{-1} = (|A|A^{-1})^{-1} = |A|^{-1}A = |A|^{-1}|A|$

由题得:

$$|A^{-1}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{c_2 - c_1 \\ c_3 - c_1}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$[A^{-1}|E] = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - 2r_1}} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_3 + r_2} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{r_1 - r_3} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 - r_2} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\text{所以 } (A^*)^{-1} = |A|^{-1}A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \diamond$$

11.期中 2018-2019 二 1.

若  $n$  阶实矩阵  $Q$  满足  $QQ^T = I$ , 则称  $Q$  为正交矩阵。设  $Q$  为正交矩阵, 则

(1)  $Q$  的行列式为 1 或 -1.

(2) 当  $|Q| = 1$  且  $n$  为奇数时, 证明  $|I - Q| = 0$ , 其中  $I$  是  $n$  阶单位矩阵;

(3)  $Q$  的逆矩阵  $Q^{-1}$  和伴随矩阵  $Q^*$  都是正交矩阵。

证明:

(1) 由题得:  $|QQ^T| = |I| = 1$ , 由行列式的性质:  $|QQ^T| = |Q| \cdot |Q^T|, |Q^T| = |Q|$ , 所以  $|QQ^T| = |Q|^2 = 1$ , 解得  $|Q| = 1$  或  $|Q| = -1$ 。

(2)  $|I - Q| = |QQ^T - Q| = |Q| \cdot |Q^T - I| = |Q^T - I| = |(Q^T)^T - I^T| = |Q - I| = |-(I - Q)| = (-1)^n |I - Q|$ , 因为  $n$  为奇数, 所以  $(-1)^n = -1$ , 即  $|I - Q| = -|I - Q|$ , 所以  $|I - Q| = 0$ 。

(3) 因为  $QQ^T = I$ , 两边同时左乘  $Q^{-1}$ :  $Q^T = Q^{-1}$ , 两边同时右乘  $(Q^T)^{-1}$ :  $I = Q^{-1}(Q^T)^{-1} = Q^{-1}(Q^{-1})^T$ , 所以  $Q^{-1}$  是正交矩阵。

由伴随矩阵的性质:  $Q^* = |Q|Q^{-1}$ ,  $(Q^T)^* = (Q^*)^T = |Q^T|(Q^T)^{-1} = |Q|(Q^{-1})^T$ , 所以  $Q^*(Q^*)^T = |Q|Q^{-1}|Q|(Q^{-1})^T = |Q|^2 Q^{-1}(Q^{-1})^T$

由 (1) 得  $|Q|^2 = 1$ , 所以有  $|Q|^2 Q^{-1}(Q^{-1})^T = Q^{-1}(Q^{-1})^T = I$ , 所以  $Q^*$  是正交矩阵。◇

## 期末试题

12. 期末 2014-2015 一 2.

设  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & t & 4 \end{bmatrix}$ ,  $B$  为 3 阶非零矩阵且  $AB = 0$ , 则  $t =$ \_\_\_\_\_。

解:

$B$  为 3 阶非零矩阵且  $AB = 0$  即  $B$  的非零列向量为  $Ax = 0$  的解, 即  $Ax = 0$  有非零解, 即  $|A| = 0$ , 把  $|A|$  按第三列展开。

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & t & 4 \end{vmatrix} = -2 \times (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & t \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -2(2t - 15) + 4 = 0 \Rightarrow t = \frac{17}{2}$$

◇

13. 期末 2014-2015 二.

设多项式  $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & 3 & 1 & 2 \\ x & x & -2 & 1 \\ 2 & 1 & x & 4 \\ x & 2 & 1 & 4x \end{vmatrix}$ , 分别求该多项式的三次项、常数项。

解:

同第一题。Matlab 算出的结果为:  $f(x) = 8x^4 - 14x^3 + 11x^2 - 53x + 14$  (作为参考)

取列为自然排列。分析得: 行数按 2134 和 4231 排列时, 对应的项为  $x^3$ 。即

$$(-1)^{\tau(2134)} a_{21} a_{12} a_{33} a_{44} + (-1)^{\tau(4231)} a_{41} a_{22} a_{33} a_{14} = (-12 - 2)x^3 = -14x^3$$

同理, 取列为自然排列。分析得行数按: 3142、3412 和 3421 排列时为常数项, 即

$$(-1)^{\tau(3142)} a_{31} a_{12} a_{43} a_{24} + (-1)^{\tau(3412)} a_{31} a_{42} a_{13} a_{24} + (-1)^{\tau(3421)} a_{31} a_{42} a_{23} a_{14} = -6 + 4 + 16 = 14$$

◇

14. 期末 2014-2015 三.

设  $A$  的伴随矩阵  $A^* = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ , 且  $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I$ , 求  $B$ 。

解:

由题得:  $|A^*| = 2 \times 2 \times 2 \times 8 = 64$

$$ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I \Rightarrow AB = B + 3A \Rightarrow A^*AB = A^*B + 3A^*A$$

$$A^*A = |A|A^{-1}A = |A|I \quad |A^*| = ||A|A^{-1}| = |A|^n|A|^{-1} = |A|^{n-1} = |A|^{4-1} = 64 \quad |A| = 4$$

所以  $4B = A^*B + 3 \times 4 \Rightarrow B = 12(4 - A^*)^{-1}$ 。

求逆的过程略。

最后的结果为:

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 4.5 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

◇

15. 期末 2014-2015 四.

$\lambda$  为何值时, 方程组 
$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$
 有无穷多组解? 并在有无穷多解时, 写出方程组的通解。

解:

$$\text{记 } A = \begin{bmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ \lambda & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix},$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ \lambda & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3+c_2} \begin{vmatrix} 2 & \lambda & \lambda-1 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(5\lambda+4)$$

可以看出  $\lambda \neq 1$  且  $\lambda \neq -\frac{4}{5}$  时即  $|A| \neq 0$  时, 方程有唯一解。

$\lambda = 1$  时:

$$[A|B] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-\frac{1}{2}r_1} \left[ \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 3 & -3 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{r_3+2r_2} \left[ \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{中间略}} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

所以  $\lambda = 1$  时有无穷多解,  $x_1 = 1, x_2 = x_3 - 1$ .

$\lambda = -\frac{4}{5}$  时,  $r(A) \neq r(A, B)$ , 此时无解。

◇

16. 期末 2016-2017 一 2.

设  $A$  的伴随矩阵  $A^* = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ , 则  $r(A^2 - 2A) =$ \_\_\_\_\_。

解:

$|A^*| = |A|^{n-1}$  得:  $|A^*| = 2^3 = |A|^3$ . 所以  $|A| = 2 \neq 0$ . 即  $A$  可逆。

所以  $r(A^2 - 2A) = r(A(A - 2)) = r(A - 2) = r(|A|(A^*)^{-1} - 2) = r((A^*)^{-1} - E) = 3$ . (求逆和秩的过程略)

◇

17. 期末 2016-2017 二 2.

设  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B$  为三阶矩阵, 且满足方程  $A^*BA = I + 2A^{-1}B$ , 求矩阵  $B$ .

解:

由题得:  $|A| = 1, A^* = |A|A^{-1} = A^{-1}$ . 对题中方程两边同时左乘  $A$  得:

$$BA = A + 2B$$

$$B = A(A - 2E)^{-1} = A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -18 \\ 0 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(求逆的过程略。  $(A - 2E)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -9 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ )

◇

18. 期末 2017-2018 一 3.

设  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ , 记  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵, 则  $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解:

$(A^*)^{-1} = (|A|A^{-1})^{-1} = \frac{A}{|A|}$ , 由题得:  $|A| = 8$

◇

19. 期末 2018-2019 一 1.

设  $A$  为 5 阶方阵满足  $|A| = 2, A^*$  是  $A$  的伴随矩阵, 则  $|2A^{-1}A^*A^T| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解:

原式 =

$$2^5 |A^{-1}| \cdot |A^*| \cdot |A^T| = 2^5 \cdot |A|^{-1} \cdot |A|^{5-1} \cdot |A| = 2^9 = 512$$

◇

20. 期末 2018-2019 一 3.

设  $A$  为  $m$  阶阵, 存在非零的  $m$  维列向量  $B$ , 使  $AB = 0$  的充分必要条件是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解:

$B$  非零, 说明  $Ax = 0$  有非零解, 由存在唯一性定理:  $|A| = 0$ , 或  $r(A) < m$ 。

◇