第一次课

- 在下次课之前完成下列视频. 合计 79 分钟.
- 1. 阶乘、连加号、连乘号(12分钟)
- 2. 排列组合(12分钟)
- 3. 矩阵(系数矩阵、增广矩阵)(14分钟)
- 4. 消元法解线性方程组(9分钟)
- 5. 阶梯形矩阵与最简阶梯形矩阵(12分钟)
- 6. 高斯消元法(11分钟)
- 7. 线性方程组的解的存在唯一性定理(9分钟)
- 看视频的同时记好笔记.

- 看线性代数教材 P1-P23 定义1.3.7之前的内容.
- 课堂上将分组讨论1.6, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18,1.21.
- 组长安排组员整理一份课堂讨论题目解答, 写上日期, 下 次课交上来.
 - 每位同学在课堂讨论完成以后独立完成以下全部作业.
- **例 1.1** 写出一个只有零解的齐次线性方程组的例子. 写出一个有非零解的齐次线性方程组的例子.

QQ:2557402756

例 1.2 证明: 如果一个线性方程组有零解,则该方程组一定是 齐次线性方程组. (等价地,非齐次线性方程组一定没有零解.)

例 1.3 证明: 如果
$$\begin{cases} x_1 = c_1 \\ x_2 = c_2 \\ \dots \\ x_n = c_n \end{cases}$$
 和
$$\begin{cases} x_1 = d_1 \\ x_2 = d_2 \\ \dots \\ x_n = d_n \end{cases}$$
 都是非齐次线
$$\begin{cases} x_1 = c_1 - d_1 \\ x_2 = c_2 - d_2 \\ \dots \\ x_n = c_n - d_n \end{cases}$$
 是齐次线性方程组 1.1.5 的解.

例 1.4 证明: 如果 $\begin{cases} x_1 = c_1 \\ x_2 = c_2 \\ \cdots \\ x_n = c_n \end{cases}$ 是非齐次线性方程组 1.1.3 的

解,而 $\begin{cases} x_1 = d_1 \\ x_2 = d_2 \\ \dots \\ x_n = d_n \end{cases}$ 是齐次线性方程组 1.1.5 的解,则

 $\begin{cases} x_1 = c_1 + d_1 \\ x_2 = c_2 + d_2 \\ \dots \end{cases}$ 是非齐次线性方程组 1.1.3 的解.

例 1.5 下述方程组中, 哪些是阶梯形方程组, 哪些是行简化阶

梯形方程组? (3) $\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 7 \\ x_4 = 6 \end{cases}$

例 1.6 在对线性方程组作初等变换时,能否用 0 乘以某个方程的两边? 为什么?

例 1.7 是否存在恰好有两个解的线性方程组? 为什么?

例 1.8 给定一个由 m 个方程组成的 n 元非齐次线性方程组. 判断下列说法是否正确, 并简要说明理由.

- (1) 如果 m < n, 则该方程组一定有无穷多个解.
- (2) 如果 m < n, 且该方程组有解, 则有可能只有一个解.
- (3) 如果 m = n, 则该方程组一定有唯一解.
- (4) 如果 m > n, 则该方程组一定没有解.
- (5) 如果 m > n, 则该方程组可能有且仅有一个解.
- (6) 如果 m > n, 则该方程组可能有无穷多个解.

例 1.9 给定一个由 m 个方程组成的 n 元齐次线性方程组. 判断下列说法是否正确, 并简要说明理由.

- (1) 如果 m < n, 则该方程组一定有无穷多个解.
- (2) 如果 m = n, 则该方程组只有零解.
- (3) 如果 m > n, 则该方程组可能没有解.
- (4) 如果 m > n, 则该方程组可能只有零解.
- (5) 如果 m > n, 则该方程组可能有非零解.

例 1.10 证明: 线性方程组的初等变换一定把齐次线性方程组变为齐次线性方程组, 把非齐次线性方程组变为非齐次线性方程组.

例 1.11 求
$$a, b, c$$
 使得
$$\begin{pmatrix} -1 & a+b & 0 \\ c-2 & -1 & a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 7 & 0 \\ 3a-2b & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

写为:
$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$
正确的增广矩阵和系数矩阵.

例 1.12 有人把线性方程组 $\begin{cases} x_2 - 2x_3 = -1 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 = 1 \end{cases}$ 的增广矩阵 $2x_1 - x_3 = 0$ 写为: $\widetilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. 是否正确?若不正确,请写出

例 1.13 下述初等行变换是否正确? 如果不正确, 说明理由.

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(2) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(3) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(4) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例 1.15 用初等行变换把
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & -8 \\ -3 & 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$
 化为行简

化阶梯形矩阵.

例 1.16 设
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 & -4 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \\ -3 & 0 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$
. 用初等行变换把 \mathbf{A} 变为一个阶梯形矩阵.

例 1.17 设
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 & -4 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \\ -3 & 0 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$
. 用初等行变换把 \mathbf{A} 变为行简化阶梯形矩阵.

例 1.18 请写出下面方程组的系数矩阵、常数项矩阵、未知量矩阵和增广矩阵.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3^2 x_3 = 3 \end{cases}$$

例 1.19 求矩阵
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 7 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$
 的最简阶梯形矩阵.

例 1.20 求线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases}$$
 的解集.
$$3x_1 + 4x_2 + x_3 = 3$$

例 1.21 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 5x_2 + x_3 + 5x_4 = 1 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$ 什么时候无 $x_1 + 3x_2 + ax_3 + 3x_4 = a$

解?什么时候有解?有解时,什么时候有有唯一解,什么时候有无穷多组解?有解时,并将所有的解表示出来.其中 a 是常数.