

Cálculo 1 - Limites

Wandeson Ricardo

10 de outubro de 2020

Sumário

0.1	Definição Intuitiva de Limite	2
0.2	Leis dos Limites	5

0.1 Definição Intuitiva de Limite


Um objeto percorre uma distância ao longo do tempo t . Em um instante t qualquer desejamos saber a velocidade do objeto. Sabemos que a velocidade média escalar deste objeto é dada por $V_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ onde Δs é a variação do espaço e Δt a variação do tempo ao longo daquela distância percorrida.

Observamos que no instante de tempo $t_{inicial}$ e t_{final} o objeto percorreu uma distância Δs onde $s_{inicial}$ e s_{final} fornecem sua posição. Podemos escrever da seguinte forma,

$$V_m := \frac{s_{final} - s_{inicial}}{t_{final} - t_{inicial}} \quad (1)$$

Em (1) observamos que a velocidade escalar média é a razão entre a variação do espaço percorrido Δs em um determinado intervalo de tempo Δt . Mas contudo e se desejássemos saber a velocidade num instante t ao invés do intervalo Δt .

Imaginemos o seguinte, temos um instante qualquer t_0 e tomamos um incremento nesse tempo o qual chamaremos de ε .



Seja $f(t) = y$ uma função de \mathbb{R} em \mathbb{R} que define a posição de um carro no instante t . A posição após t segundos é medida em metros. Podemos ver de (1) que a inclinação da reta secante r que contém os pontos P e Q nos fornece a velocidade média no intervalo de tempo $[t_0, t_1]$. Logo,

$$v_m = \frac{f(t_1) - f(t_0)}{t_1 - t_0} \quad (2)$$

que é exatamente a inclinação m_{PQ} da reta secante r .

Tomemos agora um P' qualquer sobre a curva cujas coordenadas são $(t_0 + \varepsilon, f(t_0 + \varepsilon))$ onde ε significa um pequeno incremento em t_0 .

A inclinação da reta secante s por PP' é dada por,

$$m_{PP'} = \frac{f(t_0 + \varepsilon) - f(t_0)}{(t_0 + \varepsilon) - t_0}$$

ou

$$m_{PP'} = \frac{f(t_0 + \varepsilon) - f(t_0)}{\varepsilon} \quad (3)$$

Tomando-se ε cada vez menor, teremos um $t_0 + \varepsilon$ cada vez mais próximo de t_0 . Esse valor tomado cada vez menor é o que chamaremos de limite para o qual ε ficará bem próximo de 0 mas $\varepsilon \neq 0$. Em símbolos teríamos,

$$\varepsilon \longrightarrow 0 \quad \text{talque} \quad t_0 + \varepsilon \longrightarrow t_0$$

Assim definimos o limite de forma intuitiva como,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + \varepsilon) - f(t_0)}{\varepsilon} = L \quad (4)$$

que nos fornecerá a velocidade no instante exato t_0 . No gráfico acima de $f(t)$ estaríamos tomando o ponto P' cada vez mais próximo de P .

Temos também que,

$$m = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + \varepsilon) - f(t_0)}{\varepsilon} = L$$

é nada mais que a equação da reta tangente da função f no ponto $P = (t_0, f(t_0))$.

E a velocidade no instante t_0 , ou seja, a *velocidade instantânea* seria dada por

$$v(t) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + \varepsilon) - f(t_0)}{\varepsilon} \quad (5)$$

Exemplo 1: Seja $f(x) = x^2 - 4$ calcular o limite quando x se aproxima de 1.

Solução: Verifiquemos a tabela com valores de x cada vez mais próximos de 1.

Tabela 1: $x > 1$	
x	$f(x)$
2	0
1.5	-1.75
1.4	-2.04
1.3	-2.31
1.2	-2.56
1.1	-2.79
1.05	-2.8975
1.025	-2.949375
1.0125	-2.97484375
1.00625	-2.9874609375
1.001	-2.99799
1.0001	-2.9997999

Tabela 2: $x < 1$	
x	$f(x)$
0	-4
0.5	-3.75
0.6	-3.64
0.7	-3.510
0.8	-3.36
0.9	-3.19
0.95	-3.0975
0.96	-3.0784
0.97	-3.0591
0.98	-3.0396
0.99	-3.0199
0.995	-3.0099

Das tabelas (1) e (2) notamos que a medida que o valores de x se aproximam de 1 os valores para $f(x)$ ficam cada vez mais próximos de -3 podemos daí supor que o limite seria -3.

Vejamos abaixo.

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^2 - 4$$

A medida que $x \rightarrow 1$ temos $x^2 \rightarrow 1$ logo $(x^2 - 4) \rightarrow -3$.
Portanto $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4) = -3$.

Definimos o limite de $\mathbf{f(x)}$ como,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

onde a medida que \mathbf{x} se aproxima de \mathbf{a} , com $x \neq a$, temos que $\mathbf{f(x)}$ se aproxima de \mathbf{L} que é o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow a$.

0.2 Leis dos Limites

Propriedades e leis de limites

Leis dos Limites. *Seja c uma constante e funções $f(x)$ e $g(x)$, onde existem*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ e } \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

então valem,

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
3. $\lim_{x \rightarrow a} [cg(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
5. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$.
6. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$ onde n é um inteiro positivo.
7. $\lim_{x \rightarrow a} c = c$
8. $\lim_{x \rightarrow a} x = a$
9. $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$ onde n é um inteiro positivo
10. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{a}$ onde n é um inteiro positivo. (Se n for par supomos $a > 0$.)
11. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$ onde n é um inteiro positivo. (Se n for par supomos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$.)