

## 第五次作业

题目 1. (44) 令  $X_1, \dots, X_n$  是来自  $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} I_{[\theta, \infty)}(x)$ , ( $\theta \in \mathbb{R}^1$ ) 的随机样本.

- 求解一个充分统计量.
- 求出  $\theta$  的 MLE.
- 求出  $\theta$  的矩估计.
- 求解一个完备充分统计量.
- 求解  $\theta$  的 UMVUE.
- 求出关于  $\theta$  的 Pitman 估计量.
- 使用先验分布  $g(\theta) = e^{-\theta} I_{(0, \infty)}(\theta)$ , 求出  $\theta$  的后验 Bayes 估计量.

解答. (a).  $\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n e^{-(x_i-\theta)} I_{[\theta, \infty)}(x_i) = I_{(-\infty, y_1]}(\theta) e^{n\theta} e^{-\sum_{i=1}^n x_i}$ , 则  $Y_1 = \min\{X_1, \dots, X_n\}$  是一个充分统计量.

(b). 由于  $\mathcal{L}(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n e^{-(x_i-\theta)} I_{[\theta, \infty)}(x_i) = \exp\left\{-\sum_{i=1}^n x_i + n\theta\right\} I_{(-\infty, y_1]}(\theta)$ , 其中  $Y_1 = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ , 则 MLE 为  $\hat{\theta} = Y_1$ .

(c).  $\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}(X) = \int_{\theta}^{\infty} x e^{-(x-\theta)} dx = \int_0^{\infty} (x+\theta) e^{-x} dx = \frac{\Gamma(2)}{1^2} + \theta = 1 + \theta$ , 于是  $\theta$  的矩估计为  $\tilde{\theta} = \bar{X} - 1$ .

(d). 下面证明  $Y_1$  是完备的,  $f_{Y_1} = n[1 - F_x(y)]^{n-1} f_x(y) = n e^{-n(y-\theta)}$ , 令  $z(\cdot)$  是任意实值函数, 满足  $\mathbb{E}(z(Y_1)) = 0$ ,  $\theta \in \mathbb{R}^1$ , 于是

$$\mathbb{E}(z(Y_1)) = \int_{\theta}^{\infty} z(y) n e^{-n(y-\theta)} dy = \int_{-\infty}^{-\theta} z(y) e^{-ny} dy = 0$$

对  $-\theta$  求导可得  $z(-\theta) e^{n\theta} = z(-\theta) = 0$ , 由  $\theta$  的任意性可知  $z(\cdot) \equiv 0$ , 则  $P(z(Y_1) = 0) = 1$ , 所以  $Y_1$  是完备的, 结合 (a) 可知  $Y_1$  是完备充分统计量.

(e). 由于  $\mathbb{E}(Y_1) = \int_{\theta}^{\infty} y n e^{-n(y-\theta)} dy = n \int_0^{\infty} (y+\theta) e^{-ny} dy = n \int_0^{\infty} y e^{-ny} dy + \theta \int_0^{\infty} n e^{-ny} dy = \frac{1}{n} + \theta$ . 于是  $Y_1 - 1/n$  是  $\theta$  的 UMVUE.

(f).  $X - \theta \sim e^{-x} I_{[0, \infty)}(x)$ , 于是  $\theta$  为位置参数, 则 Pitman 估计量为

$$\frac{\int \theta \mathcal{L}(\theta) d\theta}{\int \mathcal{L}(\theta) d\theta} = \frac{\int_{-\infty}^{y_1} \theta e^{n\theta} d\theta}{\int_{-\infty}^{y_1} e^{n\theta} d\theta} = \frac{\left(\frac{y_1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) e^{ny_1}}{\frac{1}{n} e^{ny_1}} = y_1 + \frac{1}{n}$$

(g). 由于  $\mathcal{L}(\theta) = e^{n\theta - \sum_{i=1}^n x_i} I_{(-\infty, y_1]}(\theta) \propto e^{n\theta} I_{(-\infty, y_1]}(\theta)$  且  $f(\theta|x_1, \dots, x_n) = \int \mathcal{L}(\theta) g(\theta) d\theta = \int_0^{y_1} e^{(n-1)\theta} d\theta = \frac{e^{(n-1)y_1} - 1}{n-1}$ , ( $y_1 > 0$ ). 则

$$f(\theta|x_1, \dots, x_n) = \frac{\mathcal{L}(\theta)g(\theta)}{\int \mathcal{L}(\theta)g(\theta) d\theta} = \frac{n-1}{e^{(n-1)y_1} - 1} e^{(n-1)\theta} I_{(0, y_1]}(\theta).$$

于是

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\theta|x_1, \dots, x_n] &= \int_0^{y_1} \theta \frac{n-1}{e^{(n-1)y_1} - 1} e^{(n-1)\theta} d\theta = \frac{n-1}{e^{(n-1)y_1} - 1} \int_0^{y_1} \theta e^{-(1-n)\theta} d\theta \\ &= \frac{n-1}{e^{(n-1)y_1} - 1} \cdot \frac{\Gamma(2)}{(1-n)^2} = \frac{1}{(n-1)(e^{(n-1)y_1} - 1)}\end{aligned}$$

则  $\theta$  的后验 Bayes 估计量为  $\frac{1}{(n-1)(e^{(n-1)y_1} - 1)}$ .

**题目 2. (47)** 令  $X_1, \dots, X_n$  是来自离散分布  $f(x; \theta) = \binom{2}{x} \theta^x (1-\theta)^{2-x} I_{\{0,1,2\}}(x)$ , ( $\theta > 0$ ) 的随机变量.

(a). 是否存在一维的充分统计量, 若存在, 是否完备?

(b). 求解  $\theta^2 = P(X_1 = 2)$  的 MLE, 并判断是否是无偏的.

(c). 求解一个关于  $\theta$  的无偏统计量, 且满足 C-R 下界. 若不存在, 证明之.

(d). 求解一个  $\theta^2$  的 UMVUE.

(e). 利用平方损失函数求解  $\theta$  关于先验分布为 Beta 分布的 Bayes 估计. Beta 分布为  $g(\theta) = \frac{1}{B(a, b)} \theta^{a-1} (1-\theta)^{b-1} I_{(0,1)}(\theta)$ .

(f). 使用平方误差损失函数, 求解  $\theta$  的极小化极大估计.

(g). 求解  $\theta^2$  均方误差的一致估计.

**解答.** (a). 由于

$$f(x; \theta) = \exp\{2 \log(1-\theta)\} \binom{2}{x} I_{\{0,1,2\}}(x) \exp\left\{x \log \frac{\theta}{1-\theta}\right\}$$

令  $a(\theta) = \exp\{2 \log(1-\theta)\}$ ,  $b(x) = \binom{2}{x} I_{\{0,1,2\}}(x)$ ,  $c(\theta) = \log \frac{\theta}{1-\theta}$ ,  $d(x) = x$ . 则  $\sum_{i=1}^n X_i$  是完备充分统计量.

$$(b). \mathcal{L}(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = (1-\theta)^{2n} \left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)^{\sum_{i=1}^n x_i} \left[\prod_{i=1}^n \binom{2}{x_i} I_{\{0,1,2\}}(x_i)\right],$$

$$\begin{aligned}\log \mathcal{L}(\theta) &= 2n \log(1-\theta) + \sum_{i=1}^n \frac{\theta}{1-\theta} + \sum_{i=1}^n \log \binom{2}{x_i} I_{\{0,1,2\}}(x_i), \text{ 于是 } \frac{\partial \log \mathcal{L}(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{2n}{1-\theta} + \\ &\frac{1}{\theta(1-\theta)} \sum_{i=1}^n x_i = 0, \text{ 得到 } \theta \text{ 的 MLE 为 } \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{2}, \text{ 于是 } \hat{\theta}^2 = \frac{\bar{X}^2}{4}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\bar{X}^2/4) &= \frac{1}{4n^2} \mathbb{E} \left[ \sum_{i=1}^n X_i \right]^2 = \frac{1}{4n^2} \mathbb{E} \left[ \sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j \right] \\ &= \frac{1}{4n^2} [n \mathbb{E}(X^2) + n(n-1)(\mathbb{E}X)^2] = \frac{1}{4n^2} [n(\text{Var}(X) + (\mathbb{E}X)^2) + n(n-1)(\mathbb{E}X)^2] \\ &= \frac{1}{4n^2} [n \text{Var}(X) + n^2 (\mathbb{E}X)^2] = \theta^2 + \frac{\theta(1-\theta)}{2n}\end{aligned}$$

所以  $\hat{\theta}^2$  不是无偏估计.

(c). 由上一问可知

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x_i; \theta) &= \frac{\partial \log L(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{2n}{1-\theta} + \frac{1}{\theta(1-\theta)} \sum_{i=1}^n x_i \\ &= \frac{2n}{\theta(1-\theta)} \left( \frac{\bar{X}}{2} - \theta \right)\end{aligned}$$

又由于  $\mathbb{E} \left[ \frac{\bar{X}}{2} \right] = \mathbb{E}(X)/2 = \theta$ , 所以  $\bar{X}/2$  是  $\theta$  的无偏统计量且满足 C-R 下界.

(d). 由 (b) 小问可知  $\mathbb{E}[\bar{X}^2/4] = \frac{2n-1}{2n}\theta^2 + \frac{\theta}{2n}$ , 于是  $\frac{2n}{2n-1} \left( \frac{\bar{X}^2}{4} - \frac{\bar{X}}{2n} \right) = \frac{\bar{X}(n\bar{X}-1)}{2(2n-1)}$

是  $\theta^2$  的无偏估计, 且是关于完备充分统计量  $\sum_{i=1}^n X_i$  的函数, 于是也是  $\theta^2$  的 UMVUE.

(e).  $\theta$  的后验概率密度函数为

$$\begin{aligned}f(\theta|x_1, \dots, x_n) &= \frac{\mathcal{L}(\theta)g(\theta)}{\int_0^1 \mathcal{L}(\theta)g(\theta) d\theta} \propto (1-\theta)^{2n} \left( \frac{\theta}{1-\theta} \right)^{\sum_{i=1}^n x_i} \theta^{a-1} (1-\theta)^{b-1} \\ &\propto \theta^{a-1+\sum_{i=1}^n x_i} (1-\theta)^{b-1+2n-\sum_{i=1}^n x_i} \sim \text{Beta} \left( a + \sum_{i=1}^n x_i, b + 2n - \sum_{i=1}^n x_i \right)\end{aligned}$$

由于平方损失函数下 Bayes 估计就是后验 Bayes 估计, 于是  $\mathbb{E}[\theta|X_1, \dots, X_n] = \frac{a+n\bar{X}}{a+b+2n}$  是  $\theta$  在先验分布为 Beta 分布时的 Bayes 估计.

(f). 由 (e) 可知,  $\theta$  的后验 Bayes 估计为  $\mathbb{E}[\theta|X_1, \dots, X_n] = \frac{a+n\bar{X}}{a+b+2n}$ , 由于损失函数为平方损失, 则后验 Bayes 估计即为 Bayes 估计. 下面求解风险函数为常数, 令  $c = \frac{1}{a+b+2n}$ , 则

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(\theta) &= \mathbb{E} \left[ \frac{a+n\bar{X}}{a+b+2n} - \theta \right]^2 = \mathbb{E} [cn\bar{X} + ac - \theta]^2 = \mathbb{E} [c(n\bar{X} - 2n\theta) + (2nc - 1)\theta + ac]^2 \\ &= c^2 \text{Var}(n\bar{X}) + [(2nc - 1)\theta + ac]^2 = c^2 \cdot 2n\theta(1-\theta) + (2nc - 1)^2 \theta^2 + 2ac(2nc - 1)\theta + a^2 c^2 \\ &= [(2nc - 1)^2 - 2nc^2] \theta^2 + [2nc^2 + 2ac(2nc - 1)] \theta + a^2 c^2\end{aligned}$$

上式与  $\theta$  无关, 得  $\begin{cases} 2nc^2 = (1 - 2nc)^2, \\ 2nc^2 = 2ac(1 - 2nc). \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = \frac{1}{\sqrt{2n} + 2n}, \\ a = \sqrt{2n}/2 \end{cases}$  于是  $b = \sqrt{2n}/2$ , 所以  $\theta$  的

Minimax 估计为  $\frac{1 + \sqrt{2n}\bar{X}}{2 + 2\sqrt{2n}}$ .

(g). 由于  $I(X_1 = 2)$  是  $\theta^2$  的无偏估计, 考虑估计量  $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 2)$ , 则  $T$  是  $\theta^2$  的无偏估计, 则 MSE 为

$$\begin{aligned}\text{MSE}_T &= \text{Var}(T) = \text{Var} \left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 2) \right] = \frac{1}{n^2} n \text{Var}(I(X = 2)) \\ &= \frac{1}{n} [\mathbb{E}(I^2(X = 2)) - \mathbb{E}[I(x_i) = 2]^2] = \frac{1}{n} (\theta^2 - \theta^4) \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

于是  $T$  是  $\theta^2$  的一致估计.