

第四次作业

题目 1. 在度量空间 l^2 中, 证明: $A = \{\xi = \{x_n\} \in l^2 : n|x_n| \leq 1\}$ 是 l^2 中的紧集.

证明. 只需证明 A 是自列紧集, 设 $\{\xi_n\} \subset A$ 是 Cauchy 列, 则 $\rho(\xi_n, \xi_m) \rightarrow 0, (n, m \rightarrow \infty)$, 于是 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i^{(n)} - x_i^{(m)}|^2 \rightarrow 0$, 所以 $\forall i \geq 1, \{x_i^{(n)}\}$ 为 \mathbb{R} 中的 Cauchy 列, 于是 $\exists x_i$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_i^{(n)} = x_i$.

令 $\xi = \{x_1, x_2, \dots\}$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$, 有 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i^{(n_0)} - x_i|^2 < \varepsilon^2$, 则 $|x_i^{(n_0)} - x_i| < \varepsilon$. 又由于 $\xi_{n_0} \in A$, 则 $\exists N \geq [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$ 使得 $\forall k \geq N$ 有 $|x_k^{(n_0)}| \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$, 于是

$$|x_i| \leq |x_i - x_i^{(n_0)}| + |x_i^{(n_0)}| < 2\varepsilon$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi \in A$, 所以 A 是自列紧集, 故 A 是紧集. □

题目 2. 用闭区间套定理证明压缩映射原理.

证明. 设度量空间为 (X, ρ) , T 为 X 上的压缩映射. 下面证明集列 $A_n = \{x \in X : \rho(x, Tx) < \frac{1}{n}\}$ 是单调递减直径趋于 0 的非空闭集列.

单调递减: $\forall x \in A_{n+1}$, 则 $\rho(x, Tx) < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$, 故 $x \in A_n$.

非空: 设 $x_0 \in A_n$ 且 $\rho(x_0, Tx_0) = C$, 记 $x_1 = Tx_0, \dots, x_{n+1} = Tx_n$, 则

$$\rho(x_n, Tx_n) \leq \alpha \rho(Tx_{n-1}, T^2x_{n-1}) \leq \dots \leq \alpha^n \rho(x_0, Tx_0) = \alpha^n C \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$$

则 $A_n \neq \emptyset$.

闭集: $\forall m \in \mathbb{N}$, 只需证 A_m 的对极限封闭, 设 $\{x_n\} \subset A_m$ 收敛于 $x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall n \geq N$ 有

$$\rho(x, Tx) \leq \rho(x, x_n) + \rho(x_n, Tx_n) + \rho(Tx_n, Tx) \leq (\alpha + 1)\varepsilon + \frac{1}{m}$$

由 ε 的任意性可知 $x \in A_m$, 所以 A_m 是闭集.

直径趋于 0: $\forall x, y \in A_n$, 则

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, Tx) + \rho(Tx, Ty) + \rho(Ty, y) \leq \frac{2}{(1 - \alpha)n} \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \dim A_n = 0$.

综上, $\{A_n\}$ 是直径趋于零的非空闭子集套, 所以存在唯一的 $x_0 \in \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$, 则 $\rho(x_0, Tx_0) = 0$, 压缩映射原理得证. □

题目 3. 设 $K(\cdot; \cdot) \in L^2([a, b] \times [a, b])$, 对于 $f \in L^2[a, b]$, 证明当 λ 充分小时,

$x(t) = f(t) + \lambda \int_a^b k(t, s)x(s) \, ds$ 在 $L^2[a, b]$ 中存在唯一解.

题目 4. 设 $K(\cdot; \cdot) \in C([a, b] \times [a, b])$, 对于 $f \in C[a, b]$, 证明 $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$x(t) = f(t) + \lambda \int_a^t k(t, s)x(s) \, ds$ 在 $C[a, b]$ 中存在唯一解.

题目 5. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 且 $\dim X < \infty$, 则 X 是 Banach 空间.

证明. 设 $\dim X = N$, 其中的一组基为 $\{l_1, l_2, \dots, l_N\}$, $\forall \{x_n\} \subset X$ 为 Cauchy 列, 令 $x_n = \sum_{i=1}^N x_i^{(n)} l_i$, 则 $\exists c_1 > 0$ 使得

$$c_1 \left(\sum_{i=1}^N (x_i^{(n)} - x_i^{(m)})^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|x_n - x_m\| \rightarrow 0, \quad (n, m \rightarrow \infty)$$

则 $|x_i^{(n)} - x_i^{(m)}| \rightarrow 0$, $(n, m \rightarrow \infty, \forall 1 \leq i \leq N)$, 则 $\{x_i^{(n)}\}$ 为 \mathbb{R} 中的 Cauchy 列, 由于 \mathbb{R} 是完备的, 所以 $\{x_i^{(n)}\}$ 收敛, $\exists x_i \in \mathbb{R}$ 使得 $x_i^{(n)} \rightarrow x_i$, $(n \rightarrow \infty)$, 令 $x = \sum_{i=1}^N x_i l_i$, 又由于 $\exists c_2 > 0$ 使得

$$\|x_n - x\| \leq c_2 \left(\sum_{i=1}^N (x_i^{(n)} - x_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty)$$

则 $\{x_n\}$ 收敛于 x , 则 X 是完备的, 故 X 是 Banach 空间. \square

题目 6. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, X 中的任何有限维子空间都是闭集.

证明. 设 $A \subset X$ 是 N 维子空间 ($N < \infty$), 其中一组基为 $\{l_1, \dots, l_N\}$, $\forall \{x_n\} \in A$ 为收敛列, 令 $x_n = \sum_{i=1}^N x_i^{(n)} l_i$, 则 $\exists x \in X$, 使得 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, $(n \rightarrow \infty)$. 假设 $x \notin A$, 则 x 与 $\{l_1, \dots, l_N\}$ 线性无关, 则 $\{l_1, \dots, l_N, x\}$ 构成 $N+1$ 维空间的一组基, 由于 $\|\cdot\|$ 与 $N+1$ 维空间坐标对应 2-范数等价, 于是

$$\left(\sum_{i=1}^N (x_i^{(n)})^2 + 1 \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty)$$

矛盾, 所以 $x \in A$. \square

题目 7. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 且 $\dim X < \infty$, 则 X 中的有界集都是列紧集.

证明. 设 $\dim X = N$, 其中的一组基为 $\{l_1, \dots, l_N\}$, $\forall A \subset X$ 为有界集, 则 $\exists C > 0$, 使得 $\forall x \in A$, $\|x\| < C$, 令 $x = \sum_{i=1}^N x_i l_i$, 则 $\sum_{i=1}^N |x_i| \|l_i\| < C$, 记 $M_1 = \sup_{1 \leq i \leq N} \|l_i\|$, 则 $\sum_{i=1}^N |x_i| \leq C/M_1$, 于是 $(x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$ 有界. 任取 A 中的数列 $\{x_n\}$, 令 $x_n = \sum_{i=1}^N x_i^{(n)} l_i$, 记 $S = \{(x_1^{(k)}, \dots, x_N^{(k)}) : x_k \in \{x_n\}\}$, 则 S 必有收敛子列 $\{(x_1^{(n_1)}, \dots, x_N^{(n_1)}), \dots, (x_1^{(n_k)}, \dots, x_N^{(n_k)}), \dots\}$, 由于 $\|\cdot\|$ 与 \mathbb{R}^N 中 2-范数等价, 于是 $\{x_{n_k}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的收敛子列, 所以 A 是列紧集. \square