$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{(1+\sin t\cos t)^2}$$

只要 $f(x)$ 是以 $T>0$ 为周期的函数，且在相关区间上可积，那么对于任意实数 $a$ 和正整数 $n$，都有：

$$\boxed{\int_a^{a+nT} f(x)\,\mathrm{d}x = n\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x}$$

这里利用了周期函数定积分的两个重要性质。

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{matrix}$$

$$|A|=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}\alpha & \frac{1}{2}\\ 0 & \beta\end{vmatrix}$$

$$\left\|\begin{matrix}\alpha & \frac{1}{2}\\ 0 & \beta\end{matrix}\right\|$$

$$\begin{Bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{Bmatrix}$$