三、肠道菌群失调与患病风险

降低,有害菌增加,从而增加多种疾病的患病风险!

肠道菌群与多种疾病的发生发展直接相关。科学研究发现,喜欢喝酸奶的人群体内的双歧杆菌等益生菌含量比较高,这些益生菌产生许多有益于肠道健康的有益物质,能促进排便和排毒,减少了患肠道疾病的风险;即使是食用高脂肪食物,肠道内脂肪代谢相关的细菌,帮助维持代谢的平衡。而经常熬夜、生活不规律的人群,肠道菌群的多样性

阵忧,有舌困境加,从凹境加多种疾病的恶病风险!		
疾病	相关肠道菌群	临床症状
炎症性肠病	患有炎症性肠病的人群,肠道菌群多样性较低, 某些致病菌增加,而产丁酸菌比例减少,提示炎 症性肠病与肠道菌群失调密切相关。肠道菌群失 调可能引起免疫调节异常、炎症反应异常,进而 促进炎性肠病的发生。	溃疡性结肠炎表现为持续或者反复发作的腹泻、 黏液脓血便伴腹痛、里急后重和不同程度的全身 症状。病程多在4~6周以上,可有关节、皮肤、 眼、口、肝胆等肠外表现。 克罗恩病表现为慢性起病、右下腹痛或脐周痛、 腹泻,可伴腹部肿块、梗阻、肠瘘、肛门病变和 反复口腔溃疡,以及发热、贫血、体重下降等全 身症状。
功能性便秘	功能性便秘与肠道菌失调密切相关,研究表明, 便秘患者肠道菌群失衡,某些有害菌比例增加, 而益生菌如双歧杆菌属、乳酸杆菌属细菌比例减 少。	表现为排便次数减少、粪便干硬和(或)排便困难。 排便次数减少指每周排便少于3次。排便困难包括 排便费力、排出困难、排便不尽感、排便费时以 及需手法辅助排便。
结直肠癌	结肠癌患者的肠道菌群与健康者相比,存在着明显失调,某些菌如大肠埃希氏菌、具核梭菌、脆弱拟杆菌、粪肠球菌等可通过释放活性氧簇(ROS)、引发炎症反应、释放内毒素、改变局部代谢水平等促进结直肠癌的发生发展。	早期结直肠癌可无明显症状,病情发展到一定程度可出现下列症状: 1.排便习惯改变。2.大便性状改变(变细、血便、黏液便等)。3.腹痛或腹部不适。4.腹部肿块。5.肠梗阻相关症状。6.贫血及全身症状: 如消瘦、乏力、低热等。
2型糖尿病	2型糖尿病患者的肠道菌群存在着明显失调,产丁酸菌下降而某些机会致病菌比例增加。肠道菌群可能通过引发炎症反应、改变代谢水平等促进2型糖尿病的发生发展。	多饮、多食、多尿、体重下降
肥胖症	肥胖者肠道菌群发生明显失调,其厚壁菌门细菌 比例增加而拟杆菌门细菌比例减少,可能通过引 发炎症反应,代谢异常,参与肥胖的发生发展。	BMI 大于28; 轻度肥胖多无症状,中、重度肥胖症可引起气 急、关节痛、肌肉酸痛、体力活动减少以及焦 虑、忧郁等。