

结肠癌早期症状	
大便习惯的改变	<ul style="list-style-type: none"><li>• 右半结肠癌早期粪便稀薄，有脓血，排便次数增多；癌肿继续增大时还可出现交替出现的腹泻与便秘。</li><li>• 左半结肠癌，表现为排便困难，并随病情的发展而不断加重。</li><li>• 癌肿位置较低，出现排便不畅和里急后重的感觉。</li></ul>
消化道症状	<ul style="list-style-type: none"><li>• 右半结肠癌，腹痛不适或隐痛，开始时可为间歇性，后转为持续性，常位于右下腹部。</li><li>• 左半结肠癌，表现为梗阻，可突发，出现腹部绞痛，伴腹胀、肠蠕动亢进、便秘和排气受阻，或慢性梗阻症状等。</li></ul>
中毒症状	<ul style="list-style-type: none"><li>• 早期结肠癌症状还包括常表现为患者出现贫血、低热、乏力、消瘦、浮肿等，其中尤以贫血、消瘦为著。</li></ul>
腹部包块	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50%左右的患者可发现腹部包块，系癌肿或与网膜、周围组织浸润粘结的肿块，质硬，形状不规则，某些包块可随肠管有一定的活动度，而晚期结肠癌由于癌肿浸润较甚者，致使包块固定。</li></ul>
粪便带血或粘液	<ul style="list-style-type: none"><li>• 右半结肠癌，出血量小且由于结肠的蠕动使之与粪便充分混合，肉眼观察不易看出，但隐血试验常为阳性。</li><li>• 左半结肠癌，出血和粘液不与粪便相混，约有1/4的患者可在粪便中肉眼观察到鲜血和粘液。</li></ul>
肠梗阻表现	<ul style="list-style-type: none"><li>• 不全性或完全性低位肠梗阻症状，如腹胀，腹痛（胀痛或绞痛），便秘或便闭。体检可见腹隆、肠型、局部有压痛，并可闻及亢进的肠鸣音。</li></ul>