



泰济生健康管理有限公司
Tai Ji Sun Health Management Co., Ltd.



肠道微生物生态检测

Detection of Intestinal Microbial Ecosystem

尊享版



解密肠道微生态
Explore your Microbiome

| | |
|-------|-------------|
| 检测者姓名 | Tom |
| 性别 | 男 |
| 年龄 | 29 |
| 样品编号 | Demo |
| 送检机构 | 泰济生健康管理有限公司 |
| 收样日期 | 2017-03-01 |
| 报告日期 | 2017-07-25 |

报告目录

| | |
|-----------------|----|
| 第一部分 前言 | 1 |
| 第二部分 检测结果 | 2 |
| 消化和吸收 | 3 |
| 消化和吸收总评 | 4 |
| 物质代谢 | 5 |
| 菌群代谢 | 8 |
| 炎症和免疫 | 10 |
| 肠道菌群 | 12 |
| 分布 | 13 |
| 致病菌 | 17 |
| 相关疾病风险分析 | 19 |
| 粪便状态 | 22 |
| 第三部分 健康建议 | 23 |
| 膳食方案 | 24 |
| 肠道调节方案 | 25 |
| 运动方案 | 25 |
| 第四部分 附录 | 26 |
| I 肠道健康 | 26 |
| II 肠道调养 | 30 |
| III 健康风险 | 38 |
| IV 相关疾病 | 43 |
| V 参考列表 | 49 |
| 第五部分 泰济生 | 51 |



前言

微生物群体几乎存在于这个世界中每一个生态群落之中，并扮演着不可或缺的角色。在人体的体表及与外界相通的各个腔道，存在着大量的微生物菌群，并且与人体的健康息息相关。根据美国著名微生物学家Thomas Luckey估计，人体内细菌的数量大约是人体细胞的10倍，即人体细胞大约为40万亿个，那么，细菌数量约为400万亿个。

在人体肠道内寄生的这些微生物，可以帮助人体获得某些必要的微量元素，也有可能造成感染、引发炎症、影响蛋白质和脂类的消化吸收、影响抵御感染的能力、改变自体免疫疾病的患病风险，还能影响人体对癌症等各类疾病治疗药物的反应。当菌群的分布和丰度处于优化平衡状态时候（菌群平衡），这些菌群有利于维持人体健康。而一旦菌群失衡，则人体健康风险将会大大增加。

近年来，随着测序技术和信息技术的快速发展，利用新一代测序技术（Next Generation Sequencing, NGS）研究肠道菌群，能快速准确的得到大量生物数据和丰富的微生物研究信息，成为研究人体微生物多样性和环境样品的重要的手段，如人体微生物组计划（HMP, Human Microbiome Project, <http://www.hmpdacc.org/>），全球微生物组计划等（EMP, Earth Microbiome Project: <http://www.earthmicrobiome.org/>）。

我们利用NGS检测肠道微生物的方法，通过检测人体肠道菌群种类与数量及有益菌群与有害菌群的比例，帮助您了解自己的肠道菌群状态，及时发现可能的健康风险，并结合最新的研究成果，为您制定针对性的调理方案，从而促进肠道健康。

我们将您的报告分为四个部分：

前言

检测结果



健康建议

附录

检测结果

 质地:  颜色: 


| 颜色指示: ● 绿色为正常 ○ 橙色为需要关注 ● 红色为有风险



消化和吸收

科学研究表明，肠道微生物和消化、吸收作用是联系在一起的。在动物实验中，无菌小鼠需要多摄取30%的碳水化合物，才能和正常有菌小鼠的体重相当。对人类来说，植物中的纤维素和半纤维素类多糖是无法消化的，而肠道菌群中的拟杆菌等细菌则具有一系列多糖消化酶，可分解这些多糖，从而为人类提供能量。除此之外，肠道菌群通过发酵还能产生短链脂肪酸和维生素供人体吸收，这些都是人体健康所必需物质。肠道菌群能够促进或者影响碳水化合物、脂类、蛋白质及其他物质的消化吸收，从而影响人体的健康。

肠道中代谢各种营养物质的细菌丰度，可以间接反应各种代谢能力。例如，淀粉和蔗糖等的代谢能力可以反映人体在供能、抗寒和解毒护肝方面的能力；脂肪酸代谢能力可以反映人体在降脂、抗动脉粥样硬化方面的能力，谷胱甘肽代谢能力可以反映人体在免疫、抗衰老、解毒方面的能力。我们通过分析相关的菌群，来评估您的消化和吸收能力，这些指标也与您的健康息息相关。




消化和吸收总评

Tom 先生：

蛋白质、脂类、碳水化合物是维持人体生命及健康的重要营养物质。蛋白质是生命的物质基础，构成人体各个组织器官，实现各种生理功能；脂类是人体主要储能物质；碳水化合物是机体最重要的直接供能物质。肠道菌群在蛋白质、脂类、碳水化合物的消化、代谢过程中起着重要的作用。

您肠道内参与蛋白降解产物、脂肪降解产物、碳水化合物降解产物的菌群指标存在异常，不利于人体健康，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|--------------------------|---|----------------------|
| 蛋白降解产物 蛋白质消化吸收能力 |  | 偏低 不利于人体获得必需氨基酸 |
| 脂肪降解产物 脂肪消化吸收能力 |  | 偏低 不利于人体获得必需脂肪酸 |
| 碳水化合物降解产物 碳水化合物消化吸收能力 |  | 偏低 不利于维持肠道稳态和菌群平衡 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群


物质代谢 – 蛋白质的消化与吸收

Tom 先生：

蛋白质是组成人体细胞、组织的重要成分，是生命活动的主要承担者，没有蛋白质就没有生命。除了与结构和性状有关，蛋白质还参与基因表达的调节、各种生物化学反应、神经传递等生命过程。

您肠道内参与蛋白质总量、谷胱甘肽代谢、牛磺酸代谢的菌群指标存在异常，可能增加心脑血管疾病的风

险，不利于获得必需氨基酸、机体解毒功能、抗氧化能力等，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 蛋白质总量 蛋白质是一切生命活动的物质基础 |  | 偏低 不利于人体获得必需氨基酸 |
| 谷胱甘肽代谢 抗衰老、解毒 |  | 偏低 不利于机体解毒功能和抗氧化能力 |
| 牛磺酸代谢 维持心血管、骨骼肌、视网膜和中枢神经系统正常功能 |  | 偏低 不利于保护视力，可能增加心血管疾病风险 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群



偏低：您的检测值低于84%的人群

物质代谢 – 脂类的消化与吸收

Tom 先生：

脂类是人体主要储能物质，同时起到保护脏器、保持体温的作用。除此之外，脂类还参与细胞膜的构成、信号传递、形成激素等生命过程。

您肠道内参与脂肪总量、脂肪酸代谢、甘油三酯代谢等的菌群指标存在异常，可能增加动脉硬化、心脑血管疾病的风险，不利于获得必需脂肪酸、降脂、细胞的生长与凋亡，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 脂肪总量 保护脏器，提供必需脂肪酸 |  | 偏低 不利于人体获得必需脂肪酸 |
| 脂肪酸代谢 降脂、抗动脉硬化 |  | 偏低 不利于降脂，可能增加动脉硬化风险 |
| 甘油三酯代谢 为机体提供能量，与动脉硬化有关 |  | 偏低 供能减少，可能增加动脉硬化风险 |
| 甘油磷脂代谢 降脂、防治心脑血管病，增强记忆力 |  | 偏低 可能增加心脑血管疾病风险 |
| 鞘脂代谢 参与调节细胞的生长与凋亡 |  | 偏低 不利于细胞的生长与凋亡 |
| 亚油酸代谢 预防心脑血管疾病，抗过敏，健脑，保护视力 |  | 偏低 可能增加心脑血管疾病及过敏风险 |
| 花生四烯酸代谢 调节脂质蛋白的代谢，有助于预防心脑血管疾病 |  | 偏低 不利于脂质蛋白的代谢，增加心脑血管疾病风险 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群



偏低：您的检测值低于84%的人群

物质代谢 – 碳水化合物的消化与吸收

Tom 先生：

碳水化合物是人体直接供能物质，维持机体的正常活动。除此之外，碳水化合物还参与维持大脑功能、调节脂肪代谢等重要生命过程。

您肠道内参与碳水化合物总量、半乳糖代谢、果糖和甘露糖代谢等的菌群指标存在异常，可能增加便秘的风险，不利于肠道稳态、菌群平衡、半乳糖消化等，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 碳水化合物总量 主要的供能物质 |  | 偏低 不利于维持肠道稳态和菌群平衡 |
| 半乳糖代谢 生成短链脂肪酸和乳酸，有利于肠道有益菌的生长 |  | 偏低 不利于半乳糖的消化及肠道有益菌的生长 |
| 果糖和甘露糖代谢 生成有机酸，抑制病原菌生长 |  | 偏低 不利于有机酸的产生，对病原菌的抑制作用减弱 |
| 蔗糖和淀粉代谢 产生短链脂肪酸，保护肠粘膜，供应能量 |  | 偏低 不利于保护肠粘膜 |
| 纤维素代谢 分解纤维素产生短链脂肪酸等有益物质，促进肠道菌生长 |  | 偏低 不利于有益物质的产生，可能增加便秘风险 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群



偏低：您的检测值低于84%的人群

菌群代谢

Tom 先生：

人体内存在多种有机小分子，如胆碱、维生素等，是维持人体生命活动必需的有机物质，也是保持人体健康的重要活性物质。这些有机小分子参与机体代谢的调节，对机体的新陈代谢、生长发育及健康有极其重要的作用。肠道菌群能够合成多种人体生长发育所必需的维生素，参与胆碱、胆汁酸等重要有机物质的代谢。

您肠道内参与维生素 B1、维生素 B2、维生素 B3 等代谢的菌群指标存在异常，可能增加头痛、肌肉酸痛、口腔炎症等的风险，不利于皮肤健康、机体物质代谢、抗衰老等，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| 维生素 B1 参与糖代谢，维持神经系统功能正常 |  | 偏低 可能引起食欲减退、乏力、头痛、肌肉酸痛 |
| 维生素 B2 促进代谢，维护皮肤和细胞膜的完整性，抗氧化 |  | 偏低 可能增加口腔与生殖器官炎症风险 |
| 维生素 B3 参与体内脂质代谢，降脂，扩张血管 |  | 偏低 可能增加黏膜炎症风险 |
| 维生素 B5 参与能量代谢及抗体合成，维持皮肤及头发健康 |  | 偏低 不利于皮肤健康 |
| 维生素 B6 抗感染，参与脂类、糖及蛋白质的代谢，参与血红蛋白合成 |  | 偏低 可能引起唇干裂、脂溢性皮炎 |
| 维生素 B7 维持皮肤及头发健康，增强免疫，与暗视力有关 |  | 偏低 可能引发脱发和白发，不利于暗视力 |
| 维生素 B9 参与氨基酸代谢，参与血红蛋白及核酸的合成，促进生长发育 |  | 偏低 可能导致巨幼红细胞性贫血、高同型半胱氨酸血症 |
| 类固醇 参与机体物质代谢，调节免疫功能 |  | 偏低 可能影响机体物质代谢，降低抵御疾病的能力 |

胆碱

肠道细菌降解胆碱会生成 TMAO，
TMAO 会增加心血管疾病风险



偏低

辅酶 Q

激活细胞呼吸代谢，抗氧化，增强免
疫力




偏低

可能降低免疫力及抗衰老能力

胆汁酸

促进食物中脂类和脂溶性维生素的
吸收



偏低

不利于摄取食物中的脂类与脂溶性维生素

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群


低：您的检测值低于97.5%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

炎症和免疫

免疫系统是人体最重要的防线。有七成以上的免疫细胞，如巨噬细胞、T细胞、NK细胞、B细胞等，分布在肠道各处。肠道免疫细胞产生七成以上的免疫球蛋白A，用来保护人体。综上所述，肠道是人体名副其实最重要的免疫器官。

肠道微生物与宿主免疫系统之间协同进化，调节B细胞、T细胞等免疫细胞功能。建立和维持肠道微生物与宿主免疫系统之间有益的相互作用是保障机体健康的关键。如果肠道菌活动发生紊乱，它们将变成致病的源头。一旦两者间的平衡被打破，各种免疫炎症性疾病，可能接踵而来。



炎症和免疫

Tom 先生：

机体免疫力是根据肠道正常菌群、肠道黏膜屏障等检测结果进行综合评价。炎症是胃肠道对外来毒素和致病微生物的防御反应，依据各类炎症反应相关的菌群综合评估。

您的异源物质降解、毒素降解、免疫指数指标存在异常，不利于人体和肠道健康，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|---------------------|---|-------------------------|
| 异源物质降解 肠道屏障功能 |  | 偏低 可能导致异源物质累积，增加疾病风险 |
| 毒素降解 维持肠道屏障功能的能力 |  | 偏低 可能导致毒素累积，增加疾病风险 |
| 免疫指数 机体免疫力 |  | 偏低 表明免疫力可能降低，增加疾病风险 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群


低：您的检测值低于97.5%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

肠道菌群

正常人体肠道内寄居着数量庞大、种类繁多的微生物，以细菌为主，统称为肠道菌群，其细胞总数高达 10^{14} 、种类 > 1000 种，是人体细胞总和的10倍。肠道菌群与人体密不可分，参与机体一系列生命活动。它不仅帮助维持能量代谢和营养吸收，也能抵御致病因子，对维护人体健康起着不可或缺的作用。

肠道各菌种与宿主相互依存、相互制约，保持一种动态平衡，一旦平衡状态被打破，将导致肠道菌群失调，引发多种疾病。肠道菌群失调还与某些疾病的发生与发展相关，如2型糖尿病、结直肠癌、炎症性肠病等。





分布




Tom 先生：


您的肠道菌群类别总共有 301 种，已知细菌 298 种；未知细菌 3 种。


您的肠道菌群多样性水平偏低，表明您的菌群平衡较差，需要注意肠道健康（儿童和老年人由于年龄因素，肠道菌群多样性水平比一般成年人差）。

您的肠道菌群多样性、有益菌、细菌敏感性等指标存在异常，可能增加菌群失衡的风险，不利于肠道健康、抵抗疾病、抗氧化等，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 肠道菌群多样性 用于衡量肠道菌群物种丰富度及稳定性 |  | 偏低 表明肠道菌群组成单一，可能增加菌群失衡风险 |
| 有益菌 产生有益物质，抑制病原菌的生长，帮助预防疾病 |  | 偏低 可能导致病原菌增多，不利于肠道健康 |
| 有害菌 损害肠道健康，可能导致疾病 |  | 偏低 |
| 细菌敏感性 抵抗致病菌的能力 |  | 偏低 对疾病抵抗力降低，不利于抵抗疾病 |
| 硫酸盐还原 产生有害气体，刺激肠道 |  | 偏低 |
| 抗氧化能力 降低炎症风险，有益肠道健康 |  | 偏低 不利于抗氧化和抗细胞衰老功能 |
| 拟杆菌属 常见肠道菌，多数与人体互利共生，少数菌种可能会导致菌血症等 |  | 偏低 不利于肠道菌群平衡 |
| 布劳特氏菌属 发酵多种植物多糖产生乙酸盐，促进肠道健康 |  | 偏低 不利于产生有益物质及肠道健康 |
| 栖粪杆菌属 发酵纤维素产生丁酸等有益物质，抑制肠道炎症，促进肠道健康 |  | 偏低 不利于产生有益物质及抑制肠道炎症 |

| | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 粪球菌属 | | 偏低 |
| 发酵多糖，能够产生丁酸、乙酸等有益物质，调节肠道环境 |  | 不利于产生有益物质及调节肠道环境 |
| 瘤胃球菌属 | | 偏低 |
| 帮助降解纤维素等人体不能消化的多糖，在肠道中广泛分布 |  | 不利于降解纤维素等多糖 |
| 颤螺菌属 | | 偏低 |
| 帮助抗性淀粉和脂肪消化，保持正常体重，抑制肠道炎症 |  | 不利于保持正常体重及抑制肠道炎症 |
| 副拟杆菌属 | | 偏低 |
| 帮助消化纤维素、抗性淀粉，保护肠道，抑制肠道炎症 |  | 不利于抑制肠道炎症及保护肠道 |
| 毛螺菌属 | | 偏低 |
| 发酵多种糖类产生乙酸、甲酸等物质，能保护肠黏膜，抑制肠道炎症 |  | 不利于产生有益物质及抑制肠道炎症 |
| 多尔氏菌属 | | 偏低 |
| 肠道的主要产气菌之一，与肠易激综合征等疾病相关 |  | |
| 链球菌属 | | 偏低 |
| 多数为共生菌，少数在免疫力弱时可能引起化脓性炎症、肺炎等 |  | 不利于肠道菌群平衡 |
| 普雷沃氏菌属 | | 偏低 |
| 肠道共生菌，偏素食人群中含量高，少数菌种与感染、牙周疾病有关 |  | 不利于肠道菌群平衡 |
| 罗斯拜瑞氏菌属 | | 偏低 |
| 产生丁酸等有益物质，抑制肠道炎症，有利于肠道及人体健康 |  | 不利于产生有益物质及抑制肠道炎症 |
| 萨特氏菌属 | | 偏低 |
| 可能与胃肠道感染相关 |  | |
| 双歧杆菌属 | | 偏低 |
| 有益菌，降解人体不能消化的多糖，产乳酸，调节免疫及肠道环境 |  | 不利于调节免疫及肠道环境 |
| 阿克曼氏菌属 | | 偏低 |
| 降解粘蛋白、调节免疫，有利于肠黏膜完整性，保持正常体重 |  | 不利于调节免疫及保持正常体重 |
| 梭菌属 | | 偏低 |
| 多数为致病菌，可能引起腹泻、肠炎等疾病 |  | |

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 嗜血杆菌属 |  | 偏低 |
| 共生菌，某些菌种在一定条件下可引起化脓性感染、败血症等 | | |
| 柯林斯氏菌属 |  | 偏低 |
| 发酵多种糖类产生氢气、乙醇等 | | 不利于发酵糖类 |
| 假单胞菌属 |  | 偏低 |
| 分布广泛，部分菌种为条件致病菌，引起医院内获得性感染 | | |
| 韦荣氏球菌属 |  | 偏低 |
| 分解乳酸为乙酸和丙酸，调节肠道 pH，极少数菌种可能引起炎症 | | 不利于产生有益物质及调节肠道 pH 值 |
| 乳杆菌属 |  | 偏低 |
| 肠道益生菌，能够生成乳酸，抑制有害菌及炎症，调节肠道环境 | | 不利于抑制肠道炎症及调节肠道环境 |
| 肠球菌属 |  | 偏低 |
| 多数为共生菌，产生乳酸。少数菌种可能导致多种感染症状 | | 不利于肠道菌群平衡 |
| 嗜胆菌属 |  | 偏低 |
| 共生菌，可能与长期高脂高蛋白饮食有关 | | |
| 沙雷氏菌属 |  | 偏低 |
| 多数为致病菌，导致尿路感染、腹膜炎等多种医院内感染 | | |
| 放线菌属 |  | 偏低 |
| 多数为共生菌，少数在免疫力弱时可引起内源性感染、龋齿等 | | 不利于肠道菌群平衡 |
| 毛杆菌属 |  | 偏低 |
| 肠道共生菌，发酵葡萄糖产生乳酸及少量乙酸和丁酸 | | 不利于肠道菌群平衡 |
| 葡萄球菌属 |  | 偏低 |
| 多数为共生菌，分解葡萄糖等产酸。少数可引起感染、食物中毒等 | | 不利于肠道菌群平衡 |
| 芽孢杆菌属 |  | 偏低 |
| 多数为共生菌，降解复杂碳水化合物。少数可引起感染、食物中毒等 | | 不利于肠道菌群平衡 |
| 阿德勒氏菌属 |  | 偏低 |
| 帮助分解食物中的异黄酮产生雌马酚，有利于肠道及人体健康 | | 不利于肠道及人体健康 |



● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低


高：您的检测值高于97.5%的人群
 低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群
 偏低：您的检测值低于84%的人群

致病菌

常言道“病从口入”。病菌随食物进入肠道后，可突破肠道粘膜屏障而侵入循环系统。当体内肠道菌群多样性高、平衡性好时，进入肠道的病菌会受到肠道有益菌群的抵御而很快被清除，因而不会致病。但是，一旦肠道菌群失调，或者人体免疫能力低下时，致病菌就会趁虚而入，危害人体健康。



肠道致病菌感染与多种疾病密切相关。细菌的致病性和毒性越高、数量越大，对人体的危害就越严重。我们为您检测92种食源性致病菌和25种机会致病菌的含量，帮助您了解潜在的健康风险。



致病菌

Tom 先生：

您的肠道内检测出含量较低的致病菌：病原性大肠埃希氏菌、脆弱拟杆菌，尽管这些致病菌含量未超标，当身体免疫力较强时可能不会出现不适感。但请注意，当您的免疫力较弱时，可能引起腹泻、腹痛、感染等病症。建议您持续监测肠道健康，一旦检测出较高含量的致病菌，建议咨询专科医生，酌情做进一步检查。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|--|---|-------|
| 病原性大肠埃希氏菌 可能导致肠胃炎、尿路感染、新生儿 儿脑膜炎、腹膜炎等 |  | 含量未超标 |
| 脆弱拟杆菌 可能导致菌血症、腹内感染、腹膜 炎 |  | 含量未超标 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

相关疾病风险分析—2型糖尿病

Tom先生：

2型糖尿病是一种代谢性疾病，表现为多饮、多尿、多食、乏力和消瘦。近年来发病率呈上升趋势。其发病与遗传因素、肥胖、高热量饮食习惯、久坐少动的生活方式及年龄等因素相关。科学研究指出，肠道微生态可能通过参与宿主的能量代谢，最终促进2型糖尿病的发生与发展。

基于您肠道菌群分析，您2型糖尿病的危险因子评估值偏低，保护因子评估值偏低，表明在其它因素相同的情况下，您体内的肠道菌群对2型糖尿病患病风险的影响是由您整体的健康状况决定的，当您健康状况改变时，肠道菌群也会发生变化，保护因子和危险因子的评估值也会相应改变。如果危险因子高于保护因子，可能会增加患2型糖尿病的风险。建议您持续监测肠道健康，保持良好的生活习惯，低脂、低糖、低热量饮食，少吃含糖高及升糖指数高的食物，适量补充益生菌，积极预防糖尿病。

2型糖尿病除了与肠道菌群相关外，还与遗传因素、生活方式及其他环境因素等相关。因此，本结果仅作为您进行全面健康管理的一项参考指标，不能作为临床诊断。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| 保护因子 调节免疫功能、能量代谢平衡，降低2型糖尿病风险 |  | 偏低 调节免疫功能以及能量代谢平衡的能力较差 |
| 危险因子 增加代谢失衡、胰岛素抵抗、2型糖尿病风险 |  | 偏低 减少代谢失衡、胰岛素抵抗风险 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

相关疾病风险分析—结直肠癌

Tom 先生：

结直肠癌是常见的消化系统恶性肿瘤，随着生活方式的改变，该病发病率在世界范围内呈逐年上升趋势。结直肠癌是大肠黏膜在环境及遗传等多种致病因素作用下发生的恶性变。近年来，有研究发现，人体内肠道菌群作为重要的环境因素在结直肠癌的发生和发展过程中发挥着重要作用。

基于您肠道菌群分析，您结直肠癌的危险因子评估值偏低，保护因子评估值偏低，表明在其他因素相同的情况下，您体内的肠道菌群对您患结直肠癌的风险影响是由您整体的健康状况决定的，当您身体健康状态改变时，肠道菌群也会变化，保护因子和危险因子的评估值也会相应改变。如果危险因子高于保护因子，有可能增加您患结直肠癌的风险。建议您持续监测肠道健康，保持良好的生活习惯，低脂、低热量、适量优质蛋白、适量粗粮饮食，避免高脂肪、高蛋白、油炸、腌制、烟熏、烧烤、霉变及辛辣刺激性食物，补充益生菌，积极预防结直肠癌。

结直肠癌除了与肠道菌群相关外，还与遗传因素、生活习惯及其他环境因素等相关。因此，本结果仅作为您进行全面健康管理的一项参考指标，不能作为临床诊断。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| 保护因子 参与抑制过敏、控制血清胆固醇水平、调节免疫功能 |  | 偏低 降低抑制过敏、调节免疫的能力 |
| 危险因子 与受体结合、刺激炎症因子分泌、引起炎症反应 |  | 偏低 降低炎症因子分泌及炎症反应风险 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

相关疾病风险分析—炎性肠病

Tom 先生：

炎性肠病以持续性肠道非特异性炎症为特征，表现为反复的腹痛、腹泻、粘液血便，甚至出现各种肠道外表现，如视物模糊、关节疼痛、皮疹等。肠道菌群及其代谢产物、宿主基因易感性及肠道黏膜免疫、精神创伤、环境因素以及生活习惯等多种因素共同参与了炎性肠病的发病机制。患该病人群的肠道菌群多样性较低，病原菌比例较高，产生有害毒素，引起炎症。

基于您肠道菌群分析，您炎性肠病的危险因子评估值偏低，保护因子评估值偏低，表明在其他因素相同的情况下，您体内的肠道菌群对您患炎性肠病的风险影响是由您整体的健康状况决定的，当您身体健康状态改变时，肠道菌群也会变化，保护因子和危险因子的评估值也会相应改变。如果危险因子高于保护因子，有可能增加您患肠炎的风险。建议您持续监测肠道健康，保持良好的生活习惯，低盐、低脂、低糖饮食，少吃生冷、油炸、烧烤及辛辣刺激性食物，补充益生菌，积极预防炎性肠病。

炎性肠病除了与肠道菌群相关外，还与遗传因素、生活习惯及其他环境因素等相关。因此，本结果仅作为您进行全面健康管理的一项参考指标，不能作为临床诊断。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|--------------------------------|---|------------------------------|
| 保护因子 阻止细菌黏附和易位，改善肠黏膜通透性 |  | 偏低 阻止细菌黏附和易位，改善肠黏膜通透性能力较低 |
| 危险因子 破坏肠道耐受机制，损伤肠上皮细胞和肠黏膜屏障 |  | 偏低 有益于保护肠上皮细胞和肠黏膜屏障 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群
低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群
偏低：您的检测值低于84%的人群

粪便状态

粪便状态分析，指的是在临床实践中，有几个和粪便自身状态相关的指标，这些指标被认为有很高的诊断价值。我们的检测中包括了临床中常用的二项指标：粪便的质地和粪便的颜色。

您本次粪便健康状况依据布里斯托大便分类法检测，由于单次粪便颜色易受到近期食物的影响（红肉火龙果，西瓜等），仅供参考。若您的粪便形态和颜色长期处于不健康状态，建议及时进行专科检查、诊治。

| 正常粪便 | | 本次结果 | 结果分析 |
|------|---|---|-------|
| 质地 |  |  | 理想的便型 |
| 颜色 |  |  | 正常 |

健康建议

肠道健康总说明

| | |
|---|---|
|  | 消化和吸收 通过菌群测得您的蛋白质消化吸收能力偏低、脂肪消化吸收能力偏低、碳水化合物消化吸收能力偏低；15种主要代谢物中蛋白质总量、谷胱甘肽代谢、牛磺酸代谢等指标存在异常。 |
|  | 炎症和免疫 您的肠道屏障功能、维持肠道屏障功能的能力、机体免疫力均较差。 |
|  | 肠道菌群 您的肠道菌群以普雷沃氏菌属为主。肠道菌群多样性水平较差，菌群失调的风险较高。有28类细菌指标与参考人群相比存在异常。 |
|  | 致病菌 您的肠道中检测到2种可能导致疾病的致病菌，含量未超标，但在您免疫能力低下时仍可能会损害您的肠道健康。 |
|  | 代谢平衡 您的代谢失衡风险高，11种重要有机小分子代谢中维生素B1、维生素B2、维生素B3等代谢异常。 |

GIhealth 提示您

1. 您的肠道菌群多样性较差，仅高于52.47%的参考人群。肠道有益菌含量较低，仅高于77.98%的参考人群，有害菌含量较高，高于26.56%的参考人群。检出2种致病菌，含量在正常范围内。
2. 通过对您的肠道菌群分析，您患2型糖尿病、结直肠癌、炎症性肠病的风险与参考人群一致。
3. 您肠道内参与维生素B1、维生素B2、维生素B3等代谢的菌群指标与参考人群相比存在异常。代谢失衡风险较高，需引起注意，建议您持续监测肠道健康。
4. 您肠道内参与蛋白质总量、谷胱甘肽代谢、牛磺酸代谢等的菌群指标与参考人群相比存在异常，需引起注意，建议您持续监测肠道健康。

基于本次您的检测结果，建议您从以下几个方面进行干预：

- 1、鉴于您的肠道菌群多样性低，建议多补充益生元和益生菌，帮助调节肠道菌群平衡；您体内未超标的致病菌在您免疫能力低下时，可能诱发相关疾病，建议您持续监测肠道健康，必要时到正规医院进行相关检查。
- 2、您的肠道菌群不会增加您患 2 型糖尿病、结直肠癌、炎症性肠病的风险，请您继续保持良好的饮食及生活习惯，维护肠道健康。
- 3、您肠道内参与蛋白质总量、谷胱甘肽代谢、牛磺酸代谢等的菌群指标异常，可能导致心脑血管疾病、动脉硬化、便秘等疾病，建议您关注血糖血脂血压、保持心态平和、养成定时排便的习惯、适量多饮水、戒烟酒、避免熬夜，定期监测肠道健康。

膳食方案

| | | |
|--|--------|---|
| | 主食 | 减少主食摄入量，粗细粮搭配；粗粮最好占主食的一半。 |
| | 肉类 | 宜吃禽类，如去皮鸡肉；避免摄入肥猪肉、肥牛、猪脑等高脂食物，适量减少五花肉、排骨的摄入。 |
| | 鱼虾类 | 适量多食用鱼虾类，代替畜肉类。 |
| | 蛋奶、大豆类 | 蛋类每天 1 个，牛奶宜选用脱脂奶，适量食用豆制品，如豆腐、豆浆等。 |
| | 蔬菜水果 | 多食用新鲜蔬菜，其中深色蔬菜占 1/2，多吃富含维生素的蔬菜，如生菜、黄瓜等；少吃含糖量高的水果，如枣、龙眼、荔枝、西瓜等。 |
| | 食用油、盐 | 食用油不超过 25g，少吃动物油，食盐不超过 6g。 |
| | 其他 | 控制总能量的摄入，每天总能量 (kcal)= 理想的体重 (kg)*(20~25)(kcal/kg)。全天能量分配：早餐 30%、午餐 40%、晚餐 30%。改变不良饮食习惯和行为，戒烟酒。烹调方法应尽量选择拌，炖、蒸、焖方法，忌煎、炸、烧、烤、熏等方法。不吃高热量食物，如油炸薯条、方便面、含糖饮料、油饼、油条等。如患痛风、溃疡性结肠炎、慢性腹泻、食物不耐受等有饮食禁忌的疾病，请综合考虑疾病的饮食原则。 |

- 以上膳食方案仅供参考，您的实际饮食请结合自身具体情况调整。

肠道调节方案

补充益生菌、益生元和膳食纤维

- 每天可服用适量低聚糖类产品，如低聚果糖、低聚寡糖，增加肠道内各种益生菌的数量，提高肠道菌群多样性。
- 每天服用适量益生菌产品（如酸奶、含乳双歧杆菌固体饮料等），有利于肠道菌群平衡。
- 每天选择性服用膳食纤维，这将有益于您的肠道健康。

注：如患炎症性肠病、腹泻，不宜服用菊粉及低聚果糖，建议选择低聚半乳糖。

补充营养品

可选择性补充复合蛋白固体饮料、大豆肽蛋白粉、含有几丁聚糖的保健品，帮助您控制体重。

补充辅酶 Q

可以帮助您增强抗氧化能力。

补充多种 VB 片

均衡多种维生素营养，促进碳水化合物、蛋白质、脂类的正常代谢。

运动方案



- 条件允许的情况下，选择爬楼梯，自行车出行等方式锻炼身体。多参加团体运动，培养运动习惯。
- 建议选用持续时间长、低强度的运动方式，如快步走、慢跑、骑自行车、游泳、乒乓球、羽毛球、网球、健身操等。配合增加肌肉量的运动，如俯卧撑、哑铃、深蹲等。
- 建议早饭或晚饭前空腹状态下进行运动，每次运动时间 30 分钟以上，每周 5 次以上。



解密肠道微生态
Explore your Microbiome

- 本报告内容仅供参考，无法代替医学诊断，也无法作为用药参考，实际情况请咨询拥有相应资质的临床医生或执业药师。
- 本项检测是基于当前微生物学的研究成果和国际公认的检测方法，但由于研究和检测方法的不断更新，本检测存在一定局限。
- 本项检测仅为您进一步全面健康管理提供参考，实际的健康管理、干预应由相应专家制定。
- 本人承诺提供的资料真实完整，若信息有误，后果由本人承担。
- 本检测报告的最终解释权归本公司所有。

附录


I 肠道健康

一、肠道健康

肠道指的是从胃幽门至肛门的消化管，是消化管中最长的一段，也是功能最重要的一段。在功能方面，肠道是人体最大的消化吸收器官，也是人体最大的排毒器官，因此，肠道的状态决定了人体的健康状态。

肠道是人体最大的免疫系统！肠粘膜展开面积大约200-250平方米，是人体接触外来细菌最多的器官，淋巴组织最发达，集结了人体约60%-70%的免疫细胞，它们在提高人体免疫能力、维护人体健康方面，起着关键性的作用。


人体的自愈能力非常强大，其中，肠道扮演了重要的角色。德国国家科研机构在一份研究报告中称：“如果能治疗疾病的物质都称作“药”的话，人体自身可以产生一万多种“药”！其中70%以上是由肠道产生的。一般的疾病靠这些“药”完全可以治愈。”所以，从这个意义上说，肠道微生态平衡支撑了整个生命活动过程，一点也不为过。



二、肠道菌群多样性

肠道细菌包括数以亿计不同种类、不同数量的细菌。菌群多样性越高，各个菌种之间的平衡就越稳定。菌群平衡结构越稳定，则越不容易被外界因素（如不规律的饮食或随意滥用抗生素等）所破坏。研究发现，一些疾病的菌群多样性水平明显低于健康人。可见，维持良好的肠道菌群的多样性对于维护肠道健康至关重要。

肠道菌群多样性有利于维持人体正常新陈代谢和免疫功能。菌群多样性减少容易引发一系列健康问题，例如腹泻。菌群多样性主要受以下几个方面的影响：1. 饮食：饮食不均衡可引起各菌群生长不平衡；2. 药物：如抗生素会抑制肠道中大多数菌群的生长；3. 年龄：随着年龄的增长，有益菌减少，有害菌增加；4. 免疫功能：免疫功能障碍可能导致致病菌侵入人体而引发疾病。



三、肠道菌群和长寿健康

通过对百岁以上健康老人的调查显示，他们一生中很少出现消化不良、慢性腹泻或顽固性便秘等症状。经过检测分析后发现，他们都具有一个良好的肠道菌群平衡状态，肠道“内环境”非常适宜胃、肠、肝、胆、胰等脏器所分泌的各种消化酶的“理化条件”，因而能充分发挥消化吸收作用，保证了机体充足的营养来源，为健康长寿提供了良好的物质基础。

正常人肠道内寄生有1000余种细菌。这些细菌可分为两大类，一类是对人类有益的，称为“有益菌类”，如乳酸杆菌和双歧杆菌等；另一类是对人体有害的，称为“有害菌类”，如大肠埃希氏菌某些种型和梭状芽孢杆菌等。正常情况下，这些细菌相互依存、相互制约、和谐共处，共同维护着肠道内环境的稳定，保持肠道良好的消化吸收功能。而一旦机体的内外环境发生变化或长期受到不良刺激，就有可能破坏肠道内菌群平衡状态。短期的失调可能会引发消化不良等症状；长期的平衡紊乱则可能引起严重的消化吸收功能障碍，从而导致营养不良、面黄肌瘦、免疫力低下和精神体力不佳等一系列亚健康表现。

四、从大便形状来判断健康

| | | | |
|------|---|-----------------|--|
| 第一型: |  | 一颗颗硬球（很难通过） |  便秘 |
| 第二型: |  | 香肠状，但表面凹凸 |  便秘 |
| 第三型: |  | 香肠状，但表面有裂痕 |  理想的便型 |
| 第四型: |  | 像香肠或蛇一样，且表面很光滑 |  理想的便型 |
| 第五型: |  | 断边光滑的柔软块状（容易通过） |  可能腹泻 |
| 第六型: |  | 粗边蓬松块，糊状大便 |  可能腹泻 |
| 第七型: |  | 水状，无固体块（完全液体） |  腹泻 |

五、从大便颜色和便中物质来判断健康

| | | | |
|------|---|----|--|
| 第一型: |  | 棕色 | 浅棕色至深棕色均为正常的粪便颜色（棕色深浅与胆红素含量有关，胆红素由红细胞降解产生） |
| 第二型: |  | 绿色 | 可能与食用绿色蔬菜有关，如菠菜等 |
| 第三型: |  | 红色 | 提示下消化道或直肠出血 |
| 第四型: |  | 黄色 | 可能与脂肪消化吸收障碍、鞭毛虫感染、肠道过度活跃有关 |
| 第五型: |  | 蓝色 | 可能与食用蓝色食物有关；婴幼儿在生病时粪便也可能呈蓝色 |
| 第六型: |  | 白色 | 通常与肝胆系统有关，因胆管受阻，胆汁无法排到肠道里，便形成白色大便；也可能与服用某些药物相关 |
| 第七型: |  | 黑色 | 可能与上消化道出血相关 |


温馨提示：

- 1、粪便颜色通常由您所摄入的食物和粪便中胆汁的含量所决定，一般情况下，健康人的粪便颜色为浅至中等棕色。如果您摄入大量的深色食物（如菠菜、蓝莓、火龙果），可能会使粪便颜色发生相应的改变，这是正常现象，请您不必过分担心。但如果您的粪便颜色长期处于异常颜色范畴或者颜色、质地突然改变，提示您的肠道健康可能出现问题，建议您及时到医院进行专科检查、诊治。
- 2、多种因素均能引起粪便颜色改变，限于篇幅限制，本表格中仅列举了部分原因。

II 肠道调养

一、肠道调养介绍

所谓肠道调养，是指通过健康的方式、顺应肠道自然，达到恢复肠道健康和正常功能的目的。以肠道的蠕动功能为例，我们知道，如果肠道蠕动不正常，就可能引起便秘或腹泻。有些治疗便秘的药物或保健品，就是通过外物强力刺激肠道蠕动，来实现通便的，但长期使用这种方式，反而会减弱肠道蠕动功能，进而导致排便功能失常，以致一旦停用就无法排便，形成恶性循环。可见，这种方式虽然刺激了肠道蠕动，但它既不健康，也没有恢复肠道的正常蠕动，所以绝不是理想中的肠道调养。



二、肠道调养的方法

| 调节肠道菌群 | 按摩 | 饮食 | 个人卫生 | 心情愉快 |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 恢复肠道正常的微生态环境，最好的方法就是服用微生态制剂，微生态制剂不但能帮助调理肠道，改善胃肠道环境，还能预防和治疗各种肠道疾病。如：慢性肠炎、便秘、溃疡性结肠炎、直肠炎、阑尾炎等疾病。 | 部分人群由于胃肠蠕动偏弱，经常出现腹胀、便秘等不适，这种情况可以采取腹部按摩，帮助刺激肠道蠕动，恢复肠动力。 | <ul style="list-style-type: none"> 每天早上喝一杯蜂蜜水，既补充水分又有利干润肠通便。 肠道功能不好的人可以每天喝适量酸奶，酸奶可以很好的调理肠胃。 便秘者可适当多吃粗粮和蔬菜水果，并保证喝足量的水，有利于促进肠道清理。 定时定量，少食多餐，避免暴饮暴食，少吃油腻及辛辣刺激性食物。 少喝浓茶，以免影响食物的消化吸收。 | 防止病从口入。不要吃腐烂变质的食物，尽量不吃剩菜剩饭。 | 精神心理因素也会影响肠道功能，保持心情愉快有利于肠道健康。 |

三、营养物质

(1) 碳水化合物是身体的主要食粮

碳水化合物 (carbohydrate) 是由碳、氢和氧三种元素组成。食物中的碳水化合物分成两类：人可以吸收利用的有效碳水化合物如单糖、双糖、多糖；人不能消化的无效碳水化合物，如纤维素，是人体必需的物质。

糖类化合物是一切生物体维持生命活动所需能量的主要来源，用于维持日常活动和身体功能。它不仅是营养物质，而且有些还具有特殊的生理活性。例如：肝脏中的肝素有抗凝血作用；血型中的糖与免疫活性有关。此外，核酸的组成成分中也含有糖类化合物——核糖和脱氧核糖。因此，糖类化合物对医学来说，具有更重要的意义。

碳水化合物的主要食物来源有：糖类、谷物（如水稻、小麦、玉米、大麦、燕麦、高粱等）、水果（如甘蔗、甜瓜、西瓜、香蕉、葡萄等）、干果类、干豆类、根茎蔬菜类（如胡萝卜、番薯等）等。应尽量多食用高纤维及血糖负载低的食物：麦麸、玉米、糙米、大豆、燕麦、荞麦、茭白、芹菜、苦瓜、水果等。

膳食中碳水化合物过少，可造成膳食蛋白质浪费，组织蛋白质和脂肪分解增强以及阳离子的丢失等。碳水化合物的吸收能力不好，能量供应不足会出现瘦弱、精神注意力不集中、反应迟缓、无精打采等问题。有研究显示，食物中过多的碳水化合物或过于旺盛的吸收能力会使人体血糖和胰岛素激增，从而引起肥胖，甚至导致糖尿病和心脏病等疾病隐患。

根据中国居民膳食碳水化合物的实际摄入量和世界卫生组织的建议，我国2016年重新修订了标准，建议健康人群的碳水化合物供给量为总能量摄入的50%–65%，同时对碳水化合物的来源也作了要求，即应包括复合碳水化合物淀粉、不消化的抗性淀粉、非淀粉多糖和低聚糖等碳水化合物；限制纯能量食物如糖的摄入量，提倡摄入营养素/能量密度高的食物，以保障人体能量和营养素的需要及改善胃肠道环境和预防龋齿的需要。

(2) 脂类的消化吸收

脂类包括油脂（甘油三酯）和类脂（磷脂、固醇类）。脂类是人体需要的重要营养素之一，在供给人体能量方面起着重要作用。脂类也是人体细胞组织的组成部分，如细胞膜、神经髓鞘都需要脂类参与。其中脂肪是脂肪酸的甘油三酯，日常食用的动植物油如猪油、菜油、豆油等均属于此类。有双键的脂肪酸称为不饱和脂肪酸，无双键的称为饱和脂肪酸。而类脂包括磷脂、固醇等性质与油脂类似的化合物，也包括脂蛋白等物质。

脂类的消化与吸收主要在小肠中进行，首先在小肠上段，通过小肠蠕动，由胆汁中的胆汁酸盐使食物脂类乳



化，使不溶于水的脂类分散成水包油的小胶体颗粒，提高溶解度增加了酶与脂类的接触面积，有利于脂类的消化吸收。

胆固醇是类脂的一种，血浆中的胆固醇可来自食物，也可在机体肝脏内合成。胆固醇的生理功能包括：1.细胞膜的组成成分之一，增强细胞膜的坚韧性。2.合成重要活性物质的原料，如：维生素D、肾上腺素、性激素、胆汁等。3.代谢产物胆酸能乳化脂类，帮助脂类物质吸收。

高胆固醇和低胆固醇的危害：高胆固醇血症可以导致动脉粥样硬化，引起一系列心脑血管疾病，严重者可导致死亡。低胆固醇血症可引起免疫力下降，导致患病率增高。

| 检验指标 | 参考值 (mmol/L) | | 临床意义 | 采样建议 |
|------------------------|-------------------|---------|--|---------------------------------------|
| 甘油三酯 (TG) | 0.3—1.7 | ↑ 升高 | 冠心病、原发性高脂血症、肥胖症、动脉硬化、阻塞性黄疸、糖尿病、极度贫血、肾病综合症、胰腺炎、甲状腺功能减退。 | 样本采集后尽快分离血清，防止TG水解 |
| | | ↓ 降低 | 甲状腺功能亢进、肾上腺皮质功能减退、肝功能严重损伤。 | |
| 总胆固醇 (CHOL) | 2.33—5.69 | ↑ 升高 | 动脉粥样硬化、肾病综合征、胆总管阻塞及粘液性水肿。 | 固定膳食和稳定体重3周，采血前空腹12小时，禁食不禁水。 |
| | | ↓ 降低 | 恶性贫血、溶血性贫血以及甲状腺功能亢进。 | |
| 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL—C) | 1.0—1.7 | ↓ 降低 | 急慢性肝病，急性应急反应（心肌梗塞、外科手术、损伤），糖尿病、甲状腺功能亢进或减低，慢性贫血等。 | |
| 低密度脂蛋白胆固醇 (LDL—C) | 1.3—4.0 | ↑ 升高 | 高脂血症、低甲状腺素血症、肾病综合征、慢性肾功能衰竭、肝脏疾病、糖尿病、动脉硬化症等。 | 采样前4周稳定体重，保持原有饮食习惯和生活习惯，采血前空腹12—14小时。 |
| | | ↓ 降低 | 营养不良、严重肝脏疾病、甲亢等。 | |

(3) 蛋白质

蛋白质是组成人体一切细胞、组织的重要成分，氨基酸是蛋白质的基本组成单位。蛋白质占人体重量的16%~20%，即一个60kg重的成年人其体内约有蛋白质9.6~12kg。食入的蛋白质在体内经过消化被水解成氨基酸被吸收后，合成人体所需蛋白质，同时新的蛋白质又在不断代谢与分解，时刻处于动态平衡中。蛋白质的功能包括：



| | |
|---------------|--|
| 修复身体各种组织细胞的材料 | 神经、肌肉、内脏、血液、骨骼、头皮、指甲等都含有蛋白质。人体组织细胞每天都在不断地更新，人体必须每天摄入一定量的蛋白质，作为构成和修复组织的材料。 |
| 构成酶、激素和抗体 | 人体的化学反应离不开酶的催化作用。这些各具特殊功能的酶，均是由蛋白质构成。此外，一些调节生理功能的激素和胰岛素以及机体抵抗致病微生物侵害的抗体，也是以蛋白质为主要原料构成的。 |
| 维持正常的血浆渗透压 | 渗透压使血浆和组织之间的物质交换保持平衡。如果膳食中长期缺乏蛋白质，血浆蛋白特别是白蛋白的含量就会降低，血液内的水分便会过多地渗入周围组织，造成临床上的营养不良性水肿。 |
| 供给机体能量 | 在能量缺乏或蛋白摄入过量的情况下，蛋白质氧化分解转化为能量。 |
| 维持机体的酸碱平衡 | 机体内组织细胞必须处于合适的酸碱度范围内，才能完成其正常的生理活动。这是通过肺、肾脏以及血液缓冲系统来实现的。蛋白质缓冲体系是血液缓冲系统的重要组成部分，因此蛋白质在维持机体酸碱平衡方面起着十分重要的作用。 |
| 运输氧气及营养物质 | 血红蛋白把氧输送到身体的各个部位，以满足组织细胞代谢的需要。蛋白质也是体内许多物质转运的载体。因此，摄入体内的蛋白质的质和量，关系到人体蛋白质的合成，尤其是青少年的生长发育、孕产妇的优生优育、老年人的健康长寿等。 |

蛋白质在胃液消化酶的作用下，初步水解，在小肠中完成整个消化吸收过程。氨基酸的吸收由小肠粘膜细胞通过主动转运系统进行，分别转运中性、酸性和碱性氨基酸。由肠道消化吸收的蛋白质，不仅来源于食物，也包括肠粘膜细胞脱落和消化液的分泌等，每天有70g左右蛋白质进入消化系统，其中大部分被消化和吸收。未被吸收的蛋白质由粪便排出体外。

高蛋白食物，一类是奶、畜肉、禽肉、蛋类、鱼、虾等动物蛋白；另一类是豆类、芝麻、瓜子、核桃、杏仁、松子等干果类的植物蛋白。由于动物蛋白所含氨基酸的种类和比例较符合人体需要，更容易被人体吸收利用，所以动物蛋白比植物蛋白营养价值高。

| | | |
|-------------|-------------|---|
| 标准饮食 | | 300g (男)/250g (女) 主食、100-150g瘦肉、鸡蛋1个、1瓶牛奶/酸奶、100-150g豆制品 |
| 谷类 | | 250-400g |
| 肉类 | 鱼虾类 | 75-100g |
| | 畜禽肉类 | 50-75g，相当于50g生猪肉、或50g生鸡肉/生鸭肉/生的瘦牛肉/生羊肉、或55g烤鸭、或60g烧鸡/烧鸭/烧鹅、或70g炸鸡 |
| 蛋类 | | 25-50g，相当于0.5/1个鸡蛋 |
| 奶制品类 | | 300g，相当于300g牛奶、或45g奶粉、或350g酸奶、或35g奶酪 |
| 豆制品类 | | 30-50g，相当于30g豆腐皮/腐竹、或60g豆腐丝/千张、或80g豆腐干/油豆腐/素鸡、或120g北豆腐、或150g豆腐花、或240g南豆腐、或300g内酯豆腐、或600g豆奶、或700g豆腐脑、或800g豆浆 |

等量替换

有时候不可能天天这么标准地吃，可以等量替换着吃。比如一天30克大豆的目标，可以今天吃豆腐，明天吃豆腐干。动物蛋白类也可以替换着吃，如鱼肉、鸡肉、牛肉、猪肉等，可以轮换着吃。另外，植物蛋白最好与动物蛋白一起吃，这样有利于植物蛋白的吸收利用。

(4) 身体的重要物质—胆汁酸和胆碱


胆汁酸是胆汁的重要成分，在脂肪代谢中起着重要作用。

1. 促进脂类的消化吸收

胆汁酸分子内既含亲水性的羟基和羧基，又含疏水性的甲基及烃核。同时羟基、羧基的空间配位又全属 α 型，故胆汁酸的主要构型具有亲水和疏水两个侧面，使分子具有界面活性分子的特征，能降低油和水两相之间的表面张力，促进脂类乳化。

2. 抑制胆固醇在胆汁中析出沉淀（结石）

胆汁酸还具有防止胆石生成作用。胆固醇难溶于水，随胆汁排入胆囊贮存时，胆汁在胆囊中被浓缩，胆固醇易沉淀，但因胆汁中含胆汁酸盐与卵磷脂，可使胆固醇分散形成可溶性微团而不易沉淀形成结石。



总胆汁酸偏高可能与以下情况相关：

1. 总胆汁酸偏高提示肝细胞发生病变，血液中胆汁酸含量升高。急性肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化、肝癌时胆汁酸明显升高。特别是肝硬化、肝癌时总胆汁酸的升高率 $> (95\%)$ ，丙氨酸转氨酶（ALT） $>20\%$ 。
2. 当肝脏实质损害时，肝细胞对胆酸合成降低，鹅脱氧胆酸的合成升高。
3. 肝实质细胞损伤时，CA/CDCA比值小于1.0。
4. 阻塞性黄疸时，CA/CDCA比值大于1.0。
5. 妊娠期胆汁淤积症、肝肠循环被破坏。
6. 总胆汁酸偏高见于急慢性病毒性肝炎、胆汁瘀滞、慢性乙醇中毒、肝硬化、原发性肝癌、胆道阻塞等。

胆碱是一种强有机碱，是卵磷脂的组成成分，也存在于神经鞘磷脂之中，是机体可变甲基的一个来源而作用于合成甲基的产物，同时又是乙酰胆碱的前体。人体也能合成胆碱，所以不易造成缺乏病。胆碱是卵磷脂的鞘磷脂的重要组成部分，卵磷脂即是磷脂酰胆碱，广泛存在于动植物中。胆碱的生理功能包括：促进脑发育和提高记忆力、保证信息传递、调控细胞凋亡、构成生物膜的重要组成成分、促进脂肪代谢、促进体内转甲基代谢、降低血清胆固醇。胆碱在蛋类、动物的脑、动物心脏与肝脏、绿叶蔬菜、啤酒酵母、麦芽、大豆中含量较高。

(5) 维生素

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。

| 维生素 | 简介 | 食物来源 |
|-------------|---|---------------------------|
| 维生素A 视黄醇 | 是一系列视黄醇的衍生物，缺少维生素A易患夜盲症。 | 胡萝卜、绿叶蔬菜、蛋黄及肝脏 |
| 维生素B1 硫胺素 | 又称抗脚气病因子、抗神经炎因子等，在生物体内通常以硫胺焦磷酸盐的形式存在。 | 糙米、豆类、家禽 |
| 维生素B2 核黄素 | 维持口腔及消化道黏膜的健康，缺少维生素B2易患口舌炎症（口腔溃疡）口角炎等。 | 动物肝脏、瘦肉、大豆、米糠、绿叶蔬菜 |
| 维生素B3/PP 烟酸 | 有助于皮肤的健康和美容，缺少维生素B3易患糙皮病 | 绿叶蔬菜、肾、肝、蛋、肉 |
| 维生素B5 泛酸 | 制造抗体，增强免疫力，加速伤口愈合及防止细菌感染。 | 糙米、肝、蛋、肉 |
| 维生素B6 吡哆醇类 | 有抑制呕吐、促进发育等功能，缺少它会引起呕吐，抽筋等症状。 | 瘦肉、果仁、糙米、绿叶蔬菜、香蕉 |
| 维生素B9 叶酸 | 制造红细胞及白细胞，增强免疫能力，缺少会引起消化不良、记忆力衰退等症状。 | 蔬菜、肉、酵母等 |
| 维生素B12 氰钴胺素 | 制造及更新体内的红细胞，缺乏时会引发恶性贫血。 | 肝、肉、蛋、鱼、奶 |
| 维生素B13 乳清酸 | 可预防肝病及未老先衰，有助于多种硬化症的治疗。 | 根茎类蔬菜、乳浆、酸奶 |
| 维生素B15 潘氨酸 | 主要用于抗脂肪肝，有时用来治疗冠心病和慢性酒精中毒。 | 啤酒酵母、糙米、全麦、南瓜子、芝麻 |
| 维生素B17 苦杏仁苷 | 具有防癌的功效，但过量会引起中毒。 | 苦杏、苦扁桃、枇杷、李子、苹果、黑樱桃等果仁和叶子 |
| 维生素C 抗坏血酸 | 抗衰老，有助于防癌，降低胆固醇，增强免疫力，防治坏血病。 | 水果、绿叶蔬菜、番茄、马铃薯等 |
| 维生素D 钙化醇 | 有助于儿童牙齿及骨骼发育，缺少会导致佝偻病；补充成人骨骼所需钙质，防治骨质疏松症。 | 鱼肝油、奶制品、蛋 |

| 维生素 | 简介 | 食物来源 |
|----------------|--|-----------------------|
| 维生素E 生育酚 | 是人体优良的抗氧化剂，人体缺少它，男女都不能生育，严重者会患肌肉萎缩症、神经麻木症。 | 植物油、深绿色蔬菜、牛奶、蛋、肝、麦及果仁 |
| 维生素F 亚麻油酸、花生油酸 | 防止动脉中胆固醇的沉积，用于治疗心血管疾病。 | 植物油、以及花生、葵花籽、核桃等坚果类食品 |
| 维生素H 生物素 | 合成维生素C的必要物质，是脂肪和蛋白质正常代谢不可或缺的物质；还具有防止白发和脱发，保持皮肤健康的作用。 | 牛奶、牛肝、蛋黄、动物、肾脏、水果、糙米 |
| 维生素L 催奶维生素 | 促进乳汁的分泌，缺少维生素L会使乳汁分泌不足。 | 牛肝、酵母、野菜 |
| 维生素K 凝血维生素 | 与凝血作用相关，人体缺少时凝血时间延长，严重者会流血不止，甚至死亡。 | 椰菜花、椰花、西蓝花、蛋黄、肝等 |
| 维生素P 生物类黄酮 | 防止维生素C被氧化破坏，增强维生素功效，增加毛细管壁强度，防止瘀伤，有利于防治牙龈出血。 | 橙子、柠檬、杏、樱桃、玫瑰果实及芥麦粉 |

III 健康风险

一、肠道菌群失调

健康人的胃肠道内寄居着种类繁多的微生物，这些微生物称为肠道菌群。肠道菌群按一定的比例组合，各菌种间互相制约，互相依存，在质和量上形成一种生态平衡，一旦机体内外环境发生变化，特别是长期应用广谱抗生素，敏感肠道菌被抑制，未被抑制的细菌则异常大量繁殖，引起菌群失调，其正常生理组合被破坏，而产生病理性组合，从而引起一系列临床表现，称为肠道菌群失调症。



二、致病菌

大部分的疾病与致病菌感染相关。细菌的致病性和毒性越高、数量越多，造成的后果越严重。有的致病菌进入人体后不一定会快速致病，而是在机体免疫能力降低时，大量繁殖产生毒素，引起疾病，这种致病菌称为机会致病菌。来自于饮食中的致病菌被称为食源性致病菌。目前可以从肠道菌群中检测出92种食源性致病菌以及25种机会致病菌。

预防致病菌感染，需养成良好的卫生习惯，如勤洗手，不食用腐败变质和不清洁的食物，避免饮用生水，少吃生食，肉类、奶类和蛋类食品食用前应煮透，水果洗净去皮，坚持餐具勤消毒等，以阻断致病菌的感染途径。

另外，已经针对许多病菌开发了相应疫苗，可以适当选用疫苗来预防疾病。若已经被致病菌感染，建议您及时就医，接受治疗。

三、肠道菌群的健康状态与疾病的患病风险有关

肠道菌群与多种疾病的发生发展直接相关。科学研究发现，喜欢喝酸奶的人群体内的双歧杆菌等益生菌含量比较高，它们产生许多有益于肠道健康的有益物质，能促进排便和排毒，减少了患肠道疾病的风险；即使是食用高脂肪食物，肠道内脂肪相关的细菌也会相应生长成为优势菌群，帮助维持代谢的平衡。而经常熬夜、生活不规律的人群，肠道菌群的多样性降低，有害菌增加，从而增加多种疾病的患病风险！

四、常见肠道菌群简介

1、埃希氏菌

埃希氏菌呈直杆状，在人的肠道中主要以大肠埃希氏菌的形式存在，能够发酵多种糖类产酸、产气，还能帮助合成维生素K2，与人体是互利共生的关系。多数不致病，能竞争性抵御致病菌的进攻；少数的大肠埃希氏菌具有毒性，如产肠毒素大肠埃希氏菌和外毒素大肠埃希氏菌等，可引起感染、腹泻和败血症等。



2、阿克曼氏菌

阿克曼氏菌多分布于盲肠中，能够降解粘蛋白，与阑尾炎和炎症性肠病有关。

3、肠球菌

肠球菌是一种常见的院内感染致病菌，也可能引起院外感染。肠球菌可引起尿路感染、皮肤软组织感染、腹腔感染、败血症、心内膜炎和脑膜炎等。该菌对多种抗生素表现出耐药性，在使用抗生素治疗时，治疗效果可能会比预期效果差。

4、粪球菌

粪球菌能够发酵碳水化合物，提供机体所需的短链脂肪酸（如丁酸、乙酸等），维护肠粘膜功能，增强免疫力。

5、克雷伯氏菌

克雷伯氏菌是引起下呼吸道感染、败血症和院内感染的常见细菌，该菌也对多种抗生素表现出耐药性。

6、链球菌

链球菌多数为人体共生菌，一些链球菌可引起感染、化脓性炎症，但也有少数对人类有益的菌种，如嗜热链球菌，则广泛应用于酸奶发酵。

7、瘤胃球菌

瘤胃球菌能够发酵纤维二糖、纤维素，产生甲酸、乙酸、乳酸、B族维生素等有益物质，在肠道中广泛分布。

8、罗斯拜瑞氏菌

罗斯拜瑞氏菌为肠道中的有益菌，能够发酵多种糖类物质（如葡萄糖、麦芽糖、纤维二糖、蔗糖、淀粉和糖原等）产生丁酸。丁酸不仅能够为肠粘膜细胞提供能量，还能促进肠粘膜的修复，减少炎性反应的发生。

9、毛螺菌

毛螺菌能够分解果胶、葡萄糖，产生甲酸、乙酸等短链脂肪酸以及乳酸，能够保护肠粘膜，抑制病原菌的生长，减少炎性反应的发生。

10、拟杆菌

拟杆菌是在哺乳动物胃肠道中分布最广泛的一类细菌。该类细菌能够将肠道中的复杂有机物分解为小分子物质，帮助保护肠粘膜，有效抵制其他致病菌在肠道中的定植。研究发现，在长期摄入较多的蛋白质和动物脂肪的人群中，肠道菌群以拟杆菌为主。正常情况下，多数拟杆菌与人体是互利共生的关系，但一些拟杆菌会引起阑尾炎和败血症。值得一提的是，拟杆菌对多种抗生素(如 β -内酰胺类、氨基糖苷类、红霉素和四环素等)均表现出耐药性，在使用抗生素治疗时，治疗效果可能会比预期效果差。

11、普雷沃氏菌

普雷沃氏菌是口腔、阴道和肠道的常见菌群，能够帮助人体分解食物中的蛋白质和碳水化合物，参与多种维生素的合成。由于普雷沃氏菌还参与肠道粘膜中粘多糖的降解，在以普雷沃氏菌为主的人群中，可能会出现腹痛、腹泻的症状。此外，在机体免疫力低下时，该类细菌还可能会引起上呼吸道及身体其他部位感染，如牙周炎、吸入性肺炎、肺脓肿、慢性中耳炎、鼻窦炎等。最新的研究结果表明，普雷沃氏菌还可能与类风湿性关节炎有关。

12、栖粪杆菌

栖粪杆菌能够产生丁酸等有益物质，是肠道中的有益菌。有研究发现，肠道中该类细菌的减少，会增加肥胖、炎症性肠病等患病风险。

13、乳杆菌

乳杆菌为肠道中的有益菌，能够发酵糖类产生乳酸，帮助机体合成氨基酸和维生素、降低胆固醇，阻止病原菌对肠道的入侵和定植，维持肠道菌群平衡，减少内毒素的产生，调节机体免疫力，有益于人体健康。

14、双歧杆菌

双歧杆菌广泛分布于哺乳动物的口腔、阴道、胃肠道中，能够有效分解碳水化合物，产生乙酸和乳酸。双歧杆菌能够帮助机体合成多种维生素、氨基酸，提高机体对钙离子的吸收；能够抑制病原菌的生长，有利于维持肠道菌群平衡，增强人体免疫机能。双歧杆菌为益生菌的典型代表，常见的有动物双歧杆菌、长双歧杆菌、短双歧杆菌、青春双歧杆菌、婴儿双歧杆菌。

15、梭菌

梭菌广泛分布于人和动物的肠道等处，属专性产芽孢厌氧菌。多数为条件致病菌，如艰难梭菌、产气荚膜梭菌和破伤风梭菌等，能引起腹泻、肠炎、破伤风等疾病。少数为有益菌，如丁酸梭菌，既能产生具有保健作用的 B 族维生素、维生素 K、淀粉酶等物质，又能促进肠道有益菌群(如双歧杆菌、乳杆菌)的繁殖和发育。

16、韦荣氏球菌

韦荣氏球菌不能代谢糖类，主要以有机酸作为能源。韦荣氏球菌能将酸性较强的乳酸转变为酸性较弱的乙酸和丙酸，调节肠道酸碱度。韦荣氏球菌属的大部分种类对人体有益，少部分与疾病有关，如小韦荣氏球菌。

17、真杆菌

真杆菌大部分为肠道中的有益菌，能够发酵葡萄糖或蛋白胨为丁酸、乙酸和甲酸等有益物质，有利于肠道健康，但某些种类的真杆菌在特定条件下可能引起疾病。

五、肠道菌群失衡的微生态制剂调养

益生元

通过选择性的刺激一种或几种菌落中的细菌生长与活性而对宿主产生有益的影响，从而改善宿主健康状况的不能被消化的食物成分。常见益生元：包括菊粉、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖等。



菊粉

菊粉(inulin) 广泛存在于各种植物，菊芋和菊苣含量最高，鲜重可高达20 %(干重80 %)，菊粉的主要成分是一类结构相似的果聚糖，不易为人体直接吸收，在结肠被肠道微生物利用、降低肠道PH、促进双歧杆菌、乳酸杆菌等的生长、抑制有害菌生长、促进肠蠕动。服用菊粉，有利于人体控制血脂、降低血糖、促进钙吸收、改善便秘、增强免疫力等。

低聚果糖

低聚果糖又称蔗果低聚糖，是由1~3个果糖基通过 β (2—1)糖苷键与蔗糖中的果糖基结合生成的蔗果三糖、蔗果四糖和蔗果五糖等的混合物。低聚果糖不易为人体吸收，在结肠中被肠道微生物利用，促进双歧杆菌的生长，抑制有害菌的生长。口服低聚果糖，有利于控制血脂、降低血糖、促进吸收、改善便秘或腹泻、促进钙吸收、增强免疫力等。

低聚半乳糖

低聚半乳糖是一种具有天然属性的功能性低聚糖，其分子结构一般是在半乳糖或葡萄糖分子上连接1~7个半乳糖基。低聚半乳糖不易被人体吸收，是肠道内乳酸杆菌与双歧杆菌良好的生长因子，抑制有害菌的生长、促进肠蠕动。口服低聚半乳糖，有利于矿物质的吸收、预防龋齿、控制血脂、预防肥胖、降低血糖、改善便秘或腹泻、促进吸收、增强免疫力等。

膳食纤维

一般分为可溶性膳食纤维和不可溶性膳食纤维，可溶性膳食纤维来源于果胶、藻胶、魔芋等。主要成分为葡甘聚糖，能量很低，吸水性强。可溶性纤维在胃肠道内和淀粉等碳水化合物交织在一起，并延缓后者的吸收，起到降低餐后血糖的作用。不可溶性纤维对人体的作用，一方面可以促进胃肠道蠕动，加快食物通过胃肠道，减少营养素的吸收；另一方面，不可溶性纤维在大肠中吸收水分软化粪便，可以防治便秘。

益生菌

益生菌是一类对宿主有益的活性微生物，是定植于人体肠道、生殖系统内，能产生确切健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性有益微生物的总称。常见益生菌包括双歧杆菌属菌类、乳杆菌属菌类、嗜热链球菌等。目前益生菌产品主要是以上各类微生物组成的复合制剂。益生菌具有预防和改善腹泻、增强免疫力、预防感染、降低胆固醇、促进肠道消化系统健康、帮助吸收营养成分等作用。



乳杆菌属

乳杆菌是一群杆状或球状的革兰氏阳性菌，可发酵碳水化合物(主要指葡萄糖)并产生大量乳酸，在自然界分布广泛，是人体肠道具有重要生理活性的菌群之一。该菌属细菌绝大多数对人体无毒、无害，并担负着人体内重要的生理功能。乳杆菌可阻止病原菌对肠道的入侵和定植、抑制病原菌生长、抑制内毒素的产生、维持肠道微生态平衡、促进消化吸收、促进肠道蠕动、预防和抑制肿瘤的发生、增强机体免疫力、合成氨基酸和维生素、降低胆固醇、降低血脂等。常见的乳杆菌属的菌种包括嗜酸乳杆菌、唾液乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、干酪乳杆菌、格氏乳杆菌、保加利亚乳杆菌等。服用乳杆菌制剂可改善便秘、腹泻、炎症性肠病、肝性脑病等症状。

双歧杆菌属

双歧杆菌是1899年由法国学者Tissier从母乳营养儿的粪便中分离出的一种厌氧的革兰氏阳性杆菌，末端常常分叉，故名双歧杆菌。双歧杆菌存在于人的口腔、阴道，该菌能发酵葡萄糖、乳糖、半乳糖和果糖等糖类，产生乙酸、L(+)-乳酸、乙醇和甲酸等。双歧杆菌属菌类可阻止病原菌对肠道的入侵和定植、抑制病原菌生长、抑制内毒素的产生、维持肠道的微生态平衡、促进消化吸收、促进钙吸收、促进肠道蠕动、预防和抑制肿瘤的发生、增强机体免疫力、合成氨基酸和维生素、降低胆固醇、降低血脂等。常见的双歧杆菌包括：长双歧杆菌、链状双歧杆菌、青春双歧杆菌、假链状双歧杆菌、短双歧杆菌、婴儿双歧杆菌、两歧双歧杆菌等。服用双歧杆菌制剂可改善便秘、腹泻、炎症性肠病、肝性脑病等症状。

嗜热链球菌


嗜热链球菌是耗氧的革兰氏阳性菌，以两个卵圆型为一对的球菌连成约0.7-0.9微米的长链。嗜热链球菌可产生乳酸，具有调节肠道PH值、抑制致病菌的生长、改善肠道微环境、增强机体免疫力、促进消化吸收等功能。

IV 相关疾病

一、2型糖尿病

糖尿病是一种常见的多病因代谢性疾病，表现为多饮、多食、乏力和消瘦。糖尿病在临幊上可分为1型和2型，其中90%的糖尿病患者属于2型糖尿病，即非胰岛素依赖型糖尿病。肠道菌群与糖尿病的发生、发展直接相关。比如长期高脂肪、低膳食纤维的饮食习惯会导致肠道中致病菌数量增加、有益菌数量减少，从而增加糖尿病的风险；如果能增加糖尿病的保护因素，如增加一些可以促进人体代谢、降低肥胖发生概率的细菌数量，就有可能降低糖尿病的发病概率。

此外，研究显示，不同于其他一些慢性疾病表现出的严重菌群失调，2型糖尿病患者普遍存在的肠道菌群失调仅为中度，主要表现为一些产丁酸盐的有益菌，如*Eubacterium rectal*、*Faecalibacterium prausnitzii*、*Roseburia intestinalis*等丰度显著降低，而多种条件致病菌，如*Bacteroides caccae*、*Clostridium hafte-wayi*、*Escherichia coli*等含量则明显增加，且这些条件致病菌的丰度在不同个体之间存在较大差异。另外，糖尿病患者中，与硫酸盐还原和氧化应激功能密切相关的细菌也同时增多。



1、2型糖尿病对比图

| | 1型糖尿病 | 2型糖尿病 |
|-------|-----------|----------|
| 发病率 | <5% | >95% |
| 发病年龄 | 0-25岁 | >40岁 |
| 体重 | 通常消瘦 | 有肥胖或超重倾向 |
| 发病情况 | 一般较急，偶有缓慢 | 逐渐发病 |
| 症状 | 症状明显 | 多数无明显症状 |
| 稳定性 | 不稳定 | 相对稳定 |
| 发病方式 | 急骤 | 缓慢 |
| 胰岛素分泌 | 约为0 | 减少或相对不足 |
| 治疗 | 必须用胰岛素 | 必要时使用胰岛素 |

世界卫生组织WHO糖尿病诊断标准：

糖尿病的诊断依据是血糖和临床症状。以下诊断标准是1999年WHO、IDF公布，同年得到中华医学会糖尿病学会的认同，并建议在中国执行。

诊断要求的几点说明

| 确诊为糖尿病 | 可排除糖尿病 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 具有典型症状，空腹血糖$\geq 7.0 \text{ mmol/l}$ (126 mg/dL) 或餐后2小时血糖$\geq 11.1 \text{ mmol/l}$ (200 mg/dL)。 没有典型症状，仅空腹血糖$\geq 7.0 \text{ mmol/l}$ (126 mg/dL) 或餐后2小时血糖$\geq 11.1 \text{ mmol/l}$ (200 mg/dL) 应再重复一次，仍达以上值者，可以确诊为糖尿病。 | <ul style="list-style-type: none"> 如糖耐量2小时血糖$140 \sim 200 \text{ mg/dL}$ ($7.8 \sim 11.1 \text{ mmol/L}$) 之间，为糖耐量减低；如空腹血糖$110 \sim 126 \text{ mg/dL}$ ($6.1 \sim 7.0 \text{ mmol/L}$) 为空腹血糖受损，均为糖尿病前期。 或餐后2小时血糖$< 140 \text{ mg/dL}$ (7.8 mmol/L) 及空腹血糖$< 100 \text{ mg/dL}$ (5.6 mmol/L) 可以排除糖尿病。 |

【注释】1、严重症状和明显高血糖者，要求血糖值超过以上指标即可确诊。
 2、在急性感染、外伤、手术或其他应激情况下，虽测出明显高血糖，亦不能立即诊断为糖尿病。
 3、无症状者不能依一次血糖值诊断，必须另一次也超过诊断标准。
 4、儿童糖尿病多数症状严重，血糖高，尿糖、尿酮体阳性，无需做糖耐量试验少数症状不严重者，则需测空腹血糖或糖耐量试验。
 5、以上血糖值为静脉血浆血糖值。如果是指尖全血或静脉全血空腹正常血糖值应该为 6.1 mmol/L 。

糖尿病的预防

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | | | |
| 防止和纠正肥胖， BMI指数超过 29 的话，会增加 25% 罹患2型糖尿病的几率。 | 避免高脂肪饮食， 高脂肪的摄入会引起肥胖风险，由此也增加了糖尿病风险。 | 日常饮食中减少果糖、蔗糖等糖分的摄入量，避免高糖饮料和甜品。 | 定期检测血糖， 30岁以上者每三年测一次血糖，做到早发现、早诊断、早治疗，防止糖尿病高危人群发展为糖尿病。 | 经常运动，每周运动不少于3次。 | 戒除烟酒嗜好及熬夜等不良生活习惯。 |

二、炎症性肠病

炎症性肠病（IBD）是一组原因不明的、以慢性炎症为特征的肠道炎性疾病。包括克罗恩病和溃疡性结肠炎两类。主要累及回肠、结肠、直肠。病因和发病机制尚未完全明确，肠道粘膜免疫系统异常导致的异常免疫炎症反应，在炎症性肠病的发生发展中起重要作用。患有炎症性肠病的人群，肠道菌群多样性较低，病原菌的比例较高，产生有害毒素，引起炎症，危害肠道健康。

患病后，腹部表现为腹痛、腹泻、腹块、里急后重。全身表现为贫血、发热、营养不良，病情严重者则有脱水、电解质紊乱及酸碱平衡失调等。儿童除常见的胃肠道临床表现外，还有如关节炎、生长迟缓、体重不增、神经性厌食等。



辅助检查方法：

- (1) 结肠镜检查
- (2) X线钡剂灌肠
- (3) 肠粘膜活检
- (4) 手术切除标本的病理学检查

炎症性肠病的预防：


- (1) 饮食方面，建议戒除烟酒嗜好，低盐、低脂、清淡饮食，食物应煮熟煮透。寒性体质者，不宜过多摄入寒凉的果蔬及含大量膳食纤维的食物，如香蕉、梨、荸荠、芹菜、芦笋、燕麦等。忌生冷及辛辣刺激性食物，如生鱼片、醉虾、冷饮、麻辣烫、烧烤等。过敏体质、乳糖或麸质不耐受者，应避免进食海鲜、牛奶、麸质等食物。
- (2) 适量运动，充足睡眠，增强自身免疫能力。
- (3) 注意心理调节，保持心态平和，避免长期紧张、焦虑等负面情绪的累积。

三、结肠癌

结肠癌是常见的发生于结肠部位的消化道恶性肿瘤，好发于直肠与乙状结肠交界处，以40~50岁年龄组发病率最高，男女之比为2~3:1。发病率占胃肠道肿瘤的第3位。结肠癌发病的主要原因是高脂肪、高蛋白、低膳食纤维的饮食习惯。在结肠癌患者的肠道内，一些能增强免疫力的细菌含量减少，而有害的致病菌增多，促进了疾病的发展。检测结肠癌的患病风险，可以尽早地发现可能致病的风险因素，通过调整饮食结构和生活习惯就可以降低患病风险。

结肠癌的辅助检查：

- (1) 直肠指检和直肠镜检，检查有无直肠息肉、直肠癌、内痔或其他病变。
- (2) 乙状结肠镜和纤维结肠镜检查，可发现癌肿，观察其大小、位置及局部浸润范围。
- (3) 腹部平片，适用于急性肠梗阻的病例，梗阻部位上方的结肠有充气、胀大现象。
- (4) 钡剂灌肠，可见癌肿部位肠壁僵硬，扩张性差，蠕动减弱或消失，结肠袋形态不规则或消失，肠腔狭窄，黏膜皱襞紊乱、破坏或消失，充盈缺损等。钡剂空气双重对比造影更有助于结肠内带蒂肿瘤的诊断。
- (5) 癌胚抗原（CEA），对早期肿瘤的诊断价值有限，对推测预后和判断复发有一定的帮助。



结肠癌早期症状

| | |
|---------|--|
| 大便习惯的改变 | <ul style="list-style-type: none"> 右半结肠癌早期粪便稀薄，有脓血，排便次数增多；癌肿继续增大时还可出现交替出现的腹泻与便秘。 左半结肠癌，表现为排便困难，并随病情的发展而不断加重。 癌肿位置较低，出现排便不畅和里急后重的感觉。 |
| 消化道症状 | <ul style="list-style-type: none"> 右半结肠癌，腹痛不适或隐痛，开始时可为间歇性，后转为持续性，常位于右下腹部。 左半结肠癌，表现为梗阻，可突发，出现腹部绞痛，伴腹胀、肠蠕动亢进、便秘和排气受阻，或慢性梗阻症状等。 |
| 中毒症状 | <ul style="list-style-type: none"> 早期结肠癌症状还包括常表现为患者出现贫血、低热、乏力、消瘦、浮肿等，其中尤以贫血、消瘦为著。 |
| 腹部包块 | <ul style="list-style-type: none"> 50%左右的患者可发现腹部包块，系癌肿或与网膜、周围组织侵润粘结的肿块，质硬，形状不规则，某些包块可随肠管有一定的活动度，而晚期结肠癌由于癌肿浸润较甚者，致使包块固定。 |
| 粪便带血或粘液 | <ul style="list-style-type: none"> 右半结肠癌，出血量小且由于结肠的蠕动使之与粪便充分混合，肉眼观察不易看出，但隐血试验常为阳性。 左半结肠癌，出血和粘液不与粪便相混，约有1/4的患者可在粪便中肉眼观察到鲜血和粘液。 |
| 肠梗阻表现 | <ul style="list-style-type: none"> 不完全性或完全性低位肠梗阻症状，如腹胀，腹痛（胀痛或绞痛），便秘或便闭。体检可见腹隆、肠型、局部有压痛，并可闻及亢进的肠鸣音。 |

结肠癌的预防

| | |
|-----------------------|---|
| 少吃或不吃富含饱和脂肪和胆固醇的食物 | 其中包括：大鱼大肉、油、动物内脏、鸡蛋黄等；植物油，包括花生油、豆油、菜籽油等限制在每人每日20~30克左右，约合2~3汤匙。不吃或少吃油炸、油煎、烧烤的食品。 |
| 增加膳食纤维的摄入，多吃富含膳食纤维的食物 | 如芋头、大豆及其制品、新鲜蔬菜和水果、藻类等；在维持主食量不变的前提下，用部分粗粮替代细粮。 |
| 补充维生素、微量元素 | 适量食用核桃、花生、奶制品、瘦肉、海产品等，补充维生素E；注意摄取麦芽、鱼类、蘑菇等富含微量元素硒的食物；适量食用含单不饱和脂肪酸的食物，如橄榄油、金枪鱼等。补充菊粉、低聚果糖、低聚半乳糖等益生元调节肠道微生物菌群，促进人体健康。 |
| 节制酒精，主动戒烟 | 酒精明显增加癌症发生的机会，如果你同时抽烟，则两种危险因子会相互叠加。 |
| 积极运动 | 运动可以控制体重，并可以减少各种癌症的发生几率。运动可以增加胃肠蠕动并缩短有害物质在肠道内停留的时间，因此可以预防结直肠癌。每周进行3次以上的运动，每次运动30分钟以上，癌症就会远离你。 |

V 参考列表

1. 重要肠道菌属列表 (共66个菌属)

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 拟杆菌属 <i>Bacteroides</i> | 乳球菌属 <i>Lactococcus</i> |
| 布劳特氏菌属 <i>Blautia</i> | 真杆菌属 <i>Eubacterium</i> |
| 栖粪杆菌属 <i>Faecalibacterium</i> | 埃希氏菌属 <i>Escherichia</i> |
| 粪球菌属 <i>Coprococcus</i> | 别样杆菌属 <i>Alistipes</i> |
| 瘤胃球菌属 <i>Ruminococcus</i> | 丁酸弧菌属 <i>Butyrivibrio</i> |
| 颤螺菌属 <i>Oscillospira</i> | 弯曲杆菌属 <i>Campylobacter</i> |
| 副拟杆菌属 <i>Parabacteroides</i> | 不动杆菌属 <i>Acinetobacter</i> |
| 毛螺菌属 <i>Lachnospira</i> | 无色小杆菌属 <i>Achromobacter</i> |
| 多尔氏菌属 <i>Dorea</i> | 产碱菌属 <i>Alcaligenes</i> |
| 链球菌属 <i>Streptococcus</i> | 乏养菌属 <i>Abiotrophia</i> |
| 普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i> | 气单胞菌属 <i>Aeromonas</i> |
| 罗斯拜瑞氏菌属 <i>Roseburia</i> | 伯克氏菌属 <i>Burkholderia</i> |
| 萨特氏菌属 <i>Sutterella</i> | 二氧化碳嗜纤维菌属 <i>Capnocytophaga</i> |
| 双歧杆菌属 <i>Bifidobacterium</i> | 柠檬酸杆菌属 <i>Citrobacter</i> |
| 阿克曼氏菌属 <i>Akkermansia</i> | 棒杆菌属 <i>Corynebacterium</i> |
| 梭菌属 <i>Clostridium</i> | 年轻泰坦杆菌属 <i>Cronobacter</i> |
| 嗜血杆菌属 <i>Haemophilus</i> | 肠杆菌属 <i>Enterobacter</i> |
| 柯林斯氏菌属 <i>Collinsella</i> | 梭杆菌属 <i>Fusobacterium</i> |
| 假单胞菌属 <i>Pseudomonas</i> | 螺杆菌属 <i>Helicobacter</i> |
| 韦荣氏球菌属 <i>Veillonella</i> | 李斯特氏菌属 <i>Listeria</i> |
| 乳杆菌属 <i>Lactobacillus</i> | 摩根氏菌属 <i>Morganella</i> |
| 肠球菌属 <i>Enterococcus</i> | 奈瑟氏球菌属 <i>Neisseria</i> |
| 嗜胆菌属 <i>Bilophila</i> | 邻单胞菌属 <i>Plesiomonas</i> |
| 沙雷氏菌属 <i>Serratia</i> | 卟啉单胞菌属 <i>Porphyromonas</i> |
| 放线菌属 <i>Actinomyces</i> | 变形菌属 <i>Proteus</i> |
| 毛杆菌属 <i>Lachnobacterium</i> | 普罗威登斯菌属 <i>Providencia</i> |
| 葡萄球菌属 <i>Staphylococcus</i> | 罗斯氏菌属 <i>Rothia</i> |
| 芽孢杆菌属 <i>Bacillus</i> | 沙门氏菌属 <i>Salmonella</i> |
| 阿德勒氏菌属 <i>Adlercreutzia</i> | 志贺氏菌属 <i>Shigella</i> |
| 嗜蛋白胨菌属 <i>Peptoniphilus</i> | 四生球菌属 <i>Tetragenococcus</i> |
| 克雷伯氏菌属 <i>Klebsiella</i> | 密螺旋体属 <i>Treponema</i> |
| 脱硫弧菌属 <i>Desulfovibrio</i> | 弧菌属 <i>Vibrio</i> |
| 爱格士氏菌属 <i>Eggerthella</i> | 耶尔森氏菌属 <i>Yersinia</i> |

2. 常见肠道有益菌与有害菌中英文对照

| 有益菌 | 有害菌 |
|--|--|
| 嗜酸乳杆菌 <i>Lactobacillus acidophilus</i> | 艰难梭菌 <i>Clostridium difficile</i> |
| 鼠李糖乳杆菌 <i>Lactobacillus rhamnosus</i> | 产气荚膜杆菌 <i>Clostridium perfringens</i> |
| 干酪乳杆菌 <i>Lactobacillus casei</i> | 病原性大肠埃希氏菌 <i>pathogenic Escherichia coli</i> |
| 代田菌 <i>Lactobacillus casei Shirota</i> | 金黄色葡萄球菌 <i>Staphylococcus aureus</i> |
| 类干酪乳杆菌 <i>Lactobacillus paracasei</i> | 铜绿假单胞菌 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> |
| 约氏乳杆菌 <i>Lactobacillus johnsonii</i> | 中间普雷沃氏菌 <i>Prevotella intermedia</i> |
| 加氏乳杆菌 <i>Lactobacillus gasseri</i> | 肺炎克雷伯氏菌 <i>Klebsiella pneumoniae</i> |
| 卷曲乳杆菌 <i>Lactobacillus crispatus</i> | 蜡样芽孢杆菌 <i>Bacillus cereus</i> |
| 路氏乳杆菌 <i>Lactobacillus reuteri</i> | 肠沙门氏菌 <i>Salmonella enterica</i> |
| 唾液乳杆菌 <i>Lactobacillus salivarius</i> | 宋内氏志贺氏菌 <i>Shigella sonnei</i> |
| 植物乳杆菌 <i>Lactobacillus plantarum</i> | 肉毒杆菌 <i>Clostridium botulinum</i> |
| 短乳杆菌 <i>Lactobacillus brevis</i> | 婴儿链球菌 <i>Streptococcus infantarius</i> |
| 保加利亚乳杆菌 <i>Lactobacillus bulgaricus</i> | 咽颊炎链球菌 <i>Streptococcus anginosus</i> |
| 发酵乳杆菌 <i>Lactobacillus fermentum</i> | 苏黎士年轻泰坦杆菌 <i>Cronobacter turicensis</i> |
| 瑞士乳杆菌 <i>Lactobacillus helveticus</i> | 阴沟肠杆菌 <i>Enterobacter cloacae</i> |
| 动物双歧杆菌 <i>Bifidobacterium animalis</i> | 普通拟杆菌 <i>Bacteroides vulgatus</i> |
| 长双歧杆菌 <i>Bifidobacterium longum</i> | 粪拟杆菌 <i>Bacteroides caccae</i> |
| 短双歧杆菌 <i>Bifidobacterium breve</i> | 脆弱拟杆菌 <i>Bacteroides fragilis</i> |
| 青春双歧杆菌 <i>Bifidobacterium adolescentis</i> | 迪氏副拟杆菌 <i>Parabacteroides distasonis</i> |
| 双歧双歧杆菌 <i>Bifidobacterium bifidus</i> | 痢疾志贺氏菌 <i>Shigella dysenteriae</i> |
| 婴儿双歧杆菌 <i>Bifidobacterium infantis</i> | 粪肠球菌 <i>Enterococcus faecalis</i> |
| 角双歧杆菌 <i>Bifidobacterium angulatum</i> | 铅黄肠球菌 <i>Enterococcus casseliflavus</i> |
| 丁酸梭菌 <i>Clostridium butyricum</i> | 霍乱弧菌 <i>Vibrio cholerae</i> |
| 嗜热链球菌 <i>Streptococcus thermophilus</i> | 缓慢爱格氏菌 <i>Eggerthella lenta</i> |
| 乳酸片球菌 <i>Pediococcus acidilactici</i> | 空肠弯曲杆菌 <i>Campylobacter jejuni</i> |
| 戊糖片球菌 <i>Pediococcus pentosaceus</i> | 微黄奈瑟氏球菌 <i>Neisseria subflava</i> |
| 单形拟杆菌 <i>Bacteroides uniformis</i> | 副流感嗜血杆菌 <i>Haemophilus parainfluenzae</i> |
| 产甲酸草酸杆菌 <i>Oxalobacter formigenes</i> | 胶胨罗斯氏菌 <i>Rothia mucilaginosa</i> |
| 普氏栖粪杆菌 <i>Faecalibacterium prausnitzii</i> | 小韦荣氏球菌 <i>Veillonella parvula</i> |

济世泰康 生命之光

泰济生医院国际健康管理中心依托天狮集团李金元董事长“大健康”产业发展思路应运而生，本着对生命科学的尊重，对人类健康事业的无限追求，全面贯彻实施“精准检测、精准预防、精准治疗、精准康复”一整套的精准医学理念，打造早发现、早治疗，“检、防、治”一体的高端健康管理服务平台，做好天狮大健康的左膀右臂，实现“一体多翼”的格局。中心坐落于天狮国际健康产业园内，建筑面积 2.8 万平方米，是天狮集团投资兴建的国内顶级规模的健康管理机构，融合了传统医院的医疗诊断资质与能力，通过引入先进科学理念和技术，面向全球高端客户提供“全方位”、“一站式”、“个性化”、“高品质”的精准健康管理服务。



泰济生的“泰”、“济”两字出自中国古老《周易》之中的两卦，“泰”为坤乾卦，表示“阴升阳降，阴阳环抱”，有“吉运亨通”之意；“济”为“既济”卦，坎离既济，表示“水升火降，水火既济”，大事成也，另有济世宏愿之意。唐代医圣孙思邈认为：心为离火，肾为坎水，心火下降，济于肾阳；肾水上升，济于心血。心肾相交，水火既济，人乃健康。而“生”字则有“生命”、“生长”、“生生不息”之意。故泰济生体现了“阴阳平衡，水火既济，人乃健康”之意。

泰济生医院国际健康管理中心不仅具备传统的医院诊断、医疗手段，可以满足国内患者及天狮家人们的医疗保健需要，同时还综合当今国际先进的设备、权威的专家团队、先进的服务理念和完善的服务流程，在全身体检方面形成了自己在全国乃至全球范围内“超早期”“精准”“系统”“全面”的独到特色，为疾病的预防、诊断、早期干预与治疗提供可靠依据！中心通过肿瘤超早期筛查、易感基因检测、肠道微生态检测、健康检测设备追踪及大数据平台共享等项目让健康管理更加人性化、系统化、科技化、高端化！

在癌症早期筛查及诊断的基础上，泰济生医院国际健康管理中心又与美国、日本、韩国等多家世界权威的免疫细胞治疗机构形成战略合作联盟，建立抗衰老研究中心，积极开展生物保健、生物美容和免疫细胞治疗为特色的医疗保健项目的研发，以期为治疗癌症、糖尿病、心脑血管疾病、免疫系统疾病、神经系统疾病等提供更优、更精准的治疗方案。中心在深度健康体检、癌症早期筛查、靶向治疗、免疫细胞治疗方面搭建一个全球高端的健康管理平台。



泰济生医院国际健康管理中心投入巨额资金引进全球一流的检测与医疗设备，譬如在中国率先引进了PET-CT（正电子发射计算机断层扫描仪）、ABI3500基因分析仪、炫速双源CT扫描系统、全景高场开放式超导型磁共振系统、贝克曼全自动生化流水线等等；除了这些国内领先、亚洲领先的硬件设施外，医院在人力资源等“软资产”上也同样实力雄厚，除了聘请国内顶级行业专家外，还通过与国际顶级医学院、医学研究中心建立合作伙伴关系，紧跟国际医学潮流、响应国家号召，积极倡导和推动精准医疗，推出领先全球的肿瘤超早期筛查、易感基因检测、肠道微生态检测等项目。泰济生医院采用美国Illumina高密度基因分型平台，可对肿瘤、心血管、代谢等9大类150种疾病易感基因进行检测和大数据分析，破译致病基因密码，对糖尿病、心脑血管疾病、恶性肿瘤疾病和新生儿遗传性疾病、进行精准分类，从而实现对这些疾病的早期发现、早期诊断、早期预防和早期治疗，将其扼杀于萌芽状态。易感基因检测技术将使人们更清晰的认识自我，通过最先进的基因测序技术，让人们了解各类疾病的患病风险，提供个性化、定制化的检测、防治、保健、医疗、康复及养生服务。肠道微生态检测利用高通量测序技术和相关数据分析方法，能够高效、准确地分析肠道内2000多种细菌的组成、含量，并进一步分析有益菌、有害菌的比例及其种类，了解其对人体的各种生物功能如肠粘膜屏障、激活免疫、引发炎症反应等，最后得出人体亚健康状态的相关指标，为肠道菌群的调理提供靶标和依据。在泰济生，从此不再“千人一药”，实现了真正意义上的“对症施治”的精准化靶向性治疗，还人们一个真正的健康体魄，提升生命质量和生活品质！

泰济生医院国际健康管理中心还配备一流的配套设施，包括可容纳7000多人的国际会议中心、招待3000多人的国际宴会中心、拥有4600多张床位的四星、五星、七星级的温泉酒店、皇家温泉水疗、泳池、中式园林、运动场地、健身设施、环球演艺中心、4D动感影院、20万平方米广场、草坪及休闲园林等。更是以人性化的管理与温馨服务，使人们能享受个性化、品质化、高度隐私化的健康管理服务，从而提高生活质量与生命质量。



肠道微生物检测

Detection of Intestinal Microbial Ecosystem

尊享版

解密肠道微生物

Explore your Microbiome



地址：中国天津市武清开发区新源道18号天狮国际健康产业园B5大楼 邮编：301700
咨询电话：400-6511-266 泰济生健康商城：SHOP.TAIJI-SUN.COM

Address: Building B5, TIENS International Health Industrial Park, No.18 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China. Postcode: 301700 Tel: 400-6511-266 Website: SHOP.TAIJI-SUN.COM