

自考就用自考笔果题库,关注公众号【笔果自考题库】

00178 市场调查与预测 2022 年 4 月真题

1、【单选题】信息作为对事物存在方式和运动状态的反映,随着客观事物的变化而变化,这体现了信息的

- A: 传递性
- B: 共享性
- C: 时效性
- D: 可加工性

答案: C

解析: 信息的时效性指信息会随着客观事物的变化而变化,若不能及时利用,其价值会降低或消失。题干中“随客观事物变化而变化”体现了时间对信息价值的影响,属于时效性特征。

2、【单选题】按信息来源的稳定程度,可将信息分为

- A: 固定信息和流动信息
- B: 内部信息和外部信息
- C: 原始信息和加工信息
- D: 历史信息、现时信息和未来信息

答案: A

解析: 按信息来源的稳定程度分类: 固定信息:来源相对稳定,如企业规章制度、标准定额等; 流动信息:随时间变化而动态更新,如每日销售数据、市场行情等。

3、【单选题】按调查对象的范围大小,市场调查可以分为

- A: 全面调查和抽样调查
- B: 连续性调查和一次性调查
- C: 探测性调查和描述性调查
- D: 因果关系调查和预测性调查

答案: A

解析: 按调查对象范围大小分类: 全面调查:对所有对象进行调查(如普查); 抽样调查:从总体中抽取样本进行调查,适用于范围广的场景。

4、【单选题】用来回答“为什么”的问题的调查是

- A: 探测性调查
- B: 描述性调查
- C: 因果关系调查

需要了解简单快速的学历提升方式,可添加笔果老师微信 18938641773

D: 预测性调查

答案: C

解析: 因果关系调查:探究变量间因果联系,回答“为什么”(如价格变动对销量的影响);
其他选项:探测性调查用于初步了解问题,描述性调查用于客观描述现状,预测性调查用于预测未来趋势。

5、【单选题】市场印象调查属于

- A: 产品调查
- B: 价格调查
- C: 促销调查
- D: 渠道调查

答案: C

解析: 市场印象调查关注消费者对企业或产品的认知、态度,属于促销调查的范畴,旨在评估促销活动的效果(如广告、公关活动对品牌形象的影响)。

6、【单选题】下列属于企业外部环境市场调查内容的是

- A: 企业使命
- B: 企业发展战略
- C: 企业业绩表现
- D: 社会文化因素

答案: D

解析: 企业外部环境包括宏观环境(政治、经济、社会文化、技术等),而 A、B、C 选项均属于企业内部环境(使命、战略、业绩)。

7、【单选题】在实验调查法中,常作为因变量的是

- A: 产品价格
- B: 产品包装
- C: 促销方法
- D: 销售量

答案: D

解析: 在实验调查中,因变量是受自变量影响而变化的结果。产品价格、包装、促销方法属于自变量(实验中操控的因素),销售量是因变量(观测的结果)。

8、【单选题】以下属于自我管理调查的是

- A: 访问

- B: 留置访问
- C: 电话访问
- D: 街头拦截访问

答案: B

解析: 自我管理调查指受访者自主填写问卷,留置访问是将问卷留给受访者,由其自行填写后回收,属于此类;其他选项(入户、电话、街头拦截)均需调查员现场或实时介入。

9、【单选题】将事物的等级大小、顺序的先后和程度的高低排列出来就是

- A: 顺序量表
- B: 类别量表
- C: 等差量表
- D: 等比量表

答案: A

解析: 顺序量表:可排列事物的等级、顺序(如“非常满意”“满意”“不满意”);类别量表仅分类(如性别),等差量表和等比量表涉及具体数值差异

10、【单选题】对问卷进行效度和信度的测量,效度高表示

- A: 测量结果所含系统误差大
- B: 测量结果所含系统误差小
- C: 测量结果所含随机误差大
- D: 测量结果所含随机误差小

答案: B

解析: 效度:指测量的准确性,效度高表示测量结果能真实反映目标变量,即系统误差小;信度:指测量的一致性,信度高表示随机误差小。

11、【单选题】以下属于非等概率抽样的是

- A: 简单随机抽样
- B: 分层比例抽样
- C: 等距随机抽样
- D: 分层最佳抽样

答案: D

解析: 非等概率抽样指总体中个体被抽中的概率不同。分层最佳抽样根据各层变异程度分配样本量,变异大的层抽样概率更高,属于非等概率抽样;其他选项(简单随机、分层比例、等距)均为等概率抽样。

12、【单选题】以下属于非随机抽样的抽样方法是

- A: 分层比例抽样
- B: 分层最佳抽样
- C: 系统抽样
- D: 配额抽样

答案: D

解析: 非随机抽样不遵循概率原则,配额抽样按预设特征(如年龄、性别)分配配额,属于非随机抽样;A、B、C选项均为随机抽样方法。

13、【单选题】区间估计中,置信概率为 **95.45%**可以表示有 **95.45%**的样本平均值落在距总体平均 值

- A: ± 1 个标准误的范围内
- B: ± 2 个标准误的范围内
- C: ± 3 个标准误的范围内
- D: ± 4 个标准误的范围内

答案: B

解析: 在正态分布中,置信概率与标准误范围的关系 68.27%的概率对应 ± 1 个标准误;95.45%对应 ± 2 个标准误;99.73%对应 ± 3 个标准误。

14、【单选题】市场调查资料整理的过程中,既是基础性又是关键性的工作是

- A: 问卷编码
- B: 数据分类
- C: 数据录入
- D: 数据校编

答案: D

解析: 数据校编是对原始数据进行审核、筛选和修正,确保数据准确完整,是整理过程中基础性和关键性的工作;编码、分类、录入均以此为前提。

15、【单选题】常用于描述类别变量数据离散程度的指标是

- A: 极差
- B: 方差
- C: 频率
- D: 变异系数

答案: C

解析: 类别变量(如性别、职业)无数值大小,常用频率(各类别出现的比例)描述离散程度;极

差、方差、变异系数适用于数值型变量。

16、【单选题】假设检验第一步是

- A: 确定显著性水平 α
- B: 选择假设检验的检验统计量
- C: 计算检验统计值
- D: 建立原假设 H_0 和备择假设 H_1

答案: D

解析: 假设检验的步骤: 建立原假设和备择假设; 确定显著性水平 α ; 选择检验统计量; 计算统计值并决策。

17、【单选题】对变异程度的相对度量一般使用变异系数,它等于

- A: 方差与均值的比值
- B: 方差与中位数的比值
- C: 标准差与均值的比值
- D: 标准差与中位数的比值

答案: C

解析: 变异系数(CV)=标准差/均值,用于消除不同数据组均值差异的影响,衡量相对变异程度。

18、【单选题】以下关于加权平均法中数据权重的说法正确的是

- A: 平均赋予权重
- B: 越接近预测期的数值所赋予的权重越大
- C: 越接近预测期的数值所赋予的权重越小
- D: 根据预测要求灵活确定

答案: B

解析: 加权平均法中,权重根据数据的重要性分配,通常近期数据对预测结果影响更大,因此权重更高。

19、【单选题】指数平滑法中,平滑系数 α 的取值范围是

- A: -1 小于 α 小于 0
- B: $-1 \leq \alpha \leq 0$
- C: $0 < \alpha < 1$
- D: $0 \leq \alpha \leq 1$

答案: D

解析：平滑系数 α 是指数平滑法的核心参数,取值范围在 0 到 1 之间, α 越大,近期数据权重越高。

20、【单选题】市场研究报告在撰写摘要时,通常不包括

- A: 报告的目的
- B: 研究的局限性
- C: 研究所使用的方法
- D: 研究结论

答案：B

解析：摘要应简明扼要,包括研究目的、方法、结论及建议;研究的局限性通常在报告正文的“局限性”部分阐述,而非摘要中。

21、【多选题】以下属于一次性调查的有

- A: 顾客满意度调查
- B: 消费者购买行为调查
- C: 广告效果调查
- D: 定期统计报表
- E: 商情动态报告

答案：ABC

解析：一次性调查针对特定时点或时期的问题,无定期重复需求;D(定期统计报表)和E(商情动态报告)属于定期调查。

22、【多选题】企业欲通过改换包装扩大产品销路,适合采用的实验设计有

- A: 对照后测设计
- B: 对照前后测设计
- C: 简单后测设计
- D: 简单前后测设计
- E: 模拟前后测设计

答案：ABCD

解析：改换包装的实验需比较不同包装(实验组)与原包装(对照组)的效果,前四种设计均涉及实验组和对照组的对比;模拟前后测设计不属于标准实验设计。

23、【多选题】常用于推断性分析的统计值或显著性检验的方法包括

- A: 卡方检验
- B: t 检验
- C: Z 检验
- D: 方差分析

E: 区间估计

答案: ABCDE

解析: 推断性分析通过样本推断总体,上述方法均用于检验统计显著性或估计总体参数:
卡方检验:分析分类变量相关性; t 检验/ Z 检验:比较均值差异; 方差分析:多组均值差异检验; 区间估计:估算总体参数范围。

24、【多选题】以下不属于定量预测法的有

- A: 简易平均法
- B: 移动平均法
- C: 专家会议法
- D: 德尔菲法
- E: 指数平滑法

答案: CD

解析: 定量预测法基于数据建模,如 A(简易平均)、B(移动平均)、E(指数平滑);C 和 D 属于定性预测法,依赖专家主观判断。

25、【多选题】数据分类时应遵循的基本原则有

- A: 包容性
- B: 互斥性
- C: 差异性
- D: 单一性
- E: 全面性

答案: ABCDE

解析: 数据分类时应遵循以下的原则: (1) 适当性; (2) 包容性; (3) 互斥性; (4) 差异性; (5) 单一性; (6) 全面性。

26、【名词解释】投射技术法

答案: 投射技术法是一种定性市场调查方法,通过间接、非结构化的方式,引导受访者在无意识状态下将内心态度、动机、情感等投射到对特定刺激物的反应中,从而揭示其潜意识中的真实想法。

27、【名词解释】问卷

答案: 问卷是市场调查中用于收集数据的标准化工具,由一系列结构化或半结构化的问题、选项及指导语组成。

28、【名词解释】购买模式观察法

答案：购买模式观察法属于观察调查法的一种,通过实地观察消费者的购买行为、时间、地点、频率、选择偏好等要素,总结其购买规律(如季节性、品牌忠诚度等)。

29、【名词解释】定量预测

答案：定量预测是基于历史数据和统计模型,通过数学方法对市场未来发展趋势进行量化估算的预测方法。

30、【简答题】市场竞争调查包括哪些内容?

答案： 竞争对手基本信息:企业规模、组织架构、市场定位、历史业绩等。 产品与服务:产品线布局、技术优势、质量标准、包装设计等。 价格策略:定价方法、价格区间、折扣策略、价格调整频率等。 促销与营销:广告投放渠道、促销活动(如打折、赠品)、品牌传播策略。 渠道分布:销售渠道类型(直营/分销)、渠道覆盖范围、物流体系效率。 市场份额与用户群体:各竞争对手的市场占有率、目标客户特征及忠诚度。 竞争策略动向:新产品发布、战略合作、并购计划等未来行动布局。

31、【简答题】简述电话访问法的优点和缺点。

答案： 优点：效率高:可快速接触大量样本,节省实地访问时间。 成本低:无需差旅费用,仅需电话费用和少量人力。 覆盖广:可跨地域访问,尤其适合偏远地区样本。 客观性强:访问流程标准化,减少面访中的主观干扰。 缺点：样本偏差:依赖电话用户,可能遗漏无电话或拒接人群。 时间限制:访问时长通常 < 15 分钟,难以深入复杂问题。 信息深度不足:无法观察受访者表情或环境,难以获取非语言反馈。 拒访率高:陌生电话易被拒绝,尤其涉及敏感问题时。

32、【简答题】集体经验判断法的基本步骤是什么?

答案： 确定参与人员:选择具备行业经验的专家、管理者、销售人员等组成团队。 独立判断:成员基于自身经验对预测对象(如销量、市场趋势)分别给出判断值。 汇总与分享:收集所有成员的判断结果,公开讨论各自的依据和逻辑。 综合调整:成员参考他人意见后,重新修正自己的判断,形成第二轮预测。 确定最终预测值:通过加权平均、中位数法等方式整合结果,得出最终预测结论。

33、【简答题】问卷设计的程序包括哪些步骤?

答案： 明确调查目的:界定问卷需收集的信息类型(如消费者态度、行为习惯)。 设计问题框架:确定问题类型(开放式/封闭式/量表题);避免引导性、歧义性问题,确保中立性。 编排问题顺序:从简单、非敏感问题入手,逐步深入复杂问题;逻辑分组(如基本信息→行为→态度),避免跳跃。 预调查测试:选取小样本试填问卷,检验问题清晰度、流程顺畅度及数据有效性。 修订与定稿:根据预调查反馈调整问题表述、顺序或删除无效题目,形成最终问卷。

需要了解简单快速的学历提升方式,可添加笔果老师微信 18938641773

34、【简答题】市场研究报告的陈述与演示具有什么特点？

答案： 简明扼要:用图表、数据可视化替代冗长文字,突出核心结论。 逻辑严谨:按“背景→方法→发现→建议”的结构组织内容,避免信息碎片化。 针对性强:根据受众(如管理层/客户)调整重点,侧重商业决策相关信息。 互动性:预留问答环节,结合听众反馈实时补充解释。 客观性:区分事实与观点,明确陈述研究局限性(如样本偏差、数据范围)。

35、【简答题】简述简单回归分析的分析步骤。

答案：

1. **确定变量关系**：明确因变量（如销量）与自变量（如价格、广告）。
2. **收集数据**：获取足够样本量的历史数据，确保数据准确性和时效性。
3. **建立回归模型**：
 - 假设线性关系： $Y = a + bX + \varepsilon$ （ Y 为因变量， X 为自变量， ε 为误差项）。
 - 用最小二乘法估算系数 a 、 b 。
4. **模型检验**：
 - 拟合度检验（如 R^2 值，判断模型解释力）；
 - 显著性检验（如 t 检验、 F 检验，验证系数有效性）。
5. **应用与预测**：基于验证后的模型，代入自变量值预测因变量趋势。

36、【计算题】某地有居民 400000 户,分别居住在中心城区、副中心城区、远城区、郊区,有关 资料如下表所示。现决定抽取 4000 户调查居民的家庭资产状况,试按分层最低成本抽样法确定各层样本数。

居住位置	户数	收入标准差	户均调查费用
中心城区	60000	1500	9
副中心城区	140000	1000	16
远城区	160000	800	25
郊区	40000	600	36

答案：

分层最低成本抽样法（Neyman 抽样的一种拓展，考虑单位调查

$$n_h = n \cdot \frac{N_h \cdot S_h / \sqrt{C_h}}{\sum_{i=1}^k N_i \cdot S_i / \sqrt{C_i}}$$

其中：

- n 为总样本量 ($n = 4000$)
- N_h 为第 h 层的总体单位数
- S_h 为第 h 层的标准差
- C_h 为第 h 层的单位调查成本
- k 为层数 (本题 $k = 4$, 对应中心城区、副中心城区、远城



步骤 1: 计算各层 $N_h \cdot S_h / \sqrt{C_h}$

- **中心城区:** $N_1 = 60000, S_1 = 1500, C_1 = 9 \frac{N_1 \cdot S_1}{\sqrt{C_1}} = \frac{60000 \times 15}{\sqrt{9}}$
- **副中心城区:** $N_2 = 140000, S_2 = 1000, C_2 = 16 \frac{N_2 \cdot S_2}{\sqrt{C_2}} = \frac{140000 \times 10}{\sqrt{16}}$
- **远城区:** $N_3 = 160000, S_3 = 800, C_3 = 25 \frac{N_3 \cdot S_3}{\sqrt{C_3}} = \frac{160000 \times 80}{\sqrt{25}}$
- **郊区:** $N_4 = 40000, S_4 = 600, C_4 = 36 \frac{N_4 \cdot S_4}{\sqrt{C_4}} = \frac{40000 \times 600}{\sqrt{36}} =$

步骤 2: 计算分母总和 $\sum_{h=1}^4 \frac{N_h \cdot S_h}{\sqrt{C_h}}$

$$30000000 + 35000000 + 25600000 + 4000000 = 94600000$$

步骤 3: 计算各层样本量 n_h

- **中心城区:** $n_1 = 4000 \times \frac{30000000}{94600000} \approx 4000 \times 0.317 = 1268$
- **副中心城区:** $n_2 = 4000 \times \frac{35000000}{94600000} \approx 4000 \times 0.370 = 1480$
- **远城区:** $n_3 = 4000 \times \frac{25600000}{94600000} \approx 4000 \times 0.271 = 1084$
- **郊区:** $n_4 = 4000 \times \frac{4000000}{94600000} \approx 4000 \times 0.042 = 168$

验证: $1268 + 1480 + 1084 + 168 = 4000$ (与总样本量一致)

3 7、【计算题】某村连续5年的生猪饲养量资料如下表。以时间为自变量运用回归分析预测法预测该村第8年生猪饲养量。(计算过程和结果均保留一位小数)

年号	1	2	3
生猪饲养量(头)	2	4	7

答案

」

以时间 t 为自变量 ($t = 1, 2, 3, 4, 5$) , 生猪饲养量 y 为因变量, 建立一元二乘法求解系数 a 、 b 。

步骤 1: 计算基础统计量

年号 t	饲养量 y	t^2	ty
1	2	1	2
2	4	4	8
3	7	9	21
4	9	16	36
5	12	25	60

- 合计: $\sum t = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$
 $\sum y = 2 + 4 + 7 + 9 + 12 = 34$
 $\sum t^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$
 $\sum ty = 2 + 8 + 21 + 36 + 60 = 127$

步骤 2: 求解回归系数 b 和 a

- 斜率 b 公式: $b = \frac{n \sum ty - \sum t \sum y}{n \sum t^2 - (\sum t)^2}$

$$\text{代入 } n = 5: b = \frac{5 \times 127 - 15 \times 34}{5 \times 55 - 15^2} = \frac{635 - 510}{275 - 225} = \frac{125}{50} = 2.5$$

- 截距 a 公式: $a = \bar{y} - b\bar{t}$

$$\text{其中 } \bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{34}{5} = 6.8, \quad \bar{t} = \frac{\sum t}{n} = \frac{15}{5} = 3, \quad a = 6.8 - 2.5 \times 3 = -0.7$$

步骤 3: 建立回归模型并预测第 8 年

$$\text{回归方程: } \hat{y} = -0.7 + 2.5t$$

$$\text{当 } t = 8 \text{ 时: } \hat{y} = -0.7 + 2.5 \times 8 = -0.7 + 20 = 19.3$$

结论:

- 37 题各层样本量: 中心城区约 1268 户、副中心城区约 1480 户
- 38 题第 8 年生猪饲养量预测为 19.3 头 (保留 1 位小数)。

38、【论述题】请结合实际论述什么情况下适合使用抽样调查?

答案：抽样调查的适用场景及案例分析：(1)总体规模庞大,全面调查不现实时 案例:全国消费者网购习惯调查(总体超10亿人),若采用全面调查,需投入巨额人力、时间和资金,而抽样调查可通过科学抽样(如分层抽样按地区、年龄分层)选取10万人样本,以<0.1%的成本获取具有代表性的数据。 逻辑:当总体数量级极大时,抽样调查通过概率理论保证样本代表性,性价比远高于全面调查。(2)调查具有破坏性或不可逆性时 案例:某食品企业检测罐头保质期,若对所有产品进行破坏性开封检验,将导致全部产品报废。通过随机抽样100罐进行检测,可在不影响整体产品的前提下,推断整批罐头的质量稳定性。 逻辑:对破坏性调查(如药品疗效、工业产品寿命测试),抽样是唯一可行的方法。(3)时间或成本限制严格时 案例:电商平台临时推出促销活动,需快速了解用户偏好以调整策略。若采用全面调查,从设计问卷到回收数据需数周,而抽样调查(如抽取10万活跃用户)可在48小时内完成数据收集,为决策提供及时支持。 逻辑:商业场景中,快速响应比绝对精确更重要,抽样调查可在短时间内输出有效结论。(4)调查对象具有同质性或规律性时 案例:某连锁超市调查顾客对新包装的满意度,各门店顾客群体特征相似(如年龄、消费能力分布均匀),只需在5家代表性门店抽样1000人,即可推断整体顾客态度,无需覆盖所有门店。 逻辑:当总体内部差异较小时,少量样本即可反映总体特征,抽样效率高。(5)对调查精度要求适中,非绝对精确时 案例:地方政府统计居民平均年收入,若要求误差在 $\pm 5\%$ 以内,通过抽样调查(如抽取2万户家庭)即可满足需求,无需耗费大量资源进行全面普查(仅在人口普查等高精度需求时采用全面调查)。 逻辑:多数商业和社会调查中,合理控制抽样误差(如 $\pm 3\% \sim 5\%$)已能满足决策需求,过度追求精确会导致成本剧增。(6)动态场景中需持续监测时 案例:社交媒体舆情监测,每天新增海量用户评论,无法全面分析。通过抽样算法(如按关键词、时间戳抽样)实时抓取1%的评论,可快速追踪热点趋势,为品牌公关提供动态反馈。 逻辑:对持续变化的总体(如舆情、股市),抽样调查可实现低成本的实时监测。总结 抽样调查的核心优势在于效率与代表性的平衡,适用于总体规模大、破坏性、时间敏感、同质性高或精度要求适中的场景。实际应用中,需结合调查目的、资源限制和统计方法(如概率抽样 vs 非概率抽样),确保样本能科学推断总体特征。例如,人口普查因需绝对精确采用全面调查,而日常市场调研则普遍依赖抽样调查以实现性价比最大化。