

## Lec-3. 条件概率

主讲教师：吴利苏 ([wulisu@sdust.edu.cn](mailto:wulisu@sdust.edu.cn))

主    页：<http://wulisu.cn>

# 目录

## 1. 条件概率

## 2. 乘法定理

## 3. 全概率公式和贝叶斯公式

## 条件概率

### 例（引例）

将一枚硬币抛两次，观察正反面. 设  $A$  为至少有一次为正面， $B$  为两次相同面. 求已知  $A$  发生的条件下  $B$  发生的概率.

解: 样本空间  $S = \{HH, HT, TH, TT\}$ ,

$A = \{HH, HT, TH\}$ ,  $B = \{HH, TT\}$ .

由于事件  $A$  已经发生, 所以这时试验的所有可能结果只有三种, 而其中事件  $B$  包含的基本事件只占其中的一种, 所以

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3}$$

表示在  $A$  发生的条件下,  $B$  发生的条件概率.

在这个例子中, 若不知道事件  $A$  发生, 则事件  $B$  发生的概率为  $P(B) = \frac{2}{4}$ . 所以

$$P(B|A) \neq P(B).$$

其原因在于事件  $A$  的发生改变了样本空间, 使它由原来的  $S$  缩减为新的样本空间  $S_A = A$ .

## 条件概率的定义

### 定义

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, P(A) > 0$$

称为事件  $A$  发生的条件下事件  $B$  发生的条件概率.

## 条件概率是概率

### 性质 ( $P(\cdot | A)$ 是概率)

- 非负性:  $P(B|A) \geq 0$ ;
- 规范性:  $P(S|A) = 1$ ;
- 可列可加性:  $B_1, \dots, B_n, \dots$  满足  $B_i \cap B_j = \emptyset, \forall i \neq j$ , 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i | A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A).$$

$P(\cdot|A)$  具有概率的所有性质. 例如:

- $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A).$



$P(\cdot|A)$  具有概率的所有性质. 例如:

- $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$ .
- 加法公式

$$P(B_1 \cup B_2 | A) = P(B_1 | A) + P(B_2 | A) - P(B_1 B_2 | A).$$

$P(\cdot|A)$  具有概率的所有性质. 例如:

- $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$ .
- 加法公式

$$P(B_1 \cup B_2 | A) = P(B_1 | A) + P(B_2 | A) - P(B_1 B_2 | A).$$

- 若  $C \subset B$ , 则

$$\begin{aligned} P(B - C | A) &= P(B | A) - P(C | A), \\ P(C | A) &\leq P(B | A). \end{aligned}$$

### 例

一个盒子有 4 只产品, 其中 3 只一等品, 1 只二等品. 从中取两次, 每次任取一只作不放回抽样. 设事件  $A$  为第一次取到的是一等品.  $B$  为第二次取到的是一等品. 求  $P(B|A)$ .

解: 将产品编号: 1,2,3 一等品, 4 为二等品. 以  $(i, j)$  表示第一次, 第二次分别取到第  $i$  号, 第  $j$  号产品. 则

$$S = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), \\ (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$$

含  $12 = C_4^1 C_3^1$  个样本点.

$$A = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), \\ (3, 1), (3, 2), (3, 4)\}$$

含  $9 = C_3^1 C_3^1$  个样本点.

$$AB = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$$

含  $6 = C_3^1 C_2^1$  个样本点. 所以,

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{2}{3}.$$

## 乘法定理

- 设  $P(A) > 0$ , 则有乘法公式,

$$P(AB) = P(B|A)P(A).$$

- 设  $P(B) > 0$ , 则有

$$P(AB) = P(A|B)P(B).$$

## 乘法定理的推广

- 三个事件  $A, B, C$  满足  $P(AB) > 0$ ,

$$P(ABC) = P(C|AB)P(B|A)P(A).$$

- $n$  个事件  $A_1, \dots, A_n$ ,  $P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0$ ,

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}) P(A_{n-1} | A_1 \cdots A_{n-2}) \times \\ \cdots \times P(A_2 | A_1) P(A_1).$$

例

$$P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}.$$

求  $P(A \cup B), P(\bar{A}|A \cup B)$ .

例

$$P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}.$$

求  $P(A \cup B), P(\bar{A}|A \cup B)$ .

$$\text{解: } P(AB) = P(B|A)P(A) = \frac{1}{12},$$

$$P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{2}. \text{ 所以}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}|A \cup B) &= 1 - P(A|A \cup B) \\ &= 1 - \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

□



## 例

设袋中有 5 个红球, 4 个白球, 采用不放回抽样, 每次取一个, 取 3 次.

- (1) 求前两次中至少有一次取到红球的概率.
- (2) 已知前两次中至少有一次取到红球, 求前两次中恰有一次取到红球的概率.
- (3) 求第 1,2 次取到红球第 3 次取到白球的概率.

解: 记  $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取到红球}\}$ ,  $i = 1, 2, 3$ , 则第  $i$  次取到白球为  $\bar{A}_i$ .

$B = \{\text{前两次至少有一次取到红球}\}$ ,

$C = \{\text{前两次恰有一次取到红球}\}$ .

$$(1) P(\bar{B}) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) = \frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{5}{6}.$$

$$(2) P(BC) = P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 A_2) = \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} + \frac{4}{9} \times \frac{5}{8},$$

$$P(C|B) = \frac{P(BC)}{P(B)} = \frac{\frac{5}{9} \times \frac{4}{8} + \frac{4}{9} \times \frac{5}{8}}{\frac{5}{6}} = \frac{2}{3}$$

$$\text{或 } P(C|B) = 1 - P(\bar{C}|B) = 1 - \frac{P(\bar{B}\bar{C})}{P(B)} = 1 - \frac{P(A_1 A_2)}{P(B)} = \frac{2}{3}.$$

(3)

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(\bar{A}_3|A_1 A_2) \\ &= \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{10}{63}. \end{aligned}$$

□

### 例

设某光学仪器厂制造的透镜, 第一次落下打破的概率为  $\frac{1}{2}$ , 若第一次落下未打破, 第二次落下打破的概率为  $\frac{7}{10}$ , 若前两次落下未打破, 第三次落下打破的概率为  $\frac{9}{10}$ , 试求落下三次未打破的概率.

解:  $A_i = \{\text{第} i \text{次落下打破}\}, i = 1, 2, 3,$   
 $B = \{\text{落下三次未打破}\}.$

$$\begin{aligned}P(B) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) \\&= P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_1) \\&= (1 - \frac{9}{10})(1 - \frac{7}{10})(1 - \frac{1}{2}) = \frac{3}{200}.\end{aligned}$$

或  $\bar{B} = A_1 \cup \bar{A}_1 A_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3,$

$A_1, \bar{A}_1 A_2, \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$  互不相容, 则

$$P(\bar{B}) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3).$$

$$P(\bar{A}_1 A_2) = P(A_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_1) = \frac{7}{10}(1 - \frac{1}{2}) = \frac{7}{20}.$$

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_1).$$

## 样本空间的划分

### 定义

设  $S$  为样本空间,  $B_1, B_2, \dots, B_n$  为一组事件. 若

- (i) 不重 (互不相容):  $B_i B_j = \emptyset, \forall i \neq j.$
- (ii) 不漏:  $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S.$

## 样本空间的划分

### 定义

设  $S$  为样本空间,  $B_1, B_2, \dots, B_n$  为一组事件. 若

- (i) 不重 (互不相容):  $B_i B_j = \emptyset, \forall i \neq j$ .
- (ii) 不漏:  $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$ .

- 若  $B_1, B_2, \dots, B_n$  为  $S$  的一个划分, 则每次试验  $B_1, B_2, \dots, B_n$  中必有且仅有一个发生.

## 例

甲、乙两人进行投骰子比赛，得点数大者为胜，若甲先投得了 5 点. 设样本空间

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A := \{\text{乙赢}\} = \{6\}$$

$$B := \{\text{平局}\} = \{5\}$$

$$C := \{\text{乙输}\} = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$D := \{\text{乙不输}\} = \{5, 6\}$$

则事件  $A, B, C$  为样本空间  $S$  的一个划分.

## 全概率公式

### 定理

设  $B_1, B_2, \dots, B_n$  为  $S$  的一个划分, 且  $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ , 则有全概率公式:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \\ &\quad \dots + P(A|B_n)P(B_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i) \end{aligned}$$



证明:  $A = AS = AB_1 \cup \dots \cup AB_n$ ,  
 $(AB_i) \cap (AB_j) = \emptyset$ ,

$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB_1) + \dots + P(AB_n) \\ &= P(A|B_1)P(B_1) + \dots + P(A|B_n)P(B_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i). \quad \square \end{aligned}$$

注: 全概率公式的主要用处在于它可以将一个复杂事件的概率问题, 分解为若干个简单事件的概率计算问题, 最后用概率的可加性求出最终结果. (化整为零)

## 贝叶斯 (Bayes) 公式

### 定理

设  $B_1, B_2, \dots, B_n$  为  $S$  的一个划分, 且  $P(B_i) > 0$ ,  $P(A) > 0$ , 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)} = \frac{p_i q_i}{\sum p_j q_j}$$

其中  $p(B_i) = p_i$ ,  $P(A|B_i) = p_i$ .

证: 由条件概率, 全概率公式

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i A)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}.$$

□

注: 特别地,  $n = 2$ ,  $B_1, B_2$  是  $S$  的一个划分. 记  $B_1 = B, B_2 = \bar{B}$ , 则

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}).$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}.$$

$$P(\bar{B}|A) = \frac{P(A\bar{B})}{P(A)} = \frac{P(\bar{B})P(A|\bar{B})}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}.$$

## 例

一小学举办家长开放日, 欢迎家长参加活动. 小明的母亲参加的概率为 80%. 若母亲参加, 则父亲参加的概率为 30%; 若母亲不参加, 则父亲参加的概率为 90%.

- (1) 求父母都参加的概率;
- (2) 求父亲参加的概率;
- (3) 在已知父亲参加的条件下, 求母亲参加的概率.