## 《线性代数》第二章作业(5月14日提交)

临班 370

## 2023年6月26日

班级:	姓名:	学号:	
-----	-----	-----	--

- 1. 判断题 (错误请给出说明或反例. 每题 2 分, 共 20 分):: 红错
- (1) |A + B| = |A| + |B|. (A = B = E)
- (2)  $|k \cdot A| = k \cdot |A|$ .  $(|k \cdot A_n| = k^n \cdot |A_n|)$
- (3) |AB| = |BA|. (A, B) 为同阶方阵时对)
- (4) AB = BA. (矩阵乘法不满足交换律)
- (5)  $A^*A = AA^*$ .
- (6)  $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ . (A=B=1)
- $(7)(A+B)(A-B) = A^2 B^2$ . (矩阵乘法不满足交换律)

(8) 
$$A^2 = O$$
,  $\mathbb{N}$   $A = O$ .  $(A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix})$ 

- $(9) (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ . (矩阵乘法不满足交换律)
- (10) 若  $AX = AY, A \neq O$ ,则 X = Y. (A 列满秩方有左消去率)
- 2. 填空题 (每空 3 分, 共 15 分):
- (1) 已知矩阵  $A, B, C_{s \times n}$ , 满足 AC = CB, 则 B 是 \_ n \_ 阶矩阵.

(2) 己知 
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, 刚 X = \begin{pmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

(4) 
$$n$$
 阶方阵  $A$  满足  $A^2 - 4A - E = 0$ , 则  $A^{-1} = A - 4E$ .

3. 计算题 (每题 10 分, 共 50 分):

(1) 设 
$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$
, 用二项式展开计算  $A^{10}$ . 提示:  $A^{10} = (\lambda E + B)^{10} = \lambda^{10}E + C_{10}^1\lambda^9B + C_{10}^2\lambda^8B^2$ .

(2) 设 
$$\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$
  $A = \alpha \beta^T,$  求  $A^{100}$ . 提示: 矩阵乘法结合率.

(3) 用 
$$A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$$
, 求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$  的逆矩阵.

注意: A\* 的定义.

 $(4)\ A\ {\rlap/ {\it h}}\ 4\ {\rlap/ {\it h}}\ {\rlap/ {\it h}}\ {\rlap/ {\it h}}\ |A|=2,\ {\rlap/ {\it k}}\ |({\textstyle\frac{1}{2}}A)^{-1}-3A^*|.$ 

(5) 求矩阵 
$$X$$
, 使得  $AX = 2X + A$ , 其中  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

注意: 矩阵乘法分左右.

4. 证明题 (第 (1) 题 5 分, 第 (2) 题 10 分, 共 15 分):

(1) AB = A + B, 证明 A - E 可逆.

提示: 凑因式乘积.

(2) 设列向量  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$  满足  $X^T X = 1$ ,  $H = E - 2XX^T$ . 证明: H 为对称矩阵, 且  $HH^T = E$ .