

物件導向 程式設計

m1 - 世界


科藝組大一 吳明潔

人類滅絕後 5000 年後的...

人類滅絕後 5000 年後的...

亞熱帶沿海

全球亞熱帶沿海大致範圍圖 (Approximate Distribution of Global Subtropical Coastal Regions)





全新溫度平衡

世界的平均溫度上升 1.5 - 2°C，極圈的融冰讓全球海平面上升數公尺，平原退縮為沼澤。



人類城市消失

人造混凝土在 300 年內全數坍塌，水泥與鋼鐵風化侵蝕為沉積層，僅殘留玻璃與鈦金屬。



塑膠化石基質

地底深處形成「塑膠膠結岩層」，成為這個時代獨特的地質現象。



全新溫度平衡

世界的平均溫度上升 1.5 - 2 °C，極圈的融冰讓全球海平面上升數公尺，平原退縮為沼澤。



人類城市消失

人造混凝土在 300 年內全數坍塌，水泥與鋼鐵風化侵蝕為沉積層，僅殘留玻璃與鈦金屬。



塑膠化石基質

地底深處形成「塑膠膠結岩層」，成為這個時代獨特的地質現象。



全新溫度平衡

世界的平均溫度上升 1.5 - 2 °C，極圈的融冰讓全球海平面上升數公尺，平原退縮為沼澤。



人類城市消失

人造混凝土在 300 年內全數坍塌，水泥與鋼鐵風化侵蝕為沉積層，僅殘留玻璃與鈦金屬。



塑膠化石基質


地底深處形成「塑膠膠結岩層」，成為這個時代獨特的地質現象。

人類滅絕後 5000 年後的...

亞熱帶沿海


人類滅絕後 5000 年後的...

亞熱帶沿海有機結晶化體體系



高溫潮濕雲霧

常年高溫 (22 - 36°C)，被高頻率的雷雨和蒸氣覆蓋。



酸性毒素水體

降雨呈現微酸，水體深層富含古代化學廢料溶出物。




超強颱風威脅

氣候劇烈變化頻繁，潮汐起伏劇烈且缺乏陸地阻擋。

那生物如何生存？

那生物如何生存？

把塑膠還有毒素當飯吃



大阪堺菌

繼承它對於 PET 的分解利用能力，將人造毒素轉化為養分。



深海管蟲

如同深海熱泉旁的管蟲，不依賴陽光，吸收底質化合物轉換能量。





