



自拟千目广香止痢散 对禽泄泻症的防治试验报告

廖海兵¹, 罗灵¹, 乐和平¹, 尧国荣², 邓登义³, 胡小明¹, 吴晓林⁴

(1. 江西合盈生物科技有限公司, 331409; 2. 江西农业工程职业学院, 331200;

3. 江西省永丰县畜牧局, 331500; 4. 江西新天地药业有限公司, 331409)

中图分类号: S853.9

文献标识码: B

文章编号: 1003-8655 (2017) 04-0006-02

禽泄泻症是由细菌、病毒、寄生虫、真菌、支原体、霉菌等引起禽类的一种以拉稀为特征的流行性疾病; 从中医观点看, 禽泄泻症是因禽湿浊内阻、胸腹胀满、暑湿热喘、风寒感冒、暑热作泻、脾胃不和等的一种禽类泄泻症候群。

禽泄泻症可发生于各种年龄的家禽, 病禽表现拉稀, 颜色从黄白色、灰褐色、红色如血样粪便; 臭味从腥味到无臭味; 稀软从软粪、团鸡眯样、水样粪便。精神萎靡, 喘气, 食欲不振, 禽体消瘦, 生产性能下降, 产蛋性能下降, 产蛋率下降 30-50%, 严重影响生产成绩。

禽泄泻症临床上主要用抗菌素如四环素类、氨基糖苷类、大环内脂类等, 磺胺类如痢菌净等、抗病毒类如病毒灵、病毒唑等; 纷杂多样的中草药如多是粉碎 200-300 目或 500 目的中草药、益生菌等方法进行预防和治疗, 但效果并不理想; 笔者依据几十年的临床实践; 禽泄泻症发病规律、发病机理; 中草药的性能归经、中医基础理论进行综合分析, 试用千目广香止痢散对禽泄泻症进行防治试验, 取得了十分满意的效果, 现报告如下, 望各位同仁垂正!

1 基本情况

广东韶关曲江区某蛋鸡生产基地刘某, 饲养 188 日龄蛋鸡 2 万余羽, 2014 年 8 月 2 日开始陆续出现鸡群泄泻, 排浓稠样、团鸡眯样、水样混有许多未消化饲料的稀粪, 眼结膜炎, 脸部浮肿, 肛门脱出, 羽毛蓬乱, 鸡冠苍白, 消瘦, 喘气, 呼吸困难; 剖检见泄殖腔溃烂, 肠壁菲薄, 有明显的肝周炎, 气囊炎, 胸腔积液等变化; 从中医角度看, 病鸡因风寒暑热, 湿浊内阻, 暑湿热喘, 暑湿作

泻, 脾胃不和引起的禽类泄泻症候群。发病率 46%, 死亡率 23%, 产蛋率 69%。

2 材料和方法

2.1 试验动物

2014 年 8 月 16 日, 选择发病比较严重的 5 栋鸡舍, 各有 1000 羽左右, 分别是 1 号鸡舍广香止痢散组, 1023 羽; 2 号鸡舍市场上的中草药组, 1112 羽; 3 号鸡舍抗菌素组, 968 羽; 4 号鸡舍益生菌组, 997 羽; 5 号鸡舍空白对照组, 1256 羽。除添加试验药物(广香止痢散、市场上常用的中草药散、抗菌素、益生菌四种药物)外, 其它如饲养管理、疫苗注射、平时用药如驱虫药、消毒药等均照常进行。

2.2 试验药物

2.2.1 广香止痢散, 由江西合盈生物科技有限公司生产, 广试产品, 用量用法: 拌料 2kg/吨料, 饲喂 10-15 天。

2.2.2 市场上某知名品牌的中药散剂, 按说明书治疗量使用, 用 10-15 天。

2.2.3 抗菌素选用某知名品牌的强力霉素 + 痢菌净, 按说明书治疗量使用, 用 7 天, 停 3 天, 再用 7 天。

2.2.4 益生菌, 某知名品牌厂家生产, 按说明书治疗量使用, 用 10-15 天。

2.2.5 空白对照, 不添加药物组。

2.3 试验时间

从 2014 年 8 月 16 日 - 2014 年 9 月 15 日止, 试验 1 个月, 观察 10 天, 即 2014 年 8 月 16 日 - 2014 年 8 月 25 日止。

3 结果和分析

3.1 试验结果 见下表。

试验组鸡死亡数(羽)、死亡率(%)和产蛋率(%)情况

组别时间		8.16	8.17	8.18	8.19	8.20	8.21	8.22	8.23	8.24	8.25	观察 10 天		
												死亡数	死亡率	产蛋率
1 号鸡舍 1023 羽, 产蛋率 65%	死亡 数	16	14	12	10	8	6	6	5	4	2	83	8.1%	78.13%
	产蛋 率	64.5	63.8	66	71	78	82	85	88	90	92			
2 号鸡 舍 1112 羽, 产蛋 率 66%	死亡 数	28	26	26	24	22	19	16	15	15	16	207	18.62 %	66.8%
	产蛋 率	65	63	60	58	67	69	71	78	70	67			



3号鸡舍 968羽,产蛋率68%	死亡数	21	17	22	24	23	21	18	16	15	18	195	20.1%	54.85%
	产蛋率	68.5	71	65	60	58	49	40	38	47	52			
4号鸡舍 997羽,产蛋率75%	死亡数	32	33	32	28	26	22	21	18	23	26	261	26.18%	57.2%
	产蛋率	76	78	71	65	62	58	47	42	38	35			
5号鸡舍 1256羽,产蛋率72%	死亡数	32	33	38	42	45	48	40	52	55	58	453	36.07%	46.1%
	产蛋率	68	62	58	53	47	44	39	32	30	28			

3.2 试验分析

3.2.1 从上表可以看出,在观察10天的时间里,1号鸡舍产蛋率从65%,上升到78.13%,远远高于2号鸡舍从66%到66.8%、3号鸡舍从68%下降到54.85%、4号鸡舍从75%下降到57.2%、及5号鸡舍空白对照组从72%下降到46.1%,说明1号鸡舍试验组(广香止痢散)对鸡群产蛋率不仅从用药后第三天开始产蛋率每天有上升趋势,而且明显优于其它各试验组和空白对照组,即广香止痢散对提高鸡群产蛋率有明显作用。

3.2.2 从上表可以看出,在观察10天的时间里,1号鸡舍死亡鸡数从1023羽,死亡83羽,死亡率为8.1%,远远低于2号鸡舍死亡数从1112羽,死亡207羽,死亡率为16.62%;3号鸡舍死亡数从968羽,死亡195羽,死亡率为20.1%;4号鸡舍死亡数从997羽,死亡261羽,死亡率为26.18%;5号鸡舍空白对照组死亡数从1256羽,死亡453羽,死亡率为36.07%;说明广香止痢散(1号鸡舍)对禽泄泻症的预防和治疗作用明显优于其它试验组和空白对照组。

3.2.3 试验的2号鸡舍使用的市场上常用的中草药由于其最多粉碎至300-500目,其生物利用度较低,故其治疗效果比1号鸡舍死亡率高10个百分点和产蛋率低12个百分点;3号鸡舍使用的抗菌素对鸡群的治疗作用比1号鸡舍死亡率高12个百分点,产蛋率低24个百分点;4号鸡舍使用的益生菌鸡群的治疗效果比1号鸡舍死亡率高18个百分点,产蛋率低21个百分点;5号鸡舍空白对照死亡率高出1号鸡舍的28个百分点,而产蛋率低32个百分点。

4 讨论和结论

4.1 禽泄泻症是禽湿浊内阻、胸腹胀满、暑湿热喘、风寒感冒、暑热作泻、脾胃不和等的一种禽类泄泻症候群,而以广藿香为主药的广香止痢散主

要也针对禽类泄泻症候群。它不是某一特定的疾病如鸡流行性腹泻、生殖道型的大肠杆菌病等。

4.2 广香止痢散是千目中草药散剂,其组成是:广藿香250g、积雪草150g、白头翁150g、地锦草150g、旱莲草150g、芦根150g,共为末,计1000g。其中藿香:辛,微温,入脾、胃、肺经。为芳香化湿、清暑散热的主药,还能和胃止呕。积雪草:甘,辛凉,清热解暑,活血祛瘀,清利湿热,生津止渴。白头翁:苦寒入胃大肠经,清大肠血热,治热痢。旱莲草:甘酸凉入肝肾经,凉血止血,养阴补肾,解毒排脓,散瘀续筋。地锦草:辛平入肝胃膀胱经,清热利湿,凉血止血,解毒消肿。芦根:甘寒入肺胃经,清热生津,利尿透疹。以藿香为君,积雪草、白头翁为臣,地锦草、旱莲草为佐,芦根为使药,诸药相互作用,共同达到“芳香化湿、清热利湿、凉血止血、养阴补肾、解毒祛瘀、生津透疹”之功效。

4.3 广香止痢散是以广藿香为主药的超微粉中草药,其特征是将每味生鲜中药或干燥中药先通过20-40目的粗粉碎、再次低温快速干燥、低温微粉碎(过200-500目)、低温超微粉碎(过1000目)。将上述各味超微粉比例称取,加入搅拌机中搅拌20-30分钟,最后分装,即得。

4.4 广香止痢散的质量标准是:全部植物粒径小于12.5um(过1000目);除去杂质(粗纤维和泥沙等)96%以上;含水率小于5%;用量是粗粉(过20~40目)的1/1~1/5;疗效是粗粉(过20~40目)的5~10倍;可直接混悬于冷水中4~6小时而不会沉淀;生物利用率不小于99.6%。

4.5 本试验验证了试验效果:在观察10天的时间内,广香止痢散对发病鸡群的产蛋率提高12个百分点以上;对鸡群的泄泻症防治效果提高了10个百分点以上;所以广香止痢散对禽类泄泻症候群对防治作用、提高禽的产蛋率取得了十分满意效果。