

## 蛋种鸡人工授精关键的几项技术措施

○福建省榕泉祖代种鸡场 王纪茂

种蛋受精率的高低,直接影响到种蛋的质量与种鸡场的经济效益。两年来,在人工受精实践中不断总结经验,使种蛋受精率达到92%以上,高时可达96%,充分发挥了种鸡笼养的优势,其关键技术措施如下:

## 一、种公鸡的培育、选择和训练

对种公鸡进行三次选留:第一次在6—8周龄时,将发育缺陷和不符合本品种特征的公鸡淘汰;第二次在18—20周龄育成期结束时,选留外貌符合本品种特征,发育很好,雄性特征明显,冠大而鲜红,按摩背部尾羽翘起的,选留比例为1:15;第三次在母鸡开产时(50%产蛋率),按1:20选留性反应较好的公鸡,并开始采精训练,使公鸡形成一种能适应统一规范化的刺激,这对采精很重要,训练2—3周后,再从公鸡体重、精子量、精子密度、形态、活力等方面考虑进行选择,选留比例为1:25—30,并定期进行精液质量监测,保证精液品质。

## 二、确定最佳授精时间和采精、输精频率、输精量、输精部位

输精时间应安排在下午3时以后,这时大部分母鸡已产完蛋,如输精时间提前,产前母鸡的子宫或阴道内有蛋,翻肛受影响,使有的母鸡输不上精,如翻肛人员动作稍重,有可能使即将产出的鸡蛋破碎,母鸡受伤,即使是输上,精子在输卵管内逆向运动受阻,使种蛋受精率明显下降。种公鸡采用隔日采精一次效果最好,种母鸡一般4—5天输精一次,间隔时间太长,受精率低,3天输一次受精率高,但抓鸡次数多,应激过于频繁,在一定程度上影响正常受精率,而且浪费人力,每次输0.025—0.03毫升原精液为宜,最佳输精部位为输入输卵管深度2—3厘米处,太深太浅效果都不佳。

## 三、精液的保存温度及时间

生产中,采用原精液10—25℃保存并在半小时内将精液输完,可保持较高的受精率(92%以上)。温度过高或低;保存时间太长都会影响受精率。

## 四、严格消毒

除对种鸡舍进行卫生消毒管理外,还要进行白痢杆菌净化和授精器械的消毒,人工授精器械要先用自来水冲洗干净后再用干燥箱进行100℃30分钟消毒。若采用滴管输精,在输精过程中,每输一只鸡用脱脂棉擦拭一次,以防疾病横向传播。

## 五、加强人工授精人员的管理

每群鸡的人工授精人员必须固定,因为每个人的手势和力度都有所不同,鸡体对人产生一种适应后,更换人员会引起应激,导致受精率下降。人工授精员必须熟练掌握采精、输精技术和技巧;动作要轻而敏捷,不符合要求的(如冒泡、精液流出)应重输。

总之,种鸡笼养人工授精是一项十分细致的技术工作,丝毫大意不得,因此建议,在这项工作中,要建立起一整套“种鸡、工作人员”的管理和技术的方案,做到心中有数,防患于未然,从而使各项技术措施产生最佳的综合效益。

维生素B<sub>1</sub>治疗母猪产后不食

母猪产后不食症在临床中较为常见,主要是母猪怀孕期饲养管理不当,饲料单调,营养物质不足或由于病菌侵害等原因所致。近年来,在治疗母猪不食采用维生素B<sub>1</sub>治疗效果较好。其方法:(1)复合维生素B注射液:2毫升/千克体重,肌肉注射,隔12小时一次,1—2次可愈。(2)维生素B<sub>1</sub> 10—20毫升, B<sub>12</sub> 5—10毫升,混合肌注。(3)维生素B<sub>1</sub> 10—20毫升, B<sub>12</sub> 10—20毫升,混合肌注。(4)维生素B<sub>1</sub> 10—20毫升,胃复安5—10毫升,混合肌注。此外,因病菌感染的母猪,应配合抗生素类药物治。(柘荣县兽医站 徐植)

**槟榔** 为棕榈科植物槟榔的干燥成熟果实,有杀虫消积、行气利水之功,能驱绦虫,治食积腹痛、水肿胀满等;对蛔虫、姜片虫、牛羊结节虫等病,有一定疗效,成年大牲畜(牛、马)30—100克,猪10—20克。

**南瓜子** 为葫芦科植物南瓜的种子,能驱除人和动物的绦虫,用新鲜南瓜子碾末,成年大牲畜1000—2000克,羊400—500克,就可以驱除绦虫。驱除猪的蛔虫,15—25公斤小猪喂新鲜南瓜子100—200克,连喂2次,即可见效。

**钩吻(大茶药、断肠草)** 为马钱科植物胡蔓藤属钩吻的根及全草。具有杀虫、健胃、杀孽止痒、拔毒生肌和止喘之功用。其用量为:牛50—100克,猪25—50克(鲜品、干品用量为鲜品四分之一)。用时应注意,猪、牛内服量不宜过大,马、犬、兔等其它家畜禁止内服。

**乌梅和花椒** 乌梅是蔷薇科木本植物的果实,经烟熏后而成。花椒为芸香科植物的干燥果实。乌梅、花椒均可驱虫,若将两者合用,效果更佳。一头15公斤的小猪,花椒、乌梅各用50克,加温水灌服,即可驱除蛔虫。

**硫酸铜** 纯品外观为蓝色或淡蓝色硫酸盐结晶,它能杀死羊的多种肠胃线虫,1:100硫酸铜溶液,即可驱虫。硫酸铜一定要现配现用,其杀虫剂量:成年绵羊80—100毫升,成年山羊不超过60毫升。

**烟叶** 系茄科植物烟叶的干(鲜)叶,能杀疥癣、虱子等体外寄生虫。用2.5公斤鲜叶或烟茎,加15公斤尿成红色,加温后洗擦疥癣,猪牛每天两次,连续洗5—6次,就可杀灭疥癣虫。(武平县中堡兽医站 林东祥)

畜禽  
驱虫  
常用  
中  
草  
药