

猪免疫参考程序

赵继得, 符金华

(江西省兽药饲料监察所, 江西 南昌 330029)

疫病经常给养猪业造成很大的损失。做好日常免疫接种工作, 可减少疫病的发生, 避免造成经济损失, 对促进养猪业的发展具有非常重大的意义。现把一个猪的免疫接种程序介绍给大家, 以供广大养猪户作参考。

1 购进种猪

购进第 2 周: 待猪群稳定后按 4 头份/2mL·头接种猪瘟疫苗。

购进第 3 周: 按 1 头份/头接种基因缺失伪狂犬疫苗, 间隔 30d 加强免疫 1 次。

购进第 4 周: 按 3mL/头深部肌注射接种五号病浓缩苗。

5 月龄后: 按 1 头份/头接种细小病毒病、乙脑疫苗, 间隔 15~20d 加强免疫 1 次。

配种前 10d: 按 4mL/头接种蓝耳疫苗, 间隔 15~20d 加强免疫 1 次。

2 生产公猪

每年春秋: 按 4 头份/2mL·头接种猪瘟疫苗各 1 次。

每年的 3、9、12 月: 按 3mL/头深部肌注射接种五号病浓缩苗各 1 次。

每年的 4、8、12 月: 按 1 头份/头接种基因缺失伪狂犬疫苗各 1 次。

每年春秋: 按 4mL/头接种蓝耳疫苗各 1 次。

每年的 3 月: 按 1 头份/头接种乙脑疫苗 1 次, 蚊虫活动前进行。

3 生产母猪

配种前: 按 4 头份/2mL·头接种猪瘟疫苗 1 次。

配种前 60~70d: 按 4mL/头皮下注射接种蓝耳疫苗 1 次, 没有威胁可免注射。

每年的 3、9、12 月: 按 3mL/头深部肌注射接种五号病浓缩苗各 1 次。

每年的 4、8、12 月: 按 1 头份/头接种基因缺失伪狂犬疫苗各 1 次。

每年的 3 月: 按 1 头份/头接种乙脑疫苗 1 次, 蚊虫活动前进行。

4 商品肉猪

2~4 周龄: 按 2mL/头皮下注射接种蓝耳疫苗 1 次, 没有威胁可免注射。

21~25 日龄: 按 2 头份/头接种猪瘟疫苗 1 次。

10~14 周龄: 按 1.5mL/头深部肌注射接种五号病

浓缩苗 1 次。

55~60 日龄: 按 3 头份/头接种猪瘟疫苗 1 次。

4~6 周龄: 按 1 头份/头接种基因缺失伪狂犬疫苗 1 次, 如种猪每年普注 3 次则可免注。

5 补充说明

分娩前 2 周可注射传染性胃肠炎、流行性腹泻、轮状病毒疫苗。

上述程序仅作参考, 应根据当地及本场的具体情况制定免疫程序, 免疫不是越多越好, 疫苗的使用方法应参考厂家介绍的方法。应急状态下(转群、疾病)不能接种疫苗, 防止过敏反应(肾上腺素或地塞米松), 一旦遇到解决不了的问题还需咨询当地兽医防疫部门。

(收稿日期: 2008-08-04)

长毛兔冬季管理歌

黄 坤 荣

(淮滨县农业局, 河南 淮滨 464400)

冬季家兔生长慢, 科学管理是关键。
天气变冷抓保暖, 稳定温度是重点。
为防家兔患感冒, 向北孔洞要堵严;
夜晚关闭门和窗, 兔舍外边盖草帘。
天寒消耗热能多, 高能饲料要加添。
冬季缺乏青饲料, 备足青贮当在先。
干草薯秧玉米叶, 麩皮树叶准备全。
切忌喂饮冰冻水, 饮喂温水较保险。
无风白天晒太阳, 增进食欲兔体健。
一般不要剪兔毛, 剪毛保暖两相权。
良种良法管理好, 冬季高产效益显。

(收稿日期: 2008-07-09)

中草药治疗奶牛腐蹄病

谢有福¹, 赖有英²

(1. 于都县牛业生产管理办, 江西 赣州 342300;

2. 于都县畜牧兽医站)

腐蹄病是奶牛的一种常见病, 以蹄底腐烂为主要临床症状, 若治疗不及时或治疗效果不佳常常转化成顽固性疾病, 造成产奶量的下降, 甚至患牛被迫淘汰, 严重影响奶牛的养殖效益。笔者采用中草药治疗此病 20 例, 治愈 19 例, 治愈率达 95%, 且不易复发。

1 病因

奶牛腐蹄病是由牛舍不卫生、久被粪尿浸蚀, 运动场、牛舍泥泞潮湿, 久不修蹄、刺伤蹄底或过削

蹄底等原因引起。湿毒侵害蹄底,淤血凝滞蹄底,日久腐烂成漏。

2 症状

行走跛行,虚行下地,脚蹄敢抬不敢落,行动困难,特别在硬地行走时跛行加重。局部检查,发现蹄叉和蹄底腐烂,削蹄后见蹄底有漏洞,并流出腐臭的黑色液体,钳压蹄叉或蹄底有压痛,伴有体温升高、食欲减退、产奶量下降、常卧地不起、消瘦等症状。

3 防治措施

3.1 治疗方法

首先修削蹄底,用消毒过的刀片挖去腐烂组织,排净脓汁,再用1%来苏儿溶液洗净患部。点燃松油烟熏患蹄1~3min后,再用桐油200g、头发3g烧成的灰和血竭200g、黄蜡200g一起加热搅匀,待不烫手时将此药涂平蹄空处,最后装蹄绷带,一次可痊愈。

3.2 预防措施

3.2.1 加强饲养管理。为预防腐蹄病的发生,需按照母牛对能量和蛋白质的需要量饲喂,不能随意改变。在干奶时期,首先应喂较少的精料或不喂精料,而给予优质粗饲料;其次在产后喂精料应逐渐增加。保持运动场和栏舍的平整、干燥、清洁。夏季注意排水,冬季注意防寒保暖和通风措施。

3.2.2 定期修蹄。每年应修蹄2次。修蹄工作应由已经过培训的专业人员进行,首先必须有专用的修蹄固定架,在固定牛时须注意保护乳房和防止已孕奶牛受伤。其次是将过长的蹄角质切除,最后是修整蹄底,主要是保证蹄形端正。

(收稿日期:2008-08-13)

鸭的采血部位及方法

黄海水,闵师强,刘继文,言月桂

(新建县农业局,江西 南昌 330100)

(1)准备一次性采血需酒精药棉、针头、试管、试管架、采样单等物品。

(2)一人把鸭右侧向下稳定于采血架上,并捉住左脚,使其不能自由活动。

(3)采血人员左手抓住被检鸭的右脚,手掌与鸭右脚掌背紧贴,手指握住其脚跟,使鸭脚保持一

条直线。

(4)用酒精药棉在鸭右肢的大跖骨内侧擦拭,此时血管清晰可见。

(5)右手拿着套好针头的采血器,找到右脚的第一趾与第二趾上方、大跖骨中下端,针尖斜正对血管形成 $5^{\circ}\sim 8^{\circ}$ 角,刺入血管0.2~0.3cm即可。

(6)采血完成后用药棉放在采血处,拔出针头,压住针眼1~2min即可。

这种方法的优点:一是在交易市场采样不会影响鸭的卖相,二是对蛋鸭产蛋影响较小,畜主比较容易接受。所以,有利于疫情监测工作的顺利开展。

(收稿日期:2008-08-10)

治

鸽

虱

汪志铮(南平农校,福建 南平 354200)

鸽虱分长虱和圆形虱,寄生于鸽的头颈和羽毛内,吸取血液和蛀毛,现介绍几种防治鸽虱的方法。

(1)常让鸽洗澡和保持舍内外卫生是预防鸽虱的最有效方法。

(2)用烟叶秆做鸽窝,可防鸽虱的生存和繁殖。

(3)染上鸽虱后,可用烟叶秆煮水给鸽洗澡,或在洗澡水中加入2%的碘酒。

(4)常用石炭酸、石灰粉清洁和消毒鸽舍,具有吸收湿气和杀虱的作用。每年用石炭酸、石灰水粉刷鸽舍2次。

(5)鸽舍、巢盘内放入“除虫菊”,或撒以杀虫粉,也可杀虱。

(6)砂浴法:每100kg细砂内加入硫磺粉5kg,充分混匀,铺成10~20cm厚,让鸽自行砂浴,以杀灭羽虱。

(收稿日期:2008-08-10)

河北华润药业有限公司

GMP证书编号(2005)兽药GMP证字01号

招 商

华润药业是一家大型动物保健品企业,建有中药提取车间、小容量注射剂、颗粒剂、中西药粉散剂、预混剂,公司结合市场需求开发了多剂型的优质、高效兽药精品,赢得了客户的信赖和支持!

公司水针部诚招江西省市级、县级代理经销商!享受公司业务员化经销商的优厚待遇!

财富热线:0311-87250628 13603112650 朱经理

公司网址:www.hrzytq.cn

更正:P2目录中邮编330077更正为330046;“与日俱进”更正为“与时俱进”;“又不断有乳母猪出去”更正为“又不断有断乳母猪出去”;P3“遵行”更正为“遵循”

P38左下角缺 当重要的作用

(收稿日期:2008-06-27)