

HM 中草药预混料和 HM 畜禽康饲养生长猪试验

卢荣洲, 黄治成, 邹以文, 潘 豪

(广东省湛江农垦畜牧有限公司 湛江 524022)

摘 要:选取体重为 $34.3 \pm 1.2 \text{ kg}$ 的健康杜大长三元杂交猪进行 90 天的饲养试验, 结果表明: HM (高效微生物群) 中草药添加剂、HM 畜禽康和对照组对生猪的日增重差异不显著 ($P > 0.05$), 但肉料比以 HM 中草药组最好为 $3.21 : 1$, 畜禽康 (HM) 组次之为 $3.22 : 1$, 对照组为 $3.45 : 1$, 经济效益显著。HM 中草药组肉质口感嫩滑, 香甜鲜美。

关键词: HM 畜禽康; 中草药; 生猪饲养

中图分类号: S816.7

文献标识码: B

文章编号: 1002-8161(2003)03-0064-02

抗生素和合成抗菌药物添加剂在饲料工业中的应用已有多年历史, 对预防和控制动物疾病、促进动物生长及提高畜禽业产量起到积极的作用, 但其应用也带来不少问题: 畜产品中的药物残留影响人体健康, 危害人类健康常见的某些疾病、畸形及中毒现象与畜产品的药物残留有关; 抗生素等药物的广泛使用增加了病原菌抗药性。因此, 迫切需要研究环保安全型无公害饲料添加剂代替抗菌物的作用。HM (高效微生物群, 海南畜禽康公司生产) 中草药猪预混料是以椰子粕作为蛋白质饲料载体, 用 HM 菌剂、红糖与中草药粉按比例配制, 经过特殊工艺发酵后再与氨基酸、维生素、无机盐、磷、钙混合, 具有促长、抗菌消炎、清热解毒、驱虫防病、防霉、镇咳止喘

的作用, 是一种高效无毒、质优价廉的绿色饲料添加剂。本试验旨在研究 HM 中草药和 HM 畜禽康作为添加剂对生长猪生长性能的影响。

1 材料与方法

试验于 2002 年 4 月 18 日至 7 月 18 日在广东省湛江农垦畜牧有限公司五一分公司进行, 饲养 90 天。供试猪为健康、体重相近三元杂交商品猪, 共 108 头, 根据性别、体重, 适当搭配。分设两个试验组 (A、B) 与对照组 (C), 每组 36 头。随机确定 A 组为 HM 中草药组, B 组为 HM 畜禽康组, C 组澳华预混组 (对照组)。

1.1 添加剂及饲料配方

A 组按中草药: HM 畜禽康液: 红糖: 水 = $6 : 1 : 1 : 500$ 的比例, 以椰子粕、玉米粉、豆粕、麸皮为载体

收稿日期: 2003-02-11

作者简介: 卢荣洲, 男, 1962 年生, 畜牧师。

病毒, 临床诊断上, 该病与小鹅瘟病有许多相似之处, 重要区别在于小肠“香肠样”栓塞更长。

6.3 过去本地雏鹅从未发生过鹅病毒性肠炎, 据调查李某引种地是疫区, 结合发病情况看, 该场发生本病与“引种”有关, 而气温突变、鹅群突遭冷风雨侵袭等应激因素导致了本病例的发生, 因此, 养鹅户在引种时应慎重, 应了解引种地疫病流行情况, 不从疫区引进种鹅, 并严格做好检疫、监测、隔离、防疫工作, 确无本病后方可进场放养。在寒冷、多雨季节, 应做好鹅群的防雨、防潮、防寒保温工作, 避免因应激导致疫病的暴发与蔓延。

6.4 雏鹅病毒性肠炎是由雏鹅病毒性肠炎病毒引起的传染病, 目前该病尚无有效的治疗用化学药物。

在多发本病区域, 刚孵出的 1 日龄雏鹅应立即用抗雏鹅病毒性肠炎和小鹅瘟的高免血清皮下注射, $0.5 \sim 1.5 \text{ ml/只}$, 可有效预防该病的发生。雏鹅一旦发病, 确诊后用高免血清防治有特效。本病例用广西大学动物科技学院禽病室研制的“鹅五联高免血清”治疗, 收到良好效果。

6.5 确诊是治疗和控制本病例的关键, 12 月 25 日鹅群发病, 李某自行用抗生素对鹅群治疗, 到 12 月 29 日死亡雏鹅 368 只, 死亡率达 28.8%。后来确诊后, 采用综合防控措施, 仅死亡 90 只雏鹅, 死亡率 9.8%, 并且很快控制了疫情。

因此, 本病例的防制应遵循早发现、早确诊、综合防制、预防为主的原则。

混合,厌氧发酵 7~10 天,制成发酵料,按 4%添加于基础日粮中。

B 组按 HM 畜禽康液:红糖:水:饲料=1:1:20:320 的比例,先制成 20 倍的 HM 红糖稀释液,然后拌入饲料中,再按 4%添加于基础日粮中。

C 组(对照组)用澳华预混料,按 4%添加于基础日粮中。饲料配方见表 1。

表 1 试验基础日粮配方及营养水平

		小猪 (33~40kg)	中猪 (40~75kg)	大猪 (75~95kg)
原料	玉米(%)	62	62	60
	豆粕(%)	23	22	23
	麦皮(%)	8	10	13
	鱼粉(%)	3	2	0
	预混料(%)	4	4	4
营养水平	粗蛋白(%)	17.12	16.28	15.80
	代谢能(MJ/kg)	12.74	12.70	12.60
	赖氨酸(%)	0.95	0.89	0.83

1.2 试验方法

试验猪在预试期中(10 天)给予相同的饲养条件,并驱虫和防疫注射。18 日早晨空腹称重,根据体重差异,略作调整。故预试期结束的体重(T 检验差异不显著, $P>0.05$)就是正试期开始的体重。每月称重一次。试验期除了饲喂所规定的饲料外,均不喂任何青、粗、副料。同组群饲自由采食、干喂法、计量不浪费为准,自由饮水。

2 结果与分析

2.1 日增重与饲料消耗

三组日增重分别为 665.7g、666.7g、673.5g(表 2),各组间日增重差异不显著($P>0.05$),但肉料比 A、B 组分别为 3.21:1 和 3.22:1,与 C 组(对照组)的 3.45:1 差异明显($P<0.05$)。

表 2 日增重与饲料消耗

处理	始重		末重		总增重 (kg)	平均增重 (kg/头)	平均日增重 (g)	耗料总量 (kg)	料肉比
	总重 (kg)	均重 (kg/头)	总重 (kg)	均重 (kg/头)					
A 组	1214	33.7	3371	93.64	2157	59.94	665.7	6920	3.21:1
B 组	1242	34.5	3390	94.16	2148	59.66	666.7	6920	3.22:1
C 组	1252	34.78	3434	95.39	2182	60.61	673.5	7520	3.45:1

注:6 月 30 日 B 组死亡一头重量 76kg,日增重按 35.8 头计算。

表 3 经济效益比较(仅以饲料消耗计)

处 理	平均增重 (kg/头)	毛猪价格 (元/kg)	增重价值 (元/头)	平均耗料 (kg/头)	饲料价格 (元/kg)	耗料价值 (元/头)	每 kg 增重 饲料成本(元)	每头经济 效益(元)
A 组	59.94	6.8	407.60	192.20	1.75	336.35	5.61	71.25
B 组	59.66	6.8	405.69	193.29	1.75	338.26	5.67	67.43
C 组	60.61	6.8	412.15	208.88	1.78	371.81	6.13	40.34

2.2 经济效益比较

表 3 结果表明,A 组每 kg 增重的饲料成本为 5.61 元,B 组为 5.67 元,C 组为 6.13 元。试验期 A 组节约饲料成本 1121.64 元,B 组节约饲料成本 988.08 元。

2.3 无公害农产品检测结果,屠宰 A 组及 C 组,取 A 组肝脏,送农业部热带农产品质量监督检测中心,按部颁标准检测,符合无公害标准。经对 A、C 两组肉品不加任何调味品清蒸后品尝测试,A 组肉质嫩滑香甜鲜美,而 C 组肉质较干硬粗涩。

3 小结与讨论

3.1 A 组(HM 中草药预混料组)及 B 组(HM 畜禽康)料肉比明显优于 C 组,提高了饲料转化率,节约了饲料。

3.2 A、B 组每 kg 增重所需饲料成本只有 5.61 元

和 5.67 元,而 C 组为 6.13 元。试验结束,A 组每头猪获利 71.25 元,B 组每头猪获利 67.43 元,C 组每头猪获利 40.34 元,差异显著($P<0.05$)。

3.3 HM 中草药预混料中的数味中草药有清热燥湿、健脾胃、消积滞、补脾益精、抗菌消炎等功效,可以有效地驱除体内寄生虫和虫卵,并在整个使用过程中采食时间短,食净度高,无拉稀、糟栏、咬尾等其他异常现象。HM 畜禽康能通过对肠道菌群的调控,促进有益菌的生长繁殖,抑制有害菌的生存。竞争性排斥病原微生物,维持肠道内的微生态平衡;同时 HM 畜禽康内含有多种酶、丰富的蛋白质和维生素,从而达到提高饲料转化率,增强机体免疫功能,预防疾病,提高生长的效果。

3.4 结果表明,在育肥猪生产中用 HM 中草药添加剂和 HM 畜禽康完全可以代替含有抗生素和合成抗菌药物的饲料添加剂,并能提高经济效益。