

中草药育肥肉猪效果显著

462314 河南鄆城县老窝乡双杨综合服务部 李得富

在养猪实践中,人们发现中草药不但对畜禽疾病有一定疗效,而且还有明显助长、催肥作用。根据猪的不同生长发育阶段,可选配投喂不同的中草药,以达到育肥增重的目的。仔猪阶段,应选喂健胃理气类中草药:如乌药、莎草、虎杖、钩吻、木防己、麦芽、神曲等,以促进猪消化器官的发育,提高饲料利用率;架子猪阶段,应添加舒经活络、松皮活血一类中草药,如蓼叶、榕叶、崖豆藤、杜娟等,以利骨骼生长和发育,为长肉增重打好基础;育肥阶段,应选择一些镇静安神、清热解毒、富含淀粉的中草药,如马尾松、柏仁、何首乌等,以降低基础代谢,提高脂肪沉积能力。

投喂方法

把中草药熬成汤剂或制成粉剂,在饲料中添加,一般以早、晚各喂1次为宜,3天中停喂1天,干草药的日服量,每10公斤体重添加2克,汤剂日服量为每公斤体重2汤匙。根据中草药来源情况,既可单剂服用,又可采用多味药配方服用,这里介绍几种配方:

1. 生长散 骨粉10%、神曲(或麦芽)20%、秋牡丹30%、土黄芪10%、赤首乌10%、贯众10%、碘盐10%;混合研成沫。每10公斤体重每次在饲料中添加6~9克,从阉割后到育肥前一直喂,可增重22%左右。

2. 催肥散 赤首乌20%、土黄芪20%、神曲(或麦芽)20%、秋牡丹10%、柏仁(或酸枣仁)20%、食盐(不含碘)10%,混合研成粉。每头育肥猪(50公斤以上)早、晚各在饲料中添加15~25克。

3. 三味催肥散 首乌、枳壳、贯众(均为干品),三味药等量,混合研成粉。体重50公斤的猪,每天喂8~20克,每天早上将药粉掺到饲料中喂1次,连喂14天,停喂2天后喂,30天即可出栏。

4. 中草药催肥剂 山楂、苍术、陈皮、槟榔(即大白)、神曲各10克,麦芽30克、川芎、甘草各6克,木通8克,共研沫,拌于早餐饲料中,让1头猪吃完,每周1次。可使猪平均日增重提高230克以上,每增重1公斤肉消耗的混合料由5.2公斤降至4.2公斤。并且此中药催肥剂作为饲料添加剂具有开胃、健脾、镇静、清热和杀菌功效,它不仅可促进畜禽生长发育,还有防治疾病的作用。

5. 生长调节剂 贯众、秦皮、苍术、桑白、枳实、苏子各100克,人工矿泉盐1000克,酒曲(饼)1500克。将上述中药晒干磨成粉,加人工盐和酒曲混合均匀。为提高适口性,可按1:3加入炒熟的黄豆粉作辅型剂。饲喂时,以30~60公斤重的猪每日加50克药剂;60~100公斤重的猪每日加70克药剂于饲料中喂给。可提高饲料利用率15%~20%,猪的增重可比不喂的提高30%以上。

6. 在猪出栏前1个月,取芝麻1份、炒黄豆3份、炒蓖麻(去壳)1份,共研细沫,拌适量饲料喂猪。

7. 当归、川芎各20克,二丑、大白(槟榔)、甘草各10克,陈皮、生地各50克,贯众、鱼粉各30克,黄豆粉2.5公斤。将中草药用文火炒脆、研细(越细越好),和鱼粉、黄豆粉混合搅拌均匀即可。每次喂3汤匙,日喂3~4次。采用此法快速催肥,不论猪的大小,日增重最低可达0.5公斤,最高可达1.7公斤。

笼养肉鸽效益高

057751 河北馆陶县南徐村乡农协 王智广

1996年,馆陶县南徐村乡颜沃头村青年农民颜士锋,一改肉鸽放养,圈养的传统饲养方式,采用了笼养肉鸽新技术,使肉鸽的孵化率和成活率显著提高,并便于管理、减少疾病、节省饲料,获得了可观的经济效益。去年他笼养的60对种鸽,年产乳鸽493对,孵化率为94%,成活率为98%,纯收入达3850元。他的主要经验是:

1. 制造笼具 笼具框架是由4厘米见方的长木条组成,高1.8米、宽2米、深0.6米,分4层,每层4格,共16格单笼,(单笼规格为高45厘米、宽50厘米、深60厘米),每格养一对种鸽。格下设有一活动抽板,以便于清理鸽粪。鸽笼四周分别用1厘米宽的薄竹片上下平行钉齐。在鸽笼的一角放置巢盘,内放清洁干燥垫物,供种鸽产蛋、孵化。笼外各设一食槽和水槽。

2. 饲养良种鸽 饲养的肉鸽品种为美国王鸽,该品种繁殖力强,乳鸽生长发育快,饲料报酬高,深受消费者的欢迎。在饲养过程中,选留体质良好,生长健壮,遗传性强的乳鸽作为后备种鸽,以逐渐扩大繁殖鸽群,提高生产性能,不断增加经济效益。

3. 日粮配合及保健砂 肉鸽的日粮采用多种饲料科学配合,使之营养完善,充分满足肉鸽正常生长发育的需要。另配有保健砂,以提高肉鸽的消化机能,促进新陈代谢和防止疾病。①青年鸽日粮配方。玉米40%、小麦20%、高粱20%、小米10%、绿豆或红小豆10%。②育雏种鸽日粮配方。玉米25%、绿豆或红小豆25%、小麦20%、高粱15%、小米10%、黄豆5%。③保健砂配方。黄泥30%、粗沙20%、旧石灰粉10%、贝壳粉10%、骨粉10%、木炭沫5%、食盐5%、食用多种维生素5%、微量元素添加剂5%。

4. 坚持消毒,加强防疫 上鸽前,用3%的福尔马林溶液对鸽笼喷洒消毒,此后每月进行一次。隔月用红霉素0.05%拌料和土霉素0.02%溶于水中共饮,连用4~5天,预防疾病的发生,保证肉鸽健康生长。