

施用农药前要看清使用说明

编辑同志：

1997年我市有一个乡农资代销店把旱土除草剂——草甘膦误作杀虫双卖给一农民，致使0.4公顷早稻被毁。这样的事例不只是今年有，以前也出现过。

造成此事的原因，一是卖药、买药、施药时没有看清说明，拿到农药就用。二是农药外包装近似，某厂生产的杀虫双与草甘膦盛药的瓶子大小、形状、颜色一样，只是瓶子上的说明不一样，很易混淆。三是个别经营单位没有其经营农药相适应的技术人员，经营者自己也弄不清。

1997年5月8日，国务院发布的《农药管理条例》第三章第二十一条中规定：“农药经营单位应当向使用农药的单位和个人正确说明农药的用途、使用方法、用量……”第十八条中规定：“有与其经营的农药相适应的技术人员；”请各农药生产单位、经营单位严格执行国务院《农药管理条例》，依法经营。也请农民兄弟在买药、施药时认真看（问）清楚农药使用说明和注意事项，以避免不必要的损失。

株洲市植保站（412000） 倪新玲

中草药饲料添加剂

中草药作畜禽饲料添加剂有预防疾病、促进畜禽生长发育、提高经济效益的作用，而且安全、效果好、原料来源广、价格便宜，适合广大养殖户选择应用。

野菊花 具有散风热、降火、解毒等功能，对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等具有抗菌作用。可预防家禽球虫病、流行性感、肝病及皮炎。一般采集花朵干燥制粉，也可将其鲜品混入饲料中饲喂，现拌现喂。

大蒜 有杀虫、健胃、驱虫等功能，作畜禽饲料的添加剂功效明显。将大蒜去皮切碎，拌入饲料，用量为日粮的2%~3%，也可直接将0.1%的大蒜粉加入混合饲料中饲喂。

桔皮 对家禽有增加食欲、促进生长及增强抗病力的作用，也可使蛋黄和皮脂增色。将桔皮晒干制粉，一般在鸡、鸭饲料中添加3%~5%。

艾叶 有解热、利尿、通经、去痰、止血等功能。加工时去掉艾叶上的绒毛即能去除苦味，再晒干粉碎成粉作添加剂。猪饲料的添加量：育成猪1.5%~2%，育肥猪2%~2.5%，仔猪3%~4%。可提高日增重5%~8%，饲料消耗率降低7%~12%。鸡饲料的添加量：育雏鸡1.5%~2%，育成鸡2%~2.5%，种鸡2%~2.5%。鸡的总重量可提高10.5%~22.7%，提高经济效益12.5%。

娄底地区农业局（417000） 赵社政

猪食烟叶中毒的防治

有些养猪户把“打顶摸孙”的烟叶当青饲料用来喂猪，由于用量单纯和过多，结果使猪发生中毒现象，如抢救不及时，往往会造成死亡。

猪食烟叶中毒的临床表现分为超急性、急性和慢性三种类型。超急性型：猪食后1小时内死亡，外表不出现任何症状。剖检见肝脏肿大呈紫黑色，但其它脏器正常。急性型：猪食后兴奋不安，呼吸和心跳加快，鼻干，口渴，皮肤发红，体温升高达39.5℃~41.5℃。慢性型：猪采食后停食，精神不振，行走无力，尿量少呈酱油色，粪干硬，体温升高至39.5℃~40.5℃。

防治方法：喂猪的烟叶先在流水中揉搓，冲洗烟叶中的毒素；用量不能超过青饲料的70%，以40%以下为宜。采取上述方法，可以避免猪烟叶中毒的发生。如果烟叶用量过多，又未将烟叶中的毒素冲洗干净，喂食后猪发生中毒现象时，可用下述方法抢救。①每头猪用10毫升维生素C静注，或皮下、肌肉注射。②用口服补液盐给猪饮服，用量不限。口服补液盐的配方：冷开水1000毫升、氯化钾1.5克、葡萄糖22克、氯化钠3.5克、小苏打2.5克。

宁远县畜牧水产局（425600） 唐开棉

鸡中毒的急救方法

农村散养鸡易误食拌过农药的种子或灭鼠药饵而引起中毒，常用的急救方法有：

1.灌服白糖水 取白糖先对少量热开水搅拌溶化，再加开水配成浓度为20%的白糖液。对中毒较轻的鸡每羽灌服50毫升，雏鸡用量酌减，一般每隔1小时灌服一次。将病鸡单独关养，并配饮清洁水，辅喂软饲料、青菜叶，治愈率可达90%。

2.灌服油菜籽水 取油菜籽少许，加水适量，放在锅内煎煮，用纱布过滤取液。中毒严重的鸡每羽灌服2匙~3匙，中毒较轻的鸡服1匙即可。

3.切囊冲洗 重度中毒鸡，可将嗦囊外部鸡毛拔掉消毒，用刀片把皮肤切开，露出嗦囊，再错开皮肤切口在嗦囊上切开，长度视内容物多少而定，把内容物取出，用0.1%的高锰酸钾溶液或食盐凉开水冲洗干净，填入少量易消化的饲料，然后用消毒的针线分别把嗦囊和皮肤缝合，在缝合处撒上消炎粉。手术后12小时内禁止喂饲料和饮水，1天~2天内喂容易消化的饲料，并控制喂量。5天~7天即可痊愈。

4.灌服麻油 将有机磷农药中毒的鸡灌服麻油半汤匙（约3毫升~5毫升），20分钟~30分钟即可见效。

5.服用甘草汁 鸡有机磷农药中毒，可用甘草50克煎汁，加滑石粉10克，供20羽鸡内服，解毒效果明显。

衡山县农业局（421300） 王正球