

鸡用中草药饲料添加剂的应用概况

四川万县市响水中学职教组(634004) 幸冀权

多途径开辟饲料添加剂是当今养殖业发展的必然趋势。中草药饲料添加剂,具有药源丰富,成本低廉,作用广泛,安全无害,不易产生抗药性和医源性疾病等优点。鸡喂畜禽可明显提高其生产性能,防治疾病、改善肉蛋品质和色泽,从而显著增加经济效益。本文专就鸡用中草药饲料添加剂的应用概况作一综述。

一、蛋鸡用中草药饲料添加剂

宋景之^[1]用淫羊藿、山药等组成的添加剂喂蛋鸡,增强了食欲和体质,提高产蛋率18.5~20.3%。张占恒^[2]在蛋鸡饲料中添加1%的“鸡儿康蛋灵”(由女贞子、黄芪、神曲等组成,结果提高产蛋率13.9%。另据报道^[3],穿心莲、黄柏、苍术、昆布、蒲公英、绿豆、麦芽、加一定量硫酸锰、硫酸亚铁等化学药物制成复方添加剂,用于肉蛋鸡试验,结果增重提高48.8%,产蛋量提高43.1%。郭氏报道^[4]在蛋鸡日粮中添加干马齿苋,产蛋率提高10~20%。陶克容^[5]每周给蛋鸡喂芹菜3次,每次每羽蛋鸡平均喂50克,能提高产蛋率15~20%,对厌食伤食症有良好治疗作用。孟昭聚报道^[6],将海带加工后的下脚料洗净,晒干加工成粉。分别以2%、4%、6%的比例添加到蛋鸡饲料中,对1536羽京白904蛋鸡行笼养试验。结果表明,产蛋率分别提高6.2%、10%、14.3%,料蛋比则分别下降0.5%、0.5%、1.0%,淘汰死亡率分别下降0.9%、1.1%、1.1%。胡明等^[7]试验发现,黄芪、神曲、麦芽、昆布、炒山楂等添加到鸡日粮中饲喂一个月后,结果产蛋量要比对照组高10~13%,死亡率降低。俄罗斯农业专家实验证明^[13],对处于产蛋后期的13~14月龄的蛋鸡,按每公斤体重给予五加皮叶粉0.15克,饲喂的第10天,每千羽鸡多产蛋2428个,比对照组提高4%,10天以后的产蛋量比对照组提高5.7~17.8%。匈牙利学者研究表明,在蛋鸡料中添加1%的辣椒粉和苜蓿粉,再加少量的植物油,产蛋率提高7~8%^[8]。

李文武等报道,在鸡日粮中添加2.5~5%的吉林麦饭石(粒度60~80目)喂鸡,能提高产蛋率3~8%,减少蛋的破损,降低死亡率。研究表明,麦饭石是一种多孔结构,化学结构主要是铝硅酸盐形式存在,具有较强的吸附性,吸气性和吸水性,并渗出有益的微量元素,调节新陈代谢,调节血清淀粉酶、脂肪酶和

谷丙转氨酶的生理范围,升高睾酮和胰岛素的含量,促进鸡的生长发育,提高产蛋率,降低饲料成本^[9]。李呈敏报道^[10],在育成鸡饲料中添加5%麦饭石使育成鸡140~290日龄时产蛋率可提高7~8%,料蛋比提高16~23%。还有报道,在日粮中添加动物性饲料(如虾粉、蝇蛆),可延长产蛋高峰期,提高产蛋率^[4]。

二、肉鸡用中草药饲料添加剂

杨志强^[11]报道:用1.5~2%的当归、蒲公英等制成的饲料添加剂,喂肉用仔鸡,平均可提高增重12.3%,耗料下降15.3%。用钩吻、卖麻藤、穿山龙制成的催肥剂,用于肉鸡,增重提高10.4%,提高饲料报酬10.9%,节省饲料10%;在肉用仔鸡日粮中添加3%的松针粉,增重提高8.1%,提高饲料报酬8.4%^[10]。用胡蔓藤为主制成的添加剂喂鸡,日增重提高10.4%,节省饲料10%,饲料报酬提高10.9%,在中草药添加剂中加少量微量元素,制成复方饲料添加剂效果更佳^[3]。徐正震等^[12]分别用党参、黄芪、神曲;当归、陈皮、海浮石;熟地、淫羊藿组成3个配方组,分别按2%添加到3个试验组。结果试验组较对照组多增重285~369克,料肉比分别是1.98、1.52、1.73,对照组为2.13,提高饲料转化率为1.04%、2.9%、18.78%。李克明^[13]添加2~5%麦饭石喂肉鸡,结果日增重提高2.5~6.8%,饲料通过消化道时间延长12~21分钟,饲料在消化道中有充裕时间被消化吸收,提高饲料利用率。刘学剑^[14]在肉用仔鸡日粮中添加0.03%的稀土,经44天饲喂,试验组体重比对照组高30~40%。

林春驿等^[15]对120羽种公鸡进行饲喂鸡生精散(淫羊藿、菟丝子、蛇床子、黄芪、党参、甘草)以促进公鸡性功能的对比试验。结果表明,用药组平均体重为 2.006 ± 0.152 公斤,对照组为 1.813 ± 0.17 公斤;睾丸平均重 11.76 ± 9.30 克,对照组为 1.93 ± 2.60 克;给药组种公鸡平均在158天,即可采出品质优良的精液,比对照组(176天)提早18天。

三、改善肉蛋品质和色泽的中草药饲料添加剂

随着人们对蛋肉的需求量日益增加,对蛋肉的品质也提出了更高的要求。其中中草药饲料添加剂喂鸡可得到质优含各种营养物质丰富的蛋肉,是重要的

开发途径之一。李呈敏报道^[10],在鸡饲料中添加5%麦饭石,可使蛋中微量元素铜、铁、锰、钴及18种氨基酸都高于对照组。用3~5%海藻粉添加于蛋鸡饲料中,蛋的质量大有改进,蛋黄变得深黄,含碘量增加。杨志强^[11]报道,饲喂党参茎叶,鸡的蛋白质存留率提高24.6%,添加沙棘叶也有类似作用。试验证明,在肉鸡饲料中添加2%左右的干大蒜粉,能明显提高鸡肉的香味,因为生长鸡的鸡肉中香味成分主要是 C_2H_5-SCO 基因^[16]。杨忠华^[17]报道,土常山、姜、郁金等中药制成粉,按2%比例掺入饲料中喂鸡,鸡产下的蛋是一种低能量高蛋白的食品。

禽类产品的颜色深浅,一般与营养价值无关,但颜色深显得鲜艳的禽蛋品总是受到消费者的青睐。外贸出口的禽产品对色泽要求更严,鲜黄色最低标准要求达8级,这说明禽产品的色泽直接影响其商品价值。利用中草药作为增色剂,不仅成本低,而且可提高禽产品的商品价值,获得很好的经济效益。据报道,对禽产品(包括蛋黄、皮肤、脂肪等)的着色,叶黄素是最好的着色剂,但成本高。而用松针粉、刺槐叶粉、聚合草粉等,一般添加5%可达到着色目的。金盏花瓣粉添加0.5~0.7%或2%紫菜粉、0.3%红辣椒粉着色效果较好。万寿菊粉增色效果最佳,是国外常用的家禽蛋黄、皮肤和脂肪的增色剂。此外,黄玉米粉,干桂皮粉等都是来源广泛效果明显的天色着色剂。

四、防治疫病的中草药饲料添加剂

球虫、白痢是影响禽类生长的主要疾病之一。据报道,饲料中加入地锦草、旱莲草、苦参、白头翁、大黄、地榆、仙鹤草等中草药具有较强的抗菌消炎、清热燥湿作用^[18]。用雄黄、白头翁、黄柏、栀子等构成“鸡痢灵”,添加2~3%拌料喂鸡,能很好地控制雏鸡白痢;用0.5%的金荞麦提取液拌料,连喂10天,治疗鸡霉形体病的有效率达77.1%,其效果与链霉素相同^[17]。吉寿义^[19]试验报道,辛夷、防风、薄荷各6克,陈皮、白芷、桔梗各5克,藿香、荆芥各10克,茯苓、黄芩各12克,苍耳子9克,(为1.5公斤重鸡的用量)煎汤自饮,治鸡慢性呼吸道病5群(约3600羽左右)均收到满意效果。杨志强用黄连等12味中草药配制的添加剂“家禽保健散防治鸡霍乱,保护率达97%,其疗效与土霉素、磺胺增效剂无明显差异^[11]。何正仲^[20]用连翘、银花和贯众、川黄柏等组成2个配方喂鸡,防治禽霍乱,保护率达70~100%。

张东等^[21]用蒲公英、大青叶、板蓝根各200克,黄芩、黄柏、银花、甘草各100克,藿香、石膏各80克

(为300~500羽鸡用量),水煎自饮,对45580羽鸡进行预防IBD的发生,保护率为100%。张厚荣^[22]用党参、黄芪、银花、板蓝根、大青叶各30克,公英40克,甘草10克,蟾蜍1只(100克以上)为100羽鸡用量,先将蟾蜍置于砂罐中,加水1.5公斤,煎沸,再加入其他药物,取汁服用,保护率为87.5%。李金安^[23]试验表明,黄芪、白术、防风以3:2:1混匀于饲料和煎汤饮水,每天每羽5克,对29户养鸡户饲喂鸡进行预防鸡传染性法氏囊病(IBD),免疫保护率达100%。祝建新^[24]报道,黄芪、白头翁、生地等益气健脾、清热解毒、凉血生津药组成方1,不论是预防、还是治疗,均能减轻IBD的临床症状;由蒲公英、板蓝根等清热解毒药组成方2,也能显著减轻IBD的剖检病变,但对减轻临床症状,控制法氏囊的肿胀不明显,控制出血性病变的效果显著弱于方1。李笑春等^[25]用大青叶、板蓝根、蒲公英各100克、银花、黄芩、黄柏各5克,生石膏、生地、栀子各20克,甘草40克,水煎两次,合并药液2公斤或研成粉散剂拌料喂,供治200羽IBD病鸡,预防400羽,防治率达98%以上。

陆杰斌^[26]试验表明,消暑消食方(田基黄、铁线草、金钱草各150克,葫芦菜、岗茶、布渣叶各300克,入地龙、崩大碗、海金沙、冰糖草、白背叶、地毡各200克,煎汁自饮或拌料(供1000羽鸡用量),对6000羽鸡进行临床观察,育成鸡的成活率达91.5%,后在养鸡专业户连续10年的推广应用,经40多万羽鸡的临床应用,成活率均在93%以上,对防治鸡的疫病和生长有良好的作用。另据辽宁艾立民报道^[27],艾叶为主,辅以适当微量元素、载体、维生素等喂鸡,成活率高,发病少、生长快,增重和蛋重高,避免啄癖,异食癖。

参考资料

- [1]宗景之,中兽医医药杂志,1989(1):3
- [2]张占恒,河北畜牧兽医,1990(1):9
- [3]胡弘,四川畜禽,1993(11):30—31
- [4]郭宝忠,四川畜禽,1993(5):24—26
- [5]陶克容,四川畜禽,1993(5):36
- [6]孟昭聚,中兽医学杂志,1993(4):6—7
- [7]胡明等,当代畜禽养殖业1993(9):18
- [8]李惠萍译,四川畜禽,1994(3):26
- [9]李文武等,草与畜杂志,1991(2):34~35
- [10]李呈敏,中药饲料添加剂,北京农业大学出版社,1993
- [11]杨志强,食品饲料添加剂信息,1992(1):12

- [12]徐正霞等,中国兽医科技,1991(12):25
 [13]李克明等,饲料研究,1991(1):24~25
 [14]刘学剑,当代畜牧,1989
 [15]林森驿等,中兽医学杂志,1993(3):19
 [16]陈洪涛,中兽医学杂志,1993(2):35~36
 [17]杨志华,当代畜禽养殖业,1994:8~9
 [18]吴德峰,中兽医医药杂志,1992(2):46
 [19]吉寿义,中兽医学杂志,1994(2):24
 [20]何正仲等,湖南畜牧兽医,1990(2):17
 [21]张东等,甘肃畜牧兽医,1992(3):22
 [22]张厚荣,中兽医医药杂志,1992(1):39
 [23]李金安,中兽医医药杂志,1992(1):29
 [24]祝建新等,中兽医学杂志,1994(2):1
 [25]李笑春等,中兽医学杂志,1994(2):13
 [26]陆杰斌等,中兽医学杂志,1994(1):19
 [27]艾立民等,饲料研究,1984(1):30

中药炮制歌

卢治华

湖北南漳县肖堰镇火田村一组(441525)

中药炮制,历代医书均有论述,今搜集民间流传中药炮制歌兹录如下,以飨同道。

芫花本利水,非醋不能通。
 绿豆本解毒,带壳不见功。
 苹果消胀效,带壳反胀凶。
 黑丑生利水,远志苗毒逐。
 蒲黄生通血,熟补血运通。
 地榆医血药,连梢不住红。
 陈皮青理气,留血补胃中。
 附子救阳症,生用走皮风。
 草乌解风痹,生用使人蒙。
 人信烧煨用,赭石火烤红。
 入醋再研末,制度必须工。
 川芎炒去油,生用痹痛攻。
 炮炙需依法,方能技无穷。
 知母桑皮天麦门,首乌生熟地黄分,
 偏宜竹片钢刀切,铁器临之便不训。
 乌药门冬巴戟天,连翘远志五般药,

并宜剉去心方妙,否则令人发烦躁。
 厚朴猪苓与茯苓,桑皮更有外皮生,
 四般最忌连皮用,去净方能不耗神。
 益智麻仁柏子仁,更加草果四般论,
 并宜去壳方为妙,不去令人心痞增。
 何物还须汤炮之,苍术半夏与陈皮,
 更宜洗易哪三味,苡蓉地黄及当归。

藿白散治疗仔猪黄白痢验证

彭梅根

湖南湘潭县云湖桥镇七里铺村(411206)

编辑同志,你好!

我是贵刊的老订户,近十年来,贵刊给我在理论、临床工作中起了很重要的指导作用。例如贵刊1985年第1期,刊登江苏常熟市多管局周其民、支塘乡畜牧兽医站金奎保合作撰写的“母猪服中药‘藿白散’预防仔猪黄痢、白痢病试验初报”一文,笔者拜读后,即按法给仔猪患黄痢难愈的母猪处以“藿白散”三剂即愈。经670余胎临床验证,此方确实是治疗仔猪黄白痢的良方。现举例介绍如下。

例一、1985年8月11日,云湖桥镇侯家村村民许某饲养的一头五胎沙子岑母猪,7月30日顺产仔猪11头,次日就患黄痢,即请兽医医治,经多方治疗无效。8月11日邀余临诊。患猪体温在39℃~40.5℃间,体温计上附有黄色粘液粪便,精神萎靡,体躯消瘦,诊为黄痢。在给仔猪施以西药治疗(庆大霉素、青霉素)的同时,给母猪处以藿白散:藿香、陈皮、木香、诃子各20g,白头翁、连翘、苦参、煨葛根各24g,木通、当归各16g,山楂炭50g,滑石60g,雄黄8g,甘草12g,煎服,一天一剂,经治二天,仔猪黄痢症状减轻,三剂痊愈。

例二、1985年8月24日,云湖桥镇侯家村村民张海清饲养的一头8胎宁乡流沙河母猪,于8月14日产仔15头,产后即患黄痢,请赤脚兽医投服痢特灵医治,不仅无效,病情反而加剧。即邀余临诊,仔猪精神萎靡,被毛粗乱,排粪痛苦,弓腰努责,里急后重,还有两头仔猪肛门失禁,当即给仔猪注射氯霉素等西药,同时,处以“藿白散”三剂喂服母猪,经治一天明显好转,三天痊愈。