

中草药与畜禽催肥

荆所义 (郑州牧专 450045)

中草药在畜禽养殖业作为催肥添加剂,已得到广泛应用,深受广大养殖场(户)和消费者的欢迎。中草药作为催肥剂的主要特点:畜禽增重快,饲料报酬高;可预防多种疾病;更重要的是无激素和其他有害物质的残留。畜禽产品质量好,消费者食用放心。中药作催肥剂时,加工方法有三种:一是晒干后,经粉碎成细粉末,添加拌到饲料中喂服;二是煎水,把所用的中药1份兑水4份,共煎2次,合并二液,1000克中药可得煎汤2000克左右,冷却后让畜禽饮用或拌料喂服;再者就是以新鲜草药直接喂服,用量是干品的4~5倍,也可获得同样效果。

1 中草药在养猪催肥上的应用

方1:山楂、苍术、陈皮、槟榔、六神曲各10克,麦芽20克,川芎、甘草各6克,木通8克,混合粉碎后,与少量饲料混合,晨喂前吃完。每周1次。该剂量适于35公斤左右的猪;

方2:首乌20%、土黄芪20%、麦芽(或神曲)20%、丹皮10%、柏籽仁(或酸枣仁)20%、食盐10%,以上成份研成细末,50公斤以上育肥猪,早晚各添加15~25克,据试验,添加后可提高增重35%;

方3:神曲(或麦芽)20%、丹皮10%、土黄芪10%、首乌10%、贯仲10%、碘盐10%、骨粉30%,混合研成末在饲喂中每10公斤体重添加6~9克,可增重22%左右;

方4:鸡血藤100克、山楂150克、竹叶100克、芦苇根100克,首乌50克、丹参50克。以上中药粉碎为细末,混入100公斤配合饲料,催肥效果明显;

方5:山药73克、陈皮73克、茯苓83克,贯仲60克、黄芪67克、首乌66克、党参60克、麦冬60克、滑石85克、甘草15克、茶叶3克,将上药研成细粉,每头50公斤的育肥猪,每次喂15~25克,饲喂半月就会出现增重高峰;

方6:首乌、枳壳、贯仲,三味药等量,混研成细末,体重50公斤的猪,每天喂8~20克,每天早上将药粉掺入饲料喂服,连喂14天,停药2天再喂,30天即可出栏;

方7:首乌、贯仲各50克,麦芽、炒黄豆各500克,作晚期催肥效果明显;

方8:苦参500克,研成粉末,每日每头猪喂16克,于猪出栏前的1个月内添加饲喂,出栏时可增重11~11.5公斤,效果明显,且无副作用;

方9:贯仲、首乌各250克,焙黄的鸡蛋壳、杂骨各500克,将4种粉碎混合,15~25公斤猪1次喂

30克,25~50公斤猪1次喂50克,50公斤以上猪每次喂100克,日喂一次,连喂10天,停药20天,如此反复,直至出栏;

方10:黄精150克、首乌200克、大黄10克、乌药20克、苍术200克、淮山药250克、贯仲250克、枳壳200克、陈皮250克、茴香200克、桂皮150克、干姜150克、甘草200克,共研细末,混匀。小猪每日每次添喂10克,中猪添喂15克,大猪添喂20克。本方冬季使用效果更佳;

方11:白芍25%、陈皮15%、首乌30%、神曲15%、石菖蒲10%、山楂5%,研成细末混匀,在25公斤以上猪的日粮中添加1.5%,日增重可提高26.4%,饲料转化率可提高16.6%;

方12:大麦芽40%、陈皮20%、白萝卜籽20%、神曲20%、粉碎混匀,在育肥猪饲料中每天添加40克,有明显的增重效果;

方13:大麦芽80%、首乌10%、贯仲10%,粉碎拌匀,在猪日粮中添加5%,日增重可提高20~25%;

方14:黄精500克,当归300克、茯神300克、黄芪500克、白术400克、女贞子200克、山楂600克、苍术400克、郁金300克、贯仲100克、柴胡400克,除杂除湿混合粉碎过20目筛,对60日龄以上断奶仔猪进行添加饲喂,添加量占日粮1%,据试验121天,平均日增重901克,全期料肉比为2.64:1;

方15:山楂、麦芽、谷芽、神曲和铜、铁、锌等粉碎混合,据对40~57公斤猪30天试验,日增重可提高54.62%,饲料消耗降低34.23%。添加比例占日粮3.1%。

2 中草药在养牛催肥上的应用

方1:薏苡仁60克,黄精60克,沙参50克,研末掺入饲料中喂服,每日1剂,连喂5~7日,对牛瘦弱症有良效;

方2:生姜200克,茶叶100克、大枣1500克、芝麻250克,先将大枣、茶叶加水1500克煎熬,然后将生姜切碎,芝麻研碎一起倒入锅中,晾温后1次灌服;

方3:豆豉500克(炒),当归250克,白术250克、红枣250克,共研成细末,开水泡后,猪油25克为引,分7次服,每隔7天灌服1次;

方4:草解150克、金银花150克、茶叶20克,牛煎汁内服;

方5:当归60克、红枣、红糖各500克,煎汁喂

饲养管理

皖西白鹅生活习性与行为的观察

潘琦 周建强 庞训胜 (安徽农业技术师范学院 凤阳 233100)

摘要 通过对皖西白鹅生态习性和行为系统的观察研究,发现皖西白鹅采食、饮水、睡眠、嬉游、就巢、放牧等,具有生物节律性,公母配种适宜比例是1:4,每只公鹅平均交配次数2.5次/日,母鹅产蛋时间集中于清晨4:00—上午9:00之间,约占产蛋母鹅的83%,有就巢性母鹅为98%,其中一年就巢两次者为92.1%。

关键词: 皖西白鹅 生活习性 行为

随着养禽业的迅猛发展,家禽行为有其重要的实用价值。研究家禽的行为能够为改善饲养管理,选种选育,调节环境条件,检查家禽健康状况,提高家禽生产力提供可靠的依据,但目前国内关于家禽行为的研究报道甚少,尚未引起饲养者的高度重视。

皖西白鹅是安徽省优良地方品种,在我国中型白鹅中体型较大,具有早期生长快,肉质好,羽绒品质优良,耐粗饲等特点,深受产区人民的喜爱。笔者通过对皖西白鹅行为的观察发现,皖西白鹅合群性强,易建立条件反射,在生产上可利用其行为特点和对环境条件的要求,人为地加以调节;加强科学的饲养管理制度,合理的开发利用品种资源,促进养鹅业的发展。

1. 材料与方法

1.1 材料

用来观察的鹅群为安徽省凤阳县农村饲养的皖西白鹅雏鹅及种鹅。

1.2 观察项目

牛,每日1剂,连喂7日;

方6:首乌、鸡血藤各250克,当归60克、猪骨适量,煮汤喂牛,连服3~5剂;

方7:女贞子100~150克,研为细末,拌料一次喂牛,连喂10~20天;

方8:用参200克(小牛量酌减)熬汁,加食盐适量,牛每天1剂,连喂3~4天;

方9:黄精子(炒黄)50~150克,研成细末,拌入饲料内喂服,连用15~30天。

3 中草药在养鸡催肥上的应用

方1:干辣椒12克、姜粉、五加皮各23克,八角茴香7克、硫酸亚铁12克,放在一起碾成粉末,每只鸡每次用0.5~1克,两天用1次。本方夏天使用

皖西白鹅的采食行为,饮水行为,理羽行为,群居行为,对环境温度所表现的行为,性行为,产蛋行为,就巢行为等。

1.3 观察方法

采用群体与个体相结合的观察方法,清晨4:00~上午9:00观察产蛋行为,上午9:00~下午6:00观察鹅群活动和行为表现,观察时不惊动鹅群,将观察结果记录于表格中,最后汇总统计分析。

2 结果与分析

2.1 采食与饮水行为

雏鹅在出壳后18小时有食欲要求,当用手指试探时,雏鹅有伸颈张喙,啄食手指或垫草的现象。雏鹅初次采食,需进行人工调教,把鲜嫩的莴苣叶或青菜切成细丝状,均匀地撒在芦席上或送到雏鹅嘴上,引诱采食;经过3~4次调教,雏鹅开始能自行采食,但采食量较少。第2天,便将切碎的青饲料加少量水拌以精料放在食槽内饲喂,平均每天每只采食为19.2±8.3次。

更适宜;

方2:姜粉24克,肉桂50克、胆草9克、八角茴香8克,硫酸亚铁9克,共碾成粉末,每只鸡每次喂服0.5~1克,两天用1次。本方冬季使用更适宜;

方3:中药肥鸡粉:肉桂粉50%、干姜粉20%、甘草粉9%、大茴香粉7%、黄豆粉(炒)6%、硫酸亚铁8%,六种药充分混匀,拌入料中,并酌情加水拌匀,每只鸡每天喂1~1.5克,隔天喂1次,15天后明显增重,平均每天可增重25~50克;

方4:喂硫磺粉催肥,每天每只肉鸡喂硫磺2.5~3毫克,拌入饲料中喂服。催肥效果显著。

注意:硫磺催肥不能超过1个月,而且宰前3~5天要停药。