

中草药添加剂对仔猪生长性能的影响

解洪业¹, 范玉霞¹, 田生花², 赵婷静¹, 史权军³, 李岳林⁴

(1. 青海省畜牧兽医科学院, 西宁, 810003; 2. 青海省湟中县良种猪场;
3. 湟中县检疫站; 4. 乐都县检疫站)

摘要: 本文介绍了添加不同浓度的复方中草药饲料添加剂与添加抗生素饲喂仔猪, 抗生素组头均增重提高 2.42kg, 增重率 14.18%, 头均增收 16.94 元, 差异显著 ($P < 0.05$)。并能有效地防制仔猪黄、白痢的发生, 具有较好的饲喂效果。

关键词: 中草药添加剂; 仔猪饲喂试验

中图分类号: S853.76

文献标识码: B

文章编号: 1003-7950(2001)02-0006-02

Effect on Piglet Growing by Chinese Medicinal Herbs Additives

XIE Hong-ye et al

(Qinghai Academy of Animal and Veterinary Sciences, Xining, 810003)

Abstract: Using several concentration compound Chinese medicinal herbs and antibiotic additives feed the piglets, it's effect on piglet growing were measured. The results showed that added 0.8% chinese medicinal herbs group had the best gain effect and its every piglet were average more gain 2.42kg than antibiotic group. The rate of gain ewre 14.18%, and every piglet were average more benefit 16.94 Yuan and had significant different ($P < 0.05$). Using compound Chinese medicinal herbs feed piglets could effectively prevent the yellow scour of newborn piglets and write scout of piglet

Key words: Chinese medicinal herbs Additives, Piglet feed test

饲料添加剂中长期、大量使用化学药物、抗生素和激素类物质,而造成畜禽体内残留,耐药性,以及 DNA 结构发生突变等现象,越来越引起人们的高度关注^[1]。而天然中草药应用于饲料添加剂中,具有安神镇静,健胃促消化,理气活血、养精补益、驱虫保健和防病治病等药理作用^[2]。同时由于它的天然性,毒副作用小,抗药性不显著等特点,有着化学药物和抗生素无法比拟的优点。为保护畜禽及消费者的健康,在饲料添加剂方面寻求高效无害的天然药物,具有极其重要的意义。本文以仔猪为试验对象,用添加不同浓度的复方中草药添加剂与添加抗生素进行对比饲喂试验,检测对仔猪生长性能的影响,现将试验结果报告如下。

1 材料和方法

1.1 复方中草药饲料添加剂: 选用桔皮、神曲、山楂、车前草、黄柏等 10 多味草药按不同比例组成配方后,置 65℃ 烘箱中烘干,30 目粉碎,分装备用。土霉素购自医药公司。

1.2 供试猪: 为湟中种猪场自繁自养的纯种长白仔猪,选择体重接近,健康无病的 55 日龄仔猪 24 头,随机分为 4 圈,每圈 6 头饲养。

1.3 日粮配制: 参考国家 GB8471-87 饲养标准,结合当地饲料资源和猪种特点配制^[3,4],日粮组成及营养水平见表 1。复方中草药添加剂按 0.4%、0.8%、1.2% 3 个不同浓度添加于日粮中;抗生素按使用说明添加。

1.4 试验分组: 将 24 头仔猪(4 圈)按添加剂类型分设 A 组:0.4% 中草药添加剂组;B 组:0.8% 中草药添加剂组;C 组:1.2% 中草药添加剂组和 D 组:添加抗生素组,每组 6 头。

1.5 试验方法: 预试期 7d,正式试验 60d。开始和结束当天早晨 8:00 时空腹称重,4 个试验组均定时等量

饲喂,日喂 3 次,自由饮水,圈舍保持清洁,定期用 3% 来苏尔消毒。数据统计分析采用方差分析法检验各組间差异。

表 1 日粮组成及营养水平

单位: %, MJ/kg

日粮组成	含量
玉 米	57.0
麸 皮	14.0
玉米蛋白粉	14.0
脱毒菜籽粕	4.0
豆 粕	5.0
微量元素添加剂	0.5
肉骨粉	3.0
GaHPO ₄	1.0
石 粉	0.8
食 盐	0.26
Lys	0.5
Lyr	0.626
DE	13.01
CP	19.53
P	0.554
Met	0.38

2 结果

2.1 增重: 在 60d 试验期内,总增重,中草药添加剂组比抗生素组平均头均多增重 1.66kg,提高 9.76%,差异显著 ($P < 0.05$)。其中,以 0.8% 浓度中草药添加剂组增重最高,比抗生素组头均多增重 2.42kg,提高 14.18%,差异极显著 ($P < 0.01$)。不同浓度中草药添加剂对组间仔猪生长性能的影响也存在有差异,其中 B 组增重最高, C 组次之,再次为 A 组,分别比抗生素头均增重提高 14.18%、9.67%、4.28%。

收稿日期:2000-11-03

表 2 生长性能及经济效益分析 单位: kg, 元, %

组别	动物数 (头)	平 均 平 始 重	平 均 平 末 重	头均 增重	全期 耗料	料重 比	增重 比较	头均多 增 重	头均多增 收金额 *
A	6	10.1 ± 0.85	27.9 ± 0.85	17.8	66.0	3.7:1	104.28	0.73	5.11
B	6	9.93 ± 0.79	29.42 ± 0.66	19.49	66.0	3.4:1	114.18	2.42	16.94
C	6	10.37 ± 0.59	29.09 ± 0.58	18.72	66.0	3.5:1	109.67	1.65	11.55
D	6	10.33 ± 0.76	27.4 ± 0.57	17.07	66.0	3.9:1	100		

* 生猪毛重按现市场价 7.00/kg 元计算。

3 结论与讨论

3.1 中草药饲料添加剂饲喂仔猪试验结果表明,以添加 0.8% 浓度组增重效果最好,其次为 1.2% 组, B、C、A 三个组分别比 D 组增重提高 14.18% ($P < 0.01$)、9.67% ($P < 0.05$) 和 4.28% ($P > 0.05$)。

3.2 至今,中草药添加剂对畜禽增重及提高生产性能的作用机理还不清楚,但很多研究表明:中草药中含有多种生物活性成分,作为饲料添加剂,具有增加动物营养,改善机体代谢的作用,从而提高了饲料的利用率。

在配方组成及添加剂量微量方面有待进一步研究。

参考文献

- 1 田允波.中草药饲料添加剂的研究及应用[J].吉林畜牧兽医,1993,(6):32~35
- 2 方热军等.自制中草药添加剂对仔鸡生长性能的影响[J].中国饲料,2000,(7):9~11
- 3 中华人民共和国标准 GB8471-87[S],1987
- 4 中国饲料工业信息中心.中国饲料成分及营养价值表(1997版)[J].中国饲料,1997,(24):27~38

·牧医简报·

猪传染性胸膜肺炎的诊治

阿怀洲，马力强

(青海省诺木洪农场兽医站, 816102)

中图分类号:S828

文献标识码:C

文章编号:1003-7950(2001)02-0007-01

猪传染性胸膜肺炎,是由胸膜肺炎放线杆菌引起猪的一种呼吸道传染病。在临床和剖检上出现肺炎和胸膜炎的特征性症状和病变。作者对诺木洪农场 6 个猪场采集典型病料送检。诊断为猪传染性胸膜肺炎。报告如下:

1 发病情况与症状

本病始发于 1996 年 7 月,系我场第 1 猪场的断奶后仔猪、架子猪。到 1998 年,全场所所有猪场的断奶仔猪、架子猪发病。表现体温升高,呼吸困难,常站立或呈犬坐式姿势,张口伸舌,腹部、背部、四肢、耳等处皮肤呈现不同程度充血、淤血;病猪常有腹泻,本病病程长,发病率高,死亡率低。

2 剖检变化

支气管内可见大量灰白色,粘液性炎性分泌物,肺炎多为两侧性,肺呈紫红色,在肺炎区出现纤维性物质附于表面,胸膜炎,胸腔积水,并有大量纤维素,胸膜与肺粘连,脾肿大,柔软暗黑,腹腔有时也有积水。

3 实验室诊断

將所取病料送往甘肅省蘭州獸醫研究所鑑定, 確診為豬傳

染性胸膜肺炎,为血清 3 型。

4 防治

4.1 病猪立即隔离,猪舍彻底消毒。健康猪耳后肌注嗜血杆菌胸膜肺炎多价灭活苗(由兰州兽医研究所生产),仔猪 2ml/头,大猪 3ml/头,种猪 1 年 2 次注射。

4.2 发病猪应用恩诺沙星, 2.5mg/kg 体重, 2 次/d, 肌注, 同时用新霉素 15mg/kg 体重, 每日 2 次, 拌料内服 1 星期, 治疗病猪 315 头, 治愈 298 头, 效果好于其它抗菌素。

5 小结

5.1 通过上述防治措施,目前 6 个猪场猪发病很少,基本上控制了本病的蔓延。而且在肥猪屠宰过程中检查发现,肺部正常。说明上述多价灭活苗对我场胸膜肺炎的预防是有效的。

5.2 从1996年我场对该病一直应用土霉素治疗和预防,可效果不太好,这可能与病原菌株产生抗药性有很大关系。

致谢 本文得到了甘肃省兰州兽医研究所逯忠新老师的大力支持,特此致谢。

收稿日期:2000-11-05

小方治病几则

郭起王秀

(青海省畜牧兽医总站, 西宁, 810001)

中图分类号:S853.9

文献标识码:C

文章编号:1003-7950(2001)02-0007-01

1 驃马破伤风:豨签草 100g 研末,开水冲,凉温后胃管投服,每日 1 次,连用 1 周,同时静滴甲硝唑注射液 250ml,破伤局部用高锰酸钾粉填塞。

2 鸭腹泻(包括法氏囊炎腹泻):用安徽省涡阳县雉河公司产的牧迪 888(或 2000)2ml 加水 0.5kg,连饮 3~5 天即愈。

3 鸡鸭传染性鼻炎:用辽宁省振兴兽药厂产的“鸽病液”5ml 加水 2kg 饮服 1~3 天,多数都能见效。

4 犬猫呕吐:生姜3片、半夏3g、红糖少许煎汁灌服,每天3次,连用1~3天。

5 骡马多尿症(尿崩症):甘草 250g 煎汁胃管投服,每天 1 次,连用 3 天,多数痊愈。

6 畜禽眼炎:黄连 5g,人奶 10ml 浸 1 天后点眼,每天 2~3 次,连用 3~7 天。

收稿日期:2000-12-02