




数学分析教程

作者：流形上的喵帕斯

组织：Kitauji Math Dept.

时间：Jan. 2024



星星之火，可以燎原。

目录

第 1 章 预备知识	1
1.1 逻辑基础	1
1.2 集合	1
1.3 函数	1
简单例子	1
函数的复合	1
交换图表	1
单射、满射和双射	1
反函数	1
集值函数	1
1.4 关系与运算	2
等价关系	2
序关系	2
运算	2
1.5 自然数	3
Peano 公理	3
自然数的计算	5
除法	5
数学归纳法	5
递归定义	6
练习	6
1.6 可数性	7
排列	7
集合的等势	7
可数集	7
无穷 Cartesian 积	7
1.7 群与同态	8

目录	3
群	8
子群	9
陪集	9
同态	9
同构	9
1.8 环、域与多项式	10
环	10
二项式定理	12
多项式定理	13
域	13
有序域	13
形式幂级数	13
多项式	14
多项式函数	14
多项式的除法	14
线性因子	14
多变量多项式	14
练习	14
1.9 有理数	15
整数	15
有理数	15
多项式的有理零点	15
平方根	15
1.10 实数	16
序完备性	16
Dedekind 对实数的构造	16
$\mathbb{R}$ 上的自然序结构	16
扩展实数系	16
上确界与下确界的刻画	16
Archimedes 公理	16
有理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性	16
n 次方根	16
无理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性	16
区间	16
练习	16
1.11 复数	17

复数的构造	17
基本性质	17
复数的运算	17
$\mathbb{K}$ 中的球	17
1.12 向量空间、仿射空间与代数	18
向量空间	18
线性映射	19
向量空间的基	20
仿射空间	20
仿射映射	20
多项式插值	20
代数	20
差分算子与求和公式	21
Newton 插值多项式	21
第 2 章 收敛性	22
2.1 序列的收敛性	24
序列	24
度量空间	25
聚点	28
收敛性	28
有界集合	30
极限的唯一性	31
子序列	31
练习	32
2.2 实数列与复数列	35
无穷小量	35
基本法则	35
比较判别法	37
复数列	38
练习	40
2.3 赋范向量空间	44
范数	44
球	45
有界集合	46
例子	46

有界函数空间	47
内积空间	48
Cauchy-Schwarz 不等式	50
Euclid 空间	52
等价范数	53
积空间中的收敛性	55
练习	56
2.4 单调数列	63
有界的单调数列	63
一些重要极限	63
练习	67
2.5 无穷极限	74
收敛到无穷大	74
上极限与下极限	75
Bolzano-Weierstrass 定理	77
练习	78
2.6 完备性	83
Cauchy 序列	83
Banach 空间	84
Cantor 的实数构造法	85
练习	85
2.7 级数	89
级数的收敛性	89
调和级数与几何级数	90
级数的运算	90
收敛性判别法	91
交错级数	92
实数的十进制、二进制及其他进制表示	93
练习	95

第 1 章 预备知识

1.1 逻辑基础

1.2 集合

1.3 函数

简单例子

函数的复合

交换图表

单射、满射和双射

反函数

集值函数

1.4 关系与运算

等价关系

序关系

例 1.4.1.

运算

命题 1.4.2. 对于给定的运算, 至多存在一个单位元.

例 1.4.3. 设 $\otimes$ 是集合 Y 上的运算, X 是非空集合. 则我们通过 $\otimes$ 在 $\text{Funct}(X, Y)$ 上诱导运算

$$(f \odot g)(x) := f(x) \otimes g(x), \quad x \in X.$$

显然, 当 $\otimes$ 具有结合性和交换性时, $\odot$ 也具有. 若 Y 关于 $\otimes$ 具有单位元 e , 则常值函数

$$X \rightarrow Y, \quad x \mapsto e$$

是 $\text{Funct}(X, Y)$ 关于 $\odot$ 的单位元.

1.5 自然数

1888 年, R. Dedekind 出版了著作 *Was sind and was sollen die Zahlen?* (数是什么以及数应当是什么?) [Ded95], 系统阐述了自然数系统的集合论基础. 这一著作不仅是该领域发展的里程碑, 更是数学史上的高峰之一.

从本节开始, 我们将以一个简单而“自然”的自然数公理系统为起点, 在后面的各节中逐步构造整数、有理数、实数, 最终完成复数的构造. 这种构造性的方法相较于 D. Hilbert 于 1899 年提出的公理化实数体系 (见 [Hil23]) 有一个优势, 即它使得整个数学体系能够从数理逻辑和公理化集合论中的少数几块基石出发逐步搭建而成.

Peano 公理

我们用 G. Peano 提出的公理系统来定义自然数, 这个公理系统形式化了这样一个思想: 给定任意自然数, 总存在一个更大的后继自然数.

公理 1.5.1 (自然数). 设 $\mathbb{N}$ 是集合, $e \in \mathbb{N}$, 其上定义了函数

$$\nu: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^* := \mathbb{N} \setminus \{e\}, \quad n \mapsto \nu(n).$$

若

(N₁) ν 是单射.

(N₂) 设 $N \subseteq \mathbb{N}$. 若 $e \in N$ 且对于任意 $n \in N$ 都有 $\nu(n) \in N$, 则 $N = \mathbb{N}$.

则称 $(\mathbb{N}, e, \nu)$ 是 *Peano 结构*. 进一步, 称 $\mathbb{N}$ 是自然数集, $\mathbb{N}$ 中的元素是自然数.

注 1.5.1. 1. 称 ν 是后继映射, 并称元素 $\nu(n)$ 是 n 的后继. 元素 e 是唯一不是任何自然数后继的自然数, 因此函数 ν 是满射, 再结合 (N₁), 则 ν 是双射.

证明. 令

$$N := \{n \in \mathbb{N}; \exists n' \in \mathbb{N}: \nu(n') = n\} \cup \{e\} = \text{im } \nu \cup \{e\}.$$

对于任意 $n \in N$ 都有 $\nu(n) \in \text{im } \nu \subseteq N$, 而 $e \in N$, 于是 (N₂) 蕴含了 $N = \mathbb{N}$. 因此 $\text{im } \nu = N \setminus \{e\} = \mathbb{N} \setminus \{e\} = \mathbb{N}^*$, 这说明 ν 是满射. $\square$

2. 我们通常记

$$0 := e, \quad 1 := \nu(e), \quad 2 := \nu(\nu(e)), \quad 3 := \nu(\nu(\nu(e))), \quad \dots$$

3. 部分作者倾向于将自然数的起点定义为 1 而非 0. 当然, 这样的定义在数学上没有本质的区别.

4. 公理 (N_2) 是数学归纳法的一种形式. 我们将在命题 1.5.6 和例 1.5.7 中对这一重要原理进行更详尽的讨论.

注 1.5.2. 1. 稍后我们将会看到, 在学校里所学的所有关于算术运算的知识, 都可以从 Peano 公理中推导出来. 尽管如此, 对于数学家来说, 仍会出现两个重要问题: (1) 是否存在一个系统 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 满足 Peano 公理? 也就是说, 是否存在这样的自然数模型? (2) 如果存在, 有多少个这样的模型? 我们在此简要探讨这些问题.

为了简化讨论, 我们引入以下概念: 称集合 M 是无穷系统, 若存在单射函数 $f: M \rightarrow M$ 使得 $f(M) \subset M$. 显然, 若自然数存在, 那么它们构成一个无穷系统. 这类系统的重要性体现在由 R. Dedekind 证明的以下定理中: 任何无穷系统都包含一个自然数模型 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$.

因此, 自然数的存在问题可以归结为无穷系统的存在问题. Dedekind 给出了这类系统的存在性的证明, 其中隐含的使用了 G. Frege 于 1893 年引入的“概括公理”: 对于集合的每个性质 E , 集合

$$M_E := \{x; x \text{ 是满足性质 } E \text{ 的集合}\}$$

存在. 在 1901 年, B. Russell 发现这一公理会导致矛盾, 即所谓的二律背反. Russell 为 E 选择了性质“ x 是一个集合且 x 不是自身的元素”. 那么概括公理便保证了集合

$$M := \{x; (x \text{ 是集合}) \wedge (x \notin x)\}$$

的存在. 这显然导致了矛盾

$$M \in M \iff M \notin M.$$

毫不意外的, 这样的二律背反动摇了集合论的基础. 进一步的研究表明, 这类集合论问题只在考虑“过大”的集合时才会出现. 为了避免 Russell 悖论, 我们可以区分两种类型的对象汇集: 类和集合. 集合是特殊的“小”类. 如果一个类是集合, 那么它可以通过公理化方式描述. 于是概括公理变为: 对于集合的每个性质 E , 类

$$M_E := \{x; x \text{ 是满足性质 } E \text{ 的集合}\}$$

存在. 此时 $M = \{x; (x \text{ 是集合}) \wedge (x \notin x)\}$ 是一个类而非集合, Russell 悖论便不再出现.

此外, 还需要一个独立的公理来得到以下我们已经多次使用过的事实: 对于任意集合 X 和集合的性质 E ,

$$\{x \in X; E(x)\} := \{x; (x \in X) \wedge E(x)\} \text{ 是集合}.$$

关于这些问题的更完整讨论, 我们建议读者参阅相关文献 (例如 [FP85]).

Dedekind 的研究表明, 为了在公理化集合论的框架内证明自然数的存在性, 还需要无穷公理: 存在归纳集. 这里, 称集合 N 是归纳集, 若 $\emptyset \in N$ 且对于任意 $n \in N$ 都有 $n \cup \{n\} \in N$. 考虑集合

$$\mathbb{N} := \bigcap \{m; m \text{ 是归纳集}\}$$

和函数

$$\nu: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto n \cup \{n\}.$$

最后, 令 $0 := \emptyset$. 可以证明, $\mathbb{N}$ 本身是归纳集且 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 满足 Peano 公理. 因此, $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 是一个自然数模型.

现在设 $(\mathbb{N}', 0', \nu')$ 是另一个自然数模型. 那么, 在集合论的框架内, 可以证明存在一个双射 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ 使得 $\varphi(0) = 0'$ 且 $\varphi \circ \nu = \nu' \circ \varphi$, 即 φ 是从 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 到 $(\mathbb{N}', 0', \nu')$ 的同构. 因此, 自然数在同构意义下是唯一的. 这样一来, 谈论自然数便是有意义的. 证明和细节可参见 [FP85].

2. 我们将上面的讨论限定在 von Neumann-Bernays-Gödel (NBG) 公理体系内进行, 该体系以“类”的概念为核心. 实际上, 这一概念完全可以避免使用. 例如, 同样广为接受的, 带有选择公理的 Zermelo-Fraenkel (ZFC) 公理体系便无需此概念. 值得庆幸的是, 可以证明这两个公理系统在以下意义上是等价的: 在两个系统中, 关于集合的相同命题都是可证明的.

自然数的计算

定理 1.5.3.

除法

数学归纳法

命题 1.5.4 (良序原理). 自然数集 $\mathbb{N}$ 是良序的, 即 $\mathbb{N}$ 的每个非空子集都包含一个最小元.

命题 1.5.5 (算术基本定理).

命题 1.5.6 (数学归纳法).

例 1.5.7.

命题 1.5.8 (完整归纳法).

递归定义

命题 1.5.9.

例 1.5.10.

注 1.5.11.

例 1.5.12.

练习

1. 设 $g \in \mathbb{N}$ 且 $g \geq 2$. 证明任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都可以写成如下形式

$$n = \sum_{j=0}^{\ell} y_j g^j \quad (1.1)$$

其中 $y_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}$ ($0 \leq k \leq \ell$) 且 $y_{\ell} > 0$. 进一步, 表达式 (2.3) 是唯一的, 也就是说, 若 $n = \sum_{j=0}^m z_j g^j$ 其中 $z_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}$ ($0 \leq k \leq m$) 且 $z_m > 0$, 则 $\ell = m$ 且 $y_k = z_k$ ($0 \leq k \leq \ell$).

1.6 可数性

排列

集合的等势

可数集

无穷 Cartesian 积

1.7 群与同态

在定理 1.5.3 中, 我们在 $m \leq n$ 的前提下, 定义了两个自然数 m 和 n 的差 $n - m$. 同时, 在 m 是 n 约数的前提下, 我们也定义了两个自然数 m 和 n 的商 n/m . 在这两种情形中, 对 m 和 n 加上的这些限制正是为了保证所得的差和商仍然是自然数. 如果我们希望对任意自然数 m 和 n 定义“差” $n - m$ 或“商” n/m , 那么就必须离开自然数这一范围. 在第 9–11 节中, 我们将构造新类型的数, 把自然数集扩展到更大的数系之中, 在这些数系里, 这些运算可以 (几乎) 不受限制地使用.

当然, 这些新的数系必须被构造得仍然满足加法与乘法的通常法则. 为此, 脱离对某个具体数系的依赖, 而对这些运算法则本身进行研究是极其有用的. 这样的研究也为我们提供了进一步的训练: 如何从给定的定义和公理中, 以逻辑方式推演出命题.

对这里以及接下来几节中所出现问题的深入讨论, 严格来说属于代数学的范畴而非分析学, 因此我们在这里的叙述会相对简略, 只证明其中少数最重要的定理. 我们的目标是: 能够识别那些一次又一次以不同形式出现的一般代数结构. 从少量公理出发推导出大量算术运算法则, 使我们得以在本来杂乱庞大的公式和结论中建立起某种秩序, 并将注意力集中在真正本质的内容上. 从这些公理推出的命题, 只要公理成立, 那么它们就成立, 而与所处的具体背景无关. 已经证明过一次的结论, 就不必在每一个特殊情形中重新证明.

在本节以及接下来的各节中, 我们只给出少数几个具体的例子. 我们的主要目的是提供一套语言, 并希望读者在后面的章节中能够体会到这套语言的用处, 同时也能看到这套形式主义背后真正的数学内容.

群

公理 1.7.1 (群). 设 G 是非空集合, 其上定义了运算

$$\odot: G \times G \rightarrow G, \quad (g, h) \mapsto g \odot h.$$

若

(G₁) $\odot$ 具有结合律.

(G₂) $\odot$ 具有单位元 e .

(G₃) 每个 $g \in G$ 都有逆元 $h \in G$ 使得 $g \odot h = h \odot g = e$.

则称 $(G, \odot)$ 是群.

定义 1.7.2 (Abel 群). 称群 $(G, \odot)$ 是交换群或 Abel 群, 若 $\odot$ 具有交换律.

注 1.7.1.

子群

陪集

同态

注 1.7.2.

同构

1.8 环、域与多项式

本节中, 我们考虑在其上定义了两种运算的集合. 在这里我们假定: 对于其中一种运算, 这个集合构成一个 Abel 群, 并且这两种运算满足某种合适的“分配律”. 由此发展出“环”和“域”的概念, 它们把运算法则加以形式化. 作为环的特别重要的例子, 我们将考察幂级数环以及单变量 (和多变量) 多项式环, 并推导它们的一些基本性质. 多项式函数在运算上相对容易处理, 在分析中也具有重要地位, 因为“复杂函数可以被多项式任意逼近”, 这一说法我们将在后文中以更精确的形式加以表述.

环

公理 1.8.1 (环). 设 R 是非空集合, 其上定义了加法运算

$$+: R \times R \rightarrow R, \quad (a, b) \mapsto a + b,$$

和乘法运算

$$\times: R \times R \rightarrow R, \quad (a, b) \mapsto a \times b.$$

若

(R₁) $(R, +)$ 是 Abel 群.

(R₂) $\times$ 具有结合律.

(R₃) $\times$ 对 $+$ 具有分配律:

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c, \quad c \times (a + b) = c \times a + c \times b, \quad a, b, c \in R.$$

则称 $(R, +, \times)$ 是环.

在这里, 我们采用通常的约定, 即乘法优先于加法. 例如, $a \times b + c$ 的意思是 $(a \times b) + c$ (也就是说, 先进行乘法 $d := a \times b$, 再计算加法 $d + c$), 而不是 $a \times (b + c)$. 另外, 在不会引起混淆的情况下, 我们通常将 $a \times b$ 简写为 ab .

定义 1.8.2 (交换环). 称环 $(R, +, \cdot)$ 是交换环, 若 $\cdot$ 具有交换律. 在这种情况下, 分配律 (R₃) 可以简化为

$$(a + b)c = ac + bc, \quad a, b, c \in R.$$

定义 1.8.3 (含幺环). 称环 $(R, +, \cdot)$ 是含幺环, 若 $\cdot$ 具有单位元. 并将该单位元记作 1_R 或 1 , 称为 R 的幺元或乘法单位元.

当加法和乘法运算在上下文中明确时, 我们把 $(R, +, \cdot)$ 简写为 R .

注 1.8.1. 设 $R := (R, +, \cdot)$ 是环.

1. 环 R 的加法群 $(R, +)$ 的单位元, 如例 1.5.12 中一样, 记作 0_R 或 0 , 称为 R 的零元或加法单位元. 根据命题 1.4.2 可知, 若 0_R 或 1_R 存在, 则唯一.
2. 由注 1.7.1(4) 可知, 对于每个 $a \in R$ 都有 $-(-a) = a$.
3. 对于每一对 $a, b \in R$, 由注 1.7.1(3) 可知, 方程 $a + x = b$ 在 R 中有唯一的解 x , 即 $x = b - a := b + (-a)$ (读作 b 减 a), 称为 a 与 b 的差.
4. 对于任意 $a \in R$, 有 $0a = a0 = 0$ 且 $-0 = 0$. 进一步, 令 $a \neq 0$, 若存在非零元 $b \in R$ 使得 $ab = 0$ 或 $ba = 0$, 则称 a 是 R 的零因子. 若 R 是交换环且没有零因子, 即 $ab = 0$ 蕴含 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 R 是整环.
5. 对于任意 $a, b \in R$, 有 $-ab := -(ab) = a(-b) = (-a)b$ 且 $(-a)(-b) = ab$.
6. 若 R 是含么环, 则对于任意 $a \in R$ 都有 $(-1)a = -a$.
7. 由例 1.5.12 可知, 对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $a \in R$, $n \cdot a = na$ 是良定义的且本例中的运算法则都成立. 特别的, $0_{\mathbb{N}} \cdot a := 0_R$. 又由注 1.8.1(4) 有 $0_R \cdot a = 0_R$, 因此把 $0_{\mathbb{N}}$ 和 0_R 的下标省略也不会产生歧义. 类似的, 若 R 是含么环, 则 $1_{\mathbb{N}} \cdot a = 1_R \cdot a = a$.

例 1.8.2. 1. 平凡环只含有一个元素 0 , 并且通常也记作 0 . 含有超过一个元素的环称为非平凡环. 平凡环显然是含么的交换环. 若 R 是含么环, 于是对于每个 $a \in R$ 都有 $1_R \cdot a = a$, 则 R 是平凡的当且仅当 $1_R = 0_R$.

2. 设 R 是环, X 是非空集合. 则 R^X 在定义如下运算后是环,

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (fg)(x) := f(x)g(x), \quad x \in X, \quad f, g \in R^X.$$

若 R 是交换环或含么环, 则 R^X 也是 (见例 1.4.3). 特别的, 当 $m \geq 2$ 时, 环 R 的直积 R^m 在定义如下运算后是环,

$$a + b := (a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m), \quad ab := (a_1 b_1, \dots, a_m b_m), \quad a, b \in R^m.$$

若 R 是非平凡的含么环且 X 有至少两个元素, 则 R^X 有零因子.

3. 设 S 是环 R 的非空子集. 若

(SR₁) S 是 $(R, +)$ 的子群.

(SR₂) S 对乘法封闭, 即 $S \cdot S \subseteq S$.

则称 S 是 R 的子环. 显然, $\{0\}$ 和 R 都是 R 的子环. 即便 R 是含么环, S 却不一定含有么元 (见例 1.8.2(5)). 不过, 若 $1_R \in S$, 则 1_R 是 S 的么元. 当然, 若 R 是交换环, 则 S 也是, 但反过来一般不成立.

4. 子环的交仍然是子环.

5. 设 R 是非平凡的含么环,

$$S := \{g \in R^{\mathbb{N}}; \text{对于几乎所有 } n \in \mathbb{N} \text{ 都有 } g(n) = 0 \text{ (即除有限多个外)}\}.$$

则 S 是 $R^{\mathbb{N}}$ 的子环且不含么元.

6. 设 X 是集合, 在 $\mathcal{P}(X)$ 上定义对称差

$$A \Delta B := (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \quad A, B \in \mathcal{P}(X).$$

则 $(\mathcal{P}(X), \Delta, \cap)$ 是含么的交换环.

定义 1.8.4 (环同态). 设 R 和 R' 是环. 称函数 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是环同态, 若 φ 与环运算相容, 即

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \quad a, b \in R.$$

特别的, 若 $R = R'$, 则称 φ 是环自同态.

定义 1.8.5 (环同构). 设 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是环同态. 若 φ 是双射, 则称 φ 是环同构, 并称 R 和 R' 同构. 特别的, 若 $R = R'$, 则称 φ 是环自同构.

注 1.8.3. 1. 环同态 $\varphi: R \rightarrow R'$, 特别的, 还是群同态 $\varphi: (R, +) \rightarrow (R', +)$. φ 的核就是这个群同态的核, 即

$$\ker \varphi := \{a \in R; \varphi(a) = 0\} = \varphi^{-1}(0).$$

2. 零函数

$$\varphi: R \rightarrow R', \quad a \mapsto 0_{R'}$$

是同态且 $\ker \varphi = R$.

3. 设 R 和 R' 是含么环, $\varphi: R \rightarrow R'$ 是同态. 正如注 1.8.3(2) 所示, $\varphi(1_R) = 1_{R'}$ 不一定成立. 这一问题可以看作是, 由于环对乘法这一运算并不构成群所导致的.

二项式定理

接下来, 我们将证明环公理 $(R_1)-(R_3)$ 除了得到注 1.8.1 的结论外还有其他重要的结果.

定理 1.8.4 (二项式定理). 设 a 和 b 是含么环 R 的两个可交换元 (即 $ab = ba$). 则

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

多项式定理

域

公理 1.8.6 (域). 设 K 是非空集合, 其上定义了加法运算

$$+: K \times K \rightarrow K, \quad (a, b) \mapsto a + b,$$

和乘法运算

$$\times: K \times K \rightarrow K, \quad (a, b) \mapsto a \times b.$$

若

(F₁) $(K, +, \times)$ 是含么的交换环.

(F₂) $(K \setminus \{0\}, \times)$ 是 *Abel* 群.

则称 $(K, +, \times)$ 是域.

有序域

形式幂级数

定义 1.8.7 (形式幂级数). 设 R 是非平凡的含么环. 在 $R^{\mathbb{N}}$ 上定义加法运算

$$(p + q)_n := p_n + q_n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad p, q \in R^{\mathbb{N}},$$

并通过卷积定义乘法运算

$$(p \cdot q)_n := \sum_{j=0}^n p_j q_{n-j} = p_0 q_n + p_1 q_{n-1} + \cdots + p_n q_0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad p, q \in R^{\mathbb{N}},$$

其中 $p_n := p(n)$ 称为 p 的第 n 项系数. 在这种情况下, 称 $p \in R^{\mathbb{N}}$ 是 R 上的形式幂级数, 并记 $R[[X]] := (R^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$.

下面的命题表明 $R[[X]]$ 是环. 注意, 这个环与例 1.8.2(2) 中介绍的函数环 $R^{\mathbb{N}}$ 并不相同.

命题 1.8.5. $R[[X]]$ 是含么环, 称为 R 上的形式幂级数环. 若 R 是交换环, 则 $R[[X]]$ 也是.

多项式

多项式函数

多项式的除法

线性因子

多变量多项式

练习

1. 设 a 和 b 是含幺环的可交换元, $n \in \mathbb{N}$. 证明

1. $a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b) \sum_{j=0}^n a^j b^{n-j}.$

2. $a^{n+1} - 1 = (a - 1) \sum_{j=0}^n a^j.$

2. 设 K 是有序域, $a, b, c, d \in K$.

1. 证明不等式 $\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$

2. 证明, 若 $b > 0, d > 0$ 且 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$, 则 $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}.$

3. 证明, 若 $a, b \in K^*$, 则 $\left| \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right| \geq 2.$

1.9 有理数

整数

有理数

命题 1.9.1. $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 是可数集.

多项式的有理零点

平方根

1.10 实数

序完备性

Dedekind 对实数的构造

$\mathbb{R}$ 上的自然序结构

扩展实数系

上确界与下确界的刻画

命题 1.10.1.

Archimedes 公理

命题 1.10.2 (Archimedes 公理). $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中没有上界, 即对于每个 $x \in \mathbb{R}$ 都存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n > x$.

推论 1.10.3. 1. 设 $a \in \mathbb{R}$. 若对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $0 \leq a \leq 1/n$, 则 $a = 0$.

2. 对于每个 $a \in \mathbb{R}$ 且 $a > 0$ 都存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $1/n < a$.

有理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性

命题 1.10.4. 对于任意 $a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $a < b$, 都存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使得 $a < r < b$.

n 次方根

注 1.10.5.

无理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性

区间

练习

1 (算术-几何平均值不等式). 设 $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n > 0$, 称 $(\prod_{j=1}^n x_j)^{1/n}$ 和 $(1/n) \sum_{j=1}^n x_j$ 是 $x_1, \dots, x_n$ 的几何平均和算术平均. 证明

$$\left(\prod_{j=1}^n x_j\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j .$$

1.11 复数

复数的构造

基本性质

注 1.11.1.

复数的运算

命题 1.11.2.

命题 1.11.3. 设 $z, w \in \mathbb{C}$.

1. $|zw| = |z||w|$.
2. 对于任意 $z \in \mathbb{R}$ 都有 $|z|_{\mathbb{C}} = |z|_{\mathbb{R}}$.
3. $|\Re z| \leq |z|$, $|\Im z| \leq |z|$, $|z| = |\bar{z}|$.
4. $|z| = 0$ 当且仅当 $z = 0$.
5. (三角不等式) $|z + w| \leq |z| + |w|$.
6. 对于任意 $z \in \mathbb{C}^*$ 都有 $z^{-1} = 1/z = \bar{z}/|z|^2$.

推论 1.11.4 (反三角不等式).

$$|z - w| \geq \left| |z| - |w| \right|, \quad z, w \in \mathbb{C}.$$

$\mathbb{K}$ 中的球

1.12 向量空间、仿射空间与代数

线性代数无疑是所有数学研究领域中最肥沃的一支, 并且为数学各个分支中许多影响深远的理论奠定了基础. 尤其是, 线性代数是分析学的主要工具之一, 因此本节将介绍其基本概念, 并配以例子加以说明. 我们的目标依然是: 能够识别那些在后续章节中以不同形式频繁出现的简单代数结构. 若要作更深入的研究, 读者可参阅线性代数的丰富文献, 例如: [Art91]、[Gab96]、[Koe83]、[Wal82] 和 [Wal85].

在下文中, K 表示一个任意的域.

向量空间

公理 1.12.1 (向量空间). 设 $(K, +, \times)$ 是域, V 是非空集合, 其上定义了“内”运算向量加法

$$\oplus: V \times V \rightarrow V, \quad (v, w) \mapsto v \oplus w,$$

和“外”运算标量乘法

$$\cdot: K \times V \rightarrow V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v.$$

若

(VS₁) $(V, \oplus)$ 是 *Abel* 群.

且对于任意 $\lambda, \mu \in K$ 和 $v, w \in V$ 都有

(VS₂) 1_K 是 $\cdot$ 的单位元:

$$1_K \cdot v = v.$$

(VS₃) $\cdot$ 对 $\oplus$ 具有分配律:

$$\lambda \cdot (v \oplus w) = \lambda \cdot v \oplus \lambda \cdot w.$$

(VS₄) $\cdot$ 对 $+$ 具有分配律:

$$(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v.$$

(VS₅) $\cdot$ 和 $\times$ 相容:

$$\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \times \mu) \cdot v.$$

则称 $(V, \oplus, \cdot)$ 是域 K 上的向量空间或 K -向量空间.

线性映射

定义 1.12.2 (线性映射). 设 V 和 W 是 K -向量空间. 称函数 $T: V \rightarrow W$ 是 K -线性映射或 K -线性的, 若 T 与向量空间运算相容, 即

$$T(\lambda v + \mu w) = \lambda T v + \mu T w, \quad \lambda, \mu \in K, \quad v, w \in V.$$

定义 1.12.3 (向量空间同态). 设 V 和 W 是 K -向量空间. 称线性映射 $T: V \rightarrow W$ 是向量空间同态, 并将从 V 到 W 的所有线性映射记作 $\text{Hom}(V, W)$. 特别的, 若 $V = W$, 则称 T 是向量空间自同态, 并将 V 上的所有向量空间自同态记作 $\text{End}(V) := \text{Hom}(V, V)$.

定义 1.12.4 (向量空间同构). 设 $T: V \rightarrow W$ 是向量空间同态. 若 T 是双射, 则称 T 是向量空间同构, 并称 V 和 W 同构, 记作 $V \cong W$. 特别的, 若 $V = W$, 则称 T 是向量空间自同构.

当我们说“ V 和 W 是向量空间且 $T: V \rightarrow W$ 是线性函数”时, 总是默认 V 和 W 是定义在同一个域上的向量空间.

注 1.12.1. 1. 对于线性映射 $T: V \rightarrow W$, 当 $v \in V$ 时, 在不会引起混淆的情况下, 通常把 $T(v)$ 记作 Tv .

2. 向量空间同态 $T: V \rightarrow W$, 特别的, 还是群同态 $T: (V, +) \rightarrow (W, +)$. 因此, $T0 = 0$ 且对于任意 $v \in V$ 都有 $T(-v) = -Tv$. T 的核或零空间就是这个群同态的核, 即

$$\ker T = \{v \in V; Tv = 0\} = T^{-1}0.$$

因此, T 是单射当且仅当其核是平凡的, 即 $\ker T = \{0\}$ (见注 1.7.2 的 1 和 4).

3. 设 U, V 和 W 是 K -向量空间. 则对于任意 $S \in \text{Hom}(U, V)$ 和 $T \in \text{Hom}(V, W)$ 都有 $T \circ S \in \text{Hom}(U, W)$.

4. V 的自同构集合 $\text{Aut}(V)$, 即所有从 V 到自身的双射的线性映射所构成的集合, 是 V 的置换群的子群, 称为 V 的自同构群.

例 1.12.2. 设 V 和 W 是 K -向量空间.

1. 一个零或平凡 (向量) 空间只包含一个向量 0 , 通常直接记作 0 . 任何其他向量空间都是非平凡的.

2. 设 U 是 V 的非空子集. 若

(SS₁) U 是 $(V, +)$ 的子群.

(SS₂) U 对标量乘法封闭, 即 $K \cdot U \subseteq U$.

则称 U 是 V 的子空间. 容易验证, U 是 V 的子空间, 当且仅当 U 对 V 的两种运算都封闭, 即

$$U + U \subseteq U, \quad K \cdot U \subseteq U.$$

3. 设 $T: V \rightarrow W$ 是线性映射. 则 $\ker T$ 是 V 的子空间, $\operatorname{im} T$ 是 W 的子空间. 若 T 是单射, 则 $T^{-1} \in \operatorname{Hom}(\operatorname{im} T, V)$.
4. 当把域上的运算视为向量空间上的运算时, K 自身就是以 K 为数域的向量空间.
5. 设 X 是集合. 则 V^X 在定义如下运算 (见例 1.4.3) 后是 K -向量空间,

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) := \lambda f(x), \quad x \in X, \quad \lambda \in K, \quad f, g \in V^X.$$

特别的, K^m ($m \in \mathbb{N}^*$) 在定义如下运算后是 K -向量空间,

$$x + y := (x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m), \quad \lambda x := (\lambda x_1, \dots, \lambda x_m), \quad \lambda \in K, \quad x, y \in K^m.$$

显然, K^1 和 K (作为 K -向量空间) 是相同的.

向量空间的基

仿射空间

仿射映射

多项式插值

代数

公理 1.12.5 (代数). 设 $(A, \oplus, \cdot)$ 是 K -向量空间, 其上定义了向量乘法

$$\otimes: A \times A \rightarrow A, \quad (a, b) \mapsto a \otimes b.$$

若

(A₁) $(A, \oplus, \otimes)$ 是环.

(A₂) $\otimes$ 和 $\cdot$ 相容:

$$\lambda \cdot (v \otimes w) = (\lambda \cdot v) \otimes w = v \otimes (\lambda \cdot w), \quad \lambda \in K, \quad v, w \in A.$$

则称 $(A, \oplus, \cdot, \otimes)$ 是域 K 上的代数或 K -代数.

例 1.12.3. 1. 设 B 是 K -代数 A 的非空子集. 若

(SA₁) B 是 A 的子空间.

(SA₂) B 对向量乘法封闭, 即 $B \otimes B \subseteq B$.

则称 B 是 A 的子代数.

2. 设 X 是非空集合. 则 K^X 在定义例 1.8.2(2) 和例 1.12.2(5) 的运算后是含么的交换 K -代数.

差分算子与求和公式

Newton 插值多项式

第 2 章 收敛性

从本章开始, 我们终于进入分析的领域. 数学的这一分支在很大程度上是建立在“收敛”这一概念之上的. 借助收敛, 我们在某种意义上得以把无穷多个数 (或向量) “加”在一起. 能够处理这样的无限运算, 正是分析与代数之间本质区别之所在.

试图把关于数列收敛的朴素想法加以公理化, 会自然地引出“距离”、“点的邻域”以及“度量空间”等概念——这正是第 2.1 节的主题. 在数列这一特殊情形中, 我们可以利用数域 $\mathbb{R}$ 的向量空间结构, 对这种情形下各种证明的分析表明: 只要有某种类似“绝对值”的概念可用, 其中大多数证明都可以推广到向量空间中的向量序列. 于是我们很自然地引向去定义“赋范向量空间”——度量空间中一个尤其重要的类别.

在所有赋范向量空间中, 内积空间由于其结构更为丰富而显得尤为重要, 并且它们的几何性质与我们熟悉的平面 Euclid 几何非常相似. 事实上, 在初等分析中, 最重要的一类内积空间就是 m -维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{C}^m$.

在第 2.4 和第 2.5 节中, 我们回到最简单的情形, 也就是在 $\mathbb{R}$ 中的收敛问题. 借助实数的序结构, 尤其是 $\mathbb{R}$ 的序完备性, 我们推导出第一批“具体的收敛判别准则”. 这些准则使我们能够求出许多重要数列的极限. 除此之外, 我们还将从 $\mathbb{R}$ 的序完备性出发, 得到一个根本性的存在性原理——Bolzano-Weierstrass 定理.

第 2.6 节专门讨论度量空间中的“完备性”概念. 将这一概念限制到赋范向量空间, 就得到了“Banach 空间”的定义. 这类空间最基本的例子就是 $\mathbb{R}^m$, 但我们还将说明: 有界函数构成的函数空间也是 Banach 空间.

Banach 空间在分析中无处不在, 因此在本书的叙述中居于核心地位. 即便如此, 它们的结构仍然足够简单, 使得初学者可以在不太费力的情况下, 从理解实数自然过渡到理解 Banach 空间. 再者, 对这些空间的较早引入, 也使得我们在后面章节中能够给出简洁而优美的证明.

为了内容的完整性, 也为了读者整体 (数学) 素养的培养, 我们在第 2.6 节中给出 Cantor 关于“序完备的有序域存在性”的证明, 这个证明是通过对 $\mathbb{Q}$ 进行“完备化”而得到的.

在本章余下的各节中, 我们将讨论级数的收敛性. 在第 2.7 节里, 我们会学习级数的基本性质, 并讨论若干最重要的例子. 这样一来, 我们就能够研究实数的十进制表示以及其他形式的表示, 从而证明实数集是不可数集.

在所有收敛级数当中, 绝对收敛的级数具有尤为重要的地位. 绝对收敛往往比较容易判别, 这类级数在运算与处理上也相对简单. 此外, 在实际应用中许多重要的级数都是绝对收敛的. 对于本章最后一节将要引入和研究的幂级数, 这一点尤为明显. 其中最重要的例子是指数级数, 它的重要性将在后续章节中逐渐显现出来.

2.1 序列的收敛性

在本节中, 我们考虑定义在自然数集上的函数, 因此这类函数只会取到可数多个值. 对这样的函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow X$, 我们特别关心的是它在“当 n 趋于无穷大时”各个取值 $\varphi(n)$ 的行为. 由于我们实际上只能对 φ 进行有限次求值, 也就是说, 我们永远不可能真正“到达无穷大”, 因此必须发展出一些方法, 使我们能够对“靠近无穷远处”的无穷多个函数值建立命题并加以证明. 这样的方法就构成了收敛序列的理论, 本节将对其进行介绍.

序列

定义 2.1.1 (序列). 设 X 是集合. 称函数

$$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow X$$

是 X 中的序列, 记作

$$(x_n), \quad (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{或} \quad (x_0, x_1, x_2, \dots),$$

并称

$$x_n := \varphi(n)$$

是序列的第 n 项.

定义 2.1.2 (数列). $\mathbb{K}$ 中的序列称为数列. 进一步, 将 $\mathbb{K}$ 中的所有数列记作 $s := s(\mathbb{K}) := \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, 于是 s 构成了 $\mathbb{K}$ -向量空间 (见例 1.12.2(5)). 最后, $\mathbb{R}$ 中的数列称为实数列, $\mathbb{C}$ 中的数列称为复数列.

注 2.1.1. 1. 区分序列 (x_n) 和它的像 $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ 是很重要的. 例如, 若对于任意 n 有 $x_n = x$, 也就是说 (x_n) 是一个常序列, 此时 $(x_n) = (x, x, x, \dots)$, 而 $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ 是单点集 $\{x\}$.

2. 设 (x_n) 是 X 中的序列, E 是某个性质. 称 E 对 (x_n) 的几乎所有项都成立, 若存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq m$ 时命题 $E(x_n)$ 都成立. 也就是说, 除了至多有限多个 x_n 以外, E 对其余所有 x_n 都成立. 当然, E 也可以对若干个 (甚至全部) $n < m$ 的项成立. 若存在 $N \subseteq \mathbb{N}$ 满足 $|N| = \aleph_0$ 且 $E(x_n)$ 对于所有 $n \in N$ 都成立, 则称 E 对 (x_n) 的无穷多项都成立. 例如, 实数列

$$\left(-5, 4, -3, 2, -1, 0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, -\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n+1}, \dots\right)$$

有无穷多个正项, 无穷多个负项, 并且对于几乎所有项都有其绝对值小于 1.

3. 对于任意 $m \in \mathbb{N}^*$, 函数

$$\psi: m + \mathbb{N} \rightarrow X$$

也称为 X 中的序列。也就是说,


$$(x_j)_{j \geq m} = (x_m, x_{m+1}, x_{m+2}, \dots)$$

是 X 中的序列, 尽管其下标不是从 0 开始. 这种约定是合理的, 因为通过映射

$$\mathbb{N} \rightarrow m + \mathbb{N}, \quad n \mapsto m + n$$

对下标进行“重新编号”之后, 这个“平移后的序列” $(x_j)_{j \geq m}$ 就可以与通常意义下的序列 $(x_{m+k})_{k \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ 对应起来.

如果把复数列 $(z_n)_{n \geq 1}$ 的前几项画在复平面上, 其中 $z_n := (1 - 1/n)(1 + i)$, 就会发现: 当 n 增大时, 这些点 z_n 会“任意接近” $z := 1 + i$. 换句话说, 随着 n 的增大, z_n 到 z 的距离会变得“任意小”. 本节的目标, 就是把对于这类数列收敛的直观几何想法加以公理化, 使之能够推广应用到向量空间中的序列, 以及更抽象的集合中的序列上.



首先我们要意识到, “距离”这一概念居于核心地位. 在数域 $\mathbb{K}$ 中, 我们可以借助绝对值函数来确定两点之间的距离. 若要研究某个任意集合 X 中序列的收敛性, 我们首先需要在 X 上赋予一种结构, 使得可以在 X 的任意两个元素之间定义“距离”.

度量空间

公理 2.1.3 (度量). 设 X 是集合, 其上定义了函数

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y).$$

若对于任意 $x, y, z \in X$ 都有

(M₁) (正定性) $d(x, y) \geq 0$, 其中 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$.

(M₂) (对称性) $d(x, y) = d(y, x)$.

(M₃) (三角不等式) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

则称 d 是 X 上的度量. 进一步, 称 (X, d) 是度量空间.

当度量在上下文中明确时, 我们把 (X, d) 简写为 X . 最后, 我们称 $d(x, y)$ 是度量空间 X 中点 x 和 y 之间的距离.

(M₁)-(M₃) 显然是对“距离函数”非常自然的要求. 举例来说, (M₃) 可以被看作这样一条规则的公理化表述: “从 x 到 y 的‘直达路径’比先从 x 到 z 再从 z 到 y 的路径更短”.

定义 2.1.4 (开球和闭球). 设 (X, d) 是度量空间, $a \in X, r > 0$. 称集合

$$\mathbb{B}(a, r) := \{x \in X; d(x, a) < r\}$$

是以 a 为中心, r 为半径的开球. 并称集合

$$\bar{\mathbb{B}}(a, r) := \{x \in X; d(x, a) \leq r\}$$

是以 a 为中心, r 为半径的闭球.

例 2.1.2. 1. 函数

$$|\cdot|: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto |x - y|$$

是 $\mathbb{K}$ 上的度量, 称为自然度量.

证明. 由命题 1.11.3 可以直接验证 $|\cdot|$ 满足度量公理. □

除非另有说明, 否则默认 $\mathbb{K}$ 是赋予了自然度量的度量空间.¹

2. 设 (X, d) 是度量空间, Y 是 X 的非空子集. 则 d 在 $Y \times Y$ 上的限制 $d_Y := d|_{Y \times Y}$ 是 Y 上的度量, 称为诱导度量. 进一步, 称 (Y, d_Y) 是 (X, d) 的子空间. 在不会引起混淆的情况下, 我们往往直接写 d , 而不特别区分 d_Y .
3. $\mathbb{C}$ 的任意非空子集, 在从 $\mathbb{C}$ 的自然度量诱导出来的度量之下, 都是度量空间. 以这种方式在 $\mathbb{R}$ 上得到的度量, 正好就是在例 2.1.2(1) 中定义的那个自然度量.
4. 设 X 是非空集合. 则函数

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y, \end{cases}$$

是 X 上的度量, 称为离散度量.

5. 设 $(X_j, d_j), 1 \leq j \leq m$ 是度量空间, $X := X_1 \times \cdots \times X_m$. 则函数

$$d(x, y) := \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in X$$

¹注意, 在这样的约定下, 上文给出的关于开球和闭球的定义 (应用于 $\mathbb{K}$) 与第 1.11 节中给出的定义是一致的.

是 X 上的度量, 称为积度量. 进一步, 称 (X, d) 是 (X_j, d_j) 的积空间. 可以验证, 对于任意 $a \in X$ 和 $r > 0$ 都有

$$\mathbb{B}_X(a, r) = \prod_{j=1}^m \mathbb{B}_{X_j}(a_j, r), \quad \bar{\mathbb{B}}_X(a, r) = \prod_{j=1}^m \bar{\mathbb{B}}_{X_j}(a_j, r).$$

度量公理的一个重要结论是反三角不等式 (见推论 1.11.4).

命题 2.1.3 (反三角不等式). 设 (X, d) 是度量空间. 则

$$d(x, y) \geq |d(x, z) - d(z, y)|, \quad x, y, z \in X.$$

证明. 设 $x, y, z \in X$. 由 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 可得

$$d(x, y) \geq d(x, z) - d(y, z),$$

交换 x 和 y 可得

$$d(x, y) = d(y, x) \geq d(y, z) - d(z, x) = -(d(x, z) - d(z, y)),$$

即 $d(x, y) \geq |d(x, z) - d(z, y)|$. □

定义 2.1.5 (邻域). 设 X 是度量空间, $U \subseteq X$, $a \in X$. 若存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{B}(a, r) \subseteq U$, 则称 U 是 a 的邻域. 进一步, 称 a 的邻域的全体是 a 的邻域系, 记作

$$\mathcal{N}(a) := \{U \subseteq X; U \text{ 是 } a \text{ 的邻域}\}.$$

例 2.1.4. 设 X 是度量空间, $a \in X$.

1. 对于每个 $\varepsilon > 0$, $\mathbb{B}(a, \varepsilon)$ 和 $\bar{\mathbb{B}}(a, \varepsilon)$ 都是 a 的邻域, 称为 a 的开 ε -邻域和闭 ε -邻域.
2. 显然 $X \in \mathcal{N}(a)$. 若 $U_1, U_2 \in \mathcal{N}(a)$, 则 $U_1 \cap U_2$ 和 $U_1 \cup U_2$ 也是 a 的邻域. 任意包含了 a 的邻域的集合同样是 a 的邻域.

证明. 设 $U_1, U_2 \in \mathcal{N}(a)$. 故存在 $r_1, r_2 > 0$ 使得 $\mathbb{B}(a, r_1) \subseteq U_1$ 和 $\mathbb{B}(a, r_2) \subseteq U_2$. 令 $r = \min\{r_1, r_2\}$, 于是

$$\mathbb{B}(a, r) \subseteq U_1 \cap U_2 \subseteq U_1 \cup U_2,$$

即 $U_1 \cap U_2$ 和 $U_1 \cup U_2$ 是 a 的邻域. □

3. 设 $X := [0, 1]$ 赋予了在 $\mathbb{R}$ 上诱导的度量. 则 $[1/2, 1]$ 是 1 的邻域, 但不是 1/2 的邻域.

在本节的其余部分里, 设 $X := (X, d)$ 是度量空间, (x_n) 是 X 中的序列.

聚点

定义 2.1.6 (聚点). 若 $a \in X$ 的任意邻域都包含了序列 (x_n) 的无穷多项, 则称 a 是 (x_n) 的聚点.

在讨论一些具体例子之前, 先给出下面这个关于聚点的刻画会对之后的讨论很有帮助.

命题 2.1.5. 以下命题是等价的.

1. a 是 (x_n) 的聚点.
2. 对于任意 $U \in \mathcal{N}(a)$ 和 $m \in \mathbb{N}$, 存在 $n \geq m$ 使得 $x_n \in U$.
3. 对于任意 $\varepsilon > 0$ 和 $m \in \mathbb{N}$, 存在 $n \geq m$ 使得 $x_n \in \mathbb{B}(a, \varepsilon)$.

证明. 由聚点的定义可以直接得到. □

例 2.1.6. 1. 实数列 $((-1)^n)$ 有两个聚点, 1 和 -1 .

2. 复数列 (i^n) 有四个聚点, ± 1 和 $\pm i$.
3. 常数列 $(x, x, x, \dots)$ 有唯一的聚点 x .
4. 自然数序列 (n) 没有聚点.
5. 设 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ 是双射 (由命题 1.9.1 可知这样的函数存在). 定义序列 (x_n) , 其中 $x_n := \varphi(n)$, $n \in \mathbb{N}$. 则每个实数都是 (x_n) 的聚点.

证明. 假设 $a \in \mathbb{R}$ 不是 (x_n) 的聚点. 由命题 2.1.5 可知, 存在 $\varepsilon > 0$ 和 $m \in \mathbb{N}$, 使得

$$x_n \notin \mathbb{B}(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon), \quad n \geq m.$$

这意味着区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 仅包含了有限多个有理数, 这与命题 1.10.4 矛盾. □

收敛性

定义 2.1.7 (收敛). 若存在 $a \in X$ 使得 a 的任意邻域都包含了序列 (x_n) 的几乎所有项, 则称 (x_n) 收敛, 记作²

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty).$$

并称当 n 趋于无穷大时, (x_n) 收敛到 a 或以 a 为极限. 若 (x_n) 不收敛, 则称 (x_n) 发散.

²在不会引起混淆的情况下, 我们同样记作 $\lim x_n = a$ 或 $x_n \rightarrow a$.

这个定义中最核心的部分是要求：极限的每个邻域都包含该序列的几乎所有项. 在 $X = \mathbb{K}$ 的情形下，这一要求正对应于那种 x_n 到 a 的距离“变得任意小”的几何直觉. 如果 a 是 (x_n) 的聚点且 U 是 a 的邻域，那么当然， U 会包含序列的无穷多项，但同时也有可能序列的无穷多项也不落在 U 中.

下一个命题是对收敛的等价刻画.

命题 2.1.7. 以下命题是等价的.

1. $\lim x_n = a$.
2. 对于任意 $U \in \mathcal{N}(a)$, 存在³ $N := N(U) \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in U$.
3. 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在⁴ $N := N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in \mathbb{B}(a, \varepsilon)$.

证明. 由收敛的定义可以直接得到. □

下面这些例子都比较简单. 对于更复杂的例子，我们需要第 2.4 节发展出的那些方法.

例 2.1.8. 1. 设实数列 $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, 则 $\lim 1/n = 0$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由推论 1.10.3 可知, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得 $1/N < \varepsilon$, 于是

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

即当 $n \geq N$ 时 $1/n \in \mathbb{B}(0, \varepsilon)$. □

2. 设复数列 (z_n) , 其中

$$z_n := \frac{n+2}{n+1} + i \frac{2n}{n+2},$$

则 $\lim z_n = 1 + 2i$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由推论 1.10.3 可知, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $1/N < \varepsilon/8$, 此时有

$$\left(\frac{n+2}{n+1} - 1\right)^2 = \left(\frac{1}{n+1}\right)^2 < \frac{1}{N^2} < \frac{\varepsilon^2}{64} < \frac{\varepsilon^2}{2}, \quad n \geq N,$$

和

$$\left(\frac{2n}{n+2} - 2\right)^2 = \left(\frac{4}{n+2}\right)^2 < \frac{16}{N^2} < \frac{\varepsilon^2}{4} < \frac{\varepsilon^2}{2}, \quad n \geq N,$$

于是

$$\begin{aligned} |z_n - (1 + 2i)| &= \left| \frac{1}{n+1} - i \frac{4}{n+2} \right| \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{n+1}\right)^2 + \left(-\frac{4}{n+2}\right)^2} < \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{2} + \frac{\varepsilon^2}{2}} < \varepsilon, \quad n \geq N, \end{aligned}$$

即当 $n \geq N$ 时 $z_n \in \mathbb{B}((1 + 2i), \varepsilon)$. □

³我们使用这样的符号来表示数字 N , 是由于 N 通常依赖于 U .

⁴我们使用这样的符号来表示数字 N , 是由于 N 通常依赖于 ε .

3. 常序列 $(a, a, a, \dots)$ 收敛到 a .
4. 实数列 $((-1)^n)$ 发散.
5. 设 X 是度量空间 (X_j, d_j) , $1 \leq j \leq m$ 的积空间. 则序列⁵ $(x_n) = ((x_n^1, \dots, x_n^m))$ 收敛到点 $a := (a^1, \dots, a^m) \in X$ 当且仅当对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有序列 (x_n^j) 收敛到点 $a^j \in X_j$.

证明. $\implies$. 设 (x_n) 收敛到点 a . 则任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$x_n = (x_n^1, \dots, x_n^m) \in \mathbb{B}_X(a, \varepsilon) = \prod_{j=1}^m \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon), \quad n \geq N,$$

即当 $n \geq N$ 时, 对于每个 j 都有 $x_n^j \in \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon)$.

$\impliedby$. 设对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 (x_n^j) 收敛到点 a^j . 任取 $\varepsilon > 0$, 则对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$, 存在 $N_j \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N_j$ 时 $x_n^j \in \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon)$. 令 $N = \max_{1 \leq j \leq m} N_j$, 于是

$$(x_n^1, \dots, x_n^m) = x_n \in \prod_{j=1}^m \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon) = \mathbb{B}_X(a, \varepsilon), \quad n \geq N.$$

(见例 2.1.2(5)).

□

有界集合

定义 2.1.8 (有界集合). 称集合 $Y \subseteq X$ 在 X 中 d -有界或有界, 若存在 $M > 0$ 使得对于任意 $x, y \in Y$ 都有 $d(x, y) \leq M$. 进一步, 称

$$\text{diam } Y := \sup_{x, y \in Y} d(x, y)$$

是 Y 的直径. 最后, 称序列 (x_n) 有界, 若它的像 $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ 有界.

例 2.1.9. 1. 对于任意 $a \in X$ 和 $r > 0$, $\mathbb{B}(a, r)$ 和 $\bar{\mathbb{B}}(a, r)$ 在 X 中有界.

2. 有界集合的每个子集都是有界的. 有界集合的有限并是有界的.
3. 集合 $Y \subseteq X$ 在 X 中有界, 当且仅当存在 $x \in X$ 和 $r > 0$ 使得 $Y \subseteq \mathbb{B}_X(x, r)$. 若 $Y \neq \emptyset$, 则存在 $x \in Y$ 也满足该性质.
4. 有界区间是有界的.
5. 集合 $Y \subseteq \mathbb{K}$ 有界, 当且仅当存在 $M > 0$ 使得对于任意 $y \in Y$ 都有 $|y| \leq M$.

⁵在这之后, 对于 $x \in X$ 和 $1 \leq j \leq m$, 我们通常记 $x^j := \text{pr}_j(x)$. 即使在 $X_j = \mathbb{K}$ 的情况下, 根据上下文也能清晰的分辨出 x^j 是积空间中点的分量还是 x 的幂.

命题 2.1.10 (有界性). 收敛序列必有界.

证明. 设序列 (x_n) 收敛到点 a . 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对于任意 $n \geq N$ 有 $x_n \in \mathbb{B}(a, 1)$. 由三角不等式可得

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, a) + d(a, x_m) < 2, \quad m, n \geq N.$$

令 $M = \max_{m, n < N} d(x_n, x_m)$, 有

$$d(x_n, x_m) \leq M, \quad m, n < N.$$

于是对于任意 $m, n \in \mathbb{N}$ 都有 $d(x_n, x_m) \leq M + 2$. □

极限的唯一性

命题 2.1.11. 设序列 (x_n) 收敛到点 a . 则 a 是 (x_n) 唯一的聚点.

证明. 显然 a 是 (x_n) 的聚点, 现证明唯一性. 假设 b 是 (x_n) 的聚点且 $a \neq b$. 取 $\varepsilon = d(a, b)/2$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in \mathbb{B}(a, \varepsilon)$. 而 b 是 (x_n) 的聚点, 故存在 $m \geq N$ 使得 $x_m \in \mathbb{B}(b, \varepsilon)$. 由命题 2.1.3 可知

$$d(a, x_m) \geq |d(a, b) - d(b, x_m)| > 2\varepsilon - \varepsilon = \varepsilon,$$

即 $x_m \notin \mathbb{B}(a, \varepsilon)$, 矛盾, 因此 b 不是 (x_n) 的聚点. □

注 2.1.12. 命题 2.1.11 的逆命题不成立, 也就是说, 存在发散但具有唯一聚点的序列. 例如, $(\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \dots)$.

推论 2.1.13 (唯一性). 收敛序列的极限唯一.

证明. 由命题 2.1.11 可以直接得到. □

子序列

定义 2.1.9 (子序列). 设 $\varphi = (x_n)$ 是 X 中的序列, $\psi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是严格递增函数. 称 $\varphi \circ \psi$ 是 φ 的子序列, 记作

$$(x_{n_k}) \quad \text{或} \quad (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}},$$

其中 $n_k := \psi(k)$.

因为 ψ 是严格递增的, 故 $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$.

例 2.1.14. 数列 $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有两个子数列, $((-1)^{2k})_{k \in \mathbb{N}} = (1, 1, 1, \dots)$ 和 $((-1)^{2k+1})_{k \in \mathbb{N}} = (-1, -1, -1, \dots)$.

命题 2.1.15. 若序列 (x_n) 收敛到点 a , 则 (x_n) 的每个子序列 (x_{n_k}) 都收敛且以 a 为极限.

证明. 设 (x_n) 收敛到 a . 任取 $U \in \mathcal{N}(a)$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in U$. 由子序列的定义可知, 对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $n_k \geq k$, 因此当 $k \geq N$ 时 $n_k \geq N$, 于是 $x_{n_k} \in U$. 即 (x_{n_k}) 收敛到 a . $\square$

例 2.1.16. 当 $m \geq 2$ 时,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^m} = 0 \quad \text{且} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{m^k} = 0.$$

证明. 令 $\psi_1(k) := k^m$, $\psi_2(k) := m^k$. 由于 $\psi_i: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$, $i = 1, 2$ 是严格递增的, 因此 (k^{-m}) 和 (m^{-k}) 是 $(1/n)$ 的子数列. 于是由例 2.1.8(1) 和命题 2.1.15 可得. $\square$

下面的命题是对聚点的进一步刻画.

命题 2.1.17. 点 a 是序列 (x_n) 的聚点, 当且仅当存在 (x_n) 的子序列 (x_{n_k}) 收敛到 a .

证明. $\Rightarrow$. 设 a 是 (x_n) 的聚点. 下面递归构造序列 (n_k) ,

$$n_0 := 0, \quad n_k := \min \{ m \in \mathbb{N}; m > n_{k-1} \text{ 且 } x_m \in \mathbb{B}(a, 1/k) \}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

由于 a 是 (x_n) 的聚点, 故

$$\{ m \in \mathbb{N}; m \geq n_{k-1} \text{ 且 } x_m \in \mathbb{B}(a, 1/k) \} \neq \emptyset, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

由良序原理可知, 对于每个 $k \in \mathbb{N}^*$, n_k 是良定义的. 于是 (n_k) 是良定义且严格递增的. 任取 $\varepsilon > 0$, 由推论 1.10.3 可知, 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得 $1/K < \varepsilon$, 由 n_k 的定义可知

$$x_{n_k} \in \mathbb{B}(a, 1/k) \subseteq \mathbb{B}(a, \varepsilon), \quad k \geq K,$$

即 (x_{n_k}) 收敛到 a .

$\Leftarrow$. 设 (x_n) 的子序列 (x_{n_k}) 收敛到 a . 任取 $U \in \mathcal{N}(a)$, $m \in \mathbb{N}$. 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq \max\{m, K\}$ 时 $x_{n_k} \in U$, 因此 a 是 (x_n) 的聚点. $\square$

练习

1. 设 d 是 $\mathbb{K}$ 上的离散度量, $X := (\mathbb{K}, d)$.

1. 设 $a \in X$ 和 $r > 0$, 给出 $\mathbb{B}_X(a, r)$ 和 $\bar{\mathbb{B}}_X(a, r)$ 的具体描述.

2. 描述 X 中任意序列的聚点.

3. 设 $a \in X$, 描述 X 中所有收敛到 a 的序列.

2. 证明例 2.1.2(5) 的断言.

3. 设 $z_n := (1 - 1/n)(1 + i)$. 证明数列 $(z_n)_{n \geq 1}$ 收敛到 $1 + i$.

4. 证明例 2.1.9 的断言.

5. 找出复数列 (z_n) 在下列情况下的全部聚点.

1. $z_n := ((1+i)/\sqrt{2})^n$.

2. $z_n := (1 + (-1)^n)(n+1)n^{-1} + (-1)^n$.

3. $z_n := (-1)^n n / (n+1)$.

6. 定义

$$a_n := n + \frac{1}{k} - \frac{k^2 + k - 2}{2}, \quad n \in \mathbb{N},$$

其中 $k \in \mathbb{N}^*$ 满足

$$k^2 + k - 2 \leq 2n \leq k^2 + 3k - 2.$$

证明 (a_n) 是良定义的并找出其所有的聚点. (提示: 先把该数列的前几项具体算出来, 以便更好的把握整个数列的行为.)

7. 对于每个 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 定义

$$d(m, n) := \begin{cases} (m+n)/mn, & m \neq n, \\ 0, & m = n, \end{cases}$$

证明 $(\mathbb{N}^*, d)$ 是度量空间, 对 $n \in \mathbb{N}^*$ 描述 $A_n := \bar{\mathbb{B}}(n, 1 + 1/n)$.

8. 设 $X := \{z \in \mathbb{C}; |z| \leq 3\}$, 并赋予其自然度量. 描述 $\bar{\mathbb{B}}_X(0, 3)$ 和 $\bar{\mathbb{B}}_X(2, 4)$, 并证明 $\bar{\mathbb{B}}_X(2, 4) \subset \bar{\mathbb{B}}_X(0, 3)$.

9 (等价度量). 集合 X 上的度量 d_1 和 d_2 被称为等价度量, 若对于每个 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在 $r_1, r_2 > 0$ 使得

$$\mathbb{B}_1(x, r_1) \subseteq \mathbb{B}_2(x, \varepsilon), \quad \mathbb{B}_2(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_1(x, \varepsilon),$$

其中 $\mathbb{B}_j$ 是 (X, d_j) , $j = 1, 2$ 中的开球. 现在, 设 (X, d) 是度量空间,

$$\delta(x, y) := \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}, \quad x, y \in X.$$

证明 d 和 δ 是 X 上的等价度量. (提示: 函数 $t \mapsto t/(1+t)$ 是递增的.)

10. 设 $X := (0, 1)$. 证明以下命题.

1. $d(x, y) := |(1/x) - (1/y)|$ 是 X 上的度量.

2. 自然度量和 d 是等价的.

3. 在 $\mathbb{R}$ 上不存在这样一个度量: 它与自然度量等价, 并且在 X 上诱导出的度量是 d .

11. 设 (X_j, d_j) , $1 \leq j \leq n$ 是度量空间, $X := X_1 \times \cdots \times X_n$ 且 d 是 X 上的积度量. 证明

$$\delta(x, y) := \sum_{j=1}^n d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in X$$

是 X 上的度量且与 d 等价.

12 (SNCF-度量). 对于每个 $z, w \in \mathbb{C}$, 定义

$$\delta(z, w) := \begin{cases} |z - w|, & \text{若存在 } \lambda > 0 \text{ 使得 } z = \lambda w, \\ |z| + |w|, & \text{其余情况.} \end{cases}$$

证明 δ 是 $\mathbb{C}$ 上的度量, 称为 SNCF-度量.⁶

13. 设 (x_n) 是 $\mathbb{C}$ 中的数列且对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\Re x_n = 0$. 证明, 若 (x_n) 收敛到 x , 则 $\Re x = 0$.

14. 设 (x_n) 是度量空间 X 中的序列. 若 (x_n) 的子序列 (x_{2n+1}) 和 (x_{2n}) 收敛到点 a , 则 (x_n) 也收敛且以 a 为极限.

证明. 任取 $U \in \mathcal{N}(a)$. 则存在 $M, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$x_{2n+1} \in U, \quad x_{2n} \in U, \quad n \geq \max\{M, N\},$$

于是当 $n \geq 2 \max\{M, N\}$ 时 $x_n \in U$. 即 (x_n) 收敛到 a . □

⁶法国铁路系统 (SNCF) 的乘客注意到两个城市 (例如, Bordeaux 和 Lyon) 之间最快的路线通常要经过巴黎.

2.2 实数列与复数列

在本节中, 我们要推导出关于收敛数列计算的最重要的法则. 如果我们把这些数列看作向量空间 $s = s(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ 中的向量, 那么这些法则将证明所有收敛数列构成了 s 的子空间. 在实数列的情形下, 我们将利用 $\mathbb{R}$ 的序结构来推导比较判别法, 而这是研究 $s(\mathbb{R})$ 中数列收敛性的主要工具.

无穷小量

定义 2.2.1 (无穷小量). 称 $\mathbb{K}$ 中的数列 (x_n) 是无穷小量, 若 (x_n) 收敛到 0. 进一步, 将 $\mathbb{K}$ 中的所有无穷小量记作

$$c_0 := c_0(\mathbb{K}) := \{ (x_n) \in s; (x_n) \text{ 收敛且 } \lim x_n = 0 \}.$$

注 2.2.1. 设 (x_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的数列, $a \in \mathbb{K}$.

1. (x_n) 是无穷小量, 当且仅当其绝对值数列 $(|x_n|)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的无穷小量.

证明. 由无穷小量的定义可以直接得到. □

2. (x_n) 收敛到 a , 当且仅当 “平移后的数列” $(x_n - a)$ 是无穷小量.

证明. 由命题 2.1.7 可以直接得到. □

3. 若存在 $\mathbb{R}$ 中的无穷小量 (r_n) 使得对于几乎所有 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $|x_n| \leq r_n$, 则 (x_n) 是无穷小量.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由假设可知存在 $M, N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq M$ 时 $|x_n| \leq r_n$, 当 $n \geq N$ 时 $|r_n| < \varepsilon$. 于是当 $n \geq \max\{M, N\}$ 时 $|x_n| \leq r_n \leq |r_n| < \varepsilon$. □

基本法则

命题 2.2.2. 设 (x_n) 和 (y_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的收敛数列且 $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$, $\alpha \in \mathbb{K}$. 则

1. 数列 $(x_n + y_n)$ 收敛且 $\lim(x_n + y_n) = a + b$.
2. 数列 (αx_n) 收敛且 $\lim \alpha x_n = \alpha a$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$.

(1). 存在 $M, N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq M$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon/2$, 当 $n \geq N$ 时 $|y_n - b| < \varepsilon/2$. 于是

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad n \geq \max\{M, N\}.$$

(2). 若 $\alpha = 0$ 显然成立, 假设 $\alpha \neq 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon/|\alpha|$. 于是

$$|\alpha x_n - \alpha a| = |\alpha| |x_n - a| < |\alpha| \frac{\varepsilon}{|\alpha|} = \varepsilon, \quad n \geq N.$$

□

注 2.2.3. 将 $\mathbb{K}$ 中的所有收敛数列记作

$$c := c(\mathbb{K}) := \{ (x_n) \in s; (x_n) \text{ 收敛} \}.$$

于是, 由命题 2.2.2 可以得到: c 是 s 的子空间且函数

$$\lim: c \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x_n) \mapsto \lim x_n$$

是线性的. 显然 $\ker \lim = c_0$, 于是, 由例 1.12.2(3) 可知, c_0 是 c 的子空间.

下面的命题表明, 对于收敛数列, 我们可以“逐项”相乘.

命题 2.2.4. 设 (x_n) 和 (y_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的数列.

1. 若 (x_n) 是无穷小量且 (y_n) 有界, 则 $(x_n y_n)$ 是无穷小量.

2. 若 $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$, 则 $\lim x_n y_n = ab$.

证明. (1). 由于 (y_n) 有界, 故存在 $M > 0$ 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $|y_n| \leq M$. 任取 $\varepsilon > 0$. 由于 (x_n) 是无穷小量, 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n| < \varepsilon/M$. 于是

$$|x_n y_n| = |x_n| |y_n| < \frac{\varepsilon}{M} M = \varepsilon, \quad n \geq N.$$

(2). 由于 (x_n) 收敛到 a , 故 $(x_n - a)$ 是无穷小量. 由命题 2.1.10 可知, (y_n) 有界. 于是由 1 可得 $((x_n - a)y_n)$ 是无穷小量, 同理可得 $(a(y_n - b))$ 是无穷小量. 由命题 2.2.2 可知

$$\lim(x_n y_n - ab) = \lim((x_n - a)y_n + a(y_n - b)) = 0,$$

于是 $(x_n y_n)$ 收敛到 ab . □

注 2.2.5. 1. 命题 2.2.4(1) 中, 关于序列 (y_n) 有界的假设不能去除.

证明. 设 $x_n := 1/n$, $y_n := n^2$. 则 (x_n) 是无穷小量, 但 $(x_n y_n)$ 发散. □

2. 由例 1.12.3(2) 可知 s 是 $\mathbb{K}$ -代数. 于是, 结合注 2.2.3 和命题 2.2.4(2) 可以得到: c 是 s 的子代数且函数

$$\lim: c \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x_n) \mapsto \lim x_n$$

是代数同态. 最后, 由命题 2.1.10 和命题 2.2.4(1) 可知 c_0 也是 c 的理想.

下面的命题和注 2.2.5(2) 表明, 商数列的极限是分子的极限除以分母的极限, 若这些极限存在的话.

命题 2.2.6. 设 (x_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的收敛数列且 $\lim x_n = a \neq 0$. 则 (x_n) 的几乎所有项都非零且 $\lim 1/x_n = 1/a$.

证明. 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < |a|/2$. 由反三角不等式可得

$$|a| - |x_n| \leq ||a| - |x_n|| \leq |x_n - a| < \frac{|a|}{2}, \quad n \geq N,$$

即当 $n \geq N$ 时 $|x_n| > |a|/2 > 0$, 即 (x_n) 的几乎所有项都非零. 而

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{a} \right| = \frac{|x_n - a|}{|a||x_n|} < \frac{2}{|a|^2} |x_n - a|, \quad n \geq N,$$

由于 (x_n) 收敛到 a , 因此 $(x_n - a)$ 是无穷小量, 进一步, $(2|x_n - a|/|a|^2)$ 是无穷小量. 于是由注 2.2.1(3) 可得 $(1/x_n - 1/a)$ 是无穷小量, 故 $\lim 1/x_n = 1/a$. $\square$

比较判别法

接下来我们将研究收敛实数列与 $\mathbb{R}$ 的序结构之间的关系. 我们将推导出夹逼定理——这是一种简单但非常有效的判定实数列极限的方法.

命题 2.2.7 (保序性). 设 (x_n) 和 (y_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的收敛数列且有无穷多项 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x_n \leq y_n$. 则

$$\lim x_n \leq \lim y_n.$$

证明. 设 $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$. 假设 $a > b$. 令 $\varepsilon := a - b$, 故存在 $M, N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq M$ 时 $x_n > a - \varepsilon/2$, 当 $n \geq N$ 时 $y_n < b + \varepsilon/2$, 故存在 $n \geq \max\{M, N\}$ 使得

$$a - \varepsilon/2 < x_n \leq y_n < b + \varepsilon/2,$$

于是 $\varepsilon = a - b < \varepsilon$, 矛盾. $\square$

注 2.2.8. 命题 2.2.7 在严格不等于下不成立, 即若有无穷多项 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x_n < y_n$ 并不蕴含 $\lim x_n < \lim y_n$.

证明. 设 $x_n := -1/n$, $y_n := 1/n$. 则对于所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $x_n < y_n$, 但 $\lim x_n = \lim y_n = 0$. $\square$

命题 2.2.9 (夹逼定理). 设 (x_n) , (y_n) 和 (z_n) 是实数列且对于几乎所有 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \leq y_n \leq z_n$. 若 $\lim x_n = \lim z_n = a$, 则 $\lim y_n = a$.

证明. 设 $M \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq M$ 时 $x_n \leq y_n \leq z_n$. 任取 $\varepsilon > 0$, 故存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N_1$ 时 $a - \varepsilon < x_n$, 当 $n \geq N_2$ 时 $z_n < a + \varepsilon$. 于是

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon, \quad n \geq \max\{M, N_1, N_2\},$$

即当 $n \geq \max\{M, N_1, N_2\}$ 时 $|y_n - a| < \varepsilon$. □

复数列

若 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的收敛数列且 $\lim x_n = a$, 则 $\lim |x_n| = |a|$. 实际上, 若 (x_n) 是无穷小量, 则是注 2.2.1(1) 的情况. 若 $a > 0$, 则 (x_n) 的几乎所有项都为正 (见练习 2.2.3), 于是 $\lim |x_n| = \lim x_n = a = |a|$. 最后, 若 $a < 0$, 则 (x_n) 的几乎所有项都为负, 于是

$$\lim |x_n| = \lim(-x_n) = -\lim x_n = -a = |a|.$$

下面的命题表明这对复数列同样成立.

命题 2.2.10. 设 (x_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的收敛数列且 $\lim x_n = a$. 则 $(|x_n|)$ 收敛且 $\lim |x_n| = |a|$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$||x_n| - |a|| \leq |x_n - a| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此 $(|x_n|)$ 收敛到 $|a|$. □

$\mathbb{C}$ 中的收敛数列可以用其对应的实部与虚部的收敛性来刻画.

命题 2.2.11. 设 (x_n) 是 $\mathbb{C}$ 中的数列. 以下命题是等价的.

1. (x_n) 收敛.
2. $(\Re x_n)$ 和 $(\Im x_n)$ 收敛.

此时有,

$$\lim x_n = \lim \Re x_n + i \lim \Im x_n.$$

证明. (1) $\implies$ (2). 设 $\lim x_n = x$. 任取 $\varepsilon > 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|\Re x_n - \Re x| = |\Re(x_n - x)| \leq |x_n - x| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此 $(\Re x_n)$ 收敛到 $\Re x$. 同理可得 $(\Im x_n)$ 收敛到 $\Im x$.

(2) $\implies$ (1). 设 $\lim \Re x_n = a$, $\lim \Im x_n = b$. 任取 $\varepsilon > 0$. 故存在 $M, N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq M$ 时 $|\Re x_n - a| < \varepsilon/\sqrt{2}$, 当 $n \geq N$ 时 $|\Im x_n - b| < \varepsilon/\sqrt{2}$, 于是

$$\begin{aligned} |x_n - (a + ib)| &= |(\Re x_n - a) + i(\Im x_n - b)| \\ &= \sqrt{(\Re x_n - a)^2 + (\Im x_n - b)^2} < \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{2} + \frac{\varepsilon^2}{2}} = \varepsilon, \quad n \geq \max\{M, N\}, \end{aligned}$$

因此 x_n 收敛到 $a + ib$. □

我们用一些例子来说明上述命题, 以此结束本节.

例 2.2.12. 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$.

证明. 由于 $\lim 1/(n+2) = 0$, 于是由命题 2.2.2 可知

$$\lim \frac{n+1}{n+2} = \lim \left(1 - \frac{1}{n+2} \right) = 1 - \lim \frac{1}{n+2} = 1.$$

□

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n}{(2n+1)^2} + i \frac{2n^2}{n^2+1} \right) = 2i$.

证明. 令

$$x_n := \frac{3n}{(2n+1)^2} + i \frac{2n^2}{n^2+1}.$$

其中

$$\Re x_n = \frac{3n}{(2n+1)^2} = \frac{3/n}{(2+1/n)^2},$$

由于 $\lim(2+1/n) = 2$, 于是由命题 2.2.4 可知 $\lim(2+1/n)^2 = 4$, 而 $(3/n)$ 是无穷小量, 因此由命题 2.2.4 和命题 2.2.6 可知 $\lim \Re x_n = 0$.

$$\Im x_n = \frac{2n^2}{n^2+1} = \frac{2}{1+1/n^2},$$

而 $\lim(1+1/n^2) = 1$, 于是由命题 2.2.2 和命题 2.2.6 可知 $\lim \Im x_n = 2$. 最后由 2.2.11 可得 $\lim x_n = 2i$. □

3. $\left(\frac{i^n}{1+in} \right)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的无穷小量.

证明. 令

$$x_n := \frac{i^n}{1+in} = \frac{1}{n} \frac{i^n}{i+1/n}.$$

注意到

$$\left| i + \frac{1}{n} \right| = \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} \geq 1, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

于是

$$\left| \frac{i^n}{i+1/n} \right| = \frac{|i^n|}{|i+1/n|} = \frac{1}{|i+1/n|} \leq 1, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

因此 $(i^n/(i+1/n))$ 有界, 由命题 2.2.4 可知 (x_n) 是无穷小量. □

练习

1. 判断下列 $\mathbb{R}$ 中的数列 (x_n) 是否收敛. 若收敛计算其极限.

1. $x_n := \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.

2. $x_n := (-1)^n \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

3. $x_n := \frac{1+2+3+\cdots+n}{n+2} - \frac{n}{2}$.

4. $x_n := \frac{(2-1/\sqrt{n})^{10} - (1+1/n^2)^{10}}{1-1/n^2-1/\sqrt{n}}$.

5. $x_n := (100+1/n)^2$.

证明. (1). 收敛到 0.

(2). 发散.

(3). 收敛到 $-1/2$.

(4). 收敛到 $2^{10} - 1$.

(5). 收敛到 100^2 . □

2. 使用 $(1+1)^n$ 的二项式展开, 证明 $(n^3/2^n)$ 是无穷小量.

证明. 注意到

$$0 \leq \frac{n^3}{2^n} = \frac{n^3}{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}} \leq \frac{n^3}{\binom{n}{4}}, \quad n \geq 4.$$

而当 $n \geq 6$ 时 $n-3 \geq n/2$, 于是

$$\binom{n}{4} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24} \geq \frac{(n/2)^4}{24}, \quad n \geq 6,$$

因此

$$\frac{n^3}{\binom{n}{4}} \leq \frac{n^3}{(n/2)^4/24} = \frac{384}{n} \rightarrow 0.$$

故由夹逼定理可知 $n^3/2^n \rightarrow 0$. □

3 (保号性). 设实数列 (x_n) 有正极限. 证明该数列的几乎所有项都为正.

证明. 设 $\lim x_n = a$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < a/2$, 于是

$$-\frac{a}{2} < x_n - a < \frac{a}{2}, \quad n \geq N,$$

即当 $n \geq N$ 时 $x_n > a/2 > 0$. □

4. 设 (x_j) 是 $\mathbb{K}$ 中的收敛数列且以 a 为极限. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j = a .$$

证明. 只用证

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j - a \right| \rightarrow 0 .$$

注意到

$$0 \leq \left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j - a \right| = \left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - a) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |x_j - a| ,$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由于 $\lim x_j = a$, 故存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $j \geq N$ 时 $|x_j - a| < \varepsilon$, 于是

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |x_j - a| = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{N-1} |x_j - a| + \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n |x_j - a| .$$

令

$$A_n := \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{N-1} |x_j - a| , \quad B_n := \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n |x_j - a| .$$

由于 $\sum_{j=1}^{N-1} |x_j - a|$ 是一个固定的有限和, 因此 $\lim A_n = 0$. 而

$$|B_n| = \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n |x_j - a| < \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n \varepsilon = \frac{n - N + 1}{n} \varepsilon \leq \varepsilon , \quad n \geq N ,$$

因此 $\lim B_n = 0$. 于是

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |x_j - a| = A_n + B_n \rightarrow 0 ,$$

故由夹逼定理可知

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j - a \right| \rightarrow 0 .$$

□

5. 设 $\mathbb{K}^m$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 是赋予了积度量 (见例 2.1.2(5)) 的度量空间,

$$s(\mathbb{K}^m) := (\mathbb{K}^m)^{\mathbb{N}} , \quad c(\mathbb{K}^m) := \{ (x_n) \in s(\mathbb{K}^m) ; (x_n) \text{ 收敛} \} .$$

证明

1. $c(\mathbb{K}^m)$ 是 $s(\mathbb{K}^m)$ 的子空间.

2. 函数

$$\lim: c(\mathbb{K}^m) \rightarrow \mathbb{K}^m , \quad (x_n) \mapsto \lim x_n$$

是线性的.

3. 设 $(\lambda_n) \in c(\mathbb{K})$, $(x_n) \in c(\mathbb{K}^m)$ 且 $\lim \lambda_n = \alpha$, $\lim x_n = a$. 则 $\lim \lambda_n x_n = \alpha a \in \mathbb{K}^m$ (提示: 例 2.1.8(5)).

证明. (1) 和 (2). 设 $(x_n), (y_n) \in c(\mathbb{K}^m)$ 且 $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$, $\alpha \in \mathbb{K}^m$. 故对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 (x_n^j) 收敛到 a^j 和 (y_n^j) 收敛到 b^j . 而在 $\mathbb{K}$ 上时, 对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 $(x_n^j + y_n^j)$ 收敛到 $a^j + b^j$, 因此 $(x_n + y_n)$ 收敛到 $a + b$. 同理可得 (αx_n) 收敛到 αa . 这说明了 $c(\mathbb{K}^m)$ 是 $s(\mathbb{K}^m)$ 的子空间且 $\lim$ 是线性的.

(3). 对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 (x_n^j) 收敛到 a^j . 而在 $\mathbb{K}$ 上时, 对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 $(\lambda_n x_n^j)$ 收敛到 αa^j , 因此 $\lambda_n x_n$ 收敛到 $(\alpha a^1, \dots, \alpha a^m) = \alpha a$. $\square$

6. 设 (x_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的收敛数列且以 a 为极限, $p, q \in \mathbb{K}[X]$ 且 $q(a) \neq 0$. 证明对于有理函数 $r := p/q$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r(x_n) = r(a).$$

特别的, 对于每个多项式 p , 数列 $(p(x_n))$ 都收敛到 $p(a)$.

7. 设 (x_n) 是 $(0, \infty)$ 中的收敛数列且以 $x \in (0, \infty)$ 为极限. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^r = x^r \quad (r \in \mathbb{Q}).$$

(提示: 当 $r = 1/q$ 时, 令 $y_n := (x_n)^r$, $y := x^r$. 则

$$x_n - x = (y_n - y) \sum_{k=0}^{q-1} y_n^k y^{q-1-k},$$

见练习 1.8.1.)

证明. $r = 0$ 时, 显然成立. 令 $r = p/q$ ($p \in \mathbb{Z}^*$, $q \in \mathbb{N}^*$). 令 $y_n := x_n^{1/q}$, $y := x^{1/q}$, 于是

$$x_n - x = y_n^q - y^q = (y_n - y) \sum_{k=0}^{q-1} y_n^k y^{q-1-k},$$

令

$$A_n := \sum_{k=0}^{q-1} y_n^k y^{q-1-k} = \sum_{k=0}^{q-1} x_n^{k/q} x^{(q-1-k)/q},$$

其中对于每个 $k \in \{0, \dots, q-1\}$ 都有 $x_n^{k/q} x^{(q-1-k)/q} > 0$, 因此

$$A_n > x^{(q-1)/q} > 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

故数列 $(1/A_n)$ 有界. 注意到 $(x_n - x)$ 是无穷小量, 而

$$y_n - y = (x_n - x) \frac{1}{A_n},$$

因此 $(y_n - y)$ 也是无穷小量, 即 $x_n^{1/q}$ 收敛到 $x^{1/q}$.

当 $p > 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^p = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdots x_n = x \cdots x = x^p .$$

当 $p < 0$ 时, 令 $s := -p$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n^s} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \cdots \frac{1}{x_n} = \frac{1}{x} \cdots \frac{1}{x} = \frac{1}{x^s} = x^p .$$

最后可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^r = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{p/q} = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^{1/q})^p = (x^{1/q})^p = x^r .$$

□

8. 设 (x_n) 是 $(0, \infty)$ 中的数列. 证明 $(1/x_n)$ 是无穷小量, 当且仅当对于每个 $K > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n > K$.

证明. $\Rightarrow$. 设 $(1/x_n)$ 是无穷小量. 任取 $K > 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left| \frac{1}{x_n} \right| = \frac{1}{x_n} < \frac{1}{K}, \quad n \geq N ,$$

即当 $n \geq N$ 时 $x_n > K$.

$\Leftarrow$. 设对于每个 $K > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n > K$. 任取 $\varepsilon > 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n > 1/\varepsilon$, 即

$$\frac{1}{x_n} = \left| \frac{1}{x_n} \right| < \varepsilon, \quad n \geq N ,$$

故 $(1/x_n)$ 是无穷小量.

□

9. 设 (a_n) 是 $(0, \infty)$ 中的数列,

$$x_n := \sum_{k=0}^n (a_k + 1/a_k), \quad n \in \mathbb{N} .$$

证明 $(1/x_n)$ 是无穷小量. (提示: 当 $a > 0$ 时 $a + 1/a \geq 2$ (见练习 1.8.2), 然后利用练习 2.2.8.)

证明. 任取 $K > 0$. 显然 (x_n) 也是 $(0, \infty)$ 中的数列. 注意到,

$$x_n = \sum_{k=0}^n (a_k + 1/a_k) \geq \sum_{k=0}^n 2 = 2n + 2, \quad n \in \mathbb{N} ,$$

由 Archimedes 公理可知, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $2N + 2 > K$, 于是当 $n \geq N$ 时 $x_n \geq 2n + 2 > K$, 于是 $(1/x_n)$ 是无穷小量.

□

2.3 赋范向量空间

本节我们将考察向量空间上的度量. 当然, 我们希望这些度量与向量空间的结构是相容的, 因此我们先从向量空间 $\mathbb{R}^2$ 入手, 在这个空间里我们已经有了距离的概念. 具体地说, 如果我们用 $\|x\|$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中向量 x 的长度, 那么两点 $x, y \in \mathbb{R}^2$ 之间的距离就是 $\|x - y\|$. 我们将在之后看到, 这确实在 $\mathbb{R}^2$ 上定义了一个度量 (见注 2.3.1(1)). 除了与度量之间的这种关系外, 函数 $x \mapsto \|x\|$ 对于向量空间结构还满足一些特殊的性质:


首先我们注意到, $\mathbb{R}^2$ 中任一向量的长度都是非负的, 也就是说, 对于任意 $x \in \mathbb{R}^2$ 都有 $\|x\| \geq 0$, 并且长度为零的向量仅有零向量.

对于 $x \in \mathbb{R}^2$ 和 $\alpha > 0$, 我们可以把 αx 看作是将向量 x 按比例 α 拉伸 (或压缩) 得到的向量. 如果 $\alpha < 0$, 那么 αx 可以理解为先按比例 $-\alpha$ 对 x 进行拉伸 (或压缩), 再把方向反转得到的向量.



在这两种情形中, 向量 αx 的长度 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

最终, 对于 $\mathbb{R}^2$ 中的任意向量 x, y , 我们有三角不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.



这三个性质足以保证 $\|x - y\|$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的度量. 由于它们也很容易推广到一般的向量空间, 因此我们就很自然地得到如下对赋范向量空间的定义.

范数

公理 2.3.1 (范数). 设 E 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, 其上定义了函数

$$\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|.$$

若对于任意 $\lambda \in \mathbb{K}$ 和 $x, y \in E$ 都有

(N₁) (正定性) $\|x\| \geq 0$, 其中 $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$.

(N₂) (绝对齐次性) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$.

(N₃) (三角不等式) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

则称 $\|\cdot\|$ 是 E 上的范数. 进一步, 称 $(E, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间.⁷

⁷除非另有说明, 否则默认向量空间是 $\mathbb{K}$ -向量空间.

当范数在上下文中明确时, 我们把 $(E, \|\cdot\|)$ 简写为 E .

注 2.3.1. 设 $(E, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间.

1. 函数

$$d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \|x - y\|$$

是 E 上的度量, 称为范数诱导的度量. 因此任意赋范向量空间都是度量空间.

证明. (M_1) 和 (M_2) 可由 (N_1) 和 (N_2) 直接得到. 而由 (N_3) 可得

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y), \quad x, y, z \in E,$$

因此 (M_3) 也成立. $\square$

2. 范数满足反三角不等式,

$$\|x - y\| \geq \left| \|x\| - \|y\| \right|, \quad x, y \in E.$$

证明. 由命题 2.1.3 可知, 对于该范数诱导的度量满足反三角不等式. 因此

$$\|x - y\| = d(x, y) \geq |d(x, 0) - d(0, y)| = \left| \|x\| - \|y\| \right|, \quad x, y \in E.$$

$\square$

3. 因为注 2.3.1(1), 故第 2.1 节中关于度量空间的全部命题同样对 E 成立. 特别的, “邻域”, “聚点” 和 “收敛性” 在 E 上是良定义的. 例如, E 中的序列 (x_n) 收敛到 x 的含义是:

$$x_n \rightarrow x \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N: \|x_n - x\| < \varepsilon.$$

此外, 回顾第 2.2 节可以发现, 只要某个命题的证明中没有用到 $\mathbb{K}$ 的域结构或序结构, 那么该命题同样适用于 E 中的序列. 特别的, 注 2.2.1, 命题 2.2.2 和命题 2.2.10 在任意赋范向量空间中都成立.

球

定义 2.3.2 (开球和闭球). 设 $a \in E, r > 0$. 称

$$\mathbb{B}(a, r) := \{x \in E; \|x - a\| < r\} \quad \text{和} \quad \bar{\mathbb{B}}(a, r) := \{x \in E; \|x - a\| \leq r\}$$

是以 a 为中心, r 为半径的开球和闭球. 特别的, 称

$$\mathbb{B} := \mathbb{B}(0, 1) = \{x \in E; \|x\| < 1\} \quad \text{和} \quad \bar{\mathbb{B}} := \bar{\mathbb{B}}(0, 1) = \{x \in E; \|x\| \leq 1\}$$

是 E 中的单位开球和单位闭球. 并记

$$r\mathbb{B} := \mathbb{B}(0, r), \quad r\bar{\mathbb{B}} := \bar{\mathbb{B}}(0, r), \quad a + r\mathbb{B} := \mathbb{B}(a, r), \quad a + r\bar{\mathbb{B}} := \bar{\mathbb{B}}(a, r).$$

注意, 当度量 d 是由范数诱导得到的时, 该定义与度量空间 (E, d) 中开球和闭球的定义是一致的.

有界集合

定义 2.3.3 (有界集合). 称集合 $X \subseteq E$ 在 E 中有界 (或范数有界), 若 X 在范数诱导的度量空间中有界.

注 2.3.2. 设 $(E, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间.

1. $X \subseteq E$ 有界, 当且仅当存在 $r > 0$ 使得 $X \subseteq r\mathbb{B}$, 即对于任意 $x \in X$ 都有 $\|x\| < r$.
2. 若 X 和 Y 是 E 的有界非空子集, 则 $X \cup Y$, $X + Y$ 和 λX ($\lambda \in \mathbb{K}$) 也是有界的.
3. 例 2.1.2(4) 表明, 在每个向量空间 V 上, 都存在度量使得 V 有界. 但是, 若 V 不是零空间, 则 (N_2) 蕴含了在 V 上不存在具有这种性质的范数.

例子

现在我们为第 1.12 节中介绍的那些向量空间定义合适的范数.

例 2.3.3. 1. 绝对值 $|\cdot|$ 是向量空间 $\mathbb{K}$ 上的范数.

除非另有说明, 否则默认 $\mathbb{K}$ 是赋予了上述范数的赋范向量空间.

2. 设 F 是赋范向量空间 $(E, \|\cdot\|)$ 的子空间. 则 $\|\cdot\|$ 在 F 上的限制 $\|\cdot\|_F := \|\cdot\|_F$ 是 F 上的范数. 因此 F 在该诱导范数 $\|\cdot\|_F$ 下是赋范向量空间. 在不会引起混淆的情况下, 我们使用 $\|\cdot\|$ 来表示 F 上的这个诱导范数.
3. 设 $(E_j, \|\cdot\|_j)$, $1 \leq j \leq m$ 是赋范向量空间, $E := E_1 \times \cdots \times E_m$. 则函数

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq j \leq m} \|x_j\|_j, \quad x \in E$$

是积向量空间 E 上的范数, 称为积范数. 当 d_j 是 $\|\cdot\|_j$ 在 E_j 上诱导的度量时, 则 $\|\cdot\|_\infty$ 在 E 上诱导的度量与例 2.1.2(5) 中的积度量是一致的.

证明. 显然 (N_1) 成立.

$$\|\lambda x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} \|\lambda x_j\|_j = \max_{1 \leq j \leq m} |\lambda| \|x_j\|_j = |\lambda| \|x\|_\infty, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad x \in E,$$

因此 (N_2) 成立.

$$\|x + y\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} \|x_j + y_j\|_j \leq \max_{1 \leq j \leq m} (\|x_j\|_j + \|y_j\|_j) \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty, \quad x, y \in E,$$

最后 (N₃) 成立. 令 d 是 $\|\cdot\|_\infty$ 在 E 上诱导的度量, 于是

$$d(x, y) = \|x - y\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} \|x_j - y_j\|_j = \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in E,$$

因此 d 与积度量是一致的. $\square$

4. $\mathbb{K}^m$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 在定义如下最大范数后是赋范向量空间,

$$|x|_\infty := \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|, \quad x \in \mathbb{K}^m.$$

当 $m = 1$ 时, $(\mathbb{K}^1, |\cdot|_\infty) = (\mathbb{K}, |\cdot|) = \mathbb{K}$.

证明. 这是 (3) 的特殊情况. $\square$

有界函数空间

定义 2.3.4 (有界函数). 设 X 是非空集合, $(E, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间. 称函数 $u \in E^X$ 有界, 若 u 的像在 E 中有界.

注 2.3.4. 定义

$$\|u\|_\infty := \sup_{x \in X} \|u(x)\| \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}, \quad u \in E^X.$$

1. 设 $u \in E^X$. 以下命题是等价的.

- (a) u 有界.
- (b) $u(X)$ 在 E 中有界.
- (c) 存在 $r > 0$ 使得对于任意 $x \in X$ 都有 $\|u(x)\| \leq r$.
- (d) $\|u\|_\infty < \infty$.

2. 显然 $\text{id} \in \mathbb{K}^{\mathbb{K}}$ 是无界的, 因为 $\|\text{id}\|_\infty = \infty$.

注 2.3.4(2) 表明, 当 E 是非平凡向量空间时, $\|\cdot\|_\infty$ 未必是向量空间 E^X 上的范数. 因此我们应该做出如下定义.

定义 2.3.5 (有界函数空间). 称

$$B(X, E) := \{u \in E^X; u \text{ 有界}\},$$

是从 X 到 E 的有界函数空间.

命题 2.3.5. $B(X, E)$ 是 E^X 的子空间且 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $B(X, E)$ 上的范数, 称为上确界范数.

证明. 由注 2.3.2(2) 可知 $B(X, E)$ 是 E^X 的子空间. 由注 2.3.4(1) 可知 $\|\cdot\|_\infty$ 是良定义的,

$$\|u\|_\infty = \sup_{x \in X} \|u(x)\| \geq 0, \quad u \in B(X, E),$$

且 $u = 0$ 当且仅当对于任意 $x \in X$ 都有 $u(x) = 0$, 即 $\|u\|_\infty = 0$, 于是 (N_1) 成立.

$$\|\lambda u\|_\infty = \sup_{x \in X} \|\lambda u(x)\| = \sup_{x \in X} |\lambda| \|u(x)\| = |\lambda| \|u\|_\infty, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad u \in B(X, E),$$

因此 (N_2) 成立.

$$\|u + v\|_\infty = \sup_{x \in X} \|u(x) + v(x)\| \leq \sup_{x \in X} (\|u(x)\| + \|v(x)\|) \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty, \quad u, v \in B(X, E),$$

最后 (N_3) 成立. $\square$

除非另有说明, 否则默认 $B(X, E)$ 是从 X 到 E 且赋予上确界范数 $\|\cdot\|_\infty$ 的有界函数空间.

注 2.3.6. 1. 若 $X := \mathbb{N}$, 则 $B(X, E)$ 是 E 中有界序列的赋范向量空间. 特别的, 若 $E := \mathbb{K}$, 则称

$$\ell_\infty := \ell_\infty(\mathbb{K}) := B(\mathbb{N}, \mathbb{K})$$

是赋予了上确界范数

$$\|(x_n)\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|, \quad (x_n) \in \ell_\infty$$

的有界数列的赋范向量空间.

2. 由命题 2.1.10 可知, 任意收敛序列都是有界的, 于是由注 2.2.3 可得 c_0 和 c 是 ℓ_∞ 的子空间. 因此 c_0 和 c 赋予上确界范数后是赋范向量空间, 且作为子空间有 $c_0 \subseteq c \subseteq \ell_\infty$.
3. 设 $X = \{1, \dots, m\}$ ($m \in \mathbb{N}^*$). 则

$$(B(X, E), \|\cdot\|_\infty) = (E^m, \|\cdot\|_\infty),$$


其中等式左边的 $\|\cdot\|_\infty$ 是上确界范数, 等式右边的 $\|\cdot\|_\infty$ 是例 2.3.3(3) 中的积范数. 因此上确界范数的记号和积范数的记号是一致的, 而不会产生歧义.

内积空间

现在我们考虑赋范向量空间 $(\mathbb{R}^2, |\cdot|_\infty)$. 于是 $\mathbb{R}^2$ 中的单位球为

$$\mathbb{B}_{\mathbb{R}^2} = \{x \in \mathbb{R}^2; |x|_\infty \leq 1\} = \{x \in \mathbb{R}^2; -1 \leq x_1, x_2 \leq 1\},$$

因此, $\mathbb{B}_{\mathbb{R}^2}$ 是平面上的一个正方形, 其边长为 2, 中心在 0.



在任意赋范向量空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中, 称集合 $\{x \in E; \|x\| = 1\}$ 是 $(E, \|\cdot\|)$ 中的单位球面, 也就是单位球的“边界”. 对我们的空间 $(\mathbb{R}^2, |\cdot|_\infty)$ 来说, 这个单位球面就是图中那个正方形的边界. 单位球面上的每一个点到原点的距离都是 1. 当然, 这里的距离是用 $|\cdot|_\infty$ 的诱导度量来定义的, 因此这里的“球”和“球面”的几何外观可能与我们以往的经验不太一样. 在学校, 我们学到: 若点到原点的距离按 Pythagoras 定理定义为“各坐标平方和的平方根”(见第 1.11 节关于 $\mathbb{B}_\mathbb{C}$ 的内容), 那么在平面上得到的就是“圆”的形状. 我们希望把这种距离的想法推广到 $\mathbb{K}^m$ 上, 通过在 $\mathbb{K}^m$ 上定义一个新的范数—Euclid 范数, 这个范数在历史上和实际应用中都很重要. 为了做到这一点, 我们需要先做一些准备工作.

公理 2.3.6 (内积). 设 E 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, 其上定义了函数

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: E \times E \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle.$$

若对于任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ 和 $x, y, z \in E$ 都有⁸

$$(\text{IP}_1) \text{ (共轭对称性)} \quad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

$$(\text{IP}_2) \text{ (对第一个参数线性)} \quad \langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle.$$

$$(\text{IP}_3) \text{ (正定性)} \quad \langle x, x \rangle \geq 0, \text{ 其中 } \langle x, x \rangle = 0 \text{ 当且仅当 } x = 0.$$

则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 E 上的内积. 进一步, 称 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间.

当内积在上下文中明确时, 我们把 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 简写为 E .

注 2.3.7. 1. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, (IP_1) 可以写为

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle, \quad x, y \in E,$$

也就是说当 E 是实向量空间时, 函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是对称的. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, 若 (IP_1) 成立, 则称函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 Hermite 的.

⁸若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 则由命题 1.11.2 可知对于任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都有 $\overline{\alpha} := \alpha$ 和 $\Re \alpha := \alpha$. 因此, 在如下定义中我们可以忽略共轭符号和 $\Re$ 符号.

2. 由 (IP₁) 和 (IP₂) 可得

$$\langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle + \bar{\mu} \langle x, z \rangle, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad x, y, z \in E,$$

即对于每个固定的 $x \in E$, 称函数 $\langle x, \cdot \rangle: E \rightarrow \mathbb{K}$ 是共轭线性的. 同时 (IP₂) 表明对于每个固定的 $x \in E$, 函数 $\langle \cdot, x \rangle: E \rightarrow \mathbb{K}$ 是线性的, 此时称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是半双线性形式. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, $\langle \cdot, x \rangle$ 和 $\langle x, \cdot \rangle$ 都是线性的, 此时称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是双线性形式. 最后 (IP₃) 表明 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是正定的. 在这样的定义下, 我们说: 当 E 是复向量空间时, 内积是 E 上正定且 Hermite 的半双线性形式. 当 E 是实向量空间时, 内积是 E 上正定且对称的双线性形式.

3. 对于任意 $x, y \in E$ 都有⁹

$$\langle x \pm y, x \pm y \rangle = \langle x, x \rangle \pm 2\Re \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle.$$

4. 对于任意 $x \in E$ 都有 $\langle x, 0 \rangle = \langle 0, x \rangle = 0$.

容易验证

$$\langle x, y \rangle := \sum_{j=1}^m x_j \bar{y}_j, \quad x, y \in \mathbb{K}^m \quad (m \in \mathbb{N}^*)$$

是 $\mathbb{K}^m$ 上的内积, 称为 $\mathbb{K}^m$ 上的 Euclid 内积.

Cauchy-Schwarz 不等式

在做完上述准备工作之后, 我们现在可以证明关于内积空间最有用的定理之一.

定理 2.3.8 (Cauchy-Schwarz 不等式). 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间. 则

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E,$$

其中等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关.

证明. 当 $y = 0$ 时, 由注 2.3.7(4) 可知定理成立. 设 $y \neq 0$. 对于任意 $\alpha \in \mathbb{K}$ 有

$$0 \leq \langle x - \alpha y, x - \alpha y \rangle = \langle x, x \rangle - 2\Re \langle x, \alpha y \rangle + \langle \alpha y, \alpha y \rangle = \langle x, x \rangle - 2\Re \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + |\alpha|^2 \langle y, y \rangle,$$

令 $\alpha := \langle x, y \rangle / \langle y, y \rangle$, 于是

$$0 \leq \langle x, x \rangle - 2\Re \frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{\langle y, y \rangle} \langle x, y \rangle + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle^2} \langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle} + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle} = \langle x, x \rangle - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle},$$

⁹使用符号 $\pm$ 和 $\mp$ 可以将两个方程写成一个. 对于其中一个方程, 全程使用上面的符号 ($+$ 或 $-$), 而对于另一个方程, 则全程使用下面的符号.

即

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E.$$

设 x 和 y 线性无关. 则对于任意 $\alpha \in \mathbb{K}$ 都有 $x - \alpha y \neq 0$, 于是 $0 < \langle x - \alpha y, x - \alpha y \rangle$, 令 $\alpha := \langle x, y \rangle / \langle y, y \rangle$ 可得

$$|\langle x, y \rangle|^2 < \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E.$$

设 x 和 y 线性相关. 则存在 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2 \setminus \{0\}$ 使得 $\alpha x + \beta y = 0$. 假设 $\alpha \neq 0$, 则 $x = -(\beta/\alpha)y$, 于是

$$|\langle x, y \rangle|^2 = \left| \left\langle -\frac{\beta}{\alpha}y, y \right\rangle \right|^2 = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|^2 \langle y, y \rangle^2 = \left\langle -\frac{\beta}{\alpha}y, -\frac{\beta}{\alpha}y \right\rangle \langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E,$$

假设 $\beta \neq 0$, 同理可得. $\square$

推论 2.3.9 (经典 Cauchy-Schwarz 不等式).

$$\left| \sum_{j=1}^m \xi_j \bar{\eta}_j \right|^2 \leq \left(\sum_{j=1}^m |\xi_j|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^m |\eta_j|^2 \right), \quad \xi_1, \dots, \xi_m, \eta_1, \dots, \eta_m \in \mathbb{K}.$$

其中等号成立当且仅当 $(\xi_1, \dots, \xi_m)$ 和 $(\eta_1, \dots, \eta_m)$ 线性相关.

证明. 将定理 2.3.8 应用到赋予 Euclid 内积的 $\mathbb{K}^m$ 上即可. $\square$

定理 2.3.10. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间. 则

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad x \in E$$

是 E 上的范数, 称为从内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 诱导的范数.

证明. 由于对于任意的 $x \in E$ 都有 $\langle x, x \rangle \geq 0$, 因此 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \geq 0$ 是良定义的且

$$\|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0,$$

于是 (N_1) 成立.

$$\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad x \in E,$$

因此 (N_2) 成立. 由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} = \|x\| \|y\|, \quad x, y \in E,$$

于是

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 2\Re \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &\leq \langle x, x \rangle + 2|\langle x, y \rangle| + \langle y, y \rangle \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2, \quad x, y \in E, \end{aligned}$$

即 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, 最后 (N_3) 成立. $\square$

除非另有说明, 否则默认内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是赋予了诱导范数的赋范向量空间.

由内积诱导的范数通常也被称为 Hilbert 范数. 利用该范数, 我们可以将定理 2.3.8 的 Cauchy-Schwarz 不等式改写为如下形式.

推论 2.3.11. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间. 则

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|, \quad x, y \in E,$$

其中等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关.

Euclid 空间

一个特别重要的例子是 $\mathbb{K}^m$ 上的 Euclid 内积. 由于我们会非常频繁的与该内积打交道, 因此我们做出如下约定会很方便.

除非另有说明, 否则默认赋予 $\mathbb{K}^m$ Euclid 内积和诱导范数¹⁰

$$|x| := \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{j=1}^m |x_j|^2}, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

称为 Euclid 范数. 在实数的情况, 我们把 $\langle x, y \rangle$ 记作 $x \cdot y$.

现在我们在向量空间 $\mathbb{K}^m$ 上有了两个范数, 即最大范数

$$|x|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

和 Euclid 范数

$$|x| = \left(\sum_{j=1}^m |x_j|^2 \right)^{1/2}, \quad x \in \mathbb{K}^m.$$

我们进一步定义一个新的范数

$$|x|_1 := \sum_{j=1}^m |x_j|, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

称为 1-范数. 验证这确实定义了一个范数是很容易的, 这里留给读者自己完成. 接下来的命题将通过再次应用 Cauchy-Schwarz 不等式, 证明 Euclid 范数与 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_\infty$ 是“可比较的”.

命题 2.3.12. 设 $m \in \mathbb{N}^*$. 则

$$|x|_\infty \leq |x| \leq \sqrt{m} |x|_\infty, \quad \frac{1}{\sqrt{m}} |x|_1 \leq |x| \leq |x|_1, \quad x \in \mathbb{K}^m.$$

¹⁰在 $m = 1$ 时, 这个记号和 $\mathbb{K}$ 中绝对值的记号 $|\cdot|$ 是一致的, 这是因为对于任意 $x, y \in \mathbb{K}^1 = \mathbb{K}$ 都有 $\langle x, y \rangle = x\bar{y}$. 而这个记号和多重索引 $\alpha \in \mathbb{N}^m$ 的长度记号 $|\alpha|$ 是不一致的, 不过根据上下文能分辨出所要表达的是哪一种含义.

证明. 显然

$$|x|_{\infty}^2 = \left(\max_{1 \leq j \leq m} |x_j| \right)^2 = \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|^2 \leq \sum_{j=1}^m |x_j|^2 = |x|^2 ,$$

因此 $|x|_{\infty} \leq |x|$. 而

$$|x|^2 = \sum_{j=1}^m |x_j|^2 \leq m \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|^2 = m \left(\max_{1 \leq j \leq m} |x_j| \right)^2 = m |x|_{\infty}^2 ,$$

因此 $|x| \leq \sqrt{m} |x|_{\infty}$.

$$|x|^2 = \sum_{j=1}^m |x_j|^2 \leq \left(\sum_{j=1}^m |x_j| \right)^2 = |x|_1^2 ,$$

因此 $|x| \leq |x|_1$. 由推论 2.3.9 可得

$$|x|_1^2 = \left(\sum_{j=1}^m 1 \cdot |x_j| \right)^2 \leq \left(\sum_{j=1}^m 1^2 \right) \left(\sum_{j=1}^m |x_j|^2 \right) = m |x|^2 ,$$

因此 $|x|_1 \leq \sqrt{m} |x|$. □

等价范数

定义 2.3.7 (等价范数). 设 E 是向量空间, $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 E 上的范数. 若存在 $K \geq 1$ 使得

$$\frac{1}{K} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq K \|x\|_1 , \quad x \in E ,$$

则称 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价, 记作 $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$.

注 2.3.13. 1. 不难验证, $\sim$ 是给定向量空间的范数集合上的等价关系.


2. 命题 2.3.12 的等价陈述是: 在 $\mathbb{K}^m$ 上

$$|\cdot|_1 \sim |\cdot| \sim |\cdot|_{\infty} .$$

3. 为了使命题 2.3.12 的等价陈述更为清晰, 我们用 $\mathbb{B}^m$, $\mathbb{B}_1^m$ 和 $\mathbb{B}_{\infty}^m$ 分别表示 $(\mathbb{R}^m, |\cdot|)$, $(\mathbb{R}^m, |\cdot|_1)$ 和 $(\mathbb{R}^m, |\cdot|_{\infty})$ 中的单位开球. 则命题 2.3.12 说

$$\mathbb{B}^m \subseteq \mathbb{B}_{\infty}^m \subseteq \sqrt{m} \mathbb{B}^m , \quad \mathbb{B}_1^m \subseteq \mathbb{B}^m \subseteq \sqrt{m} \mathbb{B}_1^m .$$

在 $m = 2$ 时, 这个包含关系如下图所示.



注意到

$$\mathbb{B}_\infty^m = \underbrace{\mathbb{B}_\infty^1 \times \cdots \times \mathbb{B}_\infty^1}_m = (-1, 1)^m ,$$

但是对于 $\mathbb{B}^m$ 和 $\mathbb{B}_1^m$, 则不存在类似的表达方式.

4. 设 E 是向量空间, $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 E 上的等价范数, 记 $E_1 := (E, \|\cdot\|_1)$, $E_2 := (E, \|\cdot\|_2)$. 则

$$\mathcal{N}_{E_1}(a) = \mathcal{N}_{E_2}(a) , \quad a \in E .$$

也就是说, a 的邻域系只依赖于该范数的等价类. 等价的范数会产生同样的邻域系.

证明. 由于 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价, 故存在 $K \geq 1$ 使得

$$\frac{1}{K} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq K \|x\|_1 , \quad x \in E .$$

我们先证明

$$\mathbb{B}_{E_1}(a, r/K) \subseteq \mathbb{B}_{E_2}(a, r) \subseteq \mathbb{B}_{E_1}(a, Kr) , \quad r > 0 , \quad a \in E .$$

任取 $x \in \mathbb{B}_{E_1}(a, r/K)$, 于是

$$\|x - a\|_2 \leq K \|x - a\|_1 < K \frac{r}{K} = r ,$$

因此 $x \in \mathbb{B}_{E_2}(a, r)$, 故 $\mathbb{B}_{E_1}(a, r/K) \subseteq \mathbb{B}_{E_2}(a, r)$. 任取 $x \in \mathbb{B}_{E_2}(a, r)$, 于是

$$\|x - a\|_1 \leq K \|x - a\|_2 < Kr ,$$

因此 $x \in \mathbb{B}_{E_1}(a, Kr)$, 故 $\mathbb{B}_{E_2}(a, r) \subseteq \mathbb{B}_{E_1}(a, Kr)$.

设 $U_1 \in \mathcal{N}_{E_1}(a)$. 故存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{B}_{E_1}(a, r) \subseteq U_1$, 于是 $\mathbb{B}_{E_2}(a, r/K) \subseteq \mathbb{B}_{E_1}(a, r) \subseteq U_1$, 因此 $U_1 \in \mathcal{N}_{E_2}(a)$, 这说明 $\mathcal{N}_{E_1}(a) \subseteq \mathcal{N}_{E_2}(a)$. 同理可得 $\mathcal{N}_{E_2}(a) \subseteq \mathcal{N}_{E_1}(a)$. $\square$

5. 通过双射

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad x + iy \mapsto (x, y),$$

复数集 $\mathbb{C} := \mathbb{R} + i\mathbb{R}$ 可以与 $\mathbb{R}^2$ 等同 (甚至可以与 Abel 群 $(\mathbb{R}^2, +)$ 等同, 见注 1.11.1(3)).

更一般的, 对于 $\mathbb{C}^m$ 可以通过双射¹¹

$$\mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}^{2m}, \quad (z_1, \dots, z_m) = (x_1 + iy_1, \dots, x_m + iy_m) \mapsto (x_1, y_1, \dots, x_m, y_m)$$

与 $\mathbb{R}^{2m}$ 等同. 在这个典范映射下

$$\mathbb{B}_{\mathbb{C}^m} = \mathbb{B}^{2m} = \mathbb{B}_{\mathbb{R}^{2m}},$$

进一步

$$\mathcal{N}_{\mathbb{C}^m} = \mathcal{N}_{\mathbb{R}^{2m}}.$$

因此, 就拓扑问题而言, 即关于点的邻域的命题, $\mathbb{C}^m$ 和 $\mathbb{R}^{2m}$ 可以视为同一.

6. “聚点”和“收敛性”是拓扑概念, 因为它们是通过邻域来定义的. 因此, 将范数替换为等价的范数后, 它们是不变的.

积空间中的收敛性

作为以上及之前讨论的结果, 我们现在有了一个对 $\mathbb{K}^m$ 中收敛数列的简单但非常有用的刻画.

命题 2.3.14. 设 $(x_n) = ((x_n^1, \dots, x_n^m))$ 是 $\mathbb{K}^m$ 中的序列. 以下命题是等价的.

1. (x_n) 收敛到 $x = (x^1, \dots, x^m) \in \mathbb{K}^m$.
2. 对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 (x_n^j) 收敛到 $x^j \in \mathbb{K}$.

证明. 由例 2.1.8(5) 和注 2.3.13(6) 可以直接得到. □

命题 2.3.14 常被称为序列 (x_n) 的按分量收敛, 因此命题 2.3.14 可以稍微不那么精确的表述为: 在 $\mathbb{K}^m$ 中, 一个序列收敛当且仅当它按分量收敛. 于是, 原则上只研究 $\mathbb{K}$ 中数列的收敛性就足够了一事实上, 由注 2.3.13(5), 只研究 $\mathbb{R}$ 中数列的收敛性就已经足够. 不过, 出于许多原因 (读者在进一步的学习中会自己体会到), 在我们的论述中做出这样的“简化”几乎得不到什么实质性的好处.

¹¹我们强调, 复向量空间 $\mathbb{C}^m$ 无法和实向量空间 $\mathbb{R}^{2m}$ 等同.

练习

1. 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的范数. 证明, 对于每个 $T \in \text{Aut}(E)$, 函数

$$\|x\|_T := \|Tx\|, \quad x \in E$$

是 E 上的范数. 特别的, 对于每个 $\alpha \in \mathbb{K}^*$, 函数 $E \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \|\alpha x\|$ 是 E 上的范数.

证明. 设 T 是 E 上的自同构, 于是 $\ker T = \{0\}$. 由于 $\|\cdot\|$ 是 E 上的范数, 因此对于任意 $x \in E$ 都有 $\|x\|_T = \|Tx\| \geq 0$ 且

$$\|x\|_T = 0 \iff \|Tx\| = 0 \iff Tx = 0 \iff x = 0,$$

于是 (N_1) 成立.

$$\|\lambda x\|_T = \|T\lambda x\| = \|\lambda Tx\| = |\lambda| \|Tx\| = |\lambda| \|x\|_T, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad x \in E,$$

因此 (N_2) 成立.

$$\|x + y\|_T = \|T(x + y)\| = \|Tx + Ty\| \leq \|Tx\| + \|Ty\| = \|x\|_T + \|y\|_T, \quad x, y \in E,$$

最后 (N_3) 成立. 而 $x \mapsto \|\alpha x\|$ 则是 $T := \alpha \text{id}_E$ 时的特殊情况. □

2. 设赋范向量空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中的序列 (x_n) 收敛到 x . 证明 $[0, \infty)$ 中的数列 $(\|x_n\|)$ 收敛到 $\|x\|$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n \geq N$ 时 $\|x_n - x\| < \varepsilon$. 由反三角不等式可得

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此 $(\|x_n\|)$ 收敛到 $\|x\|$. □

3. 证明注 2.3.4(1) 的断言.

证明. 由有界函数的定义直接可得 (a) 和 (b) 等价. 由有界集合的性质直接可得 (b) 和 (c) 等价. 而 (c) 和 (d) 等价是显然的. □

4. 证明平行四边形恒等式

$$2(\|x\|^2 + \|y\|^2) = \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2, \quad x, y \in E$$

在内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中成立.

证明.

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 &= \langle x+y, x+y \rangle + \langle x-y, x-y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 2\Re\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - 2\Re\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2), \quad x, y \in E.\end{aligned}$$

□

5. 设 $\lambda \in \mathbb{K}^m$. 则当 λ 取何值时,

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_\lambda: \mathbb{K}^m \times \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \bar{y}_j$$

是 $\mathbb{K}^m$ 上的内积.

证明. 假设 $\langle \cdot, \cdot \rangle_\lambda$ 是 $\mathbb{K}^m$ 上的内积. 由 (IP₁) 可知

$$\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \bar{y}_j = \langle x, y \rangle_\lambda = \overline{\langle y, x \rangle_\lambda} = \overline{\sum_{j=1}^m \lambda_j y_j \bar{x}_j} = \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j x_j \bar{y}_j, \quad x, y \in \mathbb{K}^m,$$

因此 $\lambda \in \mathbb{R}^m$. 由 (IP₃) 可知

$$\langle x, x \rangle_\lambda = \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \bar{x}_j = \sum_{j=1}^m \lambda_j |x_j|^2 \geq 0, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

于是对于任意 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 $\lambda_j \geq 0$, 而由等号成立当且仅当 $x = 0$ 可得, 对于任意 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 $\lambda_j \neq 0$. 最后可得 $\lambda \in (0, \infty)^m$. □

6. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是实内积空间. 证明不等式

$$(\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad x, y \in E \setminus \{0\}.$$

什么时候等号成立? (提示: 将第一个不等式两边同时平方.)

证明. 现在考虑第一个不等式. 当 $\langle x, y \rangle < 0$ 时. 注意到 $x, y \neq 0$, 因此 $\|x\| > 0$ 且 $\|y\| > 0$, 于是

$$(\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} < 0 \leq \|x + y\|,$$

故不等式成立, 此时无法取得等号. 当 $\langle x, y \rangle = 0$ 时. 有

$$(\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} = 0 \leq \|x + y\|,$$

故不等式成立, 而等号成立当且仅当

$$\|x + y\| = 0 \iff x + y = 0 \iff x = -y,$$

注意到 $y \neq 0$, 于是 $\langle x, y \rangle = \langle -y, y \rangle = -\langle y, y \rangle < 0$, 这与 $\langle x, y \rangle = 0$ 矛盾. 因此 $\langle x, y \rangle = 0$ 时也无法取得等号. 当 $\langle x, y \rangle > 0$ 时. 将不等式两边同时平方. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式有

$$\begin{aligned} (\|x\| + \|y\|)^2 \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2 \|y\|^2} &= (\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}) \frac{\langle x, y \rangle^2}{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} \\ &= \frac{\langle x, y \rangle^2}{\langle y, y \rangle} + \frac{\langle x, y \rangle^2}{\langle x, x \rangle} + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}} \\ &\leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}}, \end{aligned}$$

注意到 $\langle x, y \rangle \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$, 于是

$$\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}} \leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\langle x, y \rangle} = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle.$$

而 E 是实内积空间, 因此 $\langle x, y \rangle = \Re \langle x, y \rangle$, 于是

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\Re \langle x, y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle.$$

因此

$$(\|x\| + \|y\|)^2 \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2 \|y\|^2} \leq \|x + y\|^2 \iff (\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq \|x + y\|,$$

故不等式成立, 其中等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关. 于是第一个不等式等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关且 $\langle x, y \rangle > 0$.

而第二个不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 在任意赋范向量空间中都成立且

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \iff \|x + y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

其中

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\Re \langle x, y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle,$$

和

$$(\|x\| + \|y\|)^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \|y\| = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle},$$

因此

$$\|x + y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \iff \langle x, y \rangle = \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} \iff x \text{ 和 } y \text{ 线性相关且 } \langle x, y \rangle > 0.$$

故整个不等式等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关且 $\langle x, y \rangle > 0$. $\square$

7. 设 X 是度量空间. 称 $Y \subseteq X$ 是闭集, 若对于 Y 中的每个序列 (y_n) 都有当 (y_n) 在 X 中收敛时 (y_n) 也在 Y 中收敛. 证明 c_0 是 ℓ_∞ 的闭子空间.

证明. 设 $(u_n) \in c_0^{\mathbb{N}}$ 且 $u_n \rightarrow u \in \ell_{\infty}$. 只用证明 $u \in c_0$. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|u(k)| - |u_n(k)| \leq |u_n(k) - u(k)| \leq \|u_n - u\|_{\infty} < \frac{\varepsilon}{2}, \quad n \geq N, \quad k \in \mathbb{N}.$$

而 $u_N \in c_0$, 故存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq M$ 时 $|u_N(k)| < \varepsilon/2$. 于是

$$|u(k)| < \frac{\varepsilon}{2} + |u_N(k)| < \varepsilon, \quad k \geq M,$$

因此 $u \in c_0$. □

8. 设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是向量空间 E 上的等价范数. 定义

$$d_j(x, y) := \|x - y\|_j, \quad x, y \in E, \quad j = 1, 2.$$

证明 d_1 和 d_2 是 E 上的等价度量.

证明. 任取 $x \in E$ 和 $\varepsilon > 0$. 由于 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是等价范数, 故存在 $K \geq 1$ 使得

$$\frac{1}{K}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq K\|x\|_1, \quad x \in E.$$

令 $r_1 = r_2 := \varepsilon/K$. 任取 $y \in \mathbb{B}_1(x, r_1)$, 于是

$$d_2(x, y) = \|x - y\|_2 \leq K\|x - y\|_1 < K\frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon,$$

因此 $y \in \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$, 故 $\mathbb{B}_1(x, r_1) \subseteq \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$. 任取 $y \in \mathbb{B}_2(x, r_2)$, 于是

$$d_1(x, y) = \|x - y\|_1 \leq K\|x - y\|_2 < K\frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon,$$

因此 $y \in \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$, 故 $\mathbb{B}_2(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$. 这说明 d_1 和 d_2 是等价度量. □

9. 设 (X_j, d_j) , $1 \leq j \leq m$ 是度量空间, $X := X_1 \times \cdots \times X_m$. 证明函数

$$(x, y) \mapsto \left(\sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 \right)^{1/2}, \quad x, y \in X$$

是 X 上与积度量等价的度量.

证明. 设该函数为 d_1 , 积度量为 d_2 . 任取 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$. 令 $r_1 := \varepsilon$. 任取 $y \in \mathbb{B}_1(x, r_1)$, 于是

$$d_2(x, y)^2 = \left(\max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j) \right)^2 = \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j)^2 \leq \sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 = d_1(x, y)^2 < \varepsilon^2,$$

即 $d_2(x, y) < \varepsilon$, 因此 $y \in \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$, 故 $\mathbb{B}_1(x, r_1) \subseteq \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$. 令 $r_2 := \varepsilon/\sqrt{m}$. 任取 $y \in \mathbb{B}_2(x, r_2)$, 于是

$$\begin{aligned} d_1(x, y)^2 &= \sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 \leq m \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j)^2 \\ &= m \left(\max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j) \right)^2 = m d_2(x, y)^2 < m \frac{\varepsilon^2}{m} = \varepsilon^2, \end{aligned}$$

即 $d_1(x, y) < \varepsilon$, 因此 $y \in \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$, 故 $\mathbb{B}_2(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$. 这说明 d_1 和 d_2 是等价度量.

注意到

$$\max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j) \leq \left(\sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{m} \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in X,$$

即 $d_2(x, y) \leq d_1(x, y) \leq \sqrt{m} d_2(x, y)$, 这其实与等价范数的形式是一样, 于是我们可以说若存在 $K \geq 1$ 使得

$$\frac{1}{K} d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq K d_1(x, y), \quad x, y \in X,$$

则 d_1 和 d_2 是等价度量. 注意这仅是充分条件, 并不是必要条件, 也就是说可能存在两个度量等价, 但不满足该不等式. $\square$

10. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间, $x, y \in E$. 若 $\langle x, y \rangle = 0$, 则称 x 和 y 正交, 记作 $x \perp y$. 称 $M \subseteq E$ 是正交系, 若对于任意 $x, y \in M$ 且 $x \neq y$ 都有 $x \perp y$. 最后, 称 M 是标准正交系, 若 M 是正交系且对于任意 $x \in M$ 都有 $\|x\| = 1$.

设 $\{x_0, \dots, x_m\} \subseteq E$ 是正交系且 $x_j \neq 0$ ($0 \leq j \leq m$). 证明以下命题.

1. $\{x_0, \dots, x_m\}$ 线性无关.

2. (Pythagoras 定理)

$$\left\| \sum_{j=0}^m x_j \right\|^2 = \sum_{j=0}^m \|x_j\|^2.$$

证明. (1). 设 $\lambda_0, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K}$ 使得 $\sum_{j=0}^m \lambda_j x_j = 0$. 于是对于任意 $k \in \{0, \dots, m\}$ 都有

$$\left\langle \sum_{j=0}^m \lambda_j x_j, x_k \right\rangle = \sum_{j=0}^m \lambda_j \langle x_j, x_k \rangle = 0.$$

注意到, 仅当 $j = k$ 时才有 $\langle x_j, x_k \rangle \neq 0$, 于是

$$\sum_{j=0}^m \lambda_j \langle x_j, x_k \rangle = \lambda_k \langle x_k, x_k \rangle = 0,$$

因此 $\lambda_k = 0$. 进一步, $\lambda_0 = \dots = \lambda_m = 0$. 故 $\{x_0, \dots, x_m\}$ 线性无关.

(2). 将等式左边展开, 有

$$\left\| \sum_{j=0}^m x_j \right\|^2 = \left\langle \sum_{j=0}^m x_j, \sum_{j=0}^m x_j \right\rangle = \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^m \langle x_j, x_k \rangle,$$

同样的, 仅当 $j = k$ 时才有 $\langle x_j, x_k \rangle \neq 0$, 于是

$$\sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^m \langle x_j, x_k \rangle = \sum_{j=0}^m \langle x_j, x_j \rangle = \sum_{j=0}^m \|x_j\|^2.$$

$\square$

11. 设 F 是内积空间 E 的子空间. 证明 F 的正交补

$$F^\perp := \{x \in E; x \perp y, y \in F\}$$

是 E 的闭子空间 (见练习 7).

证明. 设 $x_1, x_2 \in F^\perp$, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$. 任取 $y \in F$. 于是

$$\langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y \rangle = \langle \alpha_1 x_1, y \rangle + \langle \alpha_2 x_2, y \rangle = \alpha_1 \langle x_1, y \rangle + \alpha_2 \langle x_2, y \rangle = 0,$$

因此 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in F^\perp$, 故 $F^\perp$ 是 E 的子空间.

设 (x_n) 是 $F^\perp$ 中的序列且 $\lim x_n = x \in E$. 任取 $y \in F$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$0 \leq |\langle x_n - x, y \rangle| \leq \|x_n - x\| \|y\|, \quad n \in \mathbb{N},$$

而 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, 于是由夹逼定理可知 $|\langle x_n - x, y \rangle| \rightarrow 0$. 注意到对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \in F^\perp$, 即 $\langle x_n, y \rangle = 0$, 于是

$$\lim |\langle x_n - x, y \rangle| = \lim |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| = \lim |\langle x, y \rangle| = |\langle x, y \rangle| = 0,$$

因此 $x \in F^\perp$, 故 $F^\perp$ 是 E 的闭集. □

12. 设 $B = \{u_0, \dots, u_m\}$ 是内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的标准正交系, $F := \text{span } B$. 定义

$$p_F: E \rightarrow F, \quad x \mapsto \sum_{j=0}^m \langle x, u_j \rangle u_j.$$

证明以下命题.

1. 对于任意 $x \in E$ 都有 $x - p_F(x) \in F^\perp$.
2. 对于任意 $x \in E$ 都有 $\|x - p_F(x)\| = \inf_{y \in F} \|x - y\|$.
3. 对于任意 $x \in E$ 都有 $\|x - p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{j=0}^m |\langle x, u_j \rangle|^2$.
4. $p_F \in \text{Hom}(E, F)$ 且 $p_F^2 = p_F$.
5. $\text{im } p_F = F$, $\ker p_F = F^\perp$ 和 $E = F \oplus F^\perp$.

(提示: 要证明 (2) 由练习 10 和 (1) 可知 $\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2$ ($y \in F$).)

证明. (1). 设 $y \in F$. 由于 $F = \text{span } B$, 故存在 $\lambda_0, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K}$ 使得 $y = \sum_{j=0}^m \lambda_j u_j$, 于是

$$\langle x - p_F(x), y \rangle = \left\langle x - p_F(x), \sum_{j=0}^m \lambda_j u_j \right\rangle = \sum_{j=0}^m \bar{\lambda}_j \langle x - p_F(x), u_j \rangle.$$

而对于任意 $j \in \{0, \dots, m\}$ 都有

$$\langle x - p_F(x), u_j \rangle = \left\langle x - \sum_{k=0}^m \langle x, u_k \rangle u_k, u_j \right\rangle = \langle x, u_j \rangle - \sum_{k=0}^m \langle x, u_k \rangle \langle u_k, u_j \rangle,$$

注意到, B 是标准正交系, 因此仅当 $k = j$ 时才有 $\langle u_k, u_j \rangle \neq 0$ 且 $\langle u_k, u_j \rangle = 1$, 故

$$\langle x - p_F(x), u_j \rangle = \langle x, u_j \rangle - \langle x, u_j \rangle \langle u_j, u_j \rangle = 0, \quad j \in \{0, \dots, m\}.$$

因此 $\langle x - p_F(x), y \rangle = 0$, 故 $x - p_F(x) \in F^\perp$. $\square$

13. 设 $B = \{u_0, \dots, u_m\}$ 是内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的标准正交系, $F := \text{span } B$. 证明以下命题.

1. 对于任意 $x \in E$ 都有 $\sum_{j=0}^m |\langle x, u_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.
2. 对于任意 $x \in F$ 都有

$$x = \sum_{j=0}^m \langle x, u_j \rangle u_j \quad \text{且} \quad \|x\|^2 = \sum_{j=0}^m |\langle x, u_j \rangle|^2.$$

(提示: 要证明 (1) 使用 Cauchy-Schwarz 不等式.)

14. 设 $\mathbb{K}^{m \times n}$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$) 是所有定义在 $\mathbb{K}$ 上的 $m \times n$ 矩阵的集合, 即

$$\mathbb{K}^{m \times n} := \text{Funct}(\{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}, \mathbb{K}).$$

于是由例 1.12.2(5) 可知 $\mathbb{K}^{m \times n}$ 是向量空间, 因此对于 $\alpha \in \mathbb{K}$ 和 $A, B \in \mathbb{K}^{m \times n}$ 有标量乘法 αA 和矩阵加法 $A + B$. 证明以下命题.

1. 函数

$$|A| := \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}, \quad A = [a_{ij}] \in \mathbb{K}^{m \times n}$$

是 $\mathbb{K}^{m \times n}$ 上的范数.

2. 以下函数定义了等价范数.

$$(a) \quad [a_{ij}] \mapsto \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

$$(b) \quad [a_{ij}] \mapsto \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

$$(c) \quad [a_{ij}] \mapsto \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

$$(d) \quad [a_{ij}] \mapsto \max_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} |a_{ij}|.$$

15. 设 E 和 F 是赋范向量空间. 证明 $B(E, F) \cap \text{Hom}(E, F) = \{0\}$.

2.4 单调数列

$\mathbb{R}$ 中的任意数列, 即 $s(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中的任意元素都是有序集之间的函数. 在本节中, 我们将再次研究这种序结构与数列收敛性之间的关系. 更具体的, 我们将研究在例 1.4.1 之前所定义的单调数列的收敛性. 因此, 若对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \leq x_{n+1}$ 则称数列 (x_n) 是递增的¹², 若对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \geq x_{n+1}$ 则称数列 (x_n) 是递减的.

有界的单调数列

由 $\mathbb{R}$ 的完备性可知, 每个有界的单调数列都是收敛的.

定理 2.4.1 (单调有界收敛定理). $\mathbb{R}$ 中每个递增的 (或递减的) 有界数列 (x_n) 都收敛, 且

$$x_n \uparrow \sup\{x_n; n \in \mathbb{N}\} \quad (\text{或 } x_n \downarrow \inf\{x_n; n \in \mathbb{N}\}).$$

证明. 设 (x_n) 是递增的有界数列. 则 $X := \{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ 是有界的且非空. 由于 $\mathbb{R}$ 是序完备的, 因此 $x := \sup X$ 是良定义的. 任取 $\varepsilon > 0$. 由命题 1.10.1 可知, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $x_N > x - \varepsilon$. 而 (x_n) 是递增的, 因此当 $n \geq N$ 时 $x_n \geq x_N > x - \varepsilon$, 于是

$$x_n \in (x - \varepsilon, x) \subseteq (x - \varepsilon, x + \varepsilon) = \mathbb{B}(x, \varepsilon), \quad n \geq N.$$

故 $x_n \uparrow x$.

若 (x_n) 是递减的有界数列, 令 $x := \inf\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$. 则 $(y_n) := (-x_n)$ 是递增的有界数列, 且 $-x = \sup\{y_n; n \in \mathbb{N}\}$. 由上面的结论可知 $y_n \uparrow -x$, 于是由命题 2.2.2 可知 $x_n \downarrow x$. $\square$

在命题 2.1.10 中我们已经看到, 有界性是数列收敛的必要条件. 但定理 2.4.1 表明, 对于单调数列而言, 有界性是其收敛的充分条件. 当然, 收敛数列并不一定是单调的, 例如无穷小量 $(-1)^n/n$ 就说明了这一点.

一些重要极限

例 2.4.2. 1. 设 $a \in \mathbb{K}$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \begin{cases} 0, & |a| < 1, \\ 1, & a = 1. \end{cases}$$

特别的, 若 $|a| \geq 1$ 且 $a \neq 1$, 则 (a^n) 发散.

¹²对于递增 (或递减) 数列 (x_n) , 我们常记作 $(x_n) \uparrow$ (或 $(x_n) \downarrow$). 进一步, 若 (x_n) 收敛到 x , 则将 $x_n \rightarrow x$ 记作 $x_n \uparrow x$ (或 $x_n \downarrow x$).

证明. 若 (a^n) 收敛, 则由命题 2.2.2 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{n+1} = a \lim_{n \rightarrow \infty} a^n ,$$

因此 $a^n \rightarrow 0$ 或 $a = 1$.

设 $|a| < 1$. 则数列 $(|a^n|) = (|a|^n)$ 是递减且有界的, 于是由定理 2.4.1 和上面的结论可知 $(|a^n|)$ 是无穷小量, 因此 $a^n \rightarrow 0$.

设 $a = 1$. 则对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $a^n = 1$, 因此 $a^n \rightarrow 1$.

设 $|a| \geq 1$ 且 $a \neq 1$. 假设 (a^n) 收敛, 则由上面的结论可知 $(|a^n|)$ 是无穷小量, 但是对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $|a^n| = |a|^n \geq 1$, 矛盾. 故 (a^n) 发散. $\square$

2. 设 $k \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{C}$ 且 $|a| > 1$. 则函数 $n \mapsto a^n$ 的增长速度快于任意的幂函数 $n \mapsto n^k$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0 .$$

证明. 令 $\alpha := 1/|a| \in (0, 1)$, $x_n := n^k \alpha^n$. 于是

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(n+1)^k \alpha^{n+1}}{n^k \alpha^n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k \alpha , \quad n \in \mathbb{N}^* ,$$

因此 $x_{n+1}/x_n \downarrow \alpha$. 固定 $\beta \in (\alpha, 1)$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_{n+1}/x_n < \beta$, 于是

$$x_{N+1} < \beta x_N , \quad x_{N+2} < \beta x_{N+1} < \beta^2 x_N , \quad \dots$$

归纳可得当 $n \geq N$ 时 $x_n < \beta^{n-N} x_N$, 于是

$$\left| \frac{n^k}{a^n} \right| = x_n < \beta^{n-N} x_N = \frac{x_N}{\beta_N} \beta^n , \quad n \geq N .$$

因此由 (1) 和注 2.2.1(3) 可知 (n^k/a^n) 是无穷小量. $\square$

3. 设 $a \in \mathbb{C}$. 则阶乘函数 $n \mapsto n!$ 的增长速度快于函数¹³ $n \mapsto a^n$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 .$$

证明. 固定 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $N > |a|$, 于是

$$\left| \frac{a^n}{n!} \right| = \prod_{k=1}^n \frac{|a|}{k} = \frac{|a|^N}{N!} \prod_{k=N+1}^n \frac{|a|}{k} \leq \frac{|a|^N}{N!} \left(\frac{|a|}{N+1} \right)^{n-N} , \quad n > N ,$$

因此由 (1) 和注 2.2.1(3) 可知 $(a^n/n!)$ 是无穷小量. $\square$

¹³在第 2.8 节中, 我们会给出一个非常简短的证明.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 则由 (2) 可知数列 $(n/(1+\varepsilon)^n)$ 是无穷小量, 于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{n}{(1+\varepsilon)^n} < 1, \quad n \geq N,$$

因此

$$1 \leq n < (1+\varepsilon)^n, \quad n \geq \max\{1, N\}.$$

由注 1.10.5(3) 可知 n 次方根函数是严格递增的, 于是

$$1 \leq \sqrt[n]{n} < 1+\varepsilon, \quad n \geq \max\{1, N\},$$

即 $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. □

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0).$

证明. 由 Archimedes 公理可知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $1/N < a < N$, 于是

$$\frac{1}{n} < a < n, \quad n \geq N.$$

由注 1.10.5(3) 可知 n 次方根函数是严格递增的, 因此

$$\frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \sqrt[n]{\frac{1}{n}} < \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n}, \quad n \geq N,$$

由 (4) 和命题 2.2.6 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/\sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 故由夹逼定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$. □

6. 数列 $((1 + 1/n)^n)$ 收敛, 并称其极限

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

是 Euler 数或自然常数, 且 $2 < e \leq 3$.

证明. 对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 令 $e_n := (1 + 1/n)^n$. 由算术-几何平均值不等式可知

$$e_n = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \left(\frac{1 + n(1 + 1/n)}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e_{n+1},$$

因此数列 (e_n) 是递增的, 故当 $n \geq 2$ 时 $2 = e_1 < e_n$. 由二项式定理可知

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k},$$

其中当 $1 \leq k \leq n$ 时

$$\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \leq \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}},$$

因此由练习 1 可知

$$e_n \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{(1/2)^n - 1}{1/2 - 1} < 1 + \frac{1}{1 - 1/2} = 3.$$

故由单调有界收敛定理可知 (e_n) 收敛且 $2 < e \leq 3$. $\square$

数字 e 在分析中有着至关重要的作用. 它的值理论上可以由数列 (e_n) 确定. 但不幸的是, 数列 (e_n) 收敛的速度很慢. e 的值近似于¹⁴

$$2.71828\ 18284\ 59045\ 23536\ \dots$$

将该值与 (e_n) 的几个项进行比较,

$$e_1 = 2, \quad e_{10} = 2.59374\dots, \quad e_{100} = 2.70481\dots, \quad e_{1000} = 2.71692\dots,$$

我们看到, 即使 $n = 1000$, $e - e_n$ 的误差也有 $0.0014\dots$ (见下一个例子).

7. 我们可以用一个收敛速度快得多的数列的极限来表示 e .

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

证明. 令 $e'_n := \sum_{k=0}^n 1/k!$. 显然 (e'_n) 是递增的. (6) 的证明里表明了对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $e_n \leq e'_n < 3$, 于是由单调有界收敛定理可知 (e'_n) 收敛. 令 $e' := \lim e'_n$, 则由极限的保序性可知 $e \leq e' \leq 3$. 于是只用证明 $e' \leq e$. 固定 $m \in \mathbb{N}^*$, 于是当 $n \geq m$ 时, 有

$$\begin{aligned} e_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \geq \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right). \end{aligned}$$

令

$$e'_{m,n} := 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right), \quad n \geq m,$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $e'_{m,n} \rightarrow e'_m$, 且当 $n \geq m$ 时 $e'_{m,n} \leq e_n$, 于是由极限的保序性可知 $e'_m \leq e$. 而这对于任意 $m \in \mathbb{N}^*$ 都成立, 于是 e 是 (e'_n) 的上界, 由单调有界收敛定理可知 e' 是 (e'_n) 的上确界, 因此 $e' \leq e$. $\square$

¹⁴我们使用这种“十进制表示法”还有些过早. 关于这种表示数字的方法的完整讨论在第 2.7 节.

正如我们提到的, 数列 (e'_n) 收敛到 e 的速度比数列 (e_n) 快得多. 实际上, 可以证明下面的误差估计 (见练习 7).

$$0 < e - e'_n \leq \frac{1}{nn!}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

当 $n = 6$ 时, 就有 $1/(6!6) = 0.00023\dots$, 这已经比 (6) 中 $n = 1000$ 时的误差要小了.

练习

1. 设 $a_1, \dots, a_k > 0$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_k^n} = \max\{a_1, \dots, a_k\}.$$

证明. 令 $a := \max\{a_1, \dots, a_k\}$. 于是

$$a = \sqrt[n]{a^n} \leq \sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_k^n} \leq \sqrt[n]{na^n} = a \sqrt[n]{n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

由于 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$, 因此由夹逼定理可知 $\sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_k^n} \rightarrow a$. □

2. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}.$$

(提示: 考虑 $\lim(1 - 1/n^2)^n = 1$ 并利用命题 2.2.6.)

证明. 考虑 $((1 - 1/n)^n)$ 的倒数,

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n.$$

注意到 $\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \rightarrow e$ 且 $1 + \frac{1}{n-1} \rightarrow 1$, 于是

$$\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \rightarrow e,$$

即 $(1 - 1/n)^{-n} \rightarrow e$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - 1/n)^{-n}} = \frac{1}{e}.$$

□

3. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = e^r \quad (r \in \mathbb{Q}).$$

(提示: 分别考虑 $r > 0$ 和 $r < 0$ 的情况. 并利用练习 2 和练习 7.)

证明. 当 $r = 0$ 时显然成立. 设 $r > 0$. 先证明 r 是正整数的情况. 令 $r \in \mathbb{N}^*$. 对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 令 $t_n := \max\{t \in \mathbb{N}; t \leq n/r\}$, 由良序原理可知 t_n 是良定义的. 故对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $t_n \leq n/r \leq t_n + 1$, 于是当 $n \geq r$ 时

$$1 + \frac{1}{t_n + 1} \leq 1 + \frac{r}{n} \leq 1 + \frac{1}{t_n},$$

因此

$$\left(1 + \frac{1}{t_n + 1}\right)^{t_n} \leq \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{t_n} \leq \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n/r} \leq \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{t_n + 1} \leq \left(1 + \frac{1}{t_n}\right)^{t_n + 1}.$$

注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时, $t_n \rightarrow \infty$, 于是 $(1 + 1/t_n)^{t_n} \rightarrow e$, 因此

$$\left(1 + \frac{1}{t_n}\right)^{t_n + 1} = \left(1 + \frac{1}{t_n}\right)^{t_n} \left(1 + \frac{1}{t_n}\right) \rightarrow e \quad \text{且} \quad \left(1 + \frac{1}{t_n + 1}\right)^{t_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{t_n + 1}\right)^{t_n + 1}}{1 + \frac{1}{t_n + 1}} \rightarrow e.$$

由夹逼定理可知 $(1 + r/n)^{n/r} \rightarrow e$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{\frac{n}{r}r} = e^r.$$

令 $r = p/q$ ($p, q \in \mathbb{N}^*$). 注意到 $((1 + p/qn)^{qn/p})$ 是 $((1 + p/n)^{n/p})$ 的子数列, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{p}{qn}\right)^{\frac{qn}{p} \frac{p}{q}} = e^{p/q} = e^r.$$

设 $r < 0$. 令 $s = -r > 0$. 于是

$$\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{s}{n}\right)^n,$$

考虑 $((1 - s/n)^n)$ 的倒数

$$\left(1 - \frac{s}{n}\right)^{-n} = \left(\frac{n}{n-s}\right)^n = \left(1 + \frac{s}{n-s}\right)^n.$$

注意到 $\left(1 + \frac{s}{n-s}\right)^{n-s} \rightarrow e^s$ 且 $\left(1 + \frac{s}{n-s}\right)^s \rightarrow 1$, 于是

$$\left(1 + \frac{s}{n-s}\right)^n = \left(1 + \frac{s}{n-s}\right)^{n-s} \left(1 + \frac{s}{n-s}\right)^s \rightarrow e^s,$$

即 $(1 - s/n)^{-n} \rightarrow e^s$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{s}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - s/n)^{-n}} = e^{-s} = e^r.$$

□

4 (Heron 算法). 设 $a \in (0, \infty)$, 递归定义实数列

$$x_0 \geq a, \quad x_{n+1} := \frac{x_n + a/x_n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明 (x_n) 收敛到 $\sqrt{a}$.¹⁵

证明. 由算术-几何平均值不等式可得

$$x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2} \geq \sqrt{x_n \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}, \quad n \in \mathbb{N},$$

于是

$$x_n - x_{n+1} = x_n - \frac{x_n + a/x_n}{2} = \frac{x_n - a/x_n}{2} = \frac{x_n^2 - a}{2x_n} \geq 0, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

因此 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ 是递减的且显然 0 是其下界, 故由单调有界收敛定理可知 (x_n) 收敛. 设 $x_n \rightarrow x$. 于是

$$x = \lim x_{n+1} = \lim \frac{x_n + a/x_n}{2} = \frac{x + a/x}{2},$$

解得 $x = \pm\sqrt{a}$, 而 0 是下界, 故 $x_n \rightarrow \sqrt{a}$. □

5. 设 $a, x_0 \in (0, \infty)$, 递归定义实数列

$$x_{n+1} := \frac{a}{1 + x_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明 (x_n) 收敛并计算其极限.

证明. 令 $M := \max\{a, x_0\}$. 于是 $0 < x_0 \leq M$. 假设 $0 < x_k \leq M$, 则

$$0 < x_{k+1} = \frac{a}{1 + x_k} < a \leq M.$$

因此由数学归纳法可得对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $0 < x_n \leq M$, 即 (x_n) 有界.

令 $(y_n) := (x_{2n})$, $(z_n) := (x_{2n+1})$,

$$f(x) := \frac{a}{1 + \frac{a}{1+x}} = \frac{a(1+x)}{1+x+a}, \quad x \in (0, \infty).$$

假设 $x_1 \leq x_2$, 于是

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{a(1+x_2)}{1+x_2+a} - \frac{a(1+x_1)}{1+x_1+a} = \frac{a^2(x_2 - x_1)}{(1+x_2+a)(1+x_1+a)} \geq 0,$$

这说明 f 是递增的. 我们来考察 (y_n) 的单调性,

$$y_1 - y_0 = f(y_0) - y_0 = \frac{a(1+y_0)}{1+y_0+a} - y_0 = \frac{a - y_0 - y_0^2}{1+y_0+a},$$

¹⁵ 这个计算 $\sqrt{a}$ 的过程被称为 Babylonian 算法或 Heron 算法. 数列 (x_n) 将以极快的速度收敛到 $\sqrt{a}$. 例如, 若 $x_0 = a = 4$, 则

$$x_1 = 2.5, \quad x_2 = 2.05, \quad x_3 = 2.006\,09\dots, \quad x_4 = 2.000\,000\,093\dots$$

注意到, 若 a 与“初始值” x_0 都是有理数, 那么所有的 x_n 都将会是有理数. 在第 4.4 节, 我们会给出 Heron 算法的几何解释并估计其收敛速度.

其中 $a - y_0 - y_0^2$ 的零点是

$$L := \frac{-1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}, \quad -L - 1 := \frac{-1 - \sqrt{1 + 4a}}{2},$$

于是

$$y_1 - y_0 = -\frac{(y_0 - L)(y_0 + L + 1)}{1 + y_0 + a}.$$

当 $y_0 \geq L$ 时 $y_1 \leq y_0$, 而 f 是递增的, 于是 $y_2 = f(y_1) \leq f(y_0) = y_1$, 归纳可得 (y_n) 是递减的, 因此由单调有界收敛定理可知 (y_n) 收敛. 设 $y_n \rightarrow y$, 于是

$$y = \lim y_{n+1} = \lim \frac{a(1 + y_n)}{1 + y_n + a} = \frac{a(1 + y)}{1 + y + a},$$

解得 $y = L$ 或 $y = -L - 1$, 而 $-L - 1 < 0$, 因此 $y = L$. 当 $y_0 \leq L$ 时, 同理可得 (y_n) 收敛到 L . 类似可得 (z_n) 收敛到 L . 故 (x_n) 收敛到 L . $\square$

6. 证明如下数列的收敛性.

$$x_0 > 0, \quad x_1 > 0, \quad x_{n+2} := \sqrt{x_{n+1}x_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明. 设 $x_0 \leq x_1$. 于是

$$x_0 = \sqrt{x_0x_0} \leq x_2 = \sqrt{x_1x_0} \leq \sqrt{x_1x_1} = x_1$$

且

$$x_2 = \sqrt{x_2x_2} \leq x_3 = \sqrt{x_2x_1} \leq \sqrt{x_1x_1} = x_1,$$

即 $x_0 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_1$. 假设 $x_0 \leq x_{2k} \leq x_{2k+2} \leq x_{2k+3} \leq x_{2k+1} \leq x_1$, 则

$$x_{2k+2} = \sqrt{x_{2k+2}x_{2k+2}} \leq x_{2k+4} = \sqrt{x_{2k+3}x_{2k+2}} \leq \sqrt{x_{2k+3}x_{2k+3}} = x_{2k+3}$$

且

$$x_{2k+4} = \sqrt{x_{2k+4}x_{2k+4}} \leq x_{2k+5} = \sqrt{x_{2k+4}x_{2k+3}} \leq \sqrt{x_{2k+3}x_{2k+3}} = x_{2k+3},$$

即 $x_0 \leq x_{2k+2} \leq x_{2k+4} \leq x_{2k+5} \leq x_{2k+3} \leq x_1$. 因此由数学归纳法可得

$$x_0 \leq x_{2n} \leq x_{2n+2} \leq x_{2n+3} \leq x_{2n+1} \leq x_1, \quad n \in \mathbb{N},$$

这说明 (x_{2n}) 是递增且有界的, 而 (x_{2n+1}) 是递减且有界的. 由单调有界收敛定理可得 (x_{2n}) 和 (x_{2n+1}) 收敛. 设 $x_{2n} \rightarrow L_e$, $x_{2n+1} \rightarrow L_o$. 于是

$$L_e = \lim x_{2n+2} = \lim \sqrt{x_{2n+1}x_{2n}} = \sqrt{L_oL_e},$$

注意到 $x_0 > 0$ 是 (x_n) 的下确界, 因此 $L_e > 0$ 且 $L_o > 0$, 这说明 $L_e = L_o$, 故 (x_n) 收敛. 当 $x_0 \geq x_1$ 时, 同理可得 (x_n) 收敛. $\square$

7. 1. 证明如下误差估计.

$$0 < e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < \frac{1}{nn!}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(提示: 对于 $n \in \mathbb{N}^*$. 令 $y_m := \sum_{k=n+1}^{n+m} 1/k!$. 证明 $y_m \rightarrow e - \sum_{k=0}^n 1/k!$ 和 $(m+n)! y_m < \sum_{k=1}^m (n+1)^{1-k}$.)

2. 利用上面的不等式证明 e 是无理数. (提示: 用反证法.)

证明. (1). 令 $e'_n := \sum_{k=0}^n 1/k!$. 固定 $n \in \mathbb{N}$, 于是对于任意 $m \in \mathbb{N}^*$ 都有

$$\begin{aligned} e'_{n+m} - e'_n &= \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{1}{k!} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{(n+k)!} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{(n+1)!(n+2) \cdots (n+k)} \\ &\leq \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=1}^m \frac{1}{(n+2)^{k-1}}, \end{aligned}$$

其中

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{(n+2)^{k-1}} = \frac{(n+2)^{-m} - 1}{(n+2)^{-1} - 1} < \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right),$$

因此

$$e'_{n+m} - e'_n < \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right).$$

令 $m \rightarrow \infty$, 由极限的保序性可知

$$e - e'_n = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) < \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{nn!}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(2). 假设 e 是有理数. 令 $e := p/q$ ($p, q \in \mathbb{N}^*$). 由 (1) 中的不等式可知当 $n = 1$ 时有 $e < 3$, 因此 $2 < e < 3$. 这说明 e 不是整数, 因此 $q \geq 2$. 再次使用 (1) 中的不等式有 $e - e'_q < 1/qq!$, 于是 $q!(e - e'_q) < 1/q \leq 1/2$, 这说明 $q!(e - e'_q)$ 不是整数, 而

$$q!(e - e'_q) = q! \left(\frac{p}{q} - 1 - \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} - \cdots - \frac{1}{q!} \right) = (q-1)!p - q! - q! - (3 \cdot 4 \cdots q) - \cdots - 1 \in \mathbb{Z},$$

矛盾. 故 e 是无理数. □

8. 递归定义实数列

$$x_0 := 1, \quad x_{n+1} := 1 + \frac{1}{x_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明 (x_n) 收敛并计算其极限.

证明. 显然 $1 \leq x_0 \leq 2$. 假设 $1 \leq x_k \leq 2$, 则

$$1 \leq x_{k+1} = 1 + \frac{1}{x_k} \leq 1 + 1 = 2.$$

因此由数学归纳法可得对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $1 \leq x_n \leq 2$, 即 (x_n) 有界.

令 $(y_n) := (x_{2n})$, $(z_n) := (x_{2n+1})$,

$$f(x) := 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 + \frac{x}{x+1}, \quad (1, \infty).$$

假设 $x_1 \leq x_2$, 于是

$$f(x_2) - f(x_1) = 1 + \frac{x_2}{x_2+1} - 1 - \frac{x_1}{x_1+1} = \frac{x_2 - x_1}{(x_2+1)(x_1+1)} \geq 0,$$

因此 f 是递增的. 下面考察 (y_n) 的单调性, 注意到 $y_0 = x_0 = 1$ 而 $y_1 = f(y_0) = 3/2$, 故 $y_0 \leq y_1$, 而 f 是递增的, 于是 $y_1 = f(y_0) \leq f(y_1) = y_2$, 归纳可得 (y_n) 是递增的, 因此由单调有界收敛定理可知 (y_n) 收敛. 设 $y_n \rightarrow y$, 于是

$$y = \lim y_{n+1} = \lim \left(1 + \frac{y_n}{y_n+1} \right) = 1 + \frac{y}{y+1},$$

解得 $y = (1 \pm \sqrt{5})/2$, 而 (y_n) 下界为 1, 故 $y = (1 + \sqrt{5})/2$. 类似的, 可得 (z_n) 收敛到 $(1 + \sqrt{5})/2$. 于是 (x_n) 收敛到 $(1 + \sqrt{5})/2$. $\square$

9. 递归定义实数列

$$f_0 := 0, \quad f_1 := 1, \quad f_{n+1} := f_n + f_{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

称 f_n 是 Fibonacci 数. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{n+1}}{f_n} = g,$$

其中 g 是练习 8 中数列的极限.

证明. 令

$$g_n := \frac{f_{n+1}}{f_n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

则

$$g_n = \frac{f_{n+1}}{f_n} = \frac{f_n + f_{n-1}}{f_n} = 1 + \frac{f_{n-1}}{f_n} = 1 + \frac{1}{g_{n-1}}, \quad n \geq 2.$$

显然 (g_n) 以 1 为下界 2 为上界, 故 (g_n) 有界. 计算 g_n 的前几项可得 $g_2 \geq g_4$ 且 $g_1 \leq g_3$.

假设 $g_{2k+2} \geq g_{2k+4}$ 且 $g_{2k+1} \leq g_{2k+3}$, 则

$$g_{2k+5} - g_{2k+3} = 1 + \frac{1}{g_{2k+4}} - 1 - \frac{1}{g_{2k+2}} \geq 0,$$

即 $g_{2k+3} \leq g_{2k+5}$, 于是

$$g_{2k+6} - g_{2k+4} = 1 + \frac{1}{g_{2k+5}} - 1 - \frac{1}{g_{2k+3}} \leq 0,$$

即 $g_{2k+4} \geq g_{2k+6}$. 因此由数学归纳法可得

$$g_{2n+2} \geq g_{2n+4}, \quad g_{2n+1} \leq g_{2n+3}, \quad n \in \mathbb{N},$$

故 (g_{2n}) 是递减的, (g_{2n+1}) 是递增的. 由单调有界收敛定理可得 (g_{2n}) 和 (g_{2n+1}) 收敛. 设 $g_{2n} \rightarrow g$, 于是

$$g = \lim g_{2n+2} = \lim \left(1 + \frac{1}{1 + 1/g_{2n}} \right) = \lim \left(1 + \frac{g_{2n}}{g_{2n} + 1} \right) = 1 + \frac{g}{g + 1},$$

解得 $g = (1 \pm \sqrt{5})/2$, 而 (g_n) 下界为 1, 故 $g = (1 + \sqrt{5})/2$. 类似的, 可得 (g_{2n+1}) 收敛到 $(1 + \sqrt{5})/2$. 于是 (g_n) 收敛到 $(1 + \sqrt{5})/2$. $\square$

10. 设

$$x_0 := 5, \quad x_1 := 1, \quad x_{n+1} := \frac{2}{3}x_n + \frac{1}{3}x_{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明 (x_n) 收敛并计算其极限. (提示: 求出 $x_n - x_{n+1}$ 的表达式.)

证明. 令

$$d_n := x_n - x_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

注意到

$$d_{n+1} = x_{n+1} - x_{n+2} = x_{n+1} - \frac{2}{3}x_{n+1} - \frac{1}{3}x_n = \frac{1}{3}(x_{n+1} - x_n) = -\frac{1}{3}d_n,$$

于是

$$d_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^n d_0 = 4\left(-\frac{1}{3}\right)^n,$$

而

$$\sum_{k=0}^{n-1} d_k = d_0 + d_1 + \cdots + d_{n-1} = (x_0 - x_1) + (x_1 - x_2) + \cdots + (x_{n-1} - x_n) = x_0 - x_n,$$

因此

$$x_n = x_0 - \sum_{k=0}^{n-1} d_k = 5 - 4 \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{3}\right)^k = 5 - 4 \frac{(-1/3)^n - 1}{-1/3 - 1} = 2 + 3\left(-\frac{1}{3}\right)^n, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

由于 $(-1/3)^n \rightarrow 0$, 故 $x_n \rightarrow 2$. $\square$

2.5 无穷极限

在扩展实数系 $\bar{\mathbb{R}}$ 中, 将某些 $\mathbb{R}$ 中的数列视为收敛到 $+\infty$ 或 $-\infty$ 是很有用的. 为了建立这种扩展的极限概念, 只需为 $\bar{\mathbb{R}}$ 中的元素 $\pm\infty$ 定义恰当的邻域即可.

收敛到无穷大

由于在 $\bar{\mathbb{R}}$ 上没有合适¹⁶的度量, 我们采用如下定义来扩展 $\mathbb{R}$ 中的邻域系.

定义 2.5.1 (无穷大的邻域). 设 $U \subseteq \bar{\mathbb{R}}$. 若存在 $K > 0$ 使得

1. $(K, \infty) \subseteq U$, 则称 U 是 ∞ 的邻域.
2. $(-\infty, -K) \subseteq U$, 则称 U 是 $-\infty$ 的邻域.

进一步, 将 $\pm\infty$ 的邻域系记作

$$\mathcal{N}(\pm\infty) := \{U \in \bar{\mathbb{R}}; U \text{ 是 } \pm\infty \text{ 的邻域}\}.$$

定义 2.5.2 (无穷大作为聚点). 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 若 $\pm\infty$ 的任意邻域都包含了 (x_n) 的无穷多项, 则称 $\pm\infty$ 是 (x_n) 的聚点.

定义 2.5.3 (无穷大作为极限). 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 若 $\pm\infty$ 的任意邻域都包含了 (x_n) 的几乎所有项, 则称 (x_n) 收敛到 $\pm\infty$ 或以 $\pm\infty$ 为极限, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \pm\infty \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow \pm\infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

若存在 $x \in \bar{\mathbb{R}}$ 使得 $\lim x_n = x$, 则称 (x_n) 在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛, 否则称 (x_n) 在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中发散.

在这样的定义下, 任意在 $\mathbb{R}$ 中收敛的数列也在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛, 任意在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中发散的数列也在 $\mathbb{R}$ 中发散. 换句话说, 存在在 $\mathbb{R}$ 中发散但在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛 (到 $\pm\infty$) 的数列. 这种情况下, 我们在度量空间中对收敛性的理解就不再适用了, 因此这种收敛性需要单独研究.

例 2.5.1. 1. 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 则 $x_n \rightarrow \infty$, 当且仅当对于任意 $K > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n > K$.

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - n) = \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} -2^n = -\infty.$$

3. 数列 $((-n)^n)$ 有两个聚点, ∞ 和 $-\infty$, 因此在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中发散.

命题 2.5.2. 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \begin{cases} 0, & \text{若 } x_n \rightarrow \pm\infty, \\ \infty, & \text{若 } x_n \rightarrow 0 \text{ 且 } (x_n) \text{ 的几乎所有项都为正,} \\ -\infty, & \text{若 } x_n \rightarrow 0 \text{ 且 } (x_n) \text{ 的几乎所有项都为负.} \end{cases}$$

¹⁶当然, 我们可以在 $\bar{\mathbb{R}}$ 上定义各种度量, 但是到目前为止我们所定义的这些度量都不适合我们的目的.

证明. 设 $x_n \rightarrow \pm\infty$. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n| > 1/\varepsilon$, 于是

$$\left| \frac{1}{x_n} \right| = \frac{1}{|x_n|} < \varepsilon, \quad n \geq N.$$

因此 $1/x_n \rightarrow 0$.

设 $x_n \rightarrow 0$ 且 (x_n) 的几乎所有项都为正. 任取 $K > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $0 < x_n < 1/K$, 于是

$$\frac{1}{x_n} > K, \quad n \geq N.$$

因此 $1/x_n \rightarrow \infty$. 设 $x_n \rightarrow 0$ 且 (x_n) 的几乎所有项都为负. 类似可得 $1/x_n \rightarrow -\infty$. $\square$

命题 2.5.3. $\mathbb{R}$ 中的每个单调数列 (x_n) 都在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \begin{cases} \sup\{x_n; n \in \mathbb{N}\}, & \text{若 } (x_n) \text{ 是递增的,} \\ \inf\{x_n; n \in \mathbb{N}\}, & \text{若 } (x_n) \text{ 是递减的.} \end{cases}$$

证明. 设 (x_n) 是递增的. 若 (x_n) 有界, 则由单调有界收敛定理可知 $\lim x_n = \sup\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$. 设 (x_n) 无上界. 故对于任意 $K > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $x_N > K$. 而 (x_n) 是递增的, 于是

$$x_n \geq x_N > K, \quad n \geq N.$$

因此 $\lim x_n = \infty = \sup\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$. 当 (x_n) 递减时, 类似可证. $\square$

上极限与下极限

设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 我们可以定义两个新数列

$$y_n := \sup_{k \geq n} x_k := \sup\{x_k; k \geq n\}, \quad z_n := \inf_{k \geq n} x_k := \inf\{x_k; k \geq n\}.$$

显然, (y_n) 是递减的, 而 (z_n) 是递增的. 于是由命题 2.5.3 可知, (y_n) 和 (z_n) 在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup_{k \geq n} x_k), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf_{k \geq n} x_k).$$

因此我们可以做出如下定义.

定义 2.5.4 (上极限与下极限). 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 称

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n := \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup_{k \geq n} x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sup_{k \geq n} x_k)$$

是 (x_n) 的上极限,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n := \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n := \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf_{k \geq n} x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\inf_{k \geq n} x_k)$$

是 (x_n) 的下极限.

接下来我们会看到, 一个数列的上极限和下极限都是该数列的聚点.

定理 2.5.4. $\mathbb{R}$ 中的任意数列 (x_n) 都有一个最小的聚点 x_* 和一个最大的聚点 x^* 且满足

$$\liminf x_n = x_* , \quad \limsup x_n = x^* .$$

证明. 令 $x^* := \limsup x_n$, $y_n := \sup_{k \geq n} x_k$. 则 (y_n) 是递减数列且

$$x^* = \inf_{n \in \mathbb{N}} y_n .$$

下面分三种情况证明 x^* 是 (x_n) 最大的聚点.

假设 $x^* = -\infty$. 则对于任意 $K > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sup_{k \geq n} x_k = y_n < -K ,$$

即当 $k \geq n$ 时 $x_k < -K$, 因此 (x_n) 收敛到 $-\infty$, 故 x^* 是 (x_n) 唯一的聚点.

假设 $x^* \in \mathbb{R}$. 由命题 1.10.1 可知, 对于每个 $\xi > x^*$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $y_n < \xi$, 于是

$$x_k \leq y_n < \xi , \quad k \geq n .$$

因此 $\mathbb{B}(\xi, \xi - y_n)$ 里仅有 (x_n) 的至多有限项, 故 ξ 不是 (x_n) 的聚点, 这说明 (x_n) 的聚点不会大于 x^* . 只用证明 x^* 本身是 (x_n) 的聚点. 任取 $\varepsilon > 0$, $m \in \mathbb{N}$. 于是由命题 1.10.1 可知存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $y_n < x^* + \varepsilon$. 而 (y_n) 是递减的, 故存在 $n \geq m$ 使得

$$x^* \leq \sup_{k \geq n} x_k = y_n < x^* + \varepsilon .$$

再一次由命题 1.10.1 可知存在 $k \geq n \geq m$ 使得

$$x^* - \varepsilon < x_k \leq \sup_{k \geq n} x_k < x^* + \varepsilon ,$$

因此 x^* 是 (x_n) 的聚点.

假设 $x^* = \infty$. 则对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $y_n = \infty$. 任取 $K > 0$, $m \in \mathbb{N}$. 则

$$\sup_{k \geq m} x_k = y_m = \infty ,$$

于是存在 $k \geq m$ 使得 $x_k > K$, 因此 x^* 是 (x_n) 的聚点, 显然也是最大的聚点.

类似可证 $x_* := \liminf x_n$ 是 (x_n) 最小的聚点. □

例 2.5.5. 1. $\limsup \frac{(-1)^n n}{n+1} = 1$, $\liminf \frac{(-1)^n n}{n+1} = -1$.

2. $\limsup n^{(-1)^n} = \infty$, $\liminf n^{(-1)^n} = 0$.

定理 2.5.6. 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 则 (x_n) 在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛当且仅当

$$\limsup x_n \leq \liminf x_n .$$

进一步, 若 (x_n) 收敛, 则

$$\lim x_n = \liminf x_n = \limsup x_n .$$

证明. $\Rightarrow$. 设 (x_n) 收敛到 $x \in \bar{\mathbb{R}}$. 则 x 是 (x_n) 唯一的聚点, 因此由定理 2.5.4 可知 $\limsup x_n \leq \liminf x_n$.

$\Leftarrow$. 设 $\limsup x_n \leq \liminf x_n$. 则由定理 2.5.4 可知 $x := \limsup x_n = \liminf x_n$ 是 (x_n) 唯一的聚点. 若 $x = -\infty$. 则 $\limsup x_n = -\infty$, 于是对于任意 $K > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq n$ 时 $x_k < -K$, 因此 (x_n) 收敛到 $-\infty$. 若 $x = \infty$, 同理可得 (x_n) 收敛到 ∞ .

若 $x \in \mathbb{R}$. 任取 $\varepsilon > 0$. 则 $\liminf x_n = x$, 于是由命题 1.10.1 可知存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq m$ 时 $x_k > x - \varepsilon$. 类似可得, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq n$ 时 $x_k < x + \varepsilon$. 于是

$$x - \varepsilon < x_k < x + \varepsilon, \quad k \geq \max\{m, n\},$$

因此 (x_n) 收敛到 x . □

Bolzano-Weierstrass 定理

对于 $\mathbb{R}$ 中的有界数列, 定理 2.5.4 称为 Bolzano-Weierstrass 定理.

定理 2.5.7 (Bolzano-Weierstrass 定理). $\mathbb{R}^m$ 中的每个有界序列都存在收敛子序列.

证明. 我们先考虑 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 的情况, 并通过数学归纳法证明该命题. 由定理 2.5.4 和命题 2.1.17 可知 $m = 1$ 时成立. 对于 m 到 $m + 1$ 的归纳步骤, 假设 (z_n) 是 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中的有界序列. 令 $M := \sup_{n \in \mathbb{N}} |z_n| \in [0, \infty)$. 由于 $\mathbb{R}^{m+1} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$, 我们可以将 $z \in \mathbb{R}^{m+1}$ 记作 $z = (x, y)$ 其中 $x \in \mathbb{R}^m$, $y \in \mathbb{R}$. 因此 $z_n = (x_n, y_n)$, 于是我们得到了 $\mathbb{R}^m$ 中的序列 (x_n) 和 $\mathbb{R}$ 中的序列 (y_n) . 而

$$\max\{|x_n|, |y_n|\} \leq \sqrt{|x_n|^2 + |y_n|^2} = |z_n| \leq M, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此 (x_n) 和 (y_n) 都是有界的. 于是由归纳假设可知 (x_n) 存在收敛子序列 (x_{n_k}) , 设 $x_{n_k} \rightarrow x$. 由于 (y_n) 的子序列 (y_{n_k}) 也是有界的, 因此由归纳假设可知 (y_{n_k}) 存在收敛子序列 $(y_{n_{k_j}})$, 设 $y_{n_{k_j}} \rightarrow y$. 由命题 2.1.15 可知 (x_{n_k}) 的子序列 $(x_{n_{k_j}})$ 也收敛到 x . 最后由命题 2.3.14 可知 $(z_n) = ((x_n, y_n))$ 的子序列 $((x_{n_{k_j}}, y_{n_{k_j}}))$ 收敛到 (x, y) .

对于 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 的情况. 使用注 2.3.13(5) 中 $\mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}^{2m}$ 的典范映射后, 即是 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 的情况. □

练习

1. 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列, $x_* := \liminf x_n$, $x^* := \limsup x_n$. 假设 $x_*, x^* \in \mathbb{R}$. 证明对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$x_* - \varepsilon < x_n < x^* + \varepsilon, \quad n \geq N.$$

在 $x_* = -\infty$ 和 $x^* = \infty$ 的情况下, 该命题需要做出什么修改?

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 令 $y_n := \sup_{k \geq n} x_k$, $z_n := \inf_{k \geq n} x_k$. 由下极限与上极限的定义可知

$$x_* = \sup_{n \in \mathbb{N}} z_n, \quad x^* = \inf_{n \in \mathbb{N}} y_n.$$

于是存在 $n, m \in \mathbb{N}$ 使得

$$z_n = \inf_{k \geq n} x_k > x_* - \varepsilon, \quad y_m = \sup_{k \geq m} x_k < x^* + \varepsilon,$$

即当 $k \geq n$ 时 $x_k > x_* - \varepsilon$, 当 $k \geq m$ 时 $x_k < x^* + \varepsilon$. 因此

$$x_* - \varepsilon < x_k < x^* + \varepsilon, \quad k \geq \max\{m, n\}.$$

若 $x_* = -\infty$, $x^* = \infty$, 则该命题平凡的成立. □

2. 设 (x_n) 和 (y_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列,

$$x_* := \liminf x_n, \quad x^* := \limsup x_n, \quad y_* := \liminf y_n, \quad y^* := \limsup y_n.$$

证明以下命题.

1. $\limsup(-x_n) = -x_*$.

2. 若 (x_*, y_*) , (x_*, y^*) , $(x^*, y^*) \notin \{(\infty, -\infty), (-\infty, \infty)\}$, 则

$$x_* + y_* \leq \liminf(x_n + y_n) \leq x_* + y^* \leq \limsup(x_n + y_n) \leq x^* + y^*.$$

3. 若 (x_n) 和 (y_n) 是非负数列且 (x_*, y_*) , (x_*, y^*) , $(x^*, y^*) \notin \{(0, \infty), (\infty, 0)\}$, 则

$$0 \leq x_* y_* \leq \liminf x_n y_n \leq x_* y^* \leq \limsup x_n y_n \leq x^* y^*.$$

4. 若 (y_n) 收敛到 $y \in \mathbb{R}$, 则

$$\limsup(x_n + y_n) = x^* + y, \quad \liminf(x_n + y_n) = x_* + y,$$

且

$$\limsup x_n y_n = \begin{cases} x^* y, & y > 0, \\ x_* y, & y < 0. \end{cases}$$

5. 若对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \leq y_n$, 则

$$\liminf x_n \leq \liminf y_n, \quad \limsup x_n \leq \limsup y_n.$$

证明. (1). 我们先证明对于任意非空集合 $X \subseteq \mathbb{R}$ 都有

$$\sup_{x \in X}(-x) = -\inf_{x \in X} x, \quad \inf_{x \in X}(-x) = -\sup_{x \in X} x.$$

令 $y := \sup_{x \in X}(-x)$. 则对于任意 $x \in X$ 都有 $-x \leq y$, 即 $x \geq -y$, 因此 $-y$ 是 X 的下界. 容易证明 $-y$ 也是 X 的下确界, 于是 $\sup(-X) = -\inf X$. 同理可得 $\inf(-X) = -\sup X$. 因此

$$\limsup(-x_n) = \inf_{n \in \mathbb{N}}(\sup_{k \geq n}(-x_k)) = \inf_{n \in \mathbb{N}}(-\inf_{k \geq n} x_k) = -\sup_{n \in \mathbb{N}}(\inf_{k \geq n} x_k) = -\liminf x_n = -x_*.$$

(2). 由于

$$\sup_{k \geq n}(x_k + y_k) \leq \sup_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k, \quad \inf_{k \geq n}(x_k + y_k) \geq \inf_{k \geq n} x_k + \inf_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此由极限的保序性可知

$$\limsup(x_n + y_n) \leq \lim(\sup_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k) = \limsup x_n + \limsup y_n = x^* + y^*,$$

$$\liminf(x_n + y_n) \geq \lim(\inf_{k \geq n} x_k + \inf_{k \geq n} y_k) = \liminf x_n + \liminf y_n = x_* + y_*.$$

而

$$\sup_{k \geq n}(x_k + y_k) \geq \sup_{k \geq n}(y_k + \inf_{j \geq n} x_j) = \inf_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N},$$

$$\inf_{k \geq n}(x_k + y_k) \leq \inf_{k \geq n}(x_k + \sup_{j \geq n} y_j) = \inf_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此由极限的保序性可知

$$\liminf(x_n + y_n) \leq \lim(\inf_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k) = \liminf x_n + \limsup y_n = x_* + y^* \leq \limsup(x_n + y_n).$$

(3). 由于 (x_n) 和 (y_n) 非负, 于是

$$\sup_{k \geq n} x_k y_k \leq \sup_{k \geq n} x_k \sup_{k \geq n} y_k, \quad \inf_{k \geq n} x_k y_k \geq \inf_{k \geq n} x_k \inf_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此由极限的保序性可知

$$\limsup x_n y_n \leq \lim(\sup_{k \geq n} x_k \sup_{k \geq n} y_k) = \limsup x_n \limsup y_n = x^* y^*,$$

$$\liminf x_n y_n \geq \lim(\inf_{k \geq n} x_k \inf_{k \geq n} y_k) = \liminf x_n \liminf y_n = x_* y_*.$$

而

$$\begin{aligned}\sup_{k \geq n} x_k y_k &\geq \sup_{k \geq n} (y_k \inf_{j \geq n} x_j) = \inf_{k \geq n} x_k \sup_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N}, \\ \inf_{k \geq n} x_k y_k &\leq \inf_{k \geq n} (x_k \sup_{j \geq n} y_j) = \inf_{k \geq n} x_k \sup_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N},\end{aligned}$$

因此由极限的保序性可知

$$\liminf x_n y_n \leq \lim_{k \geq n} (\inf_{k \geq n} x_k \sup_{k \geq n} y_k) = \liminf x_n \limsup y_n = x_* y^* \leq \limsup x_n y_n.$$

(4). 由于 (y_n) 收敛到 y , 故 $y = y_* = y^*$. 由 (2) 可知

$$\begin{aligned}x^* + y &= x^* + y_* \leq \limsup (x_n + y_n) \leq x^* + y^* = x^* + y, \\ x_* + y &= x_* + y_* \leq \liminf (x_n + y_n) \leq x_* + y^* = x_* + y.\end{aligned}$$

设 $y > 0$. 令 $\alpha := \limsup x_n y_n$. 先证明 $\limsup x_n y_n \leq x^* y$. 由于 α 是 $(x_n y_n)$ 的聚点, 故 $(x_n y_n)$ 存在子数列 $(x_{n_k} y_{n_k})$ 收敛到 α . 而 $y_{n_k} \rightarrow y > 0$, 于是 $x_{n_k} = x_{n_k} y_{n_k} / y_{n_k} \rightarrow \alpha / y$, 因此 α / y 是 (x_n) 的聚点. 注意到 x^* 是 (x_n) 最大的聚点, 于是 $\alpha / y \leq x^*$, 即 $\alpha \leq x^* y$. 再证明 $x^* y \leq \limsup x_n y_n$. 由于 x^* 是 (x_n) 的聚点, 故 (x_n) 存在子数列 (x_{n_k}) 收敛到 x^* . 而 $y_{n_k} \rightarrow y$, 于是 $x_{n_k} y_{n_k} \rightarrow x^* y$, 因此 $x^* y$ 是 $(x_n y_n)$ 的聚点. 注意到 α 是 $(x_n y_n)$ 最大的聚点, 于是 $x^* y \leq \alpha$.

设 $y < 0$. 令 $z_n := -x_n$, $z^* := \limsup z_n = -\liminf x_n = -x_*$. 由于 $-y_n \rightarrow -y > 0$, 于是

$$\limsup x_n y_n = \limsup z_n (-y_n) = z^* (-y) = x_* y.$$

(5). 先证明

$$\inf_{k \geq n} x_k \leq \inf_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N}.$$

假设存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\inf_{k \geq n} x_k > \inf_{k \geq n} y_k$. 则存在 $m \geq n$ 使得 $y_m < \inf_{k \geq n} x_k$, 因此 $y_m < x_m$, 矛盾. 于是由极限的保序性可知 $\liminf x_n \leq \liminf y_n$. 同理可得 $\limsup x_n \leq \limsup y_n$. $\square$

3. 设 $x_n := 2^n(1 + (-1)^n) + 1$. 求出以下内容.

$$\begin{aligned}\liminf x_n, \quad \liminf x_{n+1}/x_n, \quad \liminf \sqrt[n]{x_n}, \\ \limsup x_n, \quad \limsup x_{n+1}/x_n, \quad \limsup \sqrt[n]{x_n}.\end{aligned}$$

证明. 显然 $\liminf x_n = 1$, $\limsup x_n = \infty$.

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2^{n+1}(1 + (-1)^{n+1}) + 1}{2^n(1 + (-1)^n) + 1},$$

$\liminf x_{n+1}/x_n = 0, \limsup x_{n+1}/x_n = \infty.$

$$\sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{2^n(1+(-1)^n) + 1},$$

$\liminf \sqrt[n]{x_n} = 1, \limsup \sqrt[n]{x_n} = 2.$

□

4. 设 (x_n) 是 $(0, \infty)$ 中的数列. 证明

$$\liminf \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \liminf \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

(提示: 若 $q < \liminf x_{n+1}/x_n$, 则对于任意 $n \geq n(q)$ 都有 $x_{n+1}/x_n \geq q$.)

证明. 由上极限与下极限和聚点的关系可知 $\liminf \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup \sqrt[n]{x_n}$. 令

$$a_n := x_{n+1}/x_n, \quad a_* := \liminf a_n, \quad a^* := \limsup a_n.$$

先证明 $a_* \leq \liminf \sqrt[n]{x_n}$. 若 $a_* = 0$, 则显然成立. 设 $a_* > 0$. 任取 $0 < \varepsilon < a_*$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $a_n > a_* - \varepsilon$. 于是

$$x_n = x_N \frac{x_{N+1}}{x_N} \frac{x_{N+2}}{x_{N+1}} \cdots \frac{x_n}{x_{n-1}} = x_N \prod_{j=N}^{n-1} a_j > x_N \prod_{j=N}^{n-1} (a_* - \varepsilon) = x_N (a_* - \varepsilon)^{n-N}, \quad n \geq N,$$

则 $\sqrt[n]{x_n} > \sqrt[n]{x_N} (a_* - \varepsilon)^{(n-N)/n}$, 而 $\sqrt[n]{x_N} (a_* - \varepsilon)^{(n-N)/n} \rightarrow a_* - \varepsilon$. 令 $n \rightarrow \infty$, 由下极限的保序性可知

$$\liminf \sqrt[n]{x_n} \geq \liminf \sqrt[n]{x_N} (a_* - \varepsilon)^{(n-N)/n} = \lim \sqrt[n]{x_N} (a_* - \varepsilon)^{(n-N)/n} = a_* - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 由极限的保序性可知 $\liminf \sqrt[n]{x_n} \geq a_*$. 类似可证 $\limsup \sqrt[n]{x_n} \leq a^*$. □

5. 1. 证明函数

$$\varphi: \bar{\mathbb{R}} \rightarrow [-1, 1], \quad x \mapsto \varphi(x) := \begin{cases} -1, & x = -\infty, \\ x/(1+|x|), & x \in \mathbb{R}, \\ 1, & x = \infty \end{cases}$$

是严格递增的双射.

2. 证明函数

$$d: \bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto |\varphi(x) - \varphi(y)|$$

是 $\bar{\mathbb{R}}$ 上的度量.

证明. (1). 先证明 φ 是严格递增的. 设 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 且 $x_1 < x_2$. 于是

$$\varphi(x_1) - \varphi(x_2) = \frac{x_1}{1+|x_1|} - \frac{x_2}{1+|x_2|} = \frac{x_1 - x_2 + x_1|x_2| - x_2|x_1|}{(1+|x_1|)(1+|x_2|)},$$

而 $x_1 - x_2 < 0$ 且

$$\begin{aligned} x_1|x_2| - x_2|x_1| &= -x_1x_2 + x_2x_1 = 0, & x_1 < x_2 \leq 0, \\ x_1|x_2| - x_2|x_1| &= x_1x_2 + x_2x_1 = 2x_1x_2 \leq 0, & x_1 \leq 0 < x_2, \\ x_1|x_2| - x_2|x_1| &= x_1x_2 - x_2x_1 = 0, & 0 < x_1 < x_2. \end{aligned}$$

因此 $\varphi(x_1) < \varphi(x_2)$. 显然对于任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\varphi(-\infty) = -1 < \varphi(x) < 1 = \varphi(\infty)$. 故 φ 是严格递增的. 下面证明 φ 是双射. 考虑函数

$$\psi: [-1, 1] \rightarrow \bar{\mathbb{R}}, \quad y \mapsto \psi(y) := \begin{cases} -\infty, & y = -1, \\ y/(1 - |y|), & y \in (-1, 1), \\ \infty, & y = 1. \end{cases}$$

不难验证 $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\bar{\mathbb{R}}}$ 且 $\varphi \circ \psi = \text{id}_{[-1, 1]}$, 因此 φ 是双射.

(2). 由于 φ 是单射, 故 $\varphi(x) = \varphi(y)$ 当且仅当 $x = y$, 即 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$, 因此 (M_1) 成立. 而 (M_2) 和 (M_3) 显然成立. $\square$

6. 设数列

$$(x_n) := (0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, \dots), \quad (y_n) := (2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, \dots).$$

求出以下内容.

$$\begin{aligned} \liminf x_n + \liminf y_n, \quad \liminf(x_n + y_n), \quad \liminf x_n + \limsup y_n, \\ \limsup x_n + \limsup y_n, \quad \limsup(x_n + y_n). \end{aligned}$$

证明.

$$\begin{aligned} \liminf x_n + \liminf y_n = 0, \quad \liminf(x_n + y_n) = 1, \quad \liminf x_n + \limsup y_n = 2, \\ \limsup x_n + \limsup y_n = 4, \quad \limsup(x_n + y_n) = 3. \end{aligned}$$

$\square$

2.6 完备性

在第2.1节中, 我们借助邻域的概念定义了收敛性. 在该定义中, 序列的极限会显式的出现, 因此原则上要证明一个序列收敛, 必须先知道其极限值是什么. 本节中, 我们将证明在某些“完备”空间中, 我们有可能在不预先知道极限的情况下判断序列是否收敛. 序列在这样的度量空间中收敛, 当且仅当它们是 Cauchy 序列. 这类序列是收敛性理论研究的重要工具. 此外, 它们也被用于 Cantor 的实数构造法中, 这一方法我们在第1.10节已提及, 并将在本节具体展开.

Cauchy 序列

在本小节中, 设 $X := (X, d)$ 是度量空间.

定义 2.6.1 (Cauchy 序列). 称 X 中的序列 (x_n) 是 Cauchy 序列, 若对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

若 (x_n) 是赋范向量空间 E 中的序列, 则 (x_n) 是 Cauchy 序列当且仅当 (x_n) 在诱导度量下是 Cauchy 序列. 值得注意的是, Cauchy 序列在 E 中具有“平移不变性”, 即若 (x_n) 是 Cauchy 序列且 a 是 E 中的任意向量, 则“平移”后得到的序列 $(x_n + a)$ 同样也是 Cauchy 序列. 这表明 Cauchy 序列无法通过邻域来定义.

命题 2.6.1. 每个收敛序列都是 Cauchy 序列.

证明. 设 (x_n) 是 X 中的收敛序列且以 x 为极限. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon/2$, 于是

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x_m, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad m, n \geq N,$$

因此 (x_n) 是 Cauchy 序列. □

命题 2.6.1 的逆命题不成立, 即存在度量空间其中的 Cauchy 序列不一定收敛.

例 2.6.2. 递归定义数列

$$x_0 := 2, \quad x_{n+1} := \frac{x_n + 2/x_n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

则 (x_n) 是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列, 但在 $\mathbb{Q}$ 中发散.

证明. 显然对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \in \mathbb{Q}$. 进一步, 由练习 4 可知 (x_n) 收敛到 $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, 因此由命题 2.6.1 可知 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中 Cauchy 序列, 于是也是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列. 注意到 $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 因此由极限的唯一性可知 (x_n) 在 $\mathbb{Q}$ 中发散. □

命题 2.6.3. 每个 Cauchy 序列都是有界的.

证明. 设 (x_n) 是 X 中 Cauchy 序列. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(x_n, x_m) < 1$, 特别的, 当 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x_N) < 1$. 令 $M := \max_{n < N} d(x_n, x_N)$, 于是

$$d(x_n, x_N) < M + 1, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此由例 2.1.9(3) 可知 (x_n) 有界. □

命题 2.6.4. 若 Cauchy 序列存在收敛子序列, 则其自身也收敛.

证明. 设 (x_n) 是 X 中的 Cauchy 序列, (x_{n_k}) 是其收敛子序列且以 x 为极限. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(x_n, x_m) < \varepsilon/2$, 同样存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2$. 令 $M := \max\{N, K\}$ 于是

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_M}) + d(x_{n_M}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad n \geq M,$$

因此 (x_n) 收敛到 x . □

Banach 空间

定义 2.6.2 (完备性). 称度量空间 X 是完备的, 若 X 中的任意 Cauchy 序列都收敛.

定义 2.6.3 (Banach 空间). 称完备赋范向量空间是 Banach 空间.

利用 Bolzano-Weierstrass 定理, 我们可以证明完备度量空间是存在的.

定理 2.6.5. $\mathbb{K}^m$ 是 Banach 空间.

证明. 我们已经在第 2.3 节中知道了 $\mathbb{K}^m$ 是赋范向量空间, 因此只用证明完备性. 设 (x_n) 是 $\mathbb{K}^m$ 中的 Cauchy 序列. 于是由命题 2.6.3 可知 (x_n) 有界, 因此由 Bolzano-Weierstrass 定理可知 (x_n) 存在收敛子序列, 最后由命题 2.6.4 可知 (x_n) 收敛. □

定理 2.6.6. 设 X 是非空集合, $(E, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间. 则 $B(X, E)$ 也是 Banach 空间.

证明. 由命题 2.3.5 可知 $B(X, E)$ 是赋范向量空间, 因此只用证明完备性. 设 (u_n) 是 $B(X, E)$ 中的 Cauchy 序列. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|u_n(x) - u_m(x)\| \leq \|u_n - u_m\|_\infty < \varepsilon, \quad m, n \geq N, \quad x \in X,$$

这说明对于任意 $x \in X$, 序列 $(u_n(x))$ 是 Cauchy 序列. 于是由 E 的完备性可知, 存在 $a_x \in E$ 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时 $u_n(x) \rightarrow a_x$. 对于任意 $x \in X$, 令 $u(x) := a_x$, 由极限的唯一性可知 a_x 是唯一的, 因此 $u \in E^X$.

下面证明 $u_n \rightarrow u \in B(X, E)$. 在上式中, 令 $m \rightarrow \infty$ 可得

$$\|u_n(x) - u(x)\| \leq \varepsilon, \quad n \geq N, \quad x \in X,$$

因此当 $n \geq N$ 时 $\|u_n - u\|_\infty \leq \varepsilon$, 故 $u_n \rightarrow u$. 而

$$\|u(x)\| - \|u_N(x)\| \leq \|u_N(x) - u(x)\| \leq \varepsilon, \quad x \in X,$$

即

$$\|u(x)\| \leq \varepsilon + \|u_N(x)\| \leq \varepsilon + \|u_N\|_\infty, \quad x \in X,$$

于是 $\|u\|_\infty \leq \varepsilon + \|u_N\|_\infty$, 因此 $u \in B(X, E)$. $\square$

根据上面两条定理, 我们可以直接得到如下推论.

推论 2.6.7. 设 X 是非空集合. 则 $B(X, \mathbb{K}^m)$ 是 Banach 空间.

注 2.6.8. 1. 赋范向量空间 E 的完备性在更换等价范数后是不变的. 也就是说, 若 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 E 上的等价范数, 则 $(E, \|\cdot\|_1)$ 是完备的当且仅当 $(E, \|\cdot\|_2)$ 是完备的.

2. 向量空间 $\mathbb{K}^m$ 在 $|\cdot|_1$ 或 $|\cdot|_\infty$ 范数下都是完备的. (我们将在第 3.3 节证明 $\mathbb{K}^m$ 上的所有范数都是等价的.)

3. 称完备的内积空间 (见定理 2.3.10) 是 Hilbert 空间. 特别的, 定理 2.6.5 表明 $\mathbb{K}^m$ 是 Hilbert 空间.

Cantor 的实数构造法

我们用实数 $\mathbb{R}$ 的另一种构造方法来结束本节. 由于后续章节将不再使用这一构造, 读者在初次阅读本书时可跳过这部分内容.

不难验证

$$\mathcal{R} := \{r \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}; r \text{ 是 Cauchy 序列}\}$$

和

$$\mathbf{c}_0 := \{r \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}; r \text{ 是无穷小量}\}$$

是良定义的.

引理 2.6.9. $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ 的含 $\bar{1}$ 子环, 且 $\mathbf{c}_0$ 是 $\mathcal{R}$ 的非平凡真理想.

令 R 是环 $\mathcal{R}$ 模去其理想 $\mathbf{c}_0$ 所得的商环, 即 $R := \mathcal{R}/\mathbf{c}_0$.

练习

1. 设 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, 定义

$$x_k := \begin{cases} (\alpha, \beta), & k \text{ 是偶数}, \\ (\beta, \alpha), & k \text{ 是奇数}, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}$$

和

$$s_n := \sum_{k=1}^n k^{-2} x_k, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明 (s_n) 收敛.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 Archimedes 公理可知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $1/N < \varepsilon/\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$. 则

$$|s_n - s_m| = \left| \sum_{k=m+1}^n k^{-2} x_k \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |k^{-2} x_k| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k^2}, \quad n > m \geq N,$$

其中

$$\sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=m+1}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m},$$

于是

$$|s_n - s_m| \leq \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{m} < \varepsilon, \quad n > m \geq N.$$

因此 (s_n) 是 Cauchy 序列, 而 $\mathbb{R}^2$ 是 Banach 空间, 这说明 (s_n) 收敛. $\square$

2. 设 (X, d) 是完备度量空间, (x_n) 是 X 中的序列. 假设存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}), \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明 (x_n) 收敛.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 注意到

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) \leq \alpha^2 d(x_{n-1}, x_{n-2}) \leq \cdots \leq \alpha^n d(x_1, x_0),$$

于是由三角不等式可得, 当 $n > m$ 时

$$d(x_n, x_m) \leq \sum_{k=m}^{n-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq \sum_{k=m}^{n-1} \alpha^k d(x_1, x_0) = d(x_1, x_0) \frac{\alpha^n - \alpha^m}{\alpha - 1} \leq d(x_1, x_0) \frac{\alpha^m}{1 - \alpha}.$$

而 $\alpha \in (0, 1)$, 因此 $\alpha^m \rightarrow 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_1, x_0) \frac{\alpha^m}{1 - \alpha} < \varepsilon, \quad n > m \geq N,$$

因此 (x_n) 是 Cauchy 序列, 而 X 是完备的, 故 (x_n) 收敛. $\square$

3. 证明 $\mathbb{R}$ 中的每个数列都有单调子数列.

证明. 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列, 令

$$E := \{n \in \mathbb{N}; \text{ 对于任意 } m > n \text{ 都有 } x_m \leq x_n\}.$$

若 E 中元素个数有限. 则我们递归的构造序列 (n_k) ,

$$n_0 := \max E + 1, \quad n_k := \min\{m \in \mathbb{N}; m > n_{k-1} \text{ 且 } x_m > x_{n_{k-1}}\}, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

特别的, 若 $E = \emptyset$, 则令 $n_0 := 0$. 于是由 E 的定义可知, 由于 $n_{k-1} \notin E$, 故存在 $m > n_{k-1}$ 使得 $x_m > x_{n_{k-1}}$, 因此

$$\{m \in \mathbb{N}; m > n_{k-1} \text{ 且 } x_m > x_{n_{k-1}}\} \neq \emptyset.$$

由良序原理可知, 对于每个 $k \in \mathbb{N}^*$, n_k 是良定义的, 于是 (n_k) 是良定义且严格递增的. 进一步, (x_{n_k}) 是严格递增的.

若 E 中有无穷多个元素. 则我们同样递归的构造序列 (n_k) ,

$$n_0 := \min E, \quad E_1 := E \setminus \{n_0\}, \quad n_k := \min E_k, \quad E_{k+1} := E_k \setminus \{n_k\}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

显然 (n_k) 是严格递增的, 于是由 E 的定义可知 (x_{n_k}) 是递减的. □

4. 证明以下命题 (见练习 7).

1. 完备度量空间的每个闭子集都是完备度量空间 (赋予诱导度量).
2. Banach 空间的每个闭子空间都是 Banach 空间 (赋予诱导范数).
3. ℓ_∞ , c 和 c_0 都是 Banach 空间.
4. 设 M 是完备度量空间, $D \subseteq M$ 是完备子空间 (赋予诱导度量). 则 D 是闭集.

证明. (1). 设 Y 是完备度量空间 X 的闭子集, (y_n) 是 Y 中的 Cauchy 序列. 由于 X 是完备的, 因此 (y_n) 在 X 中收敛, 而 Y 是闭集, 因此 (y_n) 也在 Y 中收敛, 故 Y 是完备的.

(2). 证明与 (1) 类似.

(3). 由于 $\ell_\infty = B(\mathbb{N}, \mathbb{K})$, 因此 ℓ_∞ 是 Banach 空间, 而 c_0 是 ℓ_∞ 的闭子空间, 故 c_0 也是 Banach 空间. 只用证明 c 是 ℓ_∞ 的闭子空间. 设 $(u_n) \in c^\mathbb{N}$ 且 $u_n \rightarrow u \in \ell_\infty$. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|u_n(k) - u(k)| \leq \|u_n - u\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}, \quad n \geq N, \quad k \in \mathbb{N}.$$

而 $u_N \in c$, 因此 u_N 是 Cauchy 序列, 于是存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得

$$|u_N(n) - u_N(m)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad m, n \geq M.$$

因此由三角不等式可得

$$|u(n) - u(m)| \leq |u(n) - u_N(n)| + |u_N(n) - u_N(m)| + |u_N(m) - u(m)| < \varepsilon, \quad m, n \geq M,$$

故 u 是 Cauchy 序列, 由 $\mathbb{K}$ 的完备性可知 u 收敛, 这说明 $u \in c$.

(4). 设 (x_n) 是 D 中的序列且 (x_n) 在 M 中收敛. 则 (x_n) 是 Cauchy 序列, 而 D 是完备的, 因此 (x_n) 在 D 中收敛, 于是 D 是闭集. □

5. 证明 $R = \mathcal{R}/\mathbf{c}_0$ 上的序 $\leq$ 是传递的, 且与 R 的环结构相容.

6. 定义

$$x_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明以下命题.

1. 数列 (x_n) 不是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列. (提示: 证明 (x_n) 无界.)

2. 对于任意 $m \in \mathbb{N}^*$ 都有 $\lim_n (x_{n+m} - x_n) = 0$.

证明. (1). 由于

$$x_{2n} - x_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

因此 (x_n) 不是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列.

(2). 注意到

$$0 \leq x_{n+m} - x_n = \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{1}{k} \leq \frac{m}{n}, \quad m, n \in \mathbb{N}^*,$$

而当 $n \rightarrow \infty$ 时 $m/n \rightarrow 0$, 于是由夹逼定理可知 $\lim_n (x_{n+m} - x_n) = 0$. □

7. 定义

$$x_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明或证伪 (x_n) 是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列.

证明. 显然 (x_n) 是递增的, 而

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 - \frac{1}{n} \leq 2, \quad n \geq 2,$$

因此 (x_n) 是有界的, 于是由单调有界收敛定理可知 (x_n) 在 $\mathbb{R}$ 中收敛. 而 $\mathbb{R}$ 是完备的, 故 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列. 由于 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子空间 (赋予诱导度量), 于是由 Cauchy 序列的定义可知 (x_n) 也是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列. □

2.7 级数

目前, 我们有两种途径证明 Banach 空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中的序列 (x_n) 的收敛性. 要么先对 (x_n) 的极限值 x 作出某种猜测, 然后直接证明 $\|x_n - x\|$ 收敛到零, 要么证明 (x_n) 是 Cauchy 序列, 进而利用 E 的完备性得出结论.

在接下来的两节中, 我们将同时运用这两种方法来研究一类称为级数的特殊序列. 我们将看到, 级数所具有的简单递归结构会导出非常便捷的审敛法. 特别地, 我们将在任意 Banach 空间中讨论根值判别法与比值判别法, 并针对交错级数探讨 Leibniz 判别法.

级数的收敛性

定义 2.7.1 (级数). 设 (x_k) 是赋范向量空间 E 中的序列, 定义 E 中的新序列

$$s_n := \sum_{k=0}^n x_k, \quad n \in \mathbb{N}.$$

称 (s_n) 是 E 中的级数, 记作 $\sum x_k$. 并称 s_n 是级数 $\sum x_k$ 的部分和, x_k 是级数 $\sum x_k$ 的通项. 进一步, 称级数 $\sum x_k$ 收敛, 若其部分和序列 (s_n) 收敛, 并称 (s_n) 的极限是级数 $\sum x_k$ 的值, 记作¹⁷

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_k.$$

最后, 称级数 $\sum x_k$ 发散, 若其部分和序列 (s_n) 在 E 中发散.

由上面的定义不难得出, 级数无非是一种按如下方式递归定义的序列,

$$s_0 := x_0, \quad s_{n+1} := s_n + x_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

例 2.7.1. 1. 级数 $\sum 1/k!$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛. 由例 2.4.2(7) 可知, 其收敛到 e , 即 $e = \sum_{k=0}^{\infty} 1/k!$.

2. 级数 $\sum 1/k^2$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛.

证明. 显然其部分和数列 (s_n) 是递增的, 由于

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 - \frac{1}{n} \leq 2, \quad n \geq 2,$$

因此 (s_n) 是有界的. 于是由单调有界收敛定理可知该命题成立. $\square$

直观上能看出, 级数收敛仅当其通项构成无穷小量. 我们将在下面的命题中证明这个必要条件.

¹⁷有时需要删除级数 $\sum_k x_k$ 的前 m 项, 此时新级数记作 $\sum_{k \geq m} x_k$ 或 $(s_n)_{n \geq m}$. 这经常发生在 x_0 未定义时 (例如, 若 $x_k = 1/k$). 这时, $\sum x_k$ 表示 $\sum_{k \geq 1} x_k$.

命题 2.7.2. 若级数 $\sum x_k$ 收敛, 则 (x_k) 是无穷小量.

证明. 设 $\sum x_k$ 是收敛级数. 由命题 2.6.1 可知, 其部分和序列 (s_n) 是 Cauchy 序列. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时 $\|s_n - s_m\| < \varepsilon$. 特别的,

$$\|s_{n+1} - s_n\| = \left\| \sum_{k=0}^{n+1} x_k - \sum_{k=0}^n x_k \right\| = \|x_{n+1}\| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此 (x_n) 是无穷小量. □

调和级数与几何级数

下面的例子表明命题 2.7.2 的逆命题不成立.

例 2.7.3. 调和级数 $\sum 1/k$ 在 $\mathbb{R}$ 中发散.

证明. 由于

$$|s_{2n} - s_n| = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

这说明 (s_n) 不是 Cauchy 序列. 因此由命题 2.6.1 可知 (s_n) 发散, 即调和级数发散. □

作为命题 2.7.2 的简单应用, 我们将给出几何级数 $\sum a^k$ 收敛性态的完整描述.

例 2.7.4. 设 $a \in \mathbb{K}$, 则几何级数 $\sum a^k$ 的值

$$\sum_{k=0}^{\infty} a^k = \frac{1}{1-a}, \quad |a| < 1.$$

特别的, 若 $|a| \geq 1$, 则几何级数发散.

证明. 由练习 1 可知

$$s_n = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}, \quad n \in \mathbb{N},$$

若 $|a| < 1$, 则由例 2.4.2(1) 可知 $s_n \rightarrow 1/(1-a)$. 若 $|a| \geq 1$, 则 $|a|^k = |a^k| \geq 1$, 于是由命题 2.7.2 可知级数 $\sum a^k$ 发散. □

级数的运算

级数是特殊的序列, 因此适用于收敛序列的所有法则同样适用于级数. 特别地, $\lim$ 函数的线性性质对级数也成立 (见第 2.2 节和注 2.3.1(3)).

命题 2.7.5. 设 $\sum a_k$ 和 $\sum b_k$ 是赋范向量空间 E 中的收敛级数, $\alpha \in \mathbb{K}$. 则

1. 级数 $\sum (a_k + b_k)$ 收敛且

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k .$$

2. 级数 $\sum \alpha a_k$ 收敛且

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha a_k = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k .$$

证明. 令

$$s_n := \sum_{k=0}^n a_k , \quad t_n := \sum_{k=0}^n b_k , \quad n \in \mathbb{N} ,$$

且 $s_n \rightarrow s, t_n \rightarrow t$. 于是由命题 2.2.2 和注 2.3.1(3) 可知

$$s_n + t_n = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) \rightarrow s + t , \quad \alpha s_n = \sum_{k=0}^n \alpha a_k \rightarrow \alpha s .$$

□

收敛性判别法

我们知道, Banach 空间中的序列收敛当且仅当它是 Cauchy 序列, 因此对于级数可以改写为如下形式.

定理 2.7.6 (Cauchy 准则). Banach 空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中的级数 $\sum x_k$ 收敛, 当且仅当对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon , \quad n > m \geq N .$$

证明. 由 E 的完备性可知, (s_n) 收敛当且仅当 (s_n) 是 Cauchy 序列, 即对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|s_n - s_m\| = \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon , \quad n > m \geq N .$$

□

对于具有非负通项的实数级数, 我们有如下一个简单的收敛性判别法.

定义 2.7.2 (正项级数). 称 $\mathbb{R}$ 中的级数 $\sum x_k$ 是正项级数, 若对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $x_k \geq 0$.

定理 2.7.7. $\mathbb{R}$ 中的正项级数 $\sum x_k$ 收敛, 当且仅当 (s_n) 有界. 进一步,

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_k = \sup_{n \in \mathbb{N}} s_n .$$

证明. 显然正项级数的部分和序列 (s_n) 是递增的, 因此由单调有界收敛定理可知, (s_n) 收敛当且仅当 (s_n) 有界, 且 $s_n \uparrow \sup_{n \in \mathbb{N}} s_n$. $\square$

设 $\sum x_k$ 是 $\mathbb{R}$ 中的正项级数. 若其部分和序列是有界的, 则我们记 $\sum x_k < \infty$. 在这样的记号下, 定理 2.7.7 可以写为

$$\sum x_k \text{ 收敛} \iff \sum x_k < \infty .$$

交错级数

定义 2.7.3 (交错级数). 称 $\mathbb{R}$ 中的级数 $\sum y_k$ 是交错级数, 若对于任意 $y \in \mathbb{N}$ 都有 y_k 和 y_{k+1} 的符号相反.

一个交错级数总是能写成 $\pm \sum (-1)^k x_k$ 的形式, 其中 $x_k \geq 0$.

定理 2.7.8 (Leibniz 准则). $\mathbb{R}$ 中的交错级数 $\sum (-1)^k x_k$ 收敛, 若 $x_k \downarrow 0$.

证明. 由于 (x_k) 是递减的, 于是

$$s_{2n+2} - s_{2n} = -x_{2n+1} + x_{2n+2} \leq 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此序列 (s_{2n}) 是递减的, 而

$$s_{2n+3} - s_{2n+1} = x_{2n+2} - x_{2n+3} \geq 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此序列 (s_{2n+1}) 是递增的. 由于 $x_k \downarrow 0$, 因此 (x_k) 的所有项都非负, 于是

$$s_1 \leq s_{2n+1} = s_{2n} - x_{2n+1} \leq s_{2n} \leq s_0, \quad n \in \mathbb{N},$$

由单调有界收敛定理可知 s_{2n} 和 s_{2n+1} 收敛. 令 $s_{2n} \rightarrow s$, $s_{2n+1} \rightarrow t$, 于是

$$s - t = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} - s_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = 0,$$

因此 $s = t$, 由练习 14 可知 (s_n) 收敛. $\square$

推论 2.7.9. 设 $\sum (-1)^k x_k$ 是 $\mathbb{R}$ 中满足 Leibniz 准则且收敛到 s 的交错级数. 则

$$|s - s_n| \leq x_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明. 在 Leibniz 准则的证明中, 我们已经证明了

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} s_{2n} = s = \sup_{n \in \mathbb{N}} s_{2n+1}.$$

因此

$$0 \leq s_{2n} - s \leq s_{2n} - s_{2n+1} = x_{2n+1}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (2.1)$$

且

$$0 \leq s - s_{2n+1} \leq s_{2n+2} - s_{2n+1} = x_{2n+2}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (2.2)$$

结合 (2.1) 和 (2.2) 可知, 对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $|s - s_n| \leq x_{n+1}$. $\square$

推论 2.7.9 证明, 当交错级数的值被替换为第 n 项部分和时, 所产生的误差至多为“首个被省略的项”的绝对值. 此外, (2.1) 和 (2.2) 表明, 第 n 项部分和何时小于或何时大于级数的值.

例 2.7.10. 由 Leibniz 准则可知, 交错级数

$$\begin{aligned} 1. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots \\ 2. \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \end{aligned}$$

收敛. 它们的值分别是 $\ln 2$ 与 $\pi/4$ (我们将在之后的章节证明).

实数的十进制、二进制及其他进制表示

我们已证明有关级数的结论可用于论证, 通过小数展开表示实数的合理性. 例如, 有理数

$$24 + \frac{1}{10^1} + \frac{3}{10^2} + \frac{0}{10^3} + \frac{7}{10^4} + \frac{1}{10^5}$$

有唯一的小数表示:

$$24.13071 := 2 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + \frac{1}{10^1} + \frac{3}{10^2} + \frac{0}{10^3} + \frac{7}{10^4} + \frac{1}{10^5}.$$

我们同样还想弄清楚“无穷小数展开”的意义, 比如

$$7.52341043 \dots$$

当给定一个能够确定展开式中所有后续数字的算法时, 以下例子表明此类小数表示法需要被谨慎对待:

$$3.999 \dots = 3 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{10^k} = 3 + 9 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{10^k} = 3 + 9 \frac{1/10}{1 - 1/10} = 4.$$

选择数字 10 作为上述表示法的“基数”可能有历史、文化或实用层面的考量, 但它并非基于任何数学上的考量. 举例而言, 我们同样可以考虑二进制表示法, 例如

$$101.10010 \dots = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + \dots$$

在下文中, 我们将使上述初步讨论更加精确.

定义 2.7.4 (下取整函数). 称

$$[\cdot]: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad x \mapsto \max\{k \in \mathbb{Z}; k \leq x\}$$

是下取整函数.

显然 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 由良序原理可知 $[\cdot]$ 是良定义的.

定义 2.7.5 (基数). 设 $g \in \mathbb{N}$ 且 $g \geq 2$. 称集合 $\{0, 1, \dots, g-1\}$ 中的 g 个元素是基数 g 数字.

这里的数字 g 表示了进制系统中有多少种不同的数字符号. 因此 $\{0, 1\}$ 是二进制 (基数 2) 数字的集合, $\{0, 1, 2\}$ 是三进制 (基数 3) 数字的集合, 以及 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 是十进制 (基数 10) 数字的集合. 对于由基数 g 数字构成的任意数列 $(x_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$, 即对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $x_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}$, 我们有不等式

$$0 \leq \sum_{k=1}^n x_k g^{-k} \leq (g-1) \sum_{k=1}^{\infty} g^{-k} = 1, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

由定理 2.7.7 可知, 级数 $\sum x_k g^{-k}$ 收敛且其值 x 满足 $0 \leq x \leq 1$.

定义 2.7.6 (基数 g 展开). 设 $(x_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ 是由基数 g 数字构成的数列, 令 $x := \sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k}$. 称级数 $\sum x_k g^{-k}$ 是实数 $x \in [0, 1]$ 的基数 g 展开.

当 $g = 2$ 、 $g = 3$ 和 $g = 10$ 时, 我们称 $\sum x_k g^{-k}$ 是 x 的二进制展开、三进制展开和十进制展开. 当 g 在上下文中明确时, 我们通常将数字 $x \in [0, 1]$ 的基数 g 展开记作

$$0.x_1 x_2 x_3 x_4 \dots := \sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k}.$$

不难发现, 任意 $m \in \mathbb{N}$ 都有如下形式¹⁸的唯一表示

$$m = \sum_{j=0}^{\ell} y_j g^j, \quad y_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}, \quad 0 \leq k \leq \ell. \quad (2.3)$$

于是

$$x = m + \sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k} = \sum_{j=0}^{\ell} y_j g^j + \sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k}$$

是非负实数. 称上式的右边是 x 的基数 g 展开, 当 g 在上下文中明确时, 记作

$$y_{\ell} y_{\ell-1} \dots y_0 . x_1 x_2 x_3 \dots$$

类似的, 称

$$-y_{\ell} y_{\ell-1} \dots y_0 . x_1 x_2 x_3 \dots$$

是 $-x$ 的基数 g 展开.

¹⁸见练习 1. 为了得到表示的唯一性, 我们需要忽略前导零. 例如, 我们将 $0 \cdot 3^3 + 0 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0$ 和 $1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0$ 视为 5 的同一三进制表示.

定义 2.7.7 (循环节). 称实数 $x \in [0, 1]$ 的基数 g 展开 $\sum x_k g^{-k}$ 是循环的, 若存在 $\ell \in \mathbb{N}$ 和 $p \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $k \geq \ell$ 时 $x_{k+p} = x_k$.

定理 2.7.11. 设 $g \geq 2$. 则每个实数 x 都存在基数 g 展开. 若排除对于几乎所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $x_k = g - 1$ 的展开, 则该展开是唯一的. 进一步, x 是有理数当且仅当 x 的基数 g 展开是循环的.

练习

1. 计算下列级数的值.

$$1. \sum \frac{(-1)^k}{2^k}, \quad 2. \sum \frac{1}{4k^2 - 1}.$$

证明. (1). 由于 $|-1/2| < 1$, 因此几何级数 $\sum (-1)^k/2^k$ 收敛且

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^k} = \frac{1}{1 + 1/2} = \frac{2}{3}.$$

(2). 对于任意 $n \in \mathbb{N}$, 其部分和

$$s_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{4k^2 - 1} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k+1)(2k-1)} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{1}{2} \left(-1 - \frac{1}{2n+1} \right),$$

因此 $s_n \rightarrow -1/2$. □

2. 判断下列级数收敛还是发散.

$$1. \sum \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k}}, \quad 2. \sum (-1)^k (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}), \quad 3. \sum \frac{k!}{k^k}, \quad 4. \sum \frac{(k+1)^{k-1}}{(-k)^k}.$$

证明. (1). 由于

$$\begin{aligned} |s_{2n} - s_n| &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k}} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{k+1} + k} \\ &\geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k+1+k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{3k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{6n} = \frac{1}{6}, \quad n \in \mathbb{N}^*, \end{aligned}$$

因此 (s_n) 不是 Cauchy 序列, 故 (s_n) 发散.

(2). 由于

$$\sqrt{k+1} - \sqrt{k} = \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \downarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

因此由 Leibniz 准则可知该交错级数收敛.

(3). 我们断言

$$\frac{k!}{k^k} \leq \frac{1}{2^{k-1}}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

显然 $k=1$ 时成立. 假设 $k!/k^k \leq 1/2^{k-1}$. 于是

$$\frac{(k+1)!}{(k+1)^{k+1}} = \frac{k!}{(k+1)^k} = \frac{k!}{k^k} \frac{k^k}{(k+1)^k} \leq \frac{1}{2^{k-1}} \frac{1}{(1+1/k)^k},$$

由二项式定理可知

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \sum_{n=0}^k \binom{k}{n} \frac{1}{k^n} = 1 + 1 + \binom{k}{2} \frac{1}{k^2} + \cdots \geq 2,$$

因此 $(k+1)!/(k+1)^{k+1} \leq 1/2^k$. 由数学归纳法可知该断言成立. 于是

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{k!}{k^k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} < 2, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

故 (s_n) 是有界的, 而 (s_n) 是正项级数, 因此 (s_n) 收敛.

(4). 令 $x_k := (k+1)^{k-1}/k^k$, 故 $\sum (k+1)^{k-1}/(-k)^k = \sum (-1)^k x_k$ 是交错级数. 由于

$$\frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{(k+2)^k}{(k+1)^{k+1}} \frac{k^k}{(k+1)^{k-1}} = \left(\frac{k^2 + 2k}{k^2 + 2k + 1} \right)^k \leq 1, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

因此 (x_k) 是递减的. 而

$$x_k = \frac{(k+1)^{k-1}}{k^k} = \frac{1}{k+1} \frac{(k+1)^k}{k^k} = \frac{1}{k+1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k,$$

其中 $1/(k+1) \rightarrow 0$, $(1+1/k)^k \rightarrow e$, 故 $x_k \downarrow 0$. 由 Leibniz 准则可知该交错级数收敛. $\square$

3. 一只蜗牛以 5 cm/h 的恒定速度在一条 1 m 长的橡皮筋上爬行. 在开始爬行后的每个小时结束时, 橡皮筋会被均匀拉伸额外的一米. 如果蜗牛从橡皮筋的左端开始爬行, 它是否能在有限时间内到达右端?

证明. 由于蜗牛爬行速度恒定, 而橡皮筋每小时结束都会均匀拉伸一米, 因此 $0.05/t$ 是蜗牛在第 t 小时爬行的距离所占橡皮筋长度的比例. 蜗牛要到达另一端, 只需要其每小时爬行的比例的和等于 1 即可. 于是问题变为了是否存在 t 使得

$$\sum_{k=1}^t \frac{0.05}{k} \geq 1,$$

即 $\sum_{k=1}^t 1/k \geq 20$. 而调和级数发散, 因此存在 $t \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{k=1}^t 1/k \geq 20$. $\square$

4. 设 $\sum a_k$ 是赋范向量空间 E 中的收敛级数. 定义

$$r_n := \sum_{k=n}^{\infty} a_k, \quad n \in \mathbb{N},$$

证明序列 (r_n) 是无穷小量.

证明. 令 $\sum a_k$ 收敛到 a . 于是

$$r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k = a - \sum_{k=0}^{n-1} a_k \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

因此 (r_n) 是无穷小量. $\square$

5. 设 (x_k) 是递减数列且 $\sum x_k$ 收敛. 证明 (kx_k) 是无穷小量.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由于 $\sum x_k$ 收敛, 于是 $x_k \downarrow 0$, 这说明 (x_k) 的所有项都非负. 而 (s_n) 是 Cauchy 序列, 因此存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|nx_{2n+1}| \leq |nx_{2n}| = \left| \sum_{k=n+1}^{2n} x_{2n} \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{2n} x_k \right| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

故 $2nx_{2n} \rightarrow 0$ 且 $(2n+1)x_{2n+1} = 2nx_{2n+1} + x_{2n+1} \rightarrow 0$, 因此 (kx_k) 是无穷小量. $\square$

6. 设 (x_k) 是 $[0, \infty)$ 中的数列. 证明

$$\sum x_k < \infty \iff \sum \frac{x_k}{1+x_k} < \infty.$$

证明. 令

$$s_n := \sum_{k=0}^n x_k, \quad t_n := \sum_{k=0}^n \frac{x_k}{1+x_k}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$\implies$. 设 $\sum x_k < \infty$. 于是

$$\sum_{k=0}^n \frac{x_k}{1+x_k} \leq \sum_{k=0}^n x_k \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} s_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此 (t_n) 有界.

$\Leftarrow$. 设 $\sum x_k/(1+x_k) < \infty$. 则 $x_k/(1+x_k) \rightarrow 0$. 先证明 $x_k \rightarrow 0$. 由于 $x/(1+x)$ 是递增的. 假设 $x_k \rightarrow a > 0$, 则存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq M$ 时 $x_k > a/2$, 于是

$$\frac{x_k}{1+x_k} \geq \frac{a/2}{1+a/2} = \frac{a}{2+a} > 0, \quad k \geq M,$$

这与 $x_k/(1+x_k) \rightarrow 0$ 矛盾, 故 $x_k \rightarrow 0$. 于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq N$ 时 $x_k < 1$, 因此 $x_k/(1+x_k) > x_k/2$, 即

$$x_k < 2 \frac{x_k}{1+x_k}, \quad k \geq N.$$

于是

$$\sum_{k=0}^n x_k = \sum_{k=0}^N x_k + \sum_{k=N+1}^n x_k \leq \sum_{k=0}^N x_k + 2 \sum_{k=N+1}^n \frac{x_k}{1+x_k} \leq \sum_{k=0}^N x_k + 2 \sup_{n \in \mathbb{N}} t_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

而 $\sum_{k=0}^N x_k$ 是有限的, 因此 (s_n) 有界. $\square$

7. 设 (d_k) 是 $[0, \infty)$ 中的数列且 $\sum_{k=0}^{\infty} d_k = \infty$.

1. 对于下列级数的收敛性可以得出什么结论?

$$(a) \sum \frac{d_k}{1+d_k}, \quad (b) \sum \frac{d_k}{1+k^2 d_k}.$$

在这两种情形下, 关于数列 (d_k) 的假设都是必要的吗? (提示: 分别考虑 $\limsup d_k < \infty$ 和 $\limsup d_k = \infty$ 的情况.)

2. 通过举例证明

$$(a) \sum \frac{d_k}{1+k d_k}, \quad (b) \sum \frac{d_k}{1+d_k^2}$$

可能收敛也可能发散.

证明. (1). 由于 $\sum d_k$ 无界, 于是由上面的练习可知 $\sum d_k/(1+d_k)$ 无界, 即发散. 而

$$\sum_{k=0}^n \frac{d_k}{1+k^2 d_k} = d_0 + \sum_{k=1}^n \frac{d_k}{1+k^2 d_k} \leq d_0 + \sum_{k=1}^n \frac{d_k}{k^2 d_k} = d_0 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}, \quad n \in \mathbb{N},$$

注意当 $d_k = 0$ 时 $d_k/(1+k^2 d_k) = 0 < 1/k^2$, 因此该不等式成立, 而 $\sum 1/k^2$ 是有界的, 因此正项级数 $\sum d_k/(1+k^2 d_k)$ 有界, 故收敛. 对于 (a) 中的级数, 由于其有界性依赖于 $\sum d_k$ 的有界性, 因此假设是有必要的. 而对于 (b) 中的级数, 只要 (d_k) 是非负的, 那么不等式总是成立, 因此关于 $\sum_{k=0}^{\infty} d_k = \infty$ 的假设不是必要的.

(2). 考虑 $d_k = 1/k$, 此时 $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k = \infty$ 且

$$\sum \frac{d_k}{1+k d_k} = \sum \frac{1}{2k}, \quad \sum \frac{d_k}{1+d_k^2} = \sum \frac{1}{k+1/k}$$

发散. 考虑

$$d_k = \begin{cases} 1, & \text{若 } k = 2^m \ (m \in \mathbb{N}), \\ 0, & \text{其余情况,} \end{cases}$$

显然 $\sum_{k=0}^{\infty} d_k = \infty$, 而当 $k \neq 2^m$ 时 $d_k/(1+k d_k) = 0$, 当 $k = 2^m$ 时

$$\frac{d_k}{1+k d_k} = \frac{1}{1+2^m},$$

因此

$$\sum_{k=0}^n \frac{d_k}{1+k d_k} \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+2^k} \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1-(1/2)^{n+1}}{1-1/2} < 2, \quad n \in \mathbb{N},$$

故 $\sum d_k/(1+k d_k)$ 收敛. 考虑 $d_k = k^2$, 显然 $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 = \infty$, 由于

$$\sum_{k=0}^n \frac{d_k}{1+d_k^2} = \sum_{k=0}^n \frac{k^2}{1+k^4} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1/k^2 + k^2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}, \quad n \in \mathbb{N},$$

而 $\sum 1/k^2$ 有界, 因此 $\sum d_k/(1+d_k^2)$ 收敛. □

8. 设 $s := \sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2$. 证明

$$1 - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} - \frac{1}{8^2} - \frac{1}{10^2} + + - - \cdots = \frac{4}{9}s.$$

证明. 将上式记为 $\sum x_k$. 由于

$$\begin{aligned} s &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots \\ \frac{s}{4} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{10^2} + \cdots \\ \frac{s}{9} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k)^2} = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{9^2} + \frac{1}{12^2} + \cdots \\ \frac{s}{36} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(6k)^2} = \frac{1}{6^2} + \frac{1}{12^2} + \frac{1}{18^2} + \cdots \end{aligned}$$

注意到

$$\sum_{k=1}^{6n} x_k = \sum_{k=1}^{6n} \frac{1}{k^2} - 2 \sum_{k=1}^{3n} \frac{1}{(2k)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{(6k)^2} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{(3k)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{(6k)^2}, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k = s - \frac{s}{2} + \frac{s}{36} - \frac{s}{9} + \frac{s}{36} = \frac{4}{9}s.$$

□

9. 设 $(j, k) \in \mathbb{N}^2$, 定义

$$x_{jk} := \begin{cases} \frac{1}{j^2 - k^2}, & j \neq k, \\ 0, & j = k. \end{cases}$$

对于每个 $j \in \mathbb{N}^*$, 计算级数 $\sum_{k=0}^{\infty} x_{jk}$ 的值. (提示: 适当的因式分解 x_{jk} .)

证明. 由于 $j = k$ 时 $x_{jk} = 0$, 于是

$$\sum_{k=0}^n x_{jk} = \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \frac{1}{j^2 - k^2} = \frac{1}{2j} \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right),$$

其中

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) = \sum_{k=0}^{j-1} \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) + \sum_{k=j+1}^n \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right).$$

我们先考虑 $k < j$ 的部分,

$$\sum_{k=0}^{j-1} \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) = \sum_{k=0}^{j-1} \frac{1}{j-k} + \sum_{k=0}^{j-1} \frac{1}{j+k} = \sum_{k=1}^j \frac{1}{k} + \sum_{k=j}^{2j-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{2j-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{j},$$

而 $k > j$ 的部分,

$$\sum_{k=j+1}^n \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) = \sum_{k=1}^{n-j} \left(-\frac{1}{k} + \frac{1}{2j+k} \right) = -\sum_{k=1}^{n-j} \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{n-j} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{2j} \frac{1}{k} = \sum_{k=n-j+1}^{n+j} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{2j} \frac{1}{k},$$

因此

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) = \sum_{k=1}^{2j-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{j} + \sum_{k=n-j+1}^{n+j} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{2j} \frac{1}{k} = \frac{1}{2j} + \sum_{k=n-j+1}^{n+j} \frac{1}{k}.$$

不难证明当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sum_{k=n-j+1}^{n+j} 1/k \rightarrow 0$, 最后

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} = \frac{1}{2j} \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^{\infty} \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) = \frac{1}{4j^2}.$$

□

10. 称级数 $\sum c_k/k!$ 是 Cantor 级数, 若对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $c_k \in \mathbb{N}$ 且 $0 \leq c_{k+1} \leq k$.

1. 证明每个非负实数 x 都能展开成 Cantor 级数, 即存在 Cantor 级数使得

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!}.$$

进一步, 若对于几乎所有 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $c_k \neq k-1$, 则这种展开是唯一的.

2. 证明

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{k-1}{k!} = \frac{1}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

3. 设 $\sum c_k/k!$ 是 $x \in [0, 1)$ 的 Cantor 级数展开. 证明 x 是有理数¹⁹当且仅当存在 $k_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $k \geq k_0$ 时 $c_k = 0$.

11 (Cauchy 凝聚定理). 设 (x_k) 是 $[0, \infty)$ 中的递减数列. 则级数 $\sum x_k$ 收敛当且仅当凝聚级数 $\sum 2^k x_{2^k}$ 收敛.

证明. 由于 (x_k) 是递减的, 因此

$$2^k x_{2^{k+1}} \leq \sum_{j=2^k+1}^{2^{k+1}} x_j \leq 2^k x_{2^k}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

$\Rightarrow$. 设 $\sum x_k$ 收敛. 于是

$$\sum_{k=0}^{n+1} 2^k x_{2^k} = x_1 + \sum_{k=0}^n 2^{k+1} x_{2^{k+1}} = x_1 + 2 \sum_{k=0}^n 2^k x_{2^{k+1}}, \quad n \in \mathbb{N},$$

¹⁹比较练习 7(2).

其中

$$\sum_{k=0}^n 2^k x_{2^{k+1}} \leq \sum_{k=0}^n \sum_{j=2^{k+1}}^{2^{k+1}+1} x_j = \sum_{j=2}^{2^{n+1}} x_j \leq \sum_{j=0}^{\infty} x_j < \infty, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此 $\sum 2^k x_{2^k}$ 有界, 故 $\sum 2^k x_{2^k}$ 收敛.

$\Leftarrow$. 设 $\sum 2^k x_{2^k}$ 收敛. 于是

$$\sum_{j=2}^n x_j \leq \sum_{j=2}^{2^{n+1}} x_j = \sum_{k=0}^n \sum_{j=2^k+1}^{2^{k+1}} x_j \leq \sum_{k=0}^n 2^k x_{2^k} \leq \sum_{k=0}^{\infty} 2^k x_{2^k} < \infty, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此 $\sum x_k$ 有界, 故 $\sum x_k$ 收敛. □

12. 设 $s \in \mathbb{Q}$. 证明级数 $\sum 1/k^s$ 收敛当且仅当 $s > 1$. (提示: 练习 11 和例 2.7.4.)

证明. 当 $s \leq 0$ 时, 对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $1/k^s \geq 1$, 因此通项不趋于 0, 故 $\sum 1/k^s$ 发散. 设 $s > 0$. 则 $(1/k^s)$ 是递减的非负数列, 于是由 Cauchy 凝聚定理可知, $\sum 1/k^s$ 收敛当且仅当

$$\sum 2^k \frac{1}{2^{ks}} = \sum \frac{1}{2^{k(s-1)}} = \sum \left(\frac{1}{2^{s-1}} \right)^k$$

收敛. 而几何级数 $\sum (1/2^{s-1})^k$ 收敛当且仅当 $|1/2^{s-1}| < 1$, 即 $s > 1$. □

13. 证明 (2.3) 的断言.

14. 定义

$$x_n := \begin{cases} n^{-1}, & n \text{ 是奇数}, \\ -n^{-2}, & n \text{ 是偶数}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明 $\sum x_k$ 发散. 为什么 Leibniz 准则不适用于此级数?

证明. 我们考虑部分和序列 (s_n) 的子序列 (s_{2n}) , 由于

$$s_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} x_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

其中 $\sum 1/(2k)^2$ 有界, 但 $\sum 1/(2k-1)$ 是无界的, 因此 (s_{2n}) 发散, 故 (s_n) 发散. 令

$$y_n := \begin{cases} n^{-1}, & n \text{ 是奇数}, \\ n^{-2}, & n \text{ 是偶数}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

于是 $\sum x_k = \sum (-1)^{k+1} y_k$. 而 (y_k) 不是递减的, 因此不满足 Leibniz 准则的条件. □

15. 设 (z_n) 是 $(0, \infty)$ 中的数列且 $\liminf z_n = 0$. 证明存在 $(0, \infty)$ 中的无穷小量 (x_n) 和 (y_n) 使得

1. $\sum x_n < \infty$ 且 $\limsup x_n/z_n = \infty$. (提示: 对于每个 $k \in \mathbb{N}^*$, 选取 n_k 使得 $z_{n_k} < k^{-3}$. 然后定义 $x_{n_k} := k^{-2}$, 其余的 $x_n := n^{-2}$.)

2. $\sum y_n = \infty$ 且 $\liminf y_n/z_n = 0$. (提示: 选取子数列 (z_{n_k}) 使得 $\lim z_{n_k} = 0$. 然后定义 $y_{n_k} := z_{n_k}^2$, 其余的 $y_n := 1/n$.)

特别地, 对于任意收敛缓慢的无穷小量 (z_n) , 都存在一个收敛得足够快的无穷小量 (x_n) 使得 $\sum x_n < \infty$, 但 (x_n) 却存在子数列 (x_{n_k}) 收敛到 0 的速度比 (z_n) 的对应子数列 (z_{n_k}) 更慢. 反之, 对于任意收敛快速的无穷小量 (z_n) , 都存在一个收敛得足够慢的无穷小量 (y_n) 使得 $\sum y_n = \infty$, 但 (y_n) 却存在子数列 (y_{n_k}) 收敛到 0 的速度比 (z_n) 的对应子数列 (z_{n_k}) 更快.