

一、知识概要

本节介绍一阶线性常微分方程的矩阵解法，也就是将微分方程用矩阵抽象，通过“解耦”，计算出对应系数，最终得到解。这里会牵涉到 e^{Ax} 计算问题，（A是矩阵），所以也会引出幂指数是矩阵时算式的计算问题。最后扩展介绍了高阶微分方程的降阶求解方法。

二、解微分方程

解决微分方程问题重点在于其流程，我们通过一道例题来介绍本部分内容。

【例 1】

$$\frac{du_1}{dt} = -u_1 + 2u_2 ; \quad \frac{du_2}{dt} = u_1 - 2u_2 ; \quad u(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 求 } u(t).$$

解题流程：

解题之前首先要搞清楚这个微分方程的意义，我们看到， $u(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，就是说明在最初 0 时刻， $u_1 = 1$ ，所有的值都在 u_1 中；而此时 $u_2 = 0$ ，但是随着时间流逝， t 增加时，我们可以看到 $\frac{du_2}{dt} > 0$ 。说明 u_2 的导数大于 0， u_2 会慢慢增加， u_1 慢慢减少；（或者理解为 u_1 中的值流向 u_2 ）。最终达到某一状态，这需要我们计算来得到。

列出方程 $\frac{du}{dt} = Au$ ，其中系数矩阵 A 应综合 $\frac{du_1}{dt}$ 与 $\frac{du_2}{dt}$ ，写做 $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ 。

我们先给出通解形式：

$$\sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t} x_i$$

通解形式是如何得到的我们不做研究。具体验证可以将通解看做几个纯指数解的组合，随便挑一个代入验证一下即可。

解 A 矩阵的特征值与特征向量。不难得到这个矩阵有两个特征值： $\lambda_1=0$ ， $\lambda_2=-3$ 。特征向量为： $x_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，代入通解得到其形式如下：

$$u(t) = C_1 e^{0t} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + C_2 e^{-3t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$


再代入初值： $u(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，确定 C_1 与 C_2 ，最终解为：

$$u(t) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} e^{-3t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

分析这个通解，我们发现随着时间 t 的增加，后一项 $\frac{1}{3} e^{-3t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 逐渐衰减，最后趋于 0，而前一项 $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 不随时间改变，这也符合我们一开始分析微分方程意义的时候 u 的走势。

△通过这道题，我们可以得到解决微分方程过程中遇到的某些特点：

(1) 特征值是负数时， $u(t)$ 趋于 0。这个特点很简单，但是要注意一种特殊情况，就是特征值为复数时， $a+bi$ 怎么去判断 $u(t)$ 的趋势呢？答案是只有实数部分决定 $u(t)$ 趋势。我们可以画一个复数坐标系



不难看出，投影到实数轴，只有实数部分 a 决定正负性，而虚部 b 的作用是在另一条轴上指明方向，所以不影响我们的判断。

(2) 稳态存在时（如【例 1】中最后 t 趋于无穷时， u 趋于一个确数），一个特征向量=0，其余的特征向量全部 <0 。

(3) 如果有任何特征值实数部分 >0 ，则解无法收敛。

三. 解耦与 e^{At}

3.1 解耦

回到【例 1】， $\frac{du}{dt} = Au$ ，矩阵 A 中，有 u_1, u_2 耦合，我们的处理，就是计算出特征值与特征向量将 A 解耦。我们设 S 是特征向量矩阵。

$$\text{令 } u = SV$$

$$\frac{du}{dt} = S \frac{dv}{dt} = Au = ASV, \text{ 提取出 } S \frac{dv}{dt} = ASV。$$

两边同时左乘上 S^{-1} ，得到： $\frac{dv}{dt} = S^{-1}ASV = \Lambda V$ ，得到关于 V 的对角化方程组。新方程不耦合， $\frac{dv_1}{dt} = \lambda_1 v_1$ ， $\frac{dv_2}{dt} = \lambda_2 v_2$ 以此类推。最终可得到：

$$v(t) = e^{\Lambda t} v(0)$$

同类型地，也有： $u(t) = e^{At} u(0) = S e^{\Lambda t} S^{-1} u(0)$

由 $\frac{du}{dt} = Au$ 得到

?

这里就牵扯到了一个新问题， e^{At} 和 $e^{\Lambda t}$ 是什么？

表面来看， e^{At} 就是 $u(t)$ 的解，那么 e^{At} 为什么与 $S e^{\Lambda t} S^{-1}$ 相等呢？它们表示的是什么呢？我们接下的来重点就在介绍这些式子上。

3.2 e^{At} 与 $S(e^{\Lambda t})S^{-1}$

首先熟悉一下幂级数公式：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

(收敛域是全体实数，不用考虑特征值问题)

扩展到矩阵的计算中，同样， I 代替 1 ，矩阵代替 x ，得到：

$$e^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2} + \frac{(At)^3}{6} + \dots + \frac{(At)^n}{n!} + \dots$$

接下来我们对角化形式化简 A ，得到

$$e^{At} = S S^{-1} + S \Lambda t S^{-1} + \frac{S(\Lambda t)^2 S^{-1}}{2} + \frac{S(\Lambda t)^3 S^{-1}}{6} + \dots$$

提出 S 和 S^{-1} ，得到：

$$e^{At} = S \left(I + \Lambda t + \frac{(\Lambda t)^2}{2} + \frac{(\Lambda t)^3}{6} + \dots \right) S^{-1}$$

综合幂级数公式，得到： $e^{At} = S(e^{\Lambda t})S^{-1}$

注意：这步的化简是有条件的，即 A 必须可以对角化，即有 n 个独立的特征向量， S^{-1} 存在。

3.3 矩阵指数

上面的等式将对角矩阵与一般矩阵联系了起来，那么其中的 $e^{\Lambda t}$ 代表着什么呢？

我们知道 $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$,

那么 $e^{\Lambda t}$ 就可以如下表示：

$$\begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \cdots & 0 \\ \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

其主对角线上皆为 $e^{\lambda_i t}$ ，其余位置为 0。

同样，这里的判断是否收敛与微分方程中的判别差不多，即比较 λ 的实部的绝对值与 1 的大小关系。

四．二阶微分方程的解

解二阶微分方程时，我们可以将它降阶处理，步骤如下：

二阶微分方程 $y'' + by' + ky = 0$

设 $u = \begin{bmatrix} y' \\ y \end{bmatrix}$ ，可利用 u 将上面的方程化简为：

$$u' = \begin{bmatrix} y'' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b & -k \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y' \\ y \end{bmatrix}$$

这样我们就将二阶微分方程化简为了一阶微分方程乘上一个矩阵。同样，如果是求解一个五阶微分方程的话，我们只需要像上面那样化简，只不过其中

的 $\begin{bmatrix} -b & -k \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 会变成一个 5×5 的矩阵，类似于 $\begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的矩阵，其中 a ,

b, c, d, e 都是方程中的系数，而且主对角线上的元素下的元素都是 0。这样的矩阵将五阶微分方程转化为一阶向量方程。接下来只要使用一阶微分方程正常求解就可以了。

五、学习感悟

本节内容较多，主要目的是在实际情况下使用矩阵对角化，特征值等方法求解微分方程，给出了一种使用矩阵求解微分方程的通用规律，即高阶降阶，一阶用特征值和特征向量将原系数矩阵 A 解耦，最后得到结果。并介绍了在我们解耦 A 时使用矩阵对角化将其与特征向量联系起来运算的方法。另外介绍了判断收敛性的方法，即看特征值实部绝对值与 1 的大小关系。这些内容都是特征值与特征向量的实际应用，较为重要。

机器学习算法与自然语言处理公众号
丁坤博