

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B 为两个随机事件, $P(\bar{A})=0.3$, $P(B)=0.6$, $P(A|B)=0.2$, 则 $P(A-B)=$ 0.58。
2. 已知随机变量 X 与 Y 都服从泊松分布 $\pi(1)$ 且相互独立, 则 $P\{\max(X, Y) \geq 1\} =$ $1 - e^{-2}$ 。
3. 设随机向量 $X \sim N(0, 4)$, $Y \sim N(1, 9)$, $\rho_{XY} = 0.2$, 则 $Cov(X, Y) =$ 1.2。
4. 设 X_1, X_2, \dots, X_{100} 在区间 $(0, 1)$ 独立地随机取值, 则 $\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似地服从 $N(50, 25/3)$ 。
5. 在假设检验中, 如果增加样本量, 其他条件不变, 则犯第一类错误的概率 变小 (填: 变大、变小、不变)。

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 某小组有 4 位男生和 2 位女生, 从中抽 2 人, 则 2 位都是男生的概率是(B)。
(A) 0.6 (B) 0.4 (C) 0.2 (D) 0.8
2. 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 边缘分布函数分别为 $F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$, 则 $M = \max\{X, Y\}$ 的分布函数是(C)。
(A) $F_X(z)F_Y(z)$ (B) $F_X(x)F_Y(y)$ (C) $F(z, z)$ (D) $1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$
3. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 分布律如下:

X	-1	1
$P\{X=k\}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	1
$P\{Y=k\}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

则下列结论正确的是(C)。

- (A) $X=Y$ (B) $P\{X=Y\}=1$ (C) $P\{X=Y\}=\frac{5}{9}$ (D) $P\{X=Y\}=\frac{4}{9}$
4. 设 $E(X)=0$, $D(X)=5$, 则由切比雪夫不等式, 得 $P\{-5 < X < 5\} \geq$ (D)。
(A) 1/25 (B) 24/25 (C) 1/5 (D) 4/5
5. 在单个正态总体方差的假设检验中, 显著性水平为 α , 样本方差为 S^2 , 样本容量为 n , $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$, 则拒绝域为(D)。
(A) $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ (B) $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
(C) $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ (D) $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$



三、计算题 (共 70 分)

1. (本题 10 分) 在某项医疗保险业务中, 把被保险人投保时的健康水平分为: “一级”、“二级”、“三级”。已知这三类被保险人占比分别是 0.15、0.60、0.25, 据统计, 他们产生 2000 元以上医疗费用的概率分别是 0.05、0.10、0.30。

(1) 任选一位被保险人, 他(她)产生 2000 元以上医疗费用的概率;

(2) 若某一位被保险人产生了 2000 元以上医疗费用, 求该被保险人在投保时健康水平为“二级”的概率。

解: 设 A 表示“产生 2000 元以上医疗费用”,

$B_i (i=1,2,3)$ 分别表示健康水平为: “一级”、“二级”、“三级”。

由题可得: $P(B_1)=0.15$ $P(B_2)=0.6$ $P(B_3)=0.25$,

$$P(A|B_1)=0.05 \quad P(A|B_2)=0.10 \quad P(A|B_3)=0.30$$

(1) 由全概率公式:

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i) \\ &= 0.15 \times 0.05 + 0.6 \times 0.1 + 0.25 \times 0.3 \\ &= 0.1425 \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式:

$$P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{\sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i)} = \frac{0.6 \times 0.1}{0.1425} = \frac{8}{19} \approx 0.42.$$

2. (本题 10 分) 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律如下

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	0	1	2
0	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{18}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$

求: (1) $X+Y$ 的分布律; (2) $E(X+3Y-5)$; (3) $D(-2Y)$ 。

解: (1) 由题知 $X+Y$ 的可能取值为 0, 1, 2, 3.

$$\text{可算得 } P\{X+Y=0\} = P\{X=0, Y=0\} = \frac{1}{18},$$

$$P\{X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} + P\{X=1, Y=0\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X+Y=2\} = P\{X=1, Y=1\} + P\{X=2, Y=0\} = \frac{1}{9},$$

$$P\{X+Y=3\} = P\{X=2, Y=1\} = \frac{1}{3},$$

从而 $X+Y$ 的分布律为:

$X+Y$	0	1	2	3
P	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$

(2) 由题可得 X, Y 的边缘分布律分别为

X	0	1	2
P	$\frac{7}{18}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{7}{18}$

Y	0	1
P	$\frac{5}{18}$	$\frac{13}{18}$

所以

$$E(X + 3Y - 5)$$

$$= E(X) + 3E(Y) - 5$$

$$= 1 + 3 \times \frac{13}{18} - 5 = -\frac{11}{6}.$$

$$(3) D(-2Y) = 4D(Y) = 4[E(Y^2) - E^2(Y)]$$

$$= 4 \times \left[\frac{13}{18} - \left(\frac{13}{18} \right)^2 \right] = \frac{65}{81}.$$

3. (本题 10 分) 已知 X_1, X_2, X_3 为来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}$, \bar{X} 为样本均值, $i=1, 2, 3$, 求: (1) $D(Y_1)$; (2) $Cov(Y_2, Y_3)$ 。

解法一:

$$(1) D(Y_1) = D(X_1 - \bar{X}) = D(X_1) + D(\bar{X}) - 2Cov(X_1, \bar{X})$$

$$= 1 + \frac{1}{3} - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$(2) Cov(Y_2, Y_3) = Cov(X_2 - \bar{X}, X_3 - \bar{X})$$

$$= Cov(X_2, X_3) - Cov(\bar{X}, X_3) - Cov(X_2, \bar{X}) + Cov(\bar{X}, \bar{X})$$

$$= 0 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$$

$$= -\frac{1}{3}$$

解法二:

$$\begin{aligned}(1) \quad D(Y_1) &= D(X_1 - \bar{X}) = D\left(\frac{2}{3}X_1 - \frac{1}{3}X_2 - \frac{1}{3}X_3\right) \\ &= \frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad \text{Cov}(Y_2, Y_3) &= \text{Cov}(X_2 - \bar{X}, X_3 - \bar{X}) \\ &= \text{Cov}\left(-\frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2 - \frac{1}{3}X_3, -\frac{1}{3}X_1 - \frac{1}{3}X_2 + \frac{2}{3}X_3\right) \\ &= \text{Cov}\left(-\frac{1}{3}X_1, -\frac{1}{3}X_1\right) + \text{Cov}\left(\frac{2}{3}X_2, -\frac{1}{3}X_2\right) + \text{Cov}\left(-\frac{1}{3}X_3, \frac{2}{3}X_3\right) \\ &= \frac{1}{9} - \frac{2}{9} - \frac{2}{9} = -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

4. (本题 15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6y, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(1) 判断 X, Y 是否相互独立, 并说明理由; (2) 求概率 $P\{Y \leq 1 - X\}$; (3) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

解: (1) 根据题意, 可算得当 $0 < x < 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^x 6y dy = 3x^2,$$

所以关于 X 的边缘概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $0 < y < 1$ 时,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_y^1 6y dx = 6y - 6y^2,$$

所以关于 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = \begin{cases} 6y - 6y^2, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

故 $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 所以 X 和 Y 不独立。

$$\begin{aligned}(2) \quad P\{Y \leq 1 - X\} &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_y^{1-y} 6y dx dy \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

(3) 由 Z 的概率密度 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x)dx$,

$$\text{非零区域为 } \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ x < z < 2x \end{cases},$$

$$\text{当 } 0 < z < 1 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^z 6(z-x)dx = \frac{3}{4}z^2$$

$$\text{当 } 1 < z < 2 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^1 6(z-x)dx = -\frac{9}{4}z^2 + 6z - 3$$

$$\text{故 } Z \text{ 的概率密度为 } f_Z(z) = \begin{cases} \frac{3}{4}z^2, & 0 < z < 1, \\ -\frac{9}{4}z^2 + 6z - 3, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

5. (本题 15 分) 已知 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4a}, & 0 \leq x \leq 4a, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 的简单随机样本,

其中 $a > 0$ 为未知参数, 求: (1) a 的矩估计量; (2) a 的最大似然估计量; (3) 判断 a 的矩估计量是否为无偏估计量, 并说明理由。

解: (1) $\mu_1 = E(X) = 2a$

利用 A_1 代替 μ_1 , 得矩估计量为 $\hat{a}_1 = \frac{\bar{X}}{2}$.

(2) 设 x_1, x_2, \dots, x_n 是相应于样本 X_1, X_2, \dots, X_n 的一个样本值。似然函数为

$$L(a) = \begin{cases} \frac{1}{(4a)^n}, & 0 \leq x_i \leq 4a, i=1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在当分母 $(4a)^n$ 取最小值时, 似然函数 $L(a)$ 取最大值, 故最大似然估计量为

$$\hat{a}_2 = \frac{1}{4} \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

$$(3) \quad E(\hat{a}_1) = E\left(\frac{\bar{X}}{2}\right) = \frac{1}{2}E(\bar{X}) = \frac{1}{2} \times 2a = a$$

故矩估计量是无偏估计量。

6. (本题 10 分) 设某一年我国各地数字普惠金融总指数 $X \sim N(300, 10000)$, 五年后, 随机抽取了 25 个地区的数字普惠金融总指数, 其平均值为 365。设 5 年后数字普惠金融总指数仍服从正态分布,

且方差不变。问：在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，数字普惠金融总指数是否发生了显著变化？

($z_{0.025} = 1.96$, $z_{0.05} = 1.645$, $t_{0.025}(24) = 2.0639$, $t_{0.025}(25) = 2.0595$, $t_{0.05}(24) = 1.7109$, $t_{0.05}(25) = 1.7081$)

解： $H_0: \mu = \mu_0 = 300, H_1: \mu \neq 300$

在 H_0 为真时， $Z = \frac{\bar{X} - 300}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

拒绝域： $|Z| = \left| \frac{\bar{x} - 300}{\sigma / \sqrt{n}} \right| \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$

已知 $\sigma = 100$, $n = 25$, $\mu_0 = 300$, $\bar{x} = 365$, $\alpha = 0.05$, $z_{0.025} = 1.96$

$\left| \frac{\bar{x} - 300}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = \frac{13}{4} = 3.25 > z_{0.025} = 1.96$, 3.25 落入拒绝域。

故拒绝 H_0 , 即认为数字普惠金融总指数发生了显著变化。