

ID ПАЦИЕНТА:

833177605

ИМЯ ПАЦИЕНТА:



ДАТА РОЖДЕНИЯ:



ID ОБРАЗЦА:



4

QR-КОД:

80AEE345

ПРОАНАЛИЗИРОВАНО :

09.07.2024

ПРОВЕРЕННЫЕ АНТИГЕНЫ:

287

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ:

FOX

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ:


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Внутренний контроль качества (проверка достоверности GD) находился в пределах допустимого диапазона.

Лабораторный отчет: Обзор профиля IgG



Самая высокая измеренная концентрация IgG



Молоко и Яйцо

Пахта	45,01 мкг/мл	●●●●	Молоко коровье Bos d 8 * (Casein)	48,24 мкг/мл	●●●●
Камамбер	33,80 мкг/мл	●●●●	Буйволиное молоко	41,94 мкг/мл	●●●●
Эмменталь	32,27 мкг/мл	●●●●	Верблюжье молоко	≤ 5,00 мкг/мл	●
Гауда	35,38 мкг/мл	●●●●	Козий сыр	32,92 мкг/мл	●●●●
Творог	47,90 мкг/мл	●●●●	Козье молоко	32,80 мкг/мл	●●●●
Коровье молоко	46,70 мкг/мл	●●●●	Перепелиное яйцо	≤ 5,00 мкг/мл	●
Моцарелла	38,05 мкг/мл	●●●●	Яичный белок	35,65 мкг/мл	●●●●
Пармезан	30,11 мкг/мл	●●●●	Яичный желток	37,19 мкг/мл	●●●●
Молоко коровье Bos d 4 * (Alpha-Lactalbumin)	48,41 мкг/мл	●●●●	Овечий сыр	31,21 мкг/мл	●●●●
Молоко коровье Bos d 5 * (Beta-Lactoglobulin)	40,39 мкг/мл	●●●●	Овечье молоко	41,89 мкг/мл	●●●●

Мясо

Утиное мясо	≤ 5,00 мкг/мл	●	Курица	≤ 5,00 мкг/мл	●
Говядина	7,33 мкг/мл	●	Индейка	≤ 5,00 мкг/мл	●
Телятина	≤ 5,00 мкг/мл	●	Кролик	≤ 5,00 мкг/мл	●
Мясо косули	≤ 5,00 мкг/мл	●	Баранина	≤ 5,00 мкг/мл	●
Козлятина	≤ 5,00 мкг/мл	●	Страус	≤ 5,00 мкг/мл	●
Оленина	6,33 мкг/мл	●	Свинина	≤ 5,00 мкг/мл	●
Конина	≤ 5,00 мкг/мл	●	Кабан	≤ 5,00 мкг/мл	●

Рыба и морепродукты

Икра	48,67 мкг/мл	●●●●	Форель	≤ 5,00 мкг/мл	●
Угорь	7,14 мкг/мл	●	Устрица	≤ 5,00 мкг/мл	●
Речной рак	≤ 5,00 мкг/мл	●	Северная креветка	≤ 5,00 мкг/мл	●
Съедобный моллюск	≤ 5,00 мкг/мл	●	Гребешок	≤ 5,00 мкг/мл	●
Краб	≤ 5,00 мкг/мл	●	Двустворчатый моллюск	≤ 5,00 мкг/мл	●
Атлантическая сельдь	≤ 5,00 мкг/мл	●	Европейская камбала	≤ 5,00 мкг/мл	●
Карп	≤ 5,00 мкг/мл	●	Скат (морская лисица)	≤ 5,00 мкг/мл	●
Европейский анчоус	≤ 5,00 мкг/мл	●	Венериды	6,35 мкг/мл	●
Северная щука	≤ 5,00 мкг/мл	●	Лосось	≤ 5,00 мкг/мл	●
Атлантическая треска	≤ 5,00 мкг/мл	●	Европейская сардина	≤ 5,00 мкг/мл	●
Морские ушки	8,38 мкг/мл	●	Палтус	≤ 5,00 мкг/мл	●
Омар	≤ 5,00 мкг/мл	●	Скумбрия	≤ 5,00 мкг/мл	●

Микс креветок	≤ 5,00 мкг/мл	●
Кальмар	≤ 5,00 мкг/мл	●
Морской черт	≤ 5,00 мкг/мл	●
Пикша	≤ 5,00 мкг/мл	●
Хек	≤ 5,00 мкг/мл	●
Мидия обыкновенная	8,15 мкг/мл	●
Осьминог	≤ 5,00 мкг/мл	●

Атлантический морской окунь	≤ 5,00 мкг/мл	●
Сепия	≤ 5,00 мкг/мл	●
Морской язык	15,33 мкг/мл	●●
Дорада	≤ 5,00 мкг/мл	●
Тунец	≤ 5,00 мкг/мл	●
Рыба-меч	≤ 5,00 мкг/мл	●

Зерновые и семена

Амарант	≤ 5,00 мкг/мл	●
Овёс	13,55 мкг/мл	●●
Рапс	13,67 мкг/мл	●●
Семена конопли	≤ 5,00 мкг/мл	●
Киноа	≤ 5,00 мкг/мл	●
Семена тыквы	≤ 5,00 мкг/мл	●
Гречка	≤ 5,00 мкг/мл	●
Подсолнечник	≤ 5,00 мкг/мл	●
Ячмень	≤ 5,00 мкг/мл	●
Солод (ячмень)	17,23 мкг/мл	●●
Льняные семена	≤ 5,00 мкг/мл	●
Семена люпина	≤ 5,00 мкг/мл	●
Рис	≤ 5,00 мкг/мл	●
Просо	≤ 5,00 мкг/мл	●
Мак	6,24 мкг/мл	●

Кедровый орех	≤ 5,00 мкг/мл	●
Рожь	21,62 мкг/мл	●●●
Кунжут	≤ 5,00 мкг/мл	●
Пшеница	7,82 мкг/мл	●
Пшеничные отруби	7,19 мкг/мл	●
Глиадин пшеницы Tri a Gliadin *	6,76 мкг/мл	●
Ростки пшеницы	≤ 5,00 мкг/мл	●
Глютен	16,51 мкг/мл	●●
Полба	12,45 мкг/мл	●●
Пшеница твёрдая	15,78 мкг/мл	●●
Пшеница однозернянка	17,51 мкг/мл	●●
Пшеница польская	24,53 мкг/мл	●●●
Спельта	15,21 мкг/мл	●●
Кукуруза	≤ 5,00 мкг/мл	●

Орехи

Кешью	≤ 5,00 мкг/мл	●
Бразильский орех	≤ 5,00 мкг/мл	●
Орех пекан	≤ 5,00 мкг/мл	●
Сладкий каштан	≤ 5,00 мкг/мл	●
Кокосовое молоко	34,09 мкг/мл	●●●
Кокос	32,14 мкг/мл	●●●
Орех кола	≤ 5,00 мкг/мл	●

Фундук	40,31 мкг/мл	●●●
Сыть (чуфа)	≤ 5,00 мкг/мл	●
Грецкий орех	7,98 мкг/мл	●
Макадамия, орех	≤ 5,00 мкг/мл	●
Фисташка	≤ 5,00 мкг/мл	●
Миндаль	≤ 5,00 мкг/мл	●

Бобовые

Арахис	19,39 мкг/мл	●●
--------	--------------	----

Зеленая фасоль	≤ 5,00 мкг/мл	●
----------------	---------------	---

Нут	≤ 5,00 мкг/мл	
Соя	20,12 мкг/мл	
Чечевица	≤ 5,00 мкг/мл	
Белая фасоль	≤ 5,00 мкг/мл	

Горох	≤ 5,00 мкг/мл	
Сахарный горошек	≤ 5,00 мкг/мл	
Тамаринд	≤ 5,00 мкг/мл	
Бобы мунг	≤ 5,00 мкг/мл	

Фрукты

Киви	9,54 мкг/мл	
Ананас	9,73 мкг/мл	
Папайя	≤ 5,00 мкг/мл	
Лайм	≤ 5,00 мкг/мл	
Лимон	≤ 5,00 мкг/мл	
Арбуз	6,94 мкг/мл	
Грейпфрут	≤ 5,00 мкг/мл	
Мандарин	9,64 мкг/мл	
Апельсин	≤ 5,00 мкг/мл	
Дыня	≤ 5,00 мкг/мл	
Инжир	≤ 5,00 мкг/мл	
Клубника	≤ 5,00 мкг/мл	
Личи	≤ 5,00 мкг/мл	
Яблоко	≤ 5,00 мкг/мл	
Манго	6,69 мкг/мл	
Шелковица	≤ 5,00 мкг/мл	
Банан	7,23 мкг/мл	
Маракуйя	≤ 5,00 мкг/мл	

Финик	≤ 5,00 мкг/мл	
Физалис	≤ 5,00 мкг/мл	
Абрикос	≤ 5,00 мкг/мл	
Вишня	18,53 мкг/мл	
Слива	≤ 5,00 мкг/мл	
Персик	≤ 5,00 мкг/мл	
Нектарин	≤ 5,00 мкг/мл	
Гранат	≤ 5,00 мкг/мл	
Груша	≤ 5,00 мкг/мл	
Крыжовник	≤ 5,00 мкг/мл	
Красная смородина	≤ 5,00 мкг/мл	
Ежевика	≤ 5,00 мкг/мл	
Малина	28,66 мкг/мл	
Бузина	11,29 мкг/мл	
Черника	≤ 5,00 мкг/мл	
Клюква	≤ 5,00 мкг/мл	
Виноград	≤ 5,00 мкг/мл	
Изюм	≤ 5,00 мкг/мл	

Овощи

Лук-шалот	≤ 5,00 мкг/мл	
Лук	≤ 5,00 мкг/мл	
Лук-порей	≤ 5,00 мкг/мл	
Чеснок	31,78 мкг/мл	
Шнитт-лук	≤ 5,00 мкг/мл	
Дикий чеснок	≤ 5,00 мкг/мл	
Корень сельдерея	≤ 5,00 мкг/мл	
Стебель сельдерея	≤ 5,00 мкг/мл	
Хрен	6,93 мкг/мл	
Белая спаржа	≤ 5,00 мкг/мл	

Каперсы	≤ 5,00 мкг/мл	
Цикорный салат	≤ 5,00 мкг/мл	
Радиччо (красный салатный цикорий)	≤ 5,00 мкг/мл	
Цикорий	≤ 5,00 мкг/мл	
Мускатная тыква	≤ 5,00 мкг/мл	
Тыква Хоккайдо	6,75 мкг/мл	
Кивано	≤ 5,00 мкг/мл	
Цуккини	≤ 5,00 мкг/мл	
Огурец	≤ 5,00 мкг/мл	
Артишок	≤ 5,00 мкг/мл	

Ростки бамбука	≤ 5,00 мкг/мл		Морковь	≤ 5,00 мкг/мл	
Мангольд	≤ 5,00 мкг/мл		Руккола	≤ 5,00 мкг/мл	
Красная свекла	≤ 5,00 мкг/мл		Фенхель (корень)	≤ 5,00 мкг/мл	
Капуста	6,05 мкг/мл		Сладкий картофель	≤ 5,00 мкг/мл	
Цветная капуста	5,73 мкг/мл		Кресс-салат	≤ 5,00 мкг/мл	
Белокочанная капуста	≤ 5,00 мкг/мл		Олива	≤ 5,00 мкг/мл	
Брюссельская капуста	≤ 5,00 мкг/мл		Пастернак	≤ 5,00 мкг/мл	
Кольраби	≤ 5,00 мкг/мл		Авокадо	≤ 5,00 мкг/мл	
Брокколи	≤ 5,00 мкг/мл		Редис	7,31 мкг/мл	
Романеско	≤ 5,00 мкг/мл		Баклажан	≤ 5,00 мкг/мл	
Красная капуста	6,95 мкг/мл		Картофель	≤ 5,00 мкг/мл	
Зеленая капуста	≤ 5,00 мкг/мл		Помидор	11,74 мкг/мл	
Савойская капуста	≤ 5,00 мкг/мл		Шпинат	≤ 5,00 мкг/мл	
Репа	≤ 5,00 мкг/мл		Листья крапивы	6,23 мкг/мл	
Пак-чой/китайская капуста	≤ 5,00 мкг/мл		Полевой салат	≤ 5,00 мкг/мл	
Пекинская капуста	≤ 5,00 мкг/мл				

Специи

Укроп	≤ 5,00 мкг/мл		Мята	≤ 5,00 мкг/мл	
Эстрагон	≤ 5,00 мкг/мл		Базилик	7,37 мкг/мл	
Паприка	≤ 5,00 мкг/мл		Майоран	≤ 5,00 мкг/мл	
Кайенский перец	≤ 5,00 мкг/мл		Орегано	≤ 5,00 мкг/мл	
Чили (красный)	≤ 5,00 мкг/мл		Петрушка	≤ 5,00 мкг/мл	
Тмин	≤ 5,00 мкг/мл		Анис	7,79 мкг/мл	
Корица	≤ 5,00 мкг/мл		Перец (черный / белый / зеленый / красный / желтый)	≤ 5,00 мкг/мл	
Карри	≤ 5,00 мкг/мл		Розмарин	≤ 5,00 мкг/мл	
Кориандр	≤ 5,00 мкг/мл		Шалфей	≤ 5,00 мкг/мл	
Зира	≤ 5,00 мкг/мл		Горчица	≤ 5,00 мкг/мл	
Куркума	≤ 5,00 мкг/мл		Гвоздика	≤ 5,00 мкг/мл	
Лемонграсс	≤ 5,00 мкг/мл		Тимьян	8,60 мкг/мл	
Кардамон	≤ 5,00 мкг/мл		Пажитник	≤ 5,00 мкг/мл	
Ягода можжевельника	≤ 5,00 мкг/мл		Ваниль	≤ 5,00 мкг/мл	
Лавровый лист	≤ 5,00 мкг/мл		Имбирь	7,00 мкг/мл	
Мускатный орех	≤ 5,00 мкг/мл				

Съедобные грибы

Шампиньон	≤ 5,00 мкг/мл	●	Опята	≤ 5,00 мкг/мл	●
Подосиновик/белый гриб	≤ 5,00 мкг/мл	●	Эринги	≤ 5,00 мкг/мл	●
Лисички	5,48 мкг/мл	●	Вешенка	≤ 5,00 мкг/мл	●

Новые продукты

Домашний сверчок	11,67 мкг/мл	●●	Женьшень	≤ 5,00 мкг/мл	●
Баобаб	≤ 5,00 мкг/мл	●	Гуарана	≤ 5,00 мкг/мл	●
Алоэ	≤ 5,00 мкг/мл	●	Миндальное молоко	≤ 5,00 мкг/мл	●
Корень лопуха большой	≤ 5,00 мкг/мл	●	Нори	≤ 5,00 мкг/мл	●
Черноплодная рябина	≤ 5,00 мкг/мл	●	Семена чиа	8,44 мкг/мл	●
Сафлоровое масло	≤ 5,00 мкг/мл	●	Корень якона	≤ 5,00 мкг/мл	●
Хлорелла	10,88 мкг/мл	●●	Спирулина	≤ 5,00 мкг/мл	●
Гинкго билоба	5,82 мкг/мл	●	Корень одуванчика	≤ 5,00 мкг/мл	●
Мака перуанская	≤ 5,00 мкг/мл	●	Хрущак мучной	≤ 5,00 мкг/мл	●
Перелетная саранча	5,34 мкг/мл	●	Морские водоросли	≤ 5,00 мкг/мл	●
Тапиока	≤ 5,00 мкг/мл	●			

Кофе и чай

Чай, черный	≤ 5,00 мкг/мл	●	Ромашка	5,27 мкг/мл	●
Чай, зеленый	≤ 5,00 мкг/мл	●	Мята перечная	≤ 5,00 мкг/мл	●
Кофе	≤ 5,00 мкг/мл	●	Моринга	7,02 мкг/мл	●
Гибискус	≤ 5,00 мкг/мл	●	Какао	≤ 5,00 мкг/мл	●
Жасмин	≤ 5,00 мкг/мл	●			

Другие

Агар-агар	≤ 5,00 мкг/мл	●	Тростниковый сахар	5,59 мкг/мл	●
Мед	32,14 мкг/мл	●●●	Пивные дрожжи	≤ 5,00 мкг/мл	●
Aspergillus niger	5,47 мкг/мл	●	Цветы бузины	≤ 5,00 мкг/мл	●
Хмель	≤ 5,00 мкг/мл	●	М-трансглутаминаза, мясной клей	48,70 мкг/мл	●●●
Дрожжи хлебопекарные	≤ 5,00 мкг/мл	●			

CCD

Человеческий лактоферрин	≤ 5,00 мкг/мл	●
--------------------------	---------------	---

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕН НА
09.07.2024

* Молекулярный антиген

FOX – Количество протестированных источников пищи: 287



МОЛОКО И ЯЙЦО

17

Молоко буйвола, пахта, верблюжье молоко, камамбер, сыр, коровье молоко, яичный белок, яичный желток, сыр Эмменталь, козий сыр, козье молоко, сыр Гауда, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, перепелиное яйцо, овечий сыр, овечье молоко



МЯСО

14

Говядина, мясо дикого кабана, курица, утка, козье мясо, конина, баранина, мясо страуса, свинина, кролик, оленина, индейка, телятина, дичь



РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

37

Морские ушки, атлантическая треска, атлантическая сельдь, атлантический морской окунь, карп, икра, мидия обыкновенная, краб, угорь, европейский анчоус, европейская сардина, камбала, дорада (золотистый спар), палтус, рыба-меч, пикша, хек, омар, скумбрия, морской черт, речной рак, северная щука, северная креветка, осьминог, устрицы, двустворчатый моллюск, лосось, гребешок, сепия/каракатица, микс креветок, кальмар, рыба-меч, скат (морская лисица), форель, тунец, венериды



ЗЕРНОВЫЕ И СЕМЕНА

29

Амарант, ячмень, гречка, нут, кукуруза, пшеница твердая, пшеница однозернянка, пшеница двозернянка, глютен, конопля, семена льна, люпин, солод (ячмень), пшено, овес, кедровый орех, польский пшеница, мак, тыквенные семечки, киноа, рапс, рис, рожь, кунжут, спельты, подсолнечник, пшеница, пшеничные отруби, глиадин пшеницы, ростки пшеницы.



ОРЕХИ

13

Миндаль, бразильский орех, кешью, кокос,

кокосовое молоко, фундук, орех кола, макадамия, орех пекан, фисташки, сладкий каштан, тигровый орех, грецкий орех



БОБОВЫЕ

10

Нут, зеленая фасоль, чечевица, маш, арахис, горох, соя, сахарный горошек, тамаринд, белая фасоль



ОВОЩИ

51

Артишок, руккола, авокадо, бамбуковые ростки, брокколи, брюссельская капуста, капуста, каперсы, морковь, цветная капуста, корень сельдерея, стебель сельдерея, листовая свекла, цикорий, китайская капуста, лук, огурец, баклажаны, цикорий салат, фенхель, чеснок, зеленый капуста, хрен, кивано, кольраби, полевой салат, лук-порей, листья крапивы, оливки/маслины, лук, пастернак, пак-

чай/китайская капуста, картофель, тыква (тыква мускатная), тыква (Хоккайдо), радищ, редька, красная свекла, красная капуста, романеско, савойская капуста, лук-шалот, шпинат, сладкий картофель, помидор, репа, кресс-салат, белая спаржа, белокочанная капуста, дикий чеснок, кабачки



СПЕЦИИ

31

анис, базилик, лавровый лист, кардамон, кайенский перец, перец чили (красный), корица, гвоздика, кориандр, тмин, карри, укроп, пажитник, имбирь, можжевельные ягоды, лемонграсс, майоран, мята, горчица, мускатный орех, орегано, паприка, петрушка, перец (черный / белый / зеленый / красный / желтый), розмарин, шалфей, эстрагон, тимьян, куркума, ваниль.



СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ

6

Подосиновик/белый гриб, лисичка, энотики/зимние опята, вешенки, эринги, белый гриб



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

21

миндальное молоко, алоэ, арония, баоба, семена чиа, хлорелла, корень одуванчика, гинкго билоба, женьшень, корень лопуха, гуарана, домашний сверчок, корень маки, мучной червь, перелетная саранча, нори, сафлоровое масло, спирулина, тапиока, вакаме, корни якона.



КОФЕ И ЧАЙ

9

ромашка, какао, кофе, гибискус, жасмин, моринга, мята перечная, чай (черный), чай (зеленый)



ДРУГИЕ

9

Агар- агар, Aspergillus niger, хлебопекарные дрожжи, пивные дрожжи, цветки бузины, мед, хмель, М- трансклутаминаза (мясной клей), тростниковый сахар, перекрестно реагирующие углеводные детерминанты



ФРУКТЫ

36

Яблоко, абрикос, банан, ежевика, черника, вишня, клюква, финик, бузина, инжир, крыжовник, виноград, грейпфрут, киви, лимон, лайм, личи, манго, дыня, шелковица, нектарин, апельсин, папайя, маракуйя, персик, груша, физалис, ананас, слива, гранат, изюм, малина, красная смородина, клубника, мандарин, арбуз

Интерпретация результатов

Молоко и яйца

Буйволиное молоко

Ваш уровень IgG к буйволиному молоку составляет 41,94 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления буйволиного молока включают тошноту, боль в желудке, газообразование, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие буйволиное молоко, включают такие молочные продукты, как масло, йогурт, сыр (например, моцарелла) и мороженое.

Возможные альтернативы буйволиному молоку включают верблюжье молоко, козье молоко и коровье молоко из источников животного происхождения. Альтернативы на растительной основе включают соевое молоко, кокосовое молоко, миндальное молоко и рисовое молоко. Обратите внимание, что белки в молоке разных животных структурно схожи с белками коровьего молока. Некоторые пациенты могут их переносить, другие могут испытывать те же реакции, что и после употребления коровьего молока.

Пахта

Ваш уровень IgG к пахте составляет 45,01 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления пахты включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, которые обычно содержат пахту, включают печенье, пирожные, картофельное пюре, супы, жареный цыпленок, булочки для гамбургеров, кукурузный хлеб, заправку ранчо, смузи, блины, мороженое и сливочный сыр.

Возможные альтернативы (немолочные) пахте включают варианты на основе сои, такие как комбинация соевого молока и кислоты (например, лимонного сока или уксуса), вегетарианской сметаны и воды или несладкого растительного молока (например, кокосовое, миндальное или кешью) и кислоты (например, лимонный сок или уксус).

Камамбер

Ваш уровень IgG к Камамберу составляет 33,8 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления камамбера включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие камамбер, - это салаты, сырные доски, гамбургеры. Камамбер часто подают во французской кухне.

Возможные альтернативы (немолочные) камамберу включают заменители на основе кешью.

Творог

Ваш уровень IgG к творогу составляет 47,9 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления творога включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие творог, включают тарелки для завтрака, соусы, блины, блюда из яиц, блюда из пасты и бутерброды.

Возможные альтернативы (немолочные) творогу включают твердый тофу (раскрошенный) или заменители на основе кешью.

Коровье молоко

Ваш уровень IgG к коровьему молоку составляет 46,7 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления коровьего молока включают тошноту, боль в животе, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, содержащие коровье молоко, включают молочные продукты, такие как масло, сыр, сливки, сметана, заварной крем, йогурт, мороженое и пудинг. Белок коровьего молока часто входит в состав запеканок, хлеба, печенья, крекеров, пирожных, продуктов в кляре, смеси для торта, хлопьев, шоколада, сливок для кофе, батончиков мюсли, маргарина, картофельного пюре и заправок для салатов. На этикетках пищевых продуктов молочный белок может обозначаться как искусственное масло, сырный ароматизатор, казеин, диацетил, творог, топленое масло, гидролизаты, лактальбумин, лактоза, рекальдент, сычужный фермент, тагатоза или сыворотка.

Возможные альтернативы коровьему молоку включают козье молоко, верблюжье молоко, овечье молоко и буйволиное молоко из источников животного происхождения. Альтернативы на растительной основе включают кокосовое молоко, рисовое молоко, соевое молоко, миндальное молоко и овсяное молоко. Обратите внимание, что белки в молоке разных животных структурно схожи с белками коровьего молока. Некоторые пациенты могут их переносить, другие могут испытывать те же реакции, что и после употребления коровьего молока.

Яичный белок

Ваш уровень IgG к яичному белку составляет 35,65 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления яичного белка включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

К пищевым продуктам и блюдам, содержащим яичный белок, относятся все виды блюд из яиц (омлеты, яичницы, яичница-болтунья и т. д.), а также продукты в панировке и кляре, заправки для салатов, кремовые пироги, слоеные кремы, блины, вафли, заварные кремы, пудинги, зефир, марципан, майонез, мясной рулет, фрикадельки, безе, глазурь, паста, соусы, суфле, сурими и в некоторых случаях вино. На этикетках пищевых продуктов яичные белки могут обозначаться как альбумин, глобулин, лецитин, ливетин, лизоцим, овальбумин, оваглобулин, овамуцин, ововителлин или вителлин.

Возможные альтернативы яичному белку включают аквафабу (жидкость, содержащуюся в консервированном нуте или бобах) для безе и зефира. Если для добавления влаги в выпечку используется целое яйцо, возможной альтернативой станет банановое пюре. Чтобы выпечка стала более тяжелой и плотной, вместо яиц можно использовать молотые семена льна и семена чиа. Если яйцо используется в качестве разрыхлителя, вместо него подойдет 1/4 стакана газированной воды на каждое яйцо. Шелковый тофу используется как заменитель яичницы-болтуньи.

Яичный желток

Ваш уровень IgG к яичному желтку составляет 37,19 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления яичного желтка включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

К пищевым продуктам и блюдам, содержащим яичные желтки, относятся все виды блюд из яиц (омлеты, яичница, яичница-болтунья и т. д.), а также продукты в панировке и кляре, заправки для салатов, пироги с кремом, слоеные кремы, блины, вафли, заварные кремы, пудинги, зефир, марципан, майонез, мясной рулет, фрикадельки, безе, глазурь, паста, соусы, суфле и сурими. На этикетках пищевых продуктов яичные белки могут обозначаться как альбумин, глобулин, лецитин, ливетин, лизоцим, овальбумин, оваглобулин, овамуцин, ововителлин или вителлин.

Возможные альтернативы яичным желткам включают соевый лецитин (побочный продукт соевого масла). Если для добавления влаги в выпечку используется целое яйцо, возможной альтернативой станет банановое пюре. Чтобы выпечка стала более тяжелой и плотной, вместо яиц можно использовать молотые семена льна и семена чиа. Если яйцо используется в качестве разрыхлителя, вместо него подойдет 1/4 стакана газированной воды на каждое яйцо. Шелковый тофу может использоваться как заменитель яичницы-болтуньи.

Эмменталь

Ваш уровень IgG к сыру эмменталь составляет 32,27 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления эмменталя включают тошноту, боль в животе, газы, судороги, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие сыр эмменталь, включают такие блюда как запеканки, сырные фондю, сырные слоеные булочки, супы, пиццу и сырные доски.

Возможные альтернативы (немолочные) сыру эмменталь - вегетарианские заменители сыра на основе орехов (например, кешью, макадамия) или сои.

Козий сыр

Ваш уровень IgG к козьему сыру составляет 32,92 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления козьего сыра включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие козий сыр, включают такие блюда как салаты, пиццу, несладкие пироги, бутерброды, десерты, сырные доски и в качестве добавки к пасте.

Возможные альтернативы (немолочные) козьему сыру включают сыр тофу и сыр из кешью.

Козье молоко

Ваш уровень IgG к козьему молоку составляет 32,8 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления козьего молока включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие козье молоко, включают молочные продукты, такие как сыр, масло, мороженое, йогурт и сгущенка.

Возможные альтернативы козьему молоку включают коровье молоко, верблюжье молоко, овечье молоко и буйволиное молоко из источников животного происхождения. Альтернативы на растительной основе включают кокосовое молоко, рисовое молоко, соевое молоко, миндальное молоко и овсяное молоко. Обратите внимание, что белки в молоке разных животных структурно схожи с белками коровьего молока. Некоторые пациенты могут их переносить, другие могут испытывать те же реакции, что и после употребления коровьего молока.

Гауда

Ваш уровень IgG к сыру гауда составляет 35,38 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления сыра гауда включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие сыр гауда, включают сырные соусы, запеканки, супы, бутерброды, лазанью, пиццу и сырные доски.

Возможными альтернативами (немолочными) сыру гауда являются заменители такие как вегетарианский сыр на основе орехов (например, кешью, макадамия) или сои.

Моцарелла

Ваш уровень IgG к сыру моцарелла составляет 38,05 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления сыра моцарелла включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие моцареллу, включают пиццу, лазанью, салаты капрезе и фруктовые салаты.

Возможные альтернативы (немолочные) сыру моцарелла - вегетарианские заменители сыра на основе орехов кешью или рисового молока.

Пармезан

Ваш уровень IgG к сыру пармезан составляет 30,11 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления сыра пармезан включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие сыр пармезан, включают пиццу, лазанью, блюда из пасты, салаты «Цезарь» с курицей, супы и сырные доски.

Возможные альтернативы (немолочные) сыру пармезан - это заменители на основе сои и пищевых дрожжей.

Овечий сыр

Ваш уровень IgG к овечьему сыру составляет 31,21 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления овечьего сыра включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие овечий сыр, включают популярные сыры, такие как фета (греческий), рикотта (итальянский) и рокфор (французский).

Возможные альтернативы (немолочные) овечьему сыру - тофу и сыр кешью.

Овечье молоко

Ваш уровень IgG к овечьему молоку составляет 41,89 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления овечьего молока включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие овечье молоко, включают молочные продукты, такие как сыры (например, фета, рикотта, рокфор), йогурт, масло и мороженое.

Возможные альтернативы овечьему молоку включают коровье молоко, верблюжье молоко, козье молоко и буйволиное молоко из источников животного происхождения. Альтернативы на растительной основе включают кокосовое молоко, рисовое молоко, соевое молоко, миндальное молоко и овсяное молоко. Обратите внимание, что белки в молоке разных животных структурно схожи с белками коровьего молока. Некоторые пациенты могут их переносить, другие могут испытывать те же реакции, что и после употребления коровьего молока.

Рыба и морепродукты

Икра

Ваш уровень IgG к икре составляет 48,67 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления икры включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие икру в качестве гарнира, включают блюда из яиц, макаронные изделия, картофельные бличики, рыбные блюда, блины и супы.

Возможные альтернативы икре включают икру пинагора, а также кус-кус (сдобренный маслом и окрашенный чернилами сепии) и соевый жемчуг в качестве заменителей на растительной основе.

Солея

Ваш уровень IgG к солее составляет 15,33 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления солеи включают тошноту, боль в животе, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие солею, включают рыбные тако, запеканку, пазэлю, бутерброды, рагу и несладкие пироги.

Возможные альтернативы для солеи: пикша, минтай, полосатый окунь, хек и групер. Тофу, цветки банана и джекфрут могут служить вегетарианскими заменителями с аналогичной текстурой.

Зерновые и семена

Пшеница твёрдая

Ваш уровень IgG к твёрдой пшенице составляет 15,78 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления твердой пшеницы включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие твердую пшеницу, включают манную муку, макароны, кус-кус, сухие завтраки, пудинги, булгур, пресный хлеб и тесто для пиццы.

Возможные альтернативы муке из твердых сортов пшеницы (манной крупе) включают универсальную муку, амарантовую муку, кукурузную манную крупу, муку гарбанзо, муку из киноа и рисовую муку.

Пшеница однозернянка

Ваш уровень IgG к пшенице однозернянке составляет 17,51 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления однозерновой пшеницы включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие однозерновую пшеницу или муку из однозерновой пшеницы, включают хлеб, крекеры, лепешки, зерновые батончики, печенье, протеиновые батончики, кексы и другую выпечку.

Возможные альтернативы муке из однозерновой пшеницы - спельтовая мука, амарантовая мука, мука из полбы, ячменная мука и рисовая мука.

Полба

Ваш уровень IgG к полбе составляет 12,45 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления полбы включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие полбу или муку из полбы, включают хлеб, крекеры, лепешки, зерновые батончики, печенье, протеиновые батончики, кексы и другую выпечку.

Возможные альтернативы муке из полбы включают спельтовую муку, муку из однозерновой пшеницы, амарантовую муку, ячменную муку и рисовую муку.

Глютен

Ваш уровень IgG к глютену составляет 16,51 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления глютена включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие глютен, включают пшеницу, разновидности пшеницы (спельта, твердые сорта, кускус, манная крупа, фарина, фарро, камут, однозерновое пшеница, булгур, пшеничные отруби, пшеничный крахмал, полба, сейтан, мука грубого помола, рожь, ячмень), хлеб, питта, рогалики, лепешки, булочки, макаронные изделия, крекеры, печенье, выпечка, сухие завтраки, панировочные сухари, гренки, пиво, эль и лагеры. На этикетках пищевых продуктов глютен может обозначаться как *triticum vulgare* (пшеница), *triticale* (гибрид пшеницы и ржи), *hordeum vulgare* (ячмень), *secale cereale* (рожь) и *triticum spelta* (спельта).

Возможные альтернативы глютенным продуктам включают гречку (крупу и муку), киноа (зерно или муку), рис (зерно или муку), картофельную муку, соевую муку, муку из нута, кукурузу, амарант, просо, овес без глютена, сорго и тапиока. Альтернативы пасты без глютена делают из чечевицы, гороха, кукурузы, риса или гречки. Овощную лапшу готовят из цукини, моркови или кабачков.

Солод

Ваш уровень IgG к солоду составляет 17,23 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления солода включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие солодовое зерно и солодовый сироп - это пиво, виски, солодовое молоко, солодовый уксус, кондитерские изделия, такие как Maltesers и Whoppers, ароматизированные напитки, такие как Horlicks, Ovaltine и Milo, а также выпечка, такая как солодовый хлеб и рогалики.

Возможные альтернативы солодовым сиропам включают мед, патоку, сироп из коричневого риса, кленовый сироп, мальтозу и сахар.

Овёс

Ваш уровень IgG к овсу составляет 13,55 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления овса включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие овес и овсяную муку, включают овсяную кашу, овсяное молоко, хлопья, мюсли, оладьи, печенье, хлеб, пирожные и овсяные отруби.

Возможные альтернативы овсу: сорго, просо, кукуруза, полента и рис.

Пшеница польская

Ваш уровень IgG к польской пшенице составляет 24,53 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления польской пшеницы включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие польскую пшеницу и муку из нее, включают плов, ризотто, салаты, хлеб и выпечку.

Возможные альтернативы польской пшеничной муке включают миндальную муку, гречневую муку, муку сорго, амарантовую муку, муку из тефа, муку аррорута, муку из коричневого риса и овсяную муку.

Семена рапса

Ваш уровень IgG к семенам рапса составляет 13,67 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления семян рапса включают тошноту, боль в животе, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие семена рапса, включают рапсовое масло.

Возможные альтернативы рапсовому маслу включают масло канолы, оливковое масло, масло авокадо и масло из семян тыквы.

Рожь

Ваш уровень IgG ко ржи составляет 21,62 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления ржи включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие рожь и ржаную муку, включают хлеб для сэндвичей, хрустящий хлеб, крендели, крекеры, а также ржаной виски и ржаное пиво.

Возможные альтернативы ржи и ржаной муке включают ячмень и ячменную муку.

Спельта

Ваш уровень IgG к спельте составляет 15,21 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления спельты включают тошноту, боль в животе, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие спельту и спельтовую муку, включают хлеб, кексы, смесь для блинов, печенье, ризотто и рагу.

Возможные альтернативы муке из спельты: мука из однозерновой пшеницы, амарантовая мука, гречневая мука, ячменная мука и рисовая мука.

Орехи

Кокос

Ваш уровень IgG к кокосу составляет 32,14 мкг/мл.

Связанные симптомы пищевой непереносимости после употребления кокоса включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие кокос, тертый кокос, кокосовую стружку или кокосовое масло, включают шоколадные батончики, печенье, пироги, йогурты, мороженое, мюсли, смузи и коктейли.

Возможные альтернативы кокосу или измельченному кокосу включают молотые или измельченные орехи (например, миндаль, фундук, грецкие орехи и т. д.).

Кокосовое молоко

Ваш уровень IgG к кокосовому молоку составляет 34,09 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления кокосового молока включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие кокосовое молоко, включают карри, супы, пудинги, каши, мороженое и соусы.

Возможные альтернативы (на растительной основе) кокосовому молоку включают соевое молоко, миндальное молоко, молоко кешью, овсяное молоко, конопляное молоко и рисовое молоко.

Фундук

Ваш уровень IgG к фундуку составляет 40,31 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления фундука включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие фундук, включают печенье, торты, выпечку, шоколад, шоколадную пасту, кондитерские изделия, крупы и хлеб.

Возможные альтернативы фундуку включают миндаль, орехи макадамии, грецкие орехи и кешью. Овес, несоленые семечки подсолнечника и тыквы, изюм можно использовать в качестве заменителей без орехов в выпечке.

Бобовые

Арахис

Ваш уровень IgG к арахису составляет 19,39 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления арахиса включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие арахис, включают арахисовую пасту, арахисовое масло, выпечку (например, печенье, конфеты, пирожные), мороженое, хлопья, мюсли, смесь тропических фруктов, перец чили, супы, энергетические батончики, вегетарианские гамбургеры, салаты и заправки для салата. Арахис часто используется в африканской и азиатской кухне.

Возможные альтернативы арахису включают бобы (например, нут, черный, пинто, лима, фава) и чечевицу в качестве источников белка и клетчатки. В качестве закуски арахис можно заменить другими семенами (например, тыквой, подсолнечником), жареными соевыми бобами и жареным нутом. Арахисовое масло для приготовления пищи можно заменить маслом канолы, подсолнечным маслом, растительным маслом, маслом грецкого ореха, миндальным маслом и сафлоровым маслом.

Соя

Ваш уровень IgG к сое составляет 20,12 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления соевых продуктов включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие сою, включают эдамаме, заменители мяса, мисо, соевое молоко, соевые соусы (например, тамари, шою, терияки), темпе и тофу.

Возможные альтернативы соевым продуктам включают кокосовые аминокислоты (для соевого соуса), зеленый горошек или кешью (для эдамаме), продукты на основе миндального или овсяного молока (для соевого молока, соевого йогурта и т. д.)

Фрукты

Вишня

Ваш уровень IgG к вишне составляет 18,53 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления вишни включают тошноту, боль в животе, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие вишню, включают выпечку (например, пироги, открытые пироги, торты, кобблеры и т. д.), Мороженое, сок, компоты и снековый микс (в сушеном виде).

Возможные альтернативы вишне в выпечке: сливы, абрикосы и нектарины.

Бузина

Ваш уровень IgG к бузине составляет 11,29 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления бузины включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие ягоды бузины, включают джемы, ликеры и пироги. Обратите внимание: сырые ягоды бузины, а также семена, листья и кора бузины ядовиты!

Возможные альтернативы бузине - черная смородина и клюква.

Малина

Ваш уровень IgG к малине составляет 28,66 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления малины включают тошноту, боль в желудке, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие малину, включают выпечку (например, пироги, открытые пироги, крошки, кексы, торты и т. д.), Джемы, молочные коктейли, компоты, смузи и салаты.

Возможные альтернативы малине - ежевика и клубника.

Овощи

Чеснок

Ваш уровень IgG к чесноку составляет 31,78 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления чеснока включают тошноту, боль в животе, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие чеснок, включают макаронные блюда, супы, тушеные блюда, соусы, сливочное и растительное масло, соусы, заправки и чатни.

Возможные альтернативы чесноку: шнитт-лук, лук-шалот, лук и цедра лимона.

Помидор

Ваш уровень IgG к помидору составляет 11,74 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления помидоров включают тошноту, боль в животе, газы, судороги, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие помидоры, включают соусы, блюда из пасты, салаты, тушеные блюда, супы, соусы, чатни, сальсу и джемы.

Возможные альтернативы помидорам включают красный сладкий перец и оливки.

Новые продукты

Хлорелла

Ваш уровень IgG к хлорелле составляет 10,88 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления хлореллы включают тошноту, боль в животе, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Хлорелла — это разновидность водорослей и хороший источник белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Порошок хлореллы можно добавлять в соки и смузи.

Возможные альтернативы хлорелле включают спирулину (другой вид водорослей), сырой органический мед манука, порошок ягод асаи, муку из семян льна и ягоды годжи.

Домашний сверчок

Ваш уровень IgG к домашним сверчкам составляет 11,67 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления домашнего сверчка включают тошноту, боль в животе, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Сверчки — съедобные насекомые с высоким содержанием белка и многих других питательных веществ, их употребляют в качестве закуски в нескольких странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Возможными альтернативами сверчкам являются другие съедобные насекомые, такие как кузнечики и мучные черви.

Другое

Мёд

Ваш уровень IgG к мёду составляет 32,14 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления мёда включают тошноту, боль в животе, газы, судороги, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

К пищевым продуктам и блюдам, обычно содержащим мёд, относятся соусы, заправки для салатов, медовухи, супы и выпечка (например, хлеб, печенье, пирожные, кексы и т. д.).

Возможные альтернативы мёду включают рисовый солодовый сироп, сироп из коричневого риса, патоку, кленовый сироп, нектар агавы и золотой сироп.

М-трансглутаминаза (мясной клей)

Ваш уровень IgG к М-трансглутаминазе составляет 48,7 мкг/мл.

Сопутствующие симптомы пищевой непереносимости после употребления М-трансглутаминазы включают тошноту, боль в животе, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие М-трансглутаминазу, включают сосиски, ветчину, рыбные фрикадельки, куриные наггетсы и сурими.

Возможные альтернативы М-трансглутаминазе включают желатин и каррагинан (полученные из морских водорослей).

Disclaimer

The presence of IgG-antibodies may be an indication of food intolerances and has to be analyzed in conjunction with the clinical history and other diagnostic test results.

The Raven Interpretation Software is a tool to assist in the interpretation of FOX results but does not constitute a diagnosis. No liability is accepted for Raven comments and the resulting dietary recommendations. The stated comments are designed exclusively for FOX results.

(The connection between food intake, elevated IgG levels and chronic disorders has been described in peer reviewed publications and case studies. Nonetheless this connection is still debated in the scientific community and a consensus has not been reached thus far.)