Урок 3.

Тест FOX Food Xplorer





Светлана Каневская

Доктор медицинских наук, профессор, основатель международной школы профессора Каневской

- в прошлом Медицинский руководитель в крупнейших мед.центрах Москвы премиум класса
- 25 лет опыта преподавательской работы со студентами медицинских ВУЗов, врачами и клиническими ординаторами
- 25 лет опыта практической работы с пациентами, в том числе с тяжелыми клиническими случаями

Опыт

В прошлом — медицинский директор израильской клиники Hadassah в Сколково, Европейского медицинского центра и сети клиник «Семейный доктор».





Сегодня — основатель международной школы профессора Каневской для врачей и пациентов, автор обучающих курсов для врачей и автор методики «Формула здоровья».

О чем этот урок?

1. О компании

2. Зачем тест нужен врачам и пациентам?

3. Как работает тест? Принципы и механизмы

4. Отличия теста FOX от конкурентов

5. Разбор клинического случая с использованием теста

Что такое FOX?

- **FOX (Food Xplorer)** — инновационный мультиплексный тест на пищевую непереносимость, разработанный австрийской компанией **MacroArray Diagnostics (MADx)**.
- Позволяет одновременно определить уровень специфических IgG к **286 пищевым антигенам** из 13 групп продуктов.
- Основан на **нанотехнологиях** и методе **иммуноферментного анализа (ELISA)**, что обеспечивает высокую точность и надежность результатов.



MacroArray Diagnostics (MADx) разработчик теста FOX

Ведущий австрийский производитель молекулярных иммунодиагностических тестов, основана в Вене в 2016 г.

При этом имеет в базисе 150-лет опыта know-how в аллергодиагностике.

MADx

Компания разработала тесты **ALEX²** (аллергии) и **FOX** (пищевая непереносимость), основанные на нанотехнологиях.


Продукты MADx сертифицированы по международным стандартам качества **EN ISO 13485** и **EN ISO 9001**, а также соответствуют регламенту **IVDR** Европейского Союза.

Одна из наиболее точных технологий для подробного анализа крови на возможную пищевую непереносимость.

Что тест дает специалистам?

Повышение эффективности диагностики

- Тест помогает **быстро и точно выявить продукты, вызывающие иммунный отклик** (IgG), что особенно полезно при **неясных или хронических симптомах** (вздутие, кожные проявления, головные боли и пр.).
- Ускоряет постановку гипотез и выбор направления терапии — **меньше времени на теорию метода проб и ошибок**.





Готовый инструмент персонализированной медицины

- Результаты представлены **наглядно и понятно** — легко объяснить пациенту.
- Тест даёт **готовые рекомендации по исключению или ротации продуктов**, а также **подсказки по диете**.
- Упрощает внедрение **индивидуального подхода к питанию** без диетолога.

Углубление понимания клинической картины


Особенно полезен при:

- Синдроме раздражённого кишечника (СРК)
- Хронической усталости
- Неврологических симптомах (туман в голове, мигрени)
- Кожных проблемах (атопический дерматит, акне)
- Необъяснимых колебаниях веса

И конечно помогает **дополнить клиническую картину и обосновать гипотезу**, если стандартные анализы ничего не показывают.

Расширение спектра услуг и лояльности пациентов

- Включение FOX-теста в практику даёт врачу **новый диагностический и коммерческий инструмент**.
- Повышается **удовлетворённость пациентов**, так как они получают решение, которое **дает ощутимый эффект без медикаментов**.
- Пациенты чаще возвращаются, чтобы обсудить результаты, прогресс и получить рекомендации — это **повышает доверие и частоту визитов**.



Поддержка для специалистов

- Врачи получают **методические материалы, обучающие вебинары и консультации** от команды «Имуннотех» и MADx.
- Возможность **включить тест в алгоритмы диагностики или схемы лечения** с полной поддержкой по интерпретации результатов.
- **Партнерская программа FOX**

Что тест даст пациентам?

Понимание, какие именно продукты не подходят конкретному пациенту/клиенту

- Тест определяет **наличие IgG-антител** к 286 продуктам— от базовых (молоко, яйца, пшеница) до экзотических (киноа, тофу, специи).
- Пациент **наконец-то узнаёт, что именно может вызывать вздутие, усталость, высыпания, головную боль** и другие непонятные симптомы.
- Это **не аллергия**, а **отложенная реакция**, которую трудно отследить без теста.



Ясная картина и четкие рекомендации

Результаты оформлены **наглядно**, с цветовой градацией — легко понять, какие продукты стоит:

- *исключить временно*
- *ограничить*
- *оставить в рационе*

Пациент получает **готовые рекомендации по питанию**, что помогает сразу начать изменения и ощутить эффект.

Улучшение самочувствия и качества жизни

Уже через 2–4 недели исключающей диеты пациенты часто отмечают:

- улучшение пищеварения,
- повышение энергии,
- улучшение сна и настроения,
- уменьшение головных болей и кожных проявлений.



FOX помогает **избавиться от симптомов, которые «нельзя было объяснить» годами.**

Безопасная альтернатива медикаментозному лечению

- Многие пациенты проходят множество курсов лечения,но **не достигают стойкого результата**.
- FOX-тест позволяет **изменить питание**, что в ряде случаев **снижает необходимость в лекарствах** или делает лечение более эффективным.



Отслеживание изменений

Тест можно повторить через 6–12 месяцев, чтобы:

- Проверить динамику (антитела снижаются при исключении продукта),
- Постепенно возвращать продукты под контролем.

Именно это делает FOX - **инструментом осознанного подхода к своему телу**.

Как работает тест?

FOX

Анализ проводится в **сыворотке крови**, взятой из вены.

Иммуноанализ, основанный на **методе ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)**, который определяет наличие **специфических IgG-антител (чаще IgG1–IgG4)** к белкам 286 продуктов.



FOX включает

- молочные продукты (в т.ч. белки молока, казеин, лактальбумин),
- злаки (включая глютенсодержащие),
- яйца,
- мясо и рыбу,
- овощи и фрукты,
- специи и орехи,
- пищевые добавки и дрожжи.



Технология FOX

Двухэтапное производство




ЭТАП 0

Экстракт
антигена



ЭТАП 1

Связывание экстракта
с наночастицами



ЭТАП 2*

“Посадка” и связывание
с твердофазной подложкой

* Различные комбинации оптимизированы для каждого аллергена

Процедура анализа FOX

ПОДГОТОВКА

Взятие крови, подготовка сыворотки



ШАГ 1

Инкубация сыворотки

120 мин.



ОТМЫВКА

Удаление несвязавшихся тел


3 x 5 мин.



ШАГ 2

Внесение детектирующих тел

30 мин.



ОТМЫВКА

Удаление несвязавшихся детектирующих антител


5 x 5 мин.



ШАГ 3

Ферментативная реакция

5-10 мин.



АНАЛИЗ

Скан изображения, анализ и отчет

<1 мин.



Проще говоря

Тест FOX - это идентификация **замедленных пищевых реакций** (в отличие от IgE-опосредованных немедленных аллергий).





При этом

Согласно **EAACI** (European Academy of Allergy and Clinical Immunology), 2008–2021: IgG против пищевых антигенов не являются доказанным маркёром клинически значимой непереносимости.

А также

- IgG к продукту может свидетельствовать не о непереносимости, а об **обычном контакте с пищевым антигеном**.
- **Доказательная база** по диагностике пищевой непереносимости через IgG пока достаточно ограничена и спорна, особенно в рамках академической аллергологии и гастроэнтерологии.

Важно помнить, что тест

не заменяет IgE-диагностику
пищевой аллергии.

Тест успешно используется

различными специалистами для помощи пациентам при:

- синдромах раздраженного кишечника;
- хронической усталости;
- мигренях;
- кожных проявлениях (экзема, акне);
- псевдоаллергических реакциях;
- нарушениях настроения и концентрации;
- аутоиммунных нарушениях.

Преимущества FOX перед другими тестами

Методология и технология анализа

- Наиболее **широкий охват антигенов**
- Точечное определение по подтипам IgG (повышает аналитическую точность)
- Использование **мультиплексированных панелей** с контролем качества (EU-normed, ISO 13485)

	FOX	Другие тесты
Метод	ELISA на твердой фазе,, высокочувствительный, полуавтоматизированный	Иммуноферментный анализ (стандартный ELISA), чаще IgG общей фракции
Обработка	Европейская платформа, автоматизация анализа, контроль на кросс-реакции	Стандартные панели, не всегда индивидуализированы
Тип IgG	Суммарный IgG4, специфичный к каждому из 286 продуктов	Как правило, только суммарный IgG
Объем антигенов	286 компонентов, включая дрожжи, специи, консерванты	Обычно 90–150 пищевых компонентов

Научная база и применимость

- **Клинически применимый формат для врача** (включая рекомендации по исключению и ротации продуктов)
- Возможность **интеграции с генетическими и микробиомными профилями**

	FOX	Другие тесты
Научное сопровождение	Европейская клиническая база, исследования с 2017 по 2023 гг., публикации в BMC, Nutrients, Clinical Immunology	Используется локально, публикации ограничены или отсутствуют
Применимость в нутригеномике	Поддержка генетически ориентированных диетических протоколов (совмещается с анализами MTHFR, DAO, HLA)	Чаще применяется как standalone анализ, не интегрирован в персонализированные программы
Диетологический отчёт	Формируется персональная ротационная диета на 3 или 6 месяцев, включая рецепты	Как правило, только список продуктов "избегать и употреблять" без пояснений

Интерпретация и клинический вывод

- Более точная **классификация чувствительности**, что особенно важно для индивидуализированных диет
- **Диетические алгоритмы**, основанные на научных подходах (например, 4-diet rotation model, Elimination/Rechallenge testing)



	FOX	Другие тесты
Классификация чувствительности	5–6 уровней чувствительности (0–IV/V класс)	3 класса или бинарная классификация
Алгоритмы исключения	Предлагается пошаговый протокол элиминации и последующей ротации, основанный на уровне IgG	Только рекомендации на исключение без ротационной стратегии

Технические и логистические особенности

- Австрийское производство и мировые стандарты качества
- Высокая повторяемость результата, подтвержденная валидацией на международных площадках

	FOX	Другие тесты
Производство	Австрия, Macro Array Diagnostics	Россия/СНГ или OEM от неизвестных поставщиков
Повторяемость результата	Высокая, подтвержденная валидацией на международных площадках	Не всегда верифицирована внешне
Срок выполнения	1-2 дня	Обычно 5–7 дней

Клинический случай

Пациентка

Пол: женский

Возраст: 18 лет

Масса тела: в пределах возрастной нормы (ИМТ 20,4)

Образование: студентка первого курса университета





Обратилась с жалобами на:

- Выраженные **угревые высыпания на лице и верхней части спины**
- **Вздутие живота**, особенно после еды
- **Частые головные боли**, не зависящие от фазы цикла
- Ощущение **"тумана в голове"**, сниженной концентрации, трудности с усвоением учебного материала, сниженной энергетикой и мотивацией

Этому предшествовали

- Консультации у **дерматолога и невролога**
- Назначения: **местные ретиноиды, антибиотики, ноотропные препараты**
- Лабораторные показатели (ОАК, гормоны, печеночные пробы, щитовидная железа) – **в норме**
- Эффекта от терапии **не наблюдалось**

Почему врач назначил тест?

Отсутствие клинической динамики и системный характер симптомов (кожа, ЖКТ, ЦНС) привели к подозрению на **скрытую пищевую непереносимость IgG-зависимого типа**, как **возможного триггера низкоинтенсивного воспаления**, способствующего:

- нарушению **энтерального барьера** (leaky gut);
- **дисбиозу кишечника**;
- иммуно-дерматологическим реакциям;
- повышенной **нейровосприимчивости** и снижению когнитивной функции.

Результаты теста показали

Выраженные IgG-реакции к следующим пищевым компонентам:

- **Все молочные продукты**: казеин, сывороточные белки, овальбумин, йогурт, кефир, сыр, сливки, масло, сухое молоко
- **Фрукты**: ананас, киви
- **Морепродукты**: красная икра (лососевых)



Лечебная стратегия

1. **Диета:**

- Полное исключение всех молочных продуктов и производных на **3 месяца** (включая скрытые формы — шоколад, соусы, выпечка);
- Исключение ананаса, киви и красной икры;
- Назначена **ротационная диета** (4-day rotation model) для минимизации новых сенсибилизаций.

Лечебная стратегия

2. Поддержка кишечного барьера и микробиоты:

- **L-глютамин** – 5 г 2 раза/сут, 4 недели;
- **Пробиотик** с Lactobacillus rhamnosus GG и Bifidobacterium longum – 10 млрд КОЕ 1 раз/сут, 2 мес;
- **Цинк-карнозин** – 75 мг 1 раз/сут, 8 недель.




Результаты через месяц

- Уменьшение угревой сыпи на **50%** (по шкале GAGS)
- Снижение частоты головных болей с 4 раз в неделю до **1 раза**
- **Уменьшение** вздутия и тяжести после еды
- **Улучшение** концентрации внимания и ощущения "ясности ума"



Результаты через 3 месяца

- **Полное купирование угревой сыпи** (только остаточные постакне-элементы)
- **Полное исчезновение головных болей и "тумана" в голове**
- Нормализация пищеварения
- Субъективное улучшение **настроения, сна и энергичности**



А что если?

Если бы врач не назначил тест

- Пациентка продолжала бы **употреблять** молочные продукты и фрукты с иммунореактивностью
- **Хроническое** воспаление, нарушенная кишечная проницаемость и дисбиоз **продолжали бы поддерживать** кожные, когнитивные и неврологические симптомы
- Назначенная симптоматическая терапия **не дала бы устойчивого результата**
- Возможны психоэмоциональные последствия: **тревожность, снижение мотивации, ухудшение качества жизни и учебы**

Тест FOX в этом случае оказался **ключевым диагностическим инструментом** в ведении данной пациентки.

Он позволил **впервые выявить связь между хронической симптоматикой и скрытой пищевой гиперчувствительностью**, скорректировать питание и восстановить здоровье без фармакотерапии.

Как выглядит отчёт?



FOX
FOOD XPLORER

ID пациента:
Имя пациента:
Кундик М.А.
Дата рождения:
03.09.1991
ID образца:
37A
QR-код:
80AID37A
Проанализировано :
21.06.2025
Проверенные антигены:
287
Метод исследования:
FOX

Лечащий врач:

Дополнительная информация:

Внутренний контроль качества (проверка достоверности GD) находился в пределах допустимого диапазона.

Лабораторный отчет: Обзор профиля IgG

МОЛОКО И ЯЙЦА	●●●	ОВОЩИ	●●
МЯСО	●	СПЕЦИИ	●
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ	●●●	СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ	●
ЗЕРНОВЫЕ И СЕМЕНА	●	НОВЫЕ ПРОДУКТЫ	●
ОРЕХИ	●	КОФЕ И ЧАЙ	●
БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	●●	ДРУГИЕ	●●●
ФРУКТЫ	●●		

Самая высокая измеренная концентрация IgG

0 - 9.99 мкг/мл	10 - 19.99 мкг/мл	≥ 20 мкг/мл
●	●●	●●●
Низкий уровень IgG	Средний уровень IgG	Сильно повышенный уровень IgG

Главная страница

с данными пациента и обзором профиля IgG

Три зоны

Зеленая зона

0 - 9.99 мкг/мл

Низкий уровень IgG

Желтая зона


10 - 19.99 мкг/мл

Средний уровень IgG

Красная зона

≥ 20 мкг/мл

Сильно повышенный уровень IgG



FOX FOOD XPLORER Кундик М.А. 80AID37A 2 / 9

Молоко и Яйцо

Буйволиное молоко	< 5.00 мкг/мл	Моцарелла	7.04 мкг/мл
Верблюжье молоко	< 5.00 мкг/мл	Овечий сыр	< 5.00 мкг/мл
Гауда	18.43 мкг/мл	Овечье молоко	5.88 мкг/мл
Камамбер	11.66 мкг/мл	Пармезан	17.76 мкг/мл
Козий сыр	< 5.00 мкг/мл	Пахта	5.34 мкг/мл
Козье молоко	< 5.00 мкг/мл	Перепелиное яйцо	< 5.00 мкг/мл
Коровье молоко	5.16 мкг/мл	Творог	9.48 мкг/мл
Молоко коровье Bos d 4 * (Alpha-Lactalbumin)	8.52 мкг/мл	Эмменталь	26.53 мкг/мл
Молоко коровье Bos d 5 *(Beta-Lactoglobulin)	25.71 мкг/мл	Яичный белок	< 5.00 мкг/мл
Молоко коровье Bos d 8 *(Casein)	< 5.00 мкг/мл	Яичный желток	< 5.00 мкг/мл

Мясо


Баранина	< 5.00 мкг/мл	Курица	< 5.00 мкг/мл
Говядина	5.27 мкг/мл	Мясо косули	< 5.00 мкг/мл
Индейка	< 5.00 мкг/мл	Оленина	9.33 мкг/мл
Кабан	< 5.00 мкг/мл	Свинина	< 5.00 мкг/мл
Козлятина	< 5.00 мкг/мл	Страус	< 5.00 мкг/мл
Конина	< 5.00 мкг/мл	Телятина	< 5.00 мкг/мл
Кролик	< 5.00 мкг/мл	Утиное мясо	< 5.00 мкг/мл

Рыба и морепродукты

Атлантическая сельдь	< 5.00 мкг/мл	Морской язык	< 5.00 мкг/мл
Атлантическая треска	< 5.00 мкг/мл	Омар	< 5.00 мкг/мл
Атлантический морской окунь	< 5.00 мкг/мл	Осьминог	< 5.00 мкг/мл
Венериды	< 5.00 мкг/мл	Палтус	< 5.00 мкг/мл
Гребешок	< 5.00 мкг/мл	Пикша	< 5.00 мкг/мл
Двустворчатый моллюск	< 5.00 мкг/мл	Речной рак	< 5.00 мкг/мл
Дорада	< 5.00 мкг/мл	Рыба-меч	< 5.00 мкг/мл
Европейская камбала	< 5.00 мкг/мл	Северная креветка	< 5.00 мкг/мл
Европейская сардина	< 5.00 мкг/мл	Северная щука	< 5.00 мкг/мл
Европейский анчоус	< 5.00 мкг/мл	Сепия	< 5.00 мкг/мл
Икра	25.19 мкг/мл	Скат (морская лисица)	< 5.00 мкг/мл
Кальмар	< 5.00 мкг/мл	Скумбрия	< 5.00 мкг/мл
Карп	< 5.00 мкг/мл	Съедобный моллюск	< 5.00 мкг/мл

* Молекулярный антиген

Результаты теста по каждому маркеру в группе



FOX FOOD XPLORER Кундик М.А. 80AID37A 3 / 9

Краб	< 5.00 мкг/мл	Тунец	< 5.00 мкг/мл
Лосось	< 5.00 мкг/мл	Угорь	< 5.00 мкг/мл
Мидия обыкновенная	< 5.00 мкг/мл	Устрица	< 5.00 мкг/мл
Микс креветок	< 5.00 мкг/мл	Форель	< 5.00 мкг/мл
Морские ушки	< 5.00 мкг/мл	Хек	< 5.00 мкг/мл
Морской черт	< 5.00 мкг/мл		

Зерновые и семена

Амарант	< 5.00 мкг/мл	Пшеница однозернянка	< 5.00 мкг/мл
Глиадин пшеницы Tri a Gliadin *	< 5.00 мкг/мл	Пшеница польская	< 5.00 мкг/мл
Глютен	< 5.00 мкг/мл	Пшеница твёрдая	< 5.00 мкг/мл
Гречка	< 5.00 мкг/мл	Пшеничные отруби	< 5.00 мкг/мл
Кедровый орех	< 5.00 мкг/мл	Рапс	9.45 мкг/мл
Киноа	< 5.00 мкг/мл	Рис	< 5.00 мкг/мл
Кукуруза	< 5.00 мкг/мл	Рожь	< 5.00 мкг/мл
Кунжут	< 5.00 мкг/мл	Ростки пшеницы	< 5.00 мкг/мл
Льняные семена	< 5.00 мкг/мл	Семена конопли	< 5.00 мкг/мл
Мак	< 5.00 мкг/мл	Семена люпина	< 5.00 мкг/мл
Овёс	< 5.00 мкг/мл	Семена тыквы	< 5.00 мкг/мл
Подсолнечник	< 5.00 мкг/мл	Солод (ячмень)	< 5.00 мкг/мл
Полба	< 5.00 мкг/мл	Спельта	< 5.00 мкг/мл
Просо	< 5.00 мкг/мл	Ячмень	< 5.00 мкг/мл
Пшеница	< 5.00 мкг/мл		

Орехи


Бразильский орех	< 5.00 мкг/мл	Орех кола	< 5.00 мкг/мл
Грецкий орех	< 5.00 мкг/мл	Орех пекан	< 5.00 мкг/мл
Кешью	< 5.00 мкг/мл	Сладкий каштан	< 5.00 мкг/мл
Кокос	< 5.00 мкг/мл	Сыть (чуфа)	< 5.00 мкг/мл
Кокосовое молоко	< 5.00 мкг/мл	Фисташка	< 5.00 мкг/мл
Макадамия, орех	< 5.00 мкг/мл	Фундук	< 5.00 мкг/мл
Миндаль	< 5.00 мкг/мл		

Бобовые

Арахис	< 5.00 мкг/мл	Нут	< 5.00 мкг/мл
Белая фасоль	10.05 мкг/мл	Сахарный горошек	< 5.00 мкг/мл
Бобы мунг	< 5.00 мкг/мл	Соя	< 5.00 мкг/мл

* Молекулярный антиген

Результаты теста
по каждому маркеру
в группе



FOX FOOD XPLORER

Кундик М.А. 80AID37A 5 / 9

Кивано	< 5.00 мкг/мл	Сладкий картофель	< 5.00 мкг/мл
Кольраби	< 5.00 мкг/мл	Стебель сельдерея	< 5.00 мкг/мл
Корень сельдерея	< 5.00 мкг/мл	Тыква Хоккайдо	< 5.00 мкг/мл
Красная капуста	< 5.00 мкг/мл	Фенхель (корень)	< 5.00 мкг/мл
Красная свекла	< 5.00 мкг/мл	Хрен	< 5.00 мкг/мл
Кресс-салат	< 5.00 мкг/мл	Цветная капуста	< 5.00 мкг/мл
Листья крапивы	< 5.00 мкг/мл	Цикорий	< 5.00 мкг/мл
Лук	< 5.00 мкг/мл	Цикорный салат	10.97 мкг/мл
Лук-порей	< 5.00 мкг/мл	Цуккини	< 5.00 мкг/мл
Лук-шалот	< 5.00 мкг/мл	Чеснок	< 5.00 мкг/мл
Мангольд	< 5.00 мкг/мл	Шнитт-лук	< 5.00 мкг/мл
Морковь	< 5.00 мкг/мл	Шпинат	< 5.00 мкг/мл
Мускатная тыква	< 5.00 мкг/мл		

Специи


Анис	< 5.00 мкг/мл	Мускатный орех	< 5.00 мкг/мл
Базилик	< 5.00 мкг/мл	Мята	< 5.00 мкг/мл
Ваниль	< 5.00 мкг/мл	Орегано	< 5.00 мкг/мл
Гвоздика	< 5.00 мкг/мл	Пажитник	< 5.00 мкг/мл
Горчица	< 5.00 мкг/мл	Паприка	< 5.00 мкг/мл
Зира	< 5.00 мкг/мл	Перец (черный / белый / зеленый / красный / желтый)	< 5.00 мкг/мл
Имбирь	< 5.00 мкг/мл	Петрушка	< 5.00 мкг/мл
Кайенский перец	< 5.00 мкг/мл	Розмарин	< 5.00 мкг/мл
Кардамон	< 5.00 мкг/мл	Тимьян	< 5.00 мкг/мл
Карри	< 5.00 мкг/мл	Тмин	< 5.00 мкг/мл
Кориандр	< 5.00 мкг/мл	Укроп	< 5.00 мкг/мл
Корица	< 5.00 мкг/мл	Чили (красный)	< 5.00 мкг/мл
Куркума	< 5.00 мкг/мл	Шалфей	< 5.00 мкг/мл
Лавровый лист	< 5.00 мкг/мл	Эстрагон	< 5.00 мкг/мл
Лемонграсс	< 5.00 мкг/мл	Ягода можжевельника	< 5.00 мкг/мл
Майоран	< 5.00 мкг/мл		

Съедобные грибы

Вешенка	< 5.00 мкг/мл	Подосиновик/белый гриб	< 5.00 мкг/мл
Лисички	< 5.00 мкг/мл	Шампиньон	< 5.00 мкг/мл
Опята	< 5.00 мкг/мл	Эринги	< 5.00 мкг/мл

* Молекулярный антиген

Результаты теста по каждому маркеру в группе



FOX FOOD XPLORER

Кундик М.А. 80AID37A 6 / 9

Новые продукты

Алоэ	< 5.00 мкг/мл	Морские водоросли	< 5.00 мкг/мл
Баобаб	< 5.00 мкг/мл	Нори	< 5.00 мкг/мл
Гинкго билоба	< 5.00 мкг/мл	Перелетная саранча	< 5.00 мкг/мл
Гуарана	< 5.00 мкг/мл	Сафлоровое масло	< 5.00 мкг/мл
Домашний сверчок	< 5.00 мкг/мл	Семена чиа	< 5.00 мкг/мл
Женьшень	< 5.00 мкг/мл	Спирулина	< 5.00 мкг/мл
Корень лопуха большой	< 5.00 мкг/мл	Тапиока	< 5.00 мкг/мл
Корень одуванчика	< 5.00 мкг/мл	Хлорелла	5.90 мкг/мл
Корень якона	< 5.00 мкг/мл	Хрущак мучной	< 5.00 мкг/мл
Мака перуанская	< 5.00 мкг/мл	Черноплодная рябина	< 5.00 мкг/мл
Миндальное молоко	< 5.00 мкг/мл		

Кофе и чай

Гибискус	< 5.00 мкг/мл	Мята перечная	< 5.00 мкг/мл
Жасмин	< 5.00 мкг/мл	Ромашка	< 5.00 мкг/мл
Какао	< 5.00 мкг/мл	Чай, зеленый	< 5.00 мкг/мл
Кофе	< 5.00 мкг/мл	Чай, черный	< 5.00 мкг/мл
Моринга	< 5.00 мкг/мл		

Другие

Aspergillus niger	< 5.00 мкг/мл	Пивные дрожжи	< 5.00 мкг/мл
Агар-агар	< 5.00 мкг/мл	Тростниковый сахар	< 5.00 мкг/мл
Дрожжи хлебопекарные	< 5.00 мкг/мл	Хмель	< 5.00 мкг/мл
М-трансглутаминаза, мясной клей	< 5.00 мкг/мл	Цветы бузины	< 5.00 мкг/мл
Мед	28.43 мкг/мл		

CCD

Человеческий лактоферрин	< 5.00 мкг/мл

НАПЕЧАТАНО
21.06.2025

* Молекулярный антиген

Результаты теста
по каждому маркеру
в группе

FOX - Количество протестированных источников пищи 283

МОЛОКО И ЯЙЦО 17
Молоко буйвола, пахта, верблюжье молоко, камамбер, сыр, коровье молоко, яичный белок, яичный желток, сыр Эмменталь, козий сыр, козье молоко, сыр Гауда, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, перепелиное яйцо, овечий сыр, овечье молоко

МЯСО 14
Говядина, мясо дикого кабана, курица, утка, [illegible] конина, баранина, мясо страуса, свинина, [illegible] оленина, индейка, телятина, дичь

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 37
Морские ушки, атлантическая треска, атлантический [illegible] сельдь, атлантический морской окунь, карп, [illegible] мидия обыкновенная, краб, угорь, европейский анчоус, европейская сардина, камбала, дорада (золотистый спар), палтус, рыба-меч, пикша, хек, омар, скумбрия, морской черт, речной рак, северная щука, [illegible] креветка, осьминог, устрицы, двустворчатые [illegible] лосось, гребешок, сепия/каракатица, микс [illegible] кальмар, рыба-меч, скат (морская лисица), форель, тунец, венериды

ЗЕРНОВЫЕ И СЕМЕНА 29
Амарант, ячмень, гречка, нут, кукуруза, пшеница твердая, пшеница однозернянка, пшеница двузернянка, глютен, конопля, семена льна , люпин, солод (ячмень), пшено, овес, кедровый орех, польский пшеница, мак, тыквенные семечки, киноа, рапс, рис, рожь, кунжут, спельты, подсолнечник, пшеница, пшеничные отруби, глиадин пшеницы, ростки пшеницы.

ОРЕХИ 13
Миндаль, бразильский орех, кешью, кокос, кокосовое молоко, фундук, орех кола, макадамия, орех пекан, фисташки, сладкий каштан, тигровый орех, грецкий орех

БОБОВЫЕ 10
Нут, зеленая фасоль, чечевица, маш, арахис, горох, соя, сахарный горошек, тамаринд, белая фасоль

ФРУКТЫ 36
Яблоко, абрикос, банан, ежевика, черника, вишня, клюква, финик, бузина, инжир, крыжовник, виноград, грейпфрут, киви, лимон, лайм, личи, манго, дыня, шелковица, нектарин, апельсин, папайя, маракуйя, персик, груша, физалис, ананас, слива, гранат, изюм, малина, красная смородина, клубника, мандарин, арбуз

ОВОЩИ 51
Артишок, руккола, авокадо, бамбуковые ростки, брокколи, брюссельская капуста, капуста, каперсы, морковь, цветная капуста, корень сельдерея, стебель сельдерея, листовая свекла, цикорий, китайская капуста, лук, огурец, баклажаны, цикорий салат, фенхель, чеснок, зеленый капуста, хрен, кивано, кольраби, полевой салат, лук-порей, листья крапивы, оливки/маслины, лук, пастернак, пак-чой/китайская капуста, картофель, тыква [illegible], тыква (Хоккайдо), радиччо, редька, [illegible] красная капуста, романеско, савойская [illegible] шпинат, сладкий картофель, помидор, репа, кресс-салат, белая спаржа, белокочанная капуста, дикий чеснок, кабачки

СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ 6
Подосиновик/белый гриб, лисичка, эноки/зимние опята, вешенки, эринги, белый гриб

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 21
миндальное молоко, алоэ, арония, баобаб, семена чиа, хлорелла, корень одуванчика, гинкго билоба, женьшень, корень лопуха, гуарана, домашний сверчок, корень маки, мучной червь, перелетная саранча, нори, сафлоровое масло, спирулина, тапиока, вакаме, корни якона.

КОФЕ И ЧАЙ 9
ромашка, какао, кофе, гибискус, жасмин, моринга, мята перечная, чай (черный), чай (зеленый)

ДРУГИЕ 9
Агар- агар, Aspergillus niger, хлебопекарные дрожжи, пивные дрожжи, цветки бузины, мед, хмель, М-трансглютаминаза (мясной клей), тростниковый сахар, перекрестно реагирующие углеводные детерминанты

* Молекулярный антиген

Список пищевых маркеров по группам

Интерпретация результатов

Симптомы пищевой непереносимости, возникающие после употребления продуктов-виновников, включают тошноту, боль в животе, газы, спазмы, вздутие живота, рвоту, изжогу, диарею, головные боли, раздражительность и нервозность.

Молоко и яйца

Камамбер

Ваш уровень IgG к Камамберу составляет 11.66 мкг/мл.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие камамбер, - это салаты, сырные доски, гамбургеры. Камамбер часто подают во французской кухне.

Возможные альтернативы (немолочные) камамберу включают заменители на основе кешью.

Коровье молоко

Ваш уровень IgG к коровьему молоку составляет 25.71 мкг/мл.

Пищевые продукты и блюда, содержащие коровье молоко, включают молочные продукты, такие как масло, сыр, сливки, сметана, заварной крем, йогурт, мороженое и пудинг. Белок коровьего молока часто входит в состав запеканок, хлеба, печенья, крекеров, пирожных, продуктов в кляре, смеси для торта, хлопьев, шоколада, сливок для кофе, батончиков мюсли, маргарина, картофельного пюре и заправок для салатов. На этикетках пищевых продуктов молочный белок может обозначаться как искусственное масло, сырный ароматизатор, казеин, диацетил, творог, топленое масло, гидролизаты, лактальбумин, лактоза, рекальдент, сычужный фермент, тагатоза или сыворотка.

Возможные альтернативы коровьему молоку включают козье молоко, верблюжье молоко, овечье молоко и буйволиное молоко из источников животного происхождения. Альтернативы на растительной основе включают кокосовое молоко, рисовое молоко, соевое молоко, миндальное молоко и овсяное молоко. Обратите внимание, что белки в молоке разных животных структурно схожи с белками коровьего молока. Некоторые пациенты могут их переносить, другие могут испытывать те же реакции, что и после употребления коровьего молока.

Эмменталь

Ваш уровень IgG к сыру эмменталь составляет 26.53 мкг/мл.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие сыр эмменталь, включают такие блюда как запеканки, сырные фондю, сырные слоеные булочки, супы, пиццу и сырные доски.

Возможные альтернативы (немолочные) сыру эмменталь - вегетарианские заменители сыра на основе орехов (например, кешью, макадамия) или сои.

Гауда

Ваш уровень IgG к сыру гауда составляет 18.43 мкг/мл.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие сыр гауда, включают сырные соусы, запеканки, супы, бутерброды, лазанью, пиццу и сырные доски.

Возможными альтернативами (немолочными) сыру гауда являются заменители такие как вегетарианский сыр на основе орехов (например, кешью, макадамия) или сои.

Пармезан

Ваш уровень IgG к сыру пармезан составляет 17.76 мкг/мл.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие сыр пармезан, включают пиццу, лазанью, блюда из пасты, салаты «Цезарь» с курицей, супы и сырные доски.

Возможные альтернативы (немолочные) сыру пармезан - это заменители на основе сои и пищевых дрожжей.

Рыба и морепродукты

[illegible]

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие икру в качестве гарнира, включают блюда из яиц, макаронные изделия, картофельные блинчики, рыбные блюда, блины и супы.

Возможные альтернативы икре включают икру пинагора, а также кус-кус (сдобренный маслом и окрашенный чернилами сепии) и [illegible]

Бобовые

Белая фасоль

Ваш уровень IgG к белой фасоли составляет 10.05 мкг/мл.

Пищевые продукты и блюда, обычно содержащие белую фасоль, включают рагу, чили, хумус, супы и салаты.

* Молекулярный антиген

Интерпретация результатов (индивидуально для каждого)

Как пройти тест?

Тест можно сдать в **лабораториях-партнерах** по всей России.

















Для получения дополнительной информации и записи на тестирование:

- **Телефон**: +7 (495) 374-83-05
- **Email**: info@inmunotech.ru
- **Сайт**: foxfoodxplorer.ru

Заключение

Тест будет полезен как **инструмент в рамках персонализированного питания** и **превентивной медицины**, особенно при наличии неясных, хронических симптомов не укладывающиеся в рамки конкретных заболеваний по другим медицинским тестам.

И конечно

Интерпретация теста должна проводиться врачом, с учётом понимания клинической картины и диетологического анамнеза.

В этом уроке мы:

- Узнали о компаниях MADx
- Разобрали, почему тест на пищевую непереносимость необходим как врачам, так и пациентам
- Разобрали принципы и механизмы теста
- Поняли ключевые отличия теста FOX от конкурентов
- Рассмотрели клинический случай из практики, который подтверждает эффективность теста FOX на практике