

Lezione 15 Analisi Reale

Federico De Sisti

2025-04-16

0.1 Convergenze varie (alberto agostinelli)

Definizione 1 (Convergenza quasi uniforme)

$f_n \rightarrow f$ quasi uniformemente se $\forall \delta > 0 \exists F_\delta \subseteq X, F_\delta$ misurabile $\mu(F_\delta) < \delta$ tale che $\sup_{X \setminus F_\delta} |f_n - f| \rightarrow 0$ ($f_n \rightarrow f$ uniformemente in $X \setminus F_\delta$)

Proposizione 1

$f_n \rightarrow f$ quasi uniformemente $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \mu(\bigcup_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \varepsilon\}) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$

Dimostrazione

(\Rightarrow)

$\forall \delta > 0 \exists F_\delta \subset X, \mu(F_\delta) < \delta$ tale che, $f_n \rightarrow f$ uniformemente in $X \setminus F_\delta$

$\Leftrightarrow \forall \delta > 0 \exists F_\delta \subset X, \mu(F_\delta) < \delta$

tale che $\forall \varepsilon > 0 \exists k = k(\varepsilon, \delta) : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq k \quad \forall x \in X \setminus F_\delta$

$\Leftrightarrow \forall \delta > 0 \exists F_\delta \subset X, \mu(F_\delta) < \delta$ tale che $\forall \varepsilon > 0 \exists k = k(\delta, \varepsilon)$

$$X \setminus F_\delta \subseteq \bigcap_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| < \varepsilon\}.$$

$\Leftrightarrow \forall \delta > 0 \exists F_\delta \subset X \quad \mu(F_\delta) < \delta$

tale che $\forall \varepsilon > 0 \exists k = k(\varepsilon, \delta)$

$$\left(\bigcap_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| < \varepsilon\} \right)^c = \bigcup_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \varepsilon\} \subseteq F_\delta.$$

$\Rightarrow \forall \delta > 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists k = k(\delta, \varepsilon)$

$$\mu\left(\bigcup_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \varepsilon\}\right) < \delta \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \varepsilon\}\right) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0.$$

(\Leftarrow)

$\varepsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists k = k(\varepsilon, \delta)$ tale che

$$\mu\left(\bigcup_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \varepsilon\}\right) < \delta.$$

$\forall j \in \mathbb{N}$ per $\varepsilon = \frac{1}{j}$, $\delta = \frac{\nu}{2^j}, \nu > 0$ fissato

$\Rightarrow \exists k_j = k_j(j, \nu)$ tale che $\mu(\bigcup_{n=k_j}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \frac{1}{j}\}) < \frac{\nu}{2^j}$

$$\Rightarrow \mu\left(\bigcup_{j=1}^{+\infty} \bigcup_{n=k_j}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \frac{1}{j}\}\right) \leq \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\nu}{2^j} = \nu.$$

$x \in X \setminus F_\nu$ (dove F_ν è l'argomento della misura precedente)

$\Rightarrow x \in \bigcap_{j=1}^{+\infty} \bigcap_{n=k_j}^{+\infty} \{|f_n - f| < \frac{1}{j}\}$

$\Rightarrow \forall j \quad \exists k_j$ tale che $|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{j} \quad \forall n \geq k_j \Rightarrow \sup_{X \setminus F_\nu} |f_n - f| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

$0 \Rightarrow f_n \rightarrow f$ uniformemente su $X \setminus F_\nu$

Abbiamo caratterizzato la convergenza quasi uniforme con la misura dei sopralivelli $\forall \varepsilon > 0$

conseguenza:

$$f_n \rightarrow f \text{ q.u.} \Rightarrow \begin{cases} f_n \rightarrow f \text{ q.u.} \\ f_n \rightarrow f \text{ in misura} \end{cases}$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \mu \left(\bigcup_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \varepsilon\} \right) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0.$$

ma allora

$$0 = \lim_{k \rightarrow +\infty} \mu \left(\bigcup_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \varepsilon\} \right) = \mu \left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} \bigcup_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \varepsilon\} \right).$$

$$\forall k \quad \mu(\{|f_k - f| \geq \varepsilon\}) \leq \mu \left(\bigcup_{n=k}^{+\infty} \{|f_n - f| \geq \varepsilon\} \right) \rightarrow 0.$$

$\Rightarrow f_n \rightarrow f$ in misura

□

Teorema 1 (Egorov)

Sia (X, μ) spazio di misura finita ($\mu(X) < +\infty$)

Allora:

$$f_n \rightarrow f \text{ q.o.} \quad \Leftrightarrow \quad f_n \rightarrow f \text{ q.u..}$$

Teorema 2 (Vitali)

Sia (X, μ) uno spazio di misura finita e siano $f_n, f \in L^1(X)$ tale che $f_n \rightarrow f$ quasi ovunque

allora $f_n \rightarrow f$ in $L^1 \Leftrightarrow \{f_n\}$ equi-assolutamente integrabili

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tale che

$$\int_E |f_n| d\mu < \varepsilon \text{ se } E \in M \quad \forall n, \mu(E) < \delta.$$

Dimostrazione

(\Rightarrow) già visto

(\Leftarrow)

$f_n \rightarrow f$ quasi ovunque + $\mu(X) < +\infty$

\Rightarrow (per Egorov)

$\forall \delta > 0 \exists f_\delta \in M, \mu(F_\delta) < \delta$ tale che $f_n \rightarrow f$ uniformemente in $X \setminus f_\delta$

Sia $\varepsilon > 0$ fissato

\Rightarrow sia $\delta(\varepsilon)$ dato dall'ipotesi di equi-assoluta integrabilità

e sia $f_\delta \in M$ dato dal teorema di Egorov

$$\Rightarrow \int_X |f_n - f| d\mu = \int_{X \setminus F_\delta} |f_n - f| d\mu + \int_{F_\delta} |f_n - f| d\mu.$$

$$\leq \sup_{X \setminus F_\delta} |f_n - f| \mu(X \setminus F_\delta) + \int_{F_\delta} |f_n| d\mu + \int_{F_\delta} |f| d\mu.$$

$$\leq \left(\sup_{X \setminus F_\delta} |f_n - f| \right) \mu(X) + \varepsilon + \varepsilon \quad (\text{dato che } \mu(F_\delta) < \delta).$$

$$\Rightarrow \limsup_{n \rightarrow +\infty} \int_X |f_n - f| d\mu \leq 2\varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0.$$

$$\Rightarrow \int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

□

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\mathbb{R}, m)$

f continua $\Rightarrow f$ misurabile

f continua quasi ovunque $\Rightarrow f$ misurabile

MANCA UNA PARTE

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f \text{ è discontinua in } x\}.$$

$m\mu(D_f) = 0$ f è misurabile, infatti:

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad \{f > t\} = \{f > t\} \cap D_f \cup \{f > t\} \setminus D_f.$$

\Rightarrow ha misura nulla \Rightarrow è misurabile

$$x \in \{f > t\} \setminus D_f$$

$\lim_{y \rightarrow x} f(y) \Rightarrow f(x) > t$ e f è continua in X

$$\Rightarrow \exists \delta_x > 0 : f(y) > t \quad \forall y \in (x - \delta_x, x + \delta_x)$$

$$\Rightarrow \{f > t\} \setminus D_f = \bigcup_{x \in \{f > t\} \setminus D_f} (x - \delta_x, x + \delta_x) \setminus D_f = \bigcup_{x \in \{f > t\} \setminus D_f} (x - \delta_x, x + \delta_x) \cap D_f^c$$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

se $\exists g \in C(\mathbb{R})$

tale che $f = g$ quasi ovunque $\Rightarrow f$ misurabile

$$\exists N \subset \mathbb{R}, m(N) = 0$$

tale che $f = g$ in $\mathbb{R} \setminus N$

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad \{f > t\} = \{f > t\} \setminus N \cup \{f > t\} \cap N \text{ è misurabile}$$

$$f = \chi_Q = 0 \text{ quasi ovunque}$$

$$f = g \text{ quasi ovunque } \exists N, \mu(N) \quad f = g \text{ in } \mathbb{R} \setminus N$$

$$x \in \mathbb{R} \setminus N \quad \lim_{y \rightarrow x} f(y)$$

$f = \chi_{[0,1]}$ è continua quasi ovunque ma non può essere uguale quasi ovunque ad una funzione continua

Teorema 3

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ misurabile $\Rightarrow \forall \delta > 0 \quad \exists g_\delta \in C(\mathbb{R})$

tale che $m(\{f \neq g\}) < \delta$

e $\sup_{\mathbb{R}} |g_\delta| \leq \sup_{\mathbb{R}} |f|$