

4.3 Asymptotischer Vergleich

Link zur Formelsammlung: [FS_4.3 Asymptotischer Vergleich](#)

Landau-Symbole

$$a_n = O(b_n)$$

Bedeutet: „ a_n ist ein groß O von b_n , falls es eine Konstante $C > 0$ gibt, so dass gilt:

$$\left| \frac{a_n}{b_n} \right| \leq C \text{ für fast alle } n \in \mathbb{N}$$

$$a_n = o(b_n)$$

Bedeutet: „ a_n ist ein klein O von b_n , falls gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

$$a_n \sim b_n$$

Bedeutet: „ a_n ist asymptotisch gleich b_n , falls gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

"Obere, untere Schranke und asymptotisch gleich"

[Mathematik für Informatik, p.173](#)

Stichpunkte zur Performance-Analyse von Algorithmen

- **Folgen:** Anwendung in Performance-Analyse von Algorithmen (z.B. Laufzeit).
- **Algorithmen & Datenstrukturen:** Operieren auf Größe n (Beispiel: Sortieren von n Zahlen).
- a_n : Bezeichnet benötigte Laufzeit.
- **Laufzeit in Sekunden:** Nicht zweckmäßig (abhängig von Hardware/Implementierung).
- **Sinnvolles Maß (Komplexität):** Anzahl benötigter Operationen (elementare Schritte).
- **Analyse-Unterscheidung:**
 - **Average-Case:** a_n = mittlere Anzahl Operationen für Datensatzgröße n .
 - **Worst-Case:** a_n = maximale Anzahl Operationen für Datensatzgröße n .

Definition 4.62 (Landau-Symbole)

[Mathematik für Informatik, p.174](#)

Seien $(a_n)_{n \geq 0}$ und $(b_n)_{n \geq 0}$ Folgen. Dann schreibt man

(i) $a_n = O(b_n)$ für $n \rightarrow \infty$ (gesprochen: „ a_n ist ein groß O von b_n “), falls es eine Konstante $C > 0$ gibt, so dass

$$\left| \frac{a_n}{b_n} \right| \leq C \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

gilt,

(ii) $a_n = o(b_n)$ für $n \rightarrow \infty$ (gesprochen: „ a_n ist ein klein O von b_n “), falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = 0$ gilt.

(iii) $a_n \sim b_n$ (gesprochen: „ a_n ist asymptotisch gleich b_n “), falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = 1$ gilt.

(iv) $a_n = \Omega(b_n)$ für $n \rightarrow \infty$ (gesprochen: „ a_n ist Omega von b_n “), falls es eine Konstante $C > 0$ gibt, so dass



$$\left| \frac{b_n}{a_n} \right| \leq C \text{ für fast alle } n \in \mathbb{N}$$

gilt. **Weiter gilt:** $a_n = \Omega(b_n)$ genau dann, wenn $b_n = O(a_n)$.

(v) $a_n = \Theta(b_n)$ für $n \rightarrow \infty$ (gesprochen: „ a_n ist Theta von b_n “), falls es positive Konstanten C_1 und C_2 gibt, so dass

$$C_1|b_n| \leq |a_n| \leq C_2|b_n| \text{ für fast alle } n \in \mathbb{N}$$

gilt, d.h. $a_n = \Theta(b_n)$ genau dann, wenn sowohl $a_n = O(b_n)$ als auch $a_n = \Omega(b_n)$ zutrifft.



Das ist nicht nur in Ana wichtig sondern auch in [AD_02_AlgorithmenAnalyse.pdf](#)

Quellen:

- [Mathematik für Informatik](#);
- [4. Folgen Reihen und Funktionen](#)