

Dos:

Satu dos (satu ampul) untuk setiap kali. Sekiranya tiada sebarang reaksi pada usus bermula selepas setengah jam, dos lain hendaklah diberi.

Cara penggunaan:

Buka penutup, masukkan hujung mulut ke dalam dubur dan tekan untuk mengeluarkan kandungannya dari ampul. Hanya untuk kegunaan orang dewasa dan kanak-kanak melebihi 6 tahun dengan jangkaan parasit di dalam usus. Kegunaan enema secara paksaan boleh menyebabkan kecederaan.

Perhatian:

Perlu digunakan dengan berhati-hati pada pesakit dengan masalah fungsi renal serta pesakit yang mengambil penghalang saluran kalsium, diuretik atau ubat-ubatan lain yang mengganggu tahap elektrolit. Penggunaan berterusan mungkin menyebabkan ketagihan.

Kesan sampingan:

Kerengsaan pada gastrousus dan bahagian dubur.

Penyimpanan:

Simpan di tempat yang kering (di bawah 30°C).
Jauhi dari kanak-kanak.

Kuantiti Pembungkusan:

Ampul plastik yang mengandungi 20ml per ampul.
20ml x 2 ampul
20ml x 10 ampul

Nombor Pendaftaran :

MAL19910319X

Maklumat lanjut boleh diperolehi daripada doktor atau ahli farmasi.

ROYCE®

Pemegang Pendaftaran/ Pengilang:

ROYCE PHARMA MFG. SDN.BHD. (650435-X)
PT 1663, Nilai Industrial Estate,
71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

ROYCE®**ROYCE ENEMA****Presentation:**

A clear, colourless liquid.

Content:

Each ml contains:
Glycerin 25% w/v and Sodium Chloride 15% w/v

Pharmacological information:

Glycerin is readily absorbed from the intestine and is metabolized to carbon dioxide and glycogen or is used in the synthesis of body fats.

Sodium chloride is readily absorbed from the gastrointestinal tract. It is present in all the body fluids and is mainly found in the extra cellular fluid. The amount of sodium chloride lost in sweat is small and the osmotic equilibrium is maintained by the excretion of surplus amounts in the urine.

When glycerin is given by rectal injection or in suppositories it promotes peristalsis and evacuation of the bowel by virtue of its irritant action.

Sodium chloride is the principal salt involved in maintaining the osmotic tension of the blood and fluid, changes in the osmotic tension influence the movement of fluids and suffusion of salts in cellular tissues.

Indication:

For the treatment of constipation.

Dosage and Administration:

For rectal use only.

Dose:

One dose (an ampoule) to be administered each time. If bowel movement does not commence after half an hour, another dose to be administered.

Method of administration:

Remove the stopper, insert the tip into the rectum and press out the content. Only for use in adults and children above six years with intestinal parasitic disease. Discontinue use if resistance is encountered. Forcing the enema can result in injury.

Precaution:

Should be administered carefully to the patient with impaired renal function and patients on calcium channel blockers, diuretics, or other medicine which may affect electrolyte levels. Prolonged use of laxative may result in dependence.

Adverse Effects:

Rare gastro intestinal irritation, and irritation near the rectum.

Storage:

Store in a dry place (below 30°C).
Keep out of reach of children.

Package quantities:

Plastic ampoules containing 20ml per ampoule.
20ml x 2 ampoules
20ml x 10 ampoules

Product Registration No:

MAL19910319X

Further information can be obtained from your doctor or pharmacist.



Product Holder / Manufactured by:

ROYCE PHARMA MFG. SDN.BHD. (650435-X)
PT 1663, Nilai Industrial Estate,
71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

RPI 0058-5
100317

ROYCE®

ROYCE ENEMA

Bentuk Persembahan:

Sejenis cecair jernih dan jernih.

Kandungan:

Setiap ml mengandungi:
Glycerin 25% w/v dan Sodium Chloride 15% w/v

Maklumat farmakologi:

Glycerin diserap daripada usus dan dimetabolismekan kepada karbon dioksida dan glikogen ataupun digunakan di dalam sintesis lemak badan.

Natrium klorida diserap daripada saluran gastrousus. Ia terdapat di dalam semua cecair badan terutamanya dalam cecair ekstraselular. Kuantiti yang hilang melalui peluh adalah sedikit dan keseimbangan osmatik dikekalkan melalui pembuangan kuantiti berlebihan melalui air kencing.

Apabila gliserin diberi melalui injeksi atau dalam bentuk solid melalui rektum ia menggalakkan peristalsis dan meningkatkan pergerakan usus disebabkan oleh tindakan agen perengsa.

Natrium klorida adalah garam utama yang terlibat dalam mengekalkan ketegangan osmosis darah dan cecair, perubahan dalam ketegangan osmosis mempengaruhi pergerakan cecair dan penyerapan garam dalam tisu selular.

Indikasi:

Untuk rawatan sembelit.

Dos dan cara penggunaan:

Untuk kegunaan rektum sahaja.