

Menzza

CREAM • 軟膏 • Krim



FOR RELIEF OF JOINT AND
MUSCULAR PAINS



適用於肌肉及關節酸痛



MELEGAKAN SAKIT-SAKIT
SENDI DAN OTOT



痛必少 軟膏

产品描述:

具有menthol 特有气味的白色膏状。

有效成分的名称和强度:

Methyl Salicylate 25% w/w and Menthol 5% w/w。

药动学

外用menthol能使皮肤毛细血管扩张，瞬间产生冰凉舒适感，达到镇痛的作用。内服的menthol与 glucuronide形成结合物，通过尿液和胆汁排出体外，不同的menthol立体异构体与 glucuronic acid缓合的程度也不同。Menthol可从pulegium油分离，以pulgone代谢物的形式存在。Methyl salicylate渗透皮肤的速度不及口服快，分量也相对较少，在体内也容易被水解成salicylic acid。

主治

痛必少软膏有效舒缓肌肉和关节酸胀、拉伤、扭伤，并减轻风湿性关节炎所带来的疼痛，亦可用于缓解肌肉骨骼酸痛。

使用禁忌

婴幼儿不宜使用。对本品所含成分过敏者禁用。

不良反应

部分过敏体质人士使用含有menthol成分的产品会引起接触性皮炎，亦有人对methyl salicylate产生过敏反应。

误食应急措施

若误食，先以盐水洗胃，再将30克sodium sulphate溶解于250毫升开水作为导泻剂饮用。痉挛可给予短效 barbiturate，如thiopentone或diazepam控制。约30毫升的methyl salicylate足以致命，对幼童低至4毫升的剂量便可致死。尿碱化药可加速salicylic acid从尿液排出。肠胃受刺激的状况可饮用牛奶暂时缓解。

药物相互作用

不详。

注意事项

只供外用，避免与伤口和眼睛接触。

请保存在儿童不能触及的地方。

本产品含methyl salicylate，可渗透皮肤，并通过皮肤进入血液被吸收。对服用warfarin抗凝药的患者，过量使用可能会增加出血的风险。

孕妇及哺乳期妇女用药

- 此产品不适合用于两岁以下孩童使用，两岁以上孩童需谨慎使用。
- 孕妇或哺乳期不可使用。
- 如正在服食warfarin者，在使用此产品前请咨询医生。

用于外敷而已

建议用量

取适量痛必少软膏涂于患处，稍加按摩至吸收即可。每日可使用2-3次。不需用力揉搓。婴幼儿不宜使用。

包装

15克、25克和50克软管包装。

存放

请保存在儿童不能触及的地方。存放在低于摄氏30度的阴凉干燥处，避免阳光直射。

保质期：3年。

制造厂商

HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD.

Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6, Bandar Sultan Suleiman, 42000 Port Klang, Selangor, MALAYSIA.

修订日期: May 2020



Menzza CREAM

PRODUCT DESCRIPTION:

A white cream with a characteristic odour of menthol.

NAME AND STRENGTH OF ACTIVE SUBSTANCE:

Methyl Salicylate 25% w/w and Menthol 5% w/w"

PHARMACODYNAMICS

Methyl Salicylate has an analgesic and anti-inflammatory actions of salicylates. Menthol, applied to the skin, dilates the vessels, causing a sensation of coldness followed by an analgesic effect.

PHARMACOKINETICS

Applied to the skin, menthol dilates the blood vessels causing a sensation of coldness followed by an analgesic effect. Ingested, menthol is excreted in the bile and urine as a glucuronide conjugate; the various stereoisomers differ quantitatively in the extent to which they conjugate with glucuronic acid. Menthol may occur in the conjugated form as a metabolite of pulagone which is a constituent of pulegium oil. Methyl Salicylate is poorly absorbed through intact skin. It is completely hydrolysed to salicylic acid.

INDICATIONS

Menza Cream is indicated for the relief of joint and muscular pains, sprains and strains as well as pain associated with rheumatism and arthritis. Menzza Cream is also suitable for the temporary relief of pain associated with musculoskeletal soreness and discomfort.

CONTRAINDICATIONS

This preparation should not be used on infants and is contraindicated in those with known hypersensitivity to any component in the formulation.

ADVERSE EFFECTS

Menthol may give rise to hypersensitivity reactions in some individuals including contact dermatitis. Sensitivity to methyl salicylate have been recorded in certain individuals.

SYMPTOMS AND TREATMENT OF OVERDOSE

If swallowed,empty the stomach by lavage and aspiration.Give saline purgative,such as sodium sulphate,30g in 250ml of water.Convulsions may be controlled with a short-acting barbiturate such as thiopentone sodium or by diazepam.About 30ml of methyl salicylate may be fatal but doses of as little as 4ml have caused death in infants. Excretion of salicylates is increased by alkalizing the urine and giving copious fluids. Milk helps decrease any gastrointestinal irritation.

DRUG INTERACTION

Unknown.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

For external use only. Do not apply on wounds or near eyes. Keep out of reach of children.

This product contains methyl salicylate and when applied or rubbed on to the skin, can be absorbed through the skin into the blood.For patients taking warfarin,excessive application on to the skin for muscle or joint pains may increase the chances of bleeding.

PREGNANCY & LACTATION

- This product should not be used in children under 2 years of age. Use with caution in older children.
- Do not use during pregnancy or when breastfeeding.
- If you are taking warfarin, please consult your doctor before using this product.

Route of administration: Topical

RECOMMENDED DOSAGE

Apply small quantity of Menzza Cream onto the affected areas and massage until absorbed in to the skin. Repeat 2-3 times a day.Vigorous rubbing is not required.

Menza Cream is not suitable to be used on young infants.

PACKING

Aluminium tubes of 15g, 25g and 50g.

STORAGE

Keep out of reach of children. Store below 30°C. Protect from strong light.

Recommended shelf-life: 3 years.

Manufactured by:

HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD.

Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6, Bandar Sultan Suleiman, 42000 Port Klang, Selangor, MALAYSIA.

Revision date: May 2020

Menzza Krim

DESKRIPSI PRODUK:

Krim berwarna putih dengan bau menthol.

NAMA DAN KEKUATAN BAHAN AKTIF:

Methyl Salicylate 25% w/w dan Menthol 5% w/w.

FARMAKODINAMIK

Methyl salisilat adalah analgesik dan mempunyai tindakan anti-radang salisilat. Menthol yang digunakan untuk kulit, mengembangkan saluran darah, menyebabkan rasa sejuk diikuti dengan kesan analgesik.

FARMAKOKINETIK

Digunakan pada kulit, menthol mengembangkan saluran darah, menyebabkan rasa sejuk diikuti dengan kesan analgesik. Penghadaman, menthol dikumuhkan dalam hempedu dan air kencing sebagai konjugat glucuronide; pelbagai stereoisomer yang berbeza secara kuantitatif dalam melakukan konjugat dengan asid glucuronic. Menthol boleh terhasil dalam bentuk konjugat sebagai metabolit pulagone yang merupakan bahan daripada pulegium oil. Methy salisilat kurang diserap melalui kulit; diserap selepas pengambilan oral. Ia benar-benar dihidrolisis kepada asid salisilik.

KEGUNAAN

Krim Menzza diindikasikan untuk melegakan sakit-sakit sendi dan otot, terkehel dan tergeliat dan juga sakit yang dikaitkan dengan reumatisma dan artritis. Krim Menzza adalah juga sesuai untuk memberikan kelegaan sementara untuk sakit otot dan tulang.

KONTRAINDIKASI

Persediaan ini tidak sewajarnya digunakan pada bayi dan dikontraindikasikan pada mereka yang menunjukkan hipersensitiviti terhadap sebarang komponen dalam formulasi ini.

KESAN BERLAWANAN

Menthol boleh meningkatkan reaksi hipersensitiviti pada sesetengah individu termasuk dermatitis kontak. Kesensitifan terhadap metil salisilat telah dikaitkan di dalam individu tertentu.

GEJALA DAN RAWATAN JIKA DOS BERLEBIHAN

Jika tertelan, kosongkan perut dengan lavage dan aspirasi. Beri pencahar masin, seperti natrium sulfat, 30g dalam 250ml air. Sawan boleh dikawal dengan barbiturate yang bertindak pantas seperti natrium thiopentone atau dengan diazepam. 30ml metil salisilat boleh membawa maut tetapi dos serendah 4ml boleh menyebabkan kematian di kalangan bayi. Perkumuhan salisilat meningkat jika mengalkalikan air kencing dan pemberian cecair yang banyak. Susu membantu mengurangkan apa-apa kerengsaan gastrousus.

INTERAKSI

Tidak diketahui.

LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN AMARAN

Untuk kegunaan luar sahaja. Jangan sapu pada luka atau dekat mata. Jauhkan daripada kanak-kanak.

Produk ini mengandungi metil salisilat dan apabila diaplikasi atau digosok pada kulit, boleh diserap ke dalam darah. Pesakit yang mengambil warfarin mungkin berisiko mengalami pendarahan jika diaplikasi untuk sengal otot atau sendi secara berlebihan pada kulit.

KEHAMILAN DAN PENYUSUAN BADAN

- Produk ini tidak sesuai untuk kanak-kanak dibawah umur 2 tahun dan perhatian hendaklah diberikan kepada kanak-kanak berumur 2 tahun keatas bila menggunakannya.
- Jangan digunakan ketika hamil atau semasa menyusukan bayi.
- Jika anda mengambil warfarin, sila dapatkan nasihat doktor anda sebelum menggunakan produk ini.

Untuk kegunaan topikal sahaja.

DOS YANG DISYORKAN

Palit sedikit Krim Menzza pada kawasan yang sakit sehingga menyerap ke dalam kulit. Ulangi 2-3 kali sehari. Tidak perlu menggosok dengan kuat.

Krim Menzza tidak sesuai digunakan pada kanak-kanak kecil.

PEMBUNGKUSAN

Tiub aluminium 15g, 25g dan 50g.

PENYIMPANAN

Jauhi daripada kanak-kanak. Simpan dibawah 30°C. Lindungi dari cahaya yang kuat.

Hayat simpanan yang dicadangkan: 3 tahun.

Dikilangkan oleh:

HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD.

Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6, Bandar Sultan Suleiman, 42000 Port Klang, Selangor, MALAYSIA.

TARIKH KEMASKINI: Mei 2020