



MINYAK URUT YUEN NAM PAT YOK YU

雲南
白藥油

Minyak berwarna hijau dengan bau yang tersendiri.

INDIKASI :

Untuk melegakan kesakitan pada otot dan sendi yang berkaitan dengan sakit reumatik.

DOSE / USE INSTRUCTION :

Gosok di tempat yang sakit tidak melebihi 3 hingga 4 kali sehari.

CONTRA - INDICATION :

Persediaan ini mengandungi camphor dan berkontraindikasi bagi bayi berumur 2 tahun ke bawah.

Juga kontraindikasikan kepada pengguna yang hipersensitif kepada methyl salicylate dan menthol.

WARNING / PRECAUTIONS :

Kesan sensitif kulit mungkin berlaku. Jangan sapu ke atas luka atau kulit yang rosak.

If condition worsens, or if symptoms persist for more than 7 days or clear up and occur again within a few days, discontinue use of this product and consult a doctor.

Produk ini mengandungi metil salisiklat dan apabila digosok ke atas kulit, ada kemungkinan diserap ke dalam darah melalui kulit. Bagi pesakit yang menggunakan warfarin, kegunaannya yang terlebih ke atas kulit untuk sakit otot dan sendi mungkin menambah kejadian berdarah.

Do not bandage tightly.

Perhatian juga patut diambil semasa digunakan oleh kanak-kanak yang lebih besar. Adalah berbahaya menyapu persediaan yang mengandungi camphor ke dalam lubang hidung kanak-kanak. Ini mungkin mengakibatkan pengsan serta-merta apabila amalan sedikit digunakan.

DRUG INTERACTION : Warfarin

SIDE EFFECTS / ADVERSE REACTION :

Skin irritation, redness or swelling, burning or stinging sensation. Adverse reaction is rare, symptom of dizziness, nausea may occur.

SIGN AND SYMPTOMS OF OVERDOSE AND TREATMENT :

Mild chronic salicylate intoxication, or salicylism, usually occurs only after repeated use of large doses. Salicylism can also occur following excessive topical application of salicylates. Symptoms include dizziness, tinnitus, deafness, sweating, nausea and vomiting, headache, and confusion, and may be controlled by reducing the dosage.

PENYIMPANAN :

Simpan bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya. Jauhkan daripada kanak-kanak.

Tarikh luput : 3 tahun dari tarikh pengeluaran.

Pack Size: 60ml

适应症 :

解除有关风湿所引起的肌肉及关节痛。

用法、用量 :

只限外用。涂擦患处，每日三至四次。

贮藏 :

置于 30°C 以下。避免阳光直接照射。远离儿童。

关于警戒及其他事项，请详读说明书。

CAN CAUSE CONVULSION

Contraindicated in infants under 2 year of age.

Caution must be exercised when older children are treated.

Avoid direct application into the nostril.

NOT TO BE TAKEN. TIDAK BOLEH DIMAKAN.

UNTUK KEGUNAAN LUAR SAHAJA.

FOR EXTERNAL USE ONLY.

外用忌食

Methyl Salicylate ... 56.0 % w/v

Menthol 10.0 % w/v

Camphor 3.0 % w/v

MAL 05121199 X

Manufactured by Product Registration Holder:

Wellmetech Pharmaceutical Industries Sdn Bhd

Lot 8058, Kota Samarahan Industrial Park,

94300 Samarahan, Sarawak

Diedarkan oleh :

EYH FONG TRADING

No. 81, Laluan Rokam 13, Pekan Razaki,

31350 Ipoh, Perak.