

TORCH BRAND QIAN LI ZUI FONG U

Description: A clear reddish oil with a strong, characteristic aromatic odour.

Formula: Each bottle of medicated oil contains:

Active Ingredients:

Methyl salicylate	60% w/w
Peppermint oil	25% w/w
Camphor	5% w/w

Excipients:

White oil	10% w/w
Soluble colorant red	0.01% w/w
Soluble colorant green	0.01% w/w

Indication: For the symptomatic relief of minor aches and pains of muscles and joints associated with simple backache, sprains, sciatica and lumbago.

Direction for use: Apply and rub gently on to the affected area 3 to 4 times daily.

Action: A medicated oil with a strong, persistent characteristic aromatic odour having counter-irritant, rubefacient and analgesic actions.

Warning/Precaution: This product contains camphor which can cause convulsion. Do not apply to open wounds. Avoid contact with the eyes. Do not use for children below 2 years old. Caution must be exercised when older children are treated. If symptoms persist please consult a doctor. It is dangerous to place any camphor containing product into the nostrils of children. A small amount applied in this way may cause immediate collapse. Keep medicines out of reach of children.

This product contains methyl salicylate and when applied or rub on to the skin can be absorbed through the skin into the blood. For patients taking warfarin, excessive application on to the skin for muscle or joint pains may increase the chances of bleeding.

Drug Interaction: Warfarin

Contraindication: People who are allergic to the product or any of the ingredients.

Use in pregnancy: Safety for use in pregnancy has not been established therefore the potential benefit of the product should be weighed against the possible risks to the mother and child.

Side effects/Adverse reactions: Skin irritation, redness or swelling, burning or stinging sensation. Adverse reaction is rare, symptom of dizziness, nausea may occur.

Signs and symptoms of overdose and treatment: Mild chronic salicylate intoxication or salicylism, usually occurs only after repeated use of large doses. Salicylism can also occur following excessive topical application of salicylates. Symptoms include dizziness, tinnitus, deafness, sweating, nausea and vomiting, headache and confusion and may be controlled by reducing the dosage.

Storage condition: Store in a dry place below 30°C.

Shelf-life: 4 years from the date of manufacture.

Pack size: 60 ml glass bottles.

Revision Date: 5/4/2024

Manufactured and distributed by: MAL 08061686X

Syarikat Safety Medical

No. 48-2 & 50-2, Jalan 13/34A,
Kepong Entrepreneur's Park,
52100 Kuala Lumpur, MALAYSIA.

Tel: 603-6251 7926 Fax: 603-6257 6926

FOR EXTERNAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
NOT TO BE TAKEN ORALLY

CAP API QIAN LI ZUI FONG U

Deskripsi: Sejenis minyak berwarna merah muda yang jernih dan mempunyai ciri-ciri berbau aromatik yang kuat.

Formula: Setiap botol minyak berubat mengandungi:

Bahan Aktif:

Methyl salicylate	60% w/w
Peppermint oil	25% w/w
Camphor	5% w/w

Eksipien:

White oil	10% w/w
Soluble colorant red	0.01% w/w
Soluble colorant green	0.01% w/w

Indikasi/Kegunaan: Melegakan sakit otot dan sendi, sakit reumatik, sakit belakang, lebam, terseliuh dan sakit pinggang (lumbago).

Arahan Penggunaan: Sapu dan urut dengan perlahan-lahan pada bahagian yang berkenaan mengikut keperluan 3 hingga 4 kali sehari.

Kesan Tindakan: Sejenis minyak berubat yang mempunyai ciri-ciri berbau aromatik kuat dan bertindak sebagai counter-irritant, rubefacient dan analgesik.

Amaran/Perhatian: Produk ini mengandungi kamfor yang boleh menyebabkan kekejangan. Tidak boleh disapu pada luka terbuka. Elakkan dari kontak dengan mata. Dilarang untuk kegunaan pada kanak-kanak berumur kurang dari 2 tahun. Berhati-hati ketika digunakan untuk merawat kanak-kanak tua. Jika penyakit berlarutan dapatkan nasihat doktor. Adalah berbahaya sekiranya produk yang mengandungi kamfor digunakan terus ke dalam lubang hidung kanak-kanak. Kuantiti kecil yang digunakan dengan cara ini boleh menyebabkan rebah dengan serta-merta (immediate collapse). Jauhi daripada kanak-kanak.

Produk ini mengandungi methyl salicylate dan bila disapu pada kulit, ia mungkin diserap melalui kulit ke dalam saluran darah. Bagi pesakit yang mengambil warfarin, penyapuan yang berlebihan pada kulit untuk sakit otot atau sendi akan menambahkan kemungkinan berdarah.

Interaksi ubatan: Warfarin

Kontraindikasi: Orang yang sensitif pada produk atau pada sebarang bahan-bahan produk.

Kegunaan semasa hamil: Keselamatan penggunaan produk ini semasa hamil masih belum dibuktikan, maka kebaikan penggunaannya harus dipertimbangkan dengan kemungkinan risiko terhadap ibu yang hamil dan anaknya.

Kesan sampingan/Reaksi advers: Kulit perangsangan, kemerahan atau bengkak, perasaan melecur atau menyengat. Reaksi advers jarang berlaku, gejala seperti kepala pusing dan mual boleh berlaku.

Tanda-tanda dan gejala-gejala lebih dos dan rawatannya: Keracunan salicylate ringan atau salicylism biasanya terjadi hanya setelah penggunaan terus-menerus dalam dos besar. Salicylism juga dapat timbul setelah penggunaan salicylate secara topika yang berlebihan. Gejala-gejala seperti kepala pusing, bengap, pekak, berpeluh, mual dan mumtah, kepala sakit serta kekeliruan otak mungkin boleh dikawal dengan mengurangi dosnya.

Kedaaan Penyimpanan: Simpan di tempat yang kering dibawah 30°C.

Jangkahayat: 4 tahun dari tarikh dikilang.

Saiz Bungkus: 60 ml botol kaca.

Tarikh Semakan: 5/4/2024

Dikilang dan diedarkan oleh:

Syarikat Safety Medical

No. 48-2 & 50-2, Jalan 13/34A,
Kepong Entrepreneur's Park,
52100 Kuala Lumpur, MALAYSIA.

Tel: 603-6251 7926 Fax: 603-6257 6926

MAL 08061686X

UNTUK KEGUNAAN LUAR SAHAJA
JAUHKAN DARI PADA KANAK-KANAK
JANGAN DIMAKAN

火炬标千里追风油

描述: 带香, 浅红色精油。

药方: 每瓶含:	甲醇水杨酸	60% w/w
	薄荷油	25% w/w
	樟脑	5% w/w
	液体石蜡	10% w/w
	油溶性红色粉	0.01% w/w
	油溶性青色粉	0.01% w/w

功效: 轻微疼痛, 肌肉酸痛, 筋骨抽筋麻痹, 腰酸背痛, 四肢寒冷, 跌伤瘀肿, 驱风止痛, 风湿肿痛, 手脚酸软。

使用说明: 于痛处每天涂抹3至4次。

功用: 含药性精油, 不刺激, 以血液循环使皮肤变红, 含镇静效果。

警告/防范措施: 此产品包含樟脑, 可造成抽风。请勿涂抹于伤口上。请勿接触眼睛。2岁以下儿童不得使用。当使用于较大儿童时, 请小心。如症状维持, 请咨询医生。把含有樟脑的物品用于儿童鼻孔内会造成危险。就算小量也会造成立即晕倒。

Drug interaction: Warfarin

禁止症候: 对此产品或其中成份敏感之人。

怀孕中使用: 此产品暂未肯定适用于孕妇。

副作用: 皮肤过敏、红肿、火烧或刺痛感觉。

有害反应: 鲜少产生有害反应。可造成晕眩或呕吐。产品含有的甲醇水杨酸可被皮肤吸收至血液里。服用warfarin的病人因筋骨疼痛而过多使用时会增加流血的机会。

药剂过量之症状: 此产品会造成轻微敏感或红斑, 但这都是预料中事。精油虽造成皮肤变红但不会刺激。

储存地点: 储于30摄氏以下的阴凉地方。

有效期限: 从制造日期起, 4年。

包装: 60毫升瓶装。

修钉日期: 5/4/2024

制作与分发:

Syarikat Safety Medical,
No. 48-2 & 50-2, Jalan 13/34A,
Kepong Entrepreneur's Park,
52100 Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Tel: 603-62517926
Fax: 603-62576926

MAL 08061686X

外用忌食
小心儿童